

Mini-glosario (Las unidades dadas son las más usadas, se pueden usar otras del mismo tipo)

cte: Constante. Puede ser cualquier número, pero NO varía con el tiempo.

MRU (Movimiento rectilíneo uniforme): un objeto se desplaza en línea recta sin aceleración (velocidad constante).

MRUV (Movimiento rectilíneo uniforme variado): un objeto se desplaza en línea recta con aceleración constante (la velocidad varía linealmente, la posición de manera cuadrática).

F : fuerza, sus unidades son Newton (N). $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

m : masa, sus unidades son kilogramos (kg).

$x(t)$: posición en función del tiempo, sus unidades son metros (m).

v : velocidad, sus unidades son metros dividido segundos (m/s).

$v(t)$: velocidad en función del tiempo.

a : aceleración, sus unidades son metros dividido segundos al cuadrado (m/s^2).

t : tiempo. Se suele empezar en 0.

x_0 : posición inicial con respecto a un punto cuando $t = 0$. Es constante.

v_0 : velocidad inicial, cuando $t = 0$. Es constante.

Segunda ley de Newton:

$$F = m \cdot a$$

MRU:

$$a = 0$$

$$v = \text{cte}$$

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

MRUV:

$$a = \text{cte}$$

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

Trabajo

Suele representarse como W (de work) o con T . También suele aparecer como L . Sus unidades son Joules $J = N \cdot m$. El trabajo que realiza un cuerpo al desplazarse mientras se le aplica una fuerza es igual a la fuerza aplicada multiplicado por la distancia (d) que recorrió bajo la acción de esa fuerza:

$$W = F \cdot d$$

En caso que la fuerza sea aplicado en la dirección del desplazamiento, el trabajo es positivo, sino es negativo.

Energía

La energía de un cuerpo es la capacidad de realizar trabajo que tiene. Se ven 3 tipos de energía en general: potencial gravitatoria, cinética y mecánica. Al igual que el trabajo, se mide en Joules J .

Energía cinética

Es la energía relacionada con el movimiento. Depende de la velocidad v y de la masa m . Su fórmula es:

$$E_C = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Energía potencial gravitatoria

Es la energía relacionada con la gravedad. Cuanto más altura tenga el objeto, más será su energía potencial gravitatoria. Su fórmula es:

$$E_P = m \cdot g \cdot h$$

Energía potencial elástica

Es la energía relacionada los resortes o la elasticidad de un objeto. Cuanto más estirado o comprimido esté el objeto, mayor será su energía almacenada. Su fórmula es (siendo l la distancia frente a la longitud natural del resorte):

$$E_E = \frac{1}{2} \cdot k \cdot l^2$$

Energía mecánica

Es la suma entre la energía cinética y las energías potenciales que tiene un cuerpo. Se puede pensar como la energía "total" del cuerpo. Su fórmula es:

$$E_M = E_C + E_G + E_E$$

MCU:

Movimiento Circular Uniforme, es un movimiento en el cual un objeto describe una trayectoria circular, en el cual el tiempo que tarda en dar una vuelta es constante (no hay aceleración tangencial).

Se trabajará con las siguientes magnitudes: el período T , es cuánto se tarda en dar una vuelta. La frecuencia f es cuántas vueltas se dan en un determinado tiempo. la velocidad angular ω es cuántos grados o radianes se recorren por unidad de tiempo. La velocidad tangencial v es cuántos metros se recorren por unidad de tiempo (es análoga a la velocidad de MRU o MRUV). La aceleración centrípeta a_c es la aceleración que se encarga de modificar la dirección de la velocidad, pero no su módulo.

$$T = \frac{1}{f} \quad v = \omega \cdot r \quad \omega = 2\pi \cdot f \quad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r \quad \theta(t) = \theta_0 + \omega \cdot t$$

MUV:

Movimiento circular uniformemente variado. Además de una aceleración centrípeta, hay una aceleración tangencial constante.

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$$

Cantidad de movimiento

La cantidad de movimiento está definido como $p = m \cdot v$. El impulso es igual a la cantida dde movimiento y está definido como $I = F \cdot \Delta t$. Es decir, $p = I = \int F dt$.

Análisis de gráficos

Teniendo la gráfica de $v(t)$ (Velocidad en función del tiempo), para averiguar la aceleración en un tramo elegís un punto inicial y uno final. Cada punto tiene una componente X y una componente Y (El subíndice f significa final, el subíndice i significa inicial). La aceleración la calculás como:

$$a = \frac{Y_f - Y_i}{X_f - X_i}$$

Teniendo el mismo gráfico de $v(t)$, la distancia recorrida en cada tramo es el área del tramo (Los cuadrados, triángulos y cuadriláteros que vimos)

Geometría:

El área de un rectángulo es base por altura. El área de un triángulo es base por altura dividido 2. El área de un cuadrilátero la calculás partiendo el cuadrilátero en un cuadrado y un triángulo y sumando el área de ambos.

Mini repaso de matemática:

$$(A \cdot B)^2 = A^2 \cdot B^2$$

$$\left(\frac{A}{B}\right)^2 = \frac{A^2}{B^2}$$

$$\sqrt{A \cdot B} = \sqrt{A} \cdot \sqrt{B}$$

$$\sqrt{\left(\frac{A}{B}\right)} = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}$$

Fuerzas paralelas y colineales

Regla de Stevin: $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$. La distancia entre ambas fuerzas es d , y d_n es la distancia hasta la posición de la resultante. Las distancias y las fuerzas se ponen con signo positivo, siempre. El valor de la fuerza resultante es la suma de ambas. Si ambas tienen mismo sentido, la resultante estará entre ambas; si tienen sentido opuesto la resultante estará por fuera de ambas.

Campo gravitatorio

$$F = \frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

La constante de gravitación universal es $G = 6,67 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$

Campo eléctrico

La fórmula de campo eléctrica generado por una carga puntual q_1 es:

$$E = \frac{k \cdot q_1}{d^2}$$

La fuerza ejercida sobre una carga q_2 será:

$$F = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{d^2} = E \cdot q_2$$

La constante de Coulomb $k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$

Unidades

$$t : \text{s}$$

$$x : \text{m}$$

$$v : \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$a : \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$m : \text{kg}$$

$$F : \text{N} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$E : \text{J} = \text{N} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$P : \text{W} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{\text{s}} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^3}$$

$$P : \text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}}$$

Kilogramo fuerza y Newton:

$$\text{N} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\text{kgf} = 9,8 \text{ N} = 9,8 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Área:milímetro cúbico (mm^2)centímetro cúbico (cm^2)decímetro cúbico (dm^2)metro cúbico (m^2)decámetro cúbico (dam^2)hectómetro cúbico (hm^2)kilómetro cúbico (km^2)**Volumen:**milímetro cúbico (mm^3)centímetro cúbico (cm^3)decímetro cúbico (dm^3)metro cúbico (m^3)decámetro cúbico (dam^3)hectómetro cúbico (hm^3)kilómetro cúbico (km^3)**Masa:**miligramo (mg)centigramo (cg)decagramo (dg)gramo (g)decagramo (dag)hectogramo (hg)kilogramo (kg)**Engranajes**

Si están en un mismo eje, la frecuencia angular ω es constante. Si están en contacto o enlazados por una cadena, las velocidades tangenciales v_t son iguales.

Ejercicios MRU:

- 1) Una persona corre a una velocidad constante de 10 km/h. ¿Cuánto tarda en alejarse 5 km?
 - 2) Un nene corre a una velocidad constante de 8 km/h. ¿Cuánto tarda en alejarse 400 m? Expresar la respuesta en horas y en minutos.
 - 3) Un auto se mueve a una velocidad constante de 50 km/h. Sale desde el kilómetro 20 de una ruta. ¿Cuánto tarda en llegar al kilómetro 120 de esa ruta? ¿Qué distancia recorrió?
 - 4) Una chica empieza a andar en patineta a 15 km/h. Está a 1 kilómetro de un poste (alejándose del poste) ¿Qué tan lejos del poste va a estar luego de 2 horas?
 - 5) Una chica está por escalar una palestra. La altura de la palestra es de 20 metros. Si sube con una velocidad de 2 metros por segundo (m/s), ¿cuánto tarda en escalarla?
 - 6) Un ciclista se mueve a 20 km/h. Luego de 5 horas se cansa, y se empieza a mover a 15 km/h. ¿Qué distancia recorre hasta cansarse? ¿Qué distancia recorre en 2 horas? ¿Qué distancia recorre en 8 horas? ¿Cuánto tarda en recorrer 160 km?
 - 7) Un auto parte del kilómetro 80 de una ruta a una velocidad constante de 100 km/h. Otro auto parte del kilómetro 20 de la misma ruta a una velocidad de 120 km/h. ¿En qué kilómetro se encuentran? ¿Cuánto tiempo pasa desde que salen hasta que se encuentran?
 - 8) Está Jerry huyendo a 20m/s constantes de Tom, quien está 20m adelante suyo. Tom lo persigue a 30m/s constantes. ¿Cuánto tarda Tom en alcanzarlo? A qué distancia de su posición inicial lo alcanza?
-

Ejercicios MRUV:

- 1) Un auto inicialmente quieto empieza a acelerar, siendo su aceleración constante 10 m/s^2 . ¿Cuánto tiempo pasa hasta que se alejó 2000 m de su posición inicial? ¿En cuánto tiempo recorre los primeros 1000 m? ¿Cuánto tiempo tarda hasta llegar a una velocidad de 30 m/s? ¿Qué distancia recorre hasta llegar a una velocidad de 60 m/s?
- 2) Un auto va a 300 m/s por una calle. El conductor ve un nene a 500m en medio de la calle y clava los frenos. La desaceleración es -100 m/s^2 . ¿Cuánto tarda en detenerse? ¿Cuánta distancia recorre hasta detenerse? ¿Atropella al nene?
- 3) Un auto va a 100 m/s por una ruta. Al llegar al kilómetro 10 de dicha ruta empieza a acelerar de manera constante a 20 m/s^2 hasta llegar al kilómetro 20 de la ruta. ¿Cuál es la velocidad en el kilómetro 15 de la ruta y cuánto tarda en llegar a este? ¿Y para el kilómetro 20?
- 4) La velocidad de un auto en el kilómetro 60 de la ruta es 100 km/h. La velocidad del mismo auto en el kilómetro 70 es 120 km/h. Suponiendo que aceleró de manera uniforme, ¿cuánto vale la aceleración? Expresar la respuesta en km/h^2 y en m/s^2 .
- 5) Un chico tira una piedra para arriba desde un edificio. La velocidad inicial de la piedra es 30 m/s. El edificio tiene 20 metros de alto. ¿Cuánto tarda en volver a la altura inicial? ¿Y en llegar al suelo? La aceleración de la gravedad es -10 m/s^2 .
- 6) Un ciclista en una carrera va a 72 m/s. Al llegar a una bajada acelera a 5 m/s. La bajada tiene 360 metros de largo. Luego, siguiendo con el envión de la bajada, recorre medio kilómetro de camino llano. Al terminar el camino llano llega a una subida de 180 metros en la cual desacelera a 6 m/s. Luego de la

subida sigue sin acelerar por 1 kilómetro y llega a la meta. ¿Cuánto tarda en llegar a la meta? ¿A qué velocidad llega?

- 7) Un avión parte desde los 50m a una velocidad de 7m/s con una aceleración constante y carretea 1800 m por la pista durante 30 segundos hasta despegar.
- Calcular la velocidad del avión.
 - Calcular la velocidad con la que despegar.
 - ¿Cuánto tarda en recorrer el primer kilómetro?
 - ¿Qué distancia recorre en los últimos 10s?

Tiro Vertical

- 1) Se arroja hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 100 m/s.
 - a. ¿A qué altura y velocidad se encuentra luego de 5 segundos?
 - b. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? ¿A qué velocidad toca el suelo?
- 2) Se arroja hacia arriba una moneda desde una altura de 30 m con una velocidad inicial de 150 m/s.
 - a. ¿A qué altura y velocidad se encuentra luego de 5 segundos?
 - b. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? ¿A qué velocidad toca el suelo?
 - c. ¿En qué momentos está a una altura de 10 m?
- 3) Se dispara hacia arriba un cañón cuya bala sale a 1500 m/s desde una altura de 100 m.
 - a. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? ¿A qué velocidad toca el suelo?
 - b. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza?
- 4) Una persona dispara un arma desde la calle hacia arriba. 100 metros arriba de la persona hay una bandera. Decir en qué momentos la bala se encuentra a 15 metros de la bandera y a qué velocidad está yendo.

Ejercicios Dinámica:


- 1) A un cuerpo se le aplica una fuerza de 400 N y tiene una masa de 24 kg, ¿cuánto vale su aceleración?
- 2) A un cuerpo se le aplica una fuerza de 45.000 N y tiene una masa de 15 toneladas, ¿cuánto vale su aceleración?
- 3) A un cuerpo se le aplica una fuerza de 50 N y tiene una masa de 40 g, ¿cuánto vale su aceleración?
- 4) Un cuerpo se encuentra bajo el efecto de una fuerza de 1650 N. Su aceleración es 13,25 m/s², ¿cuánto vale su masa? Expresar el resultado en kg y en g.
- 5) Un cuerpo se encuentra bajo el efecto de una fuerza de 1.000.000 N. Su aceleración es 2 m/s², ¿cuánto vale su masa? Expresar el resultado en kg, en g y en toneladas.
- 6) Un cuerpo tiene una masa de 25 kg y está acelerando a 14 m/s², ¿cuánto vale la fuerza total ejercida al cuerpo? Expresar el resultado en N y en kgf.
- 7) Una persona tiene una masa de 60 kg y está en la superficie terrestre, ¿cuánto vale la fuerza total ejercida al cuerpo? Expresar el resultado en N y en kgf.

Ejercicios unidades


- 1) Tengo 300 g de manzanas ¿cuántos kilogramos de manzanas tengo?
- 2) Tengo 7 hg de peras ¿cuántos dg tengo?
- 3) Una ruta mide 4000 km ¿cuántos dm mide?
- 4) Se tiene una pileta de 80 dl ¿cuántos dal tiene?
- 5) Una botella tiene 2 litros de capacidad ¿cuántos dm^3 tiene?
- 6) Una botella tiene 2 litros de capacidad ¿cuántos dm^3 tiene?
- 7) Se tienen 300 dam^3 ¿cuántos hectolitros son?

Engranajes

- 1) La velocidad tangencial de un diente del engrajane 1 es de 7 m/s. Averiguar v_{t2} y ω_2 .



- 2) La velocidad angular $\omega_1 = 3,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Averiguar v_{t2} y ω_2 .



- 3) Un ventilador de 32cm de radio se enciende y empieza a girar con una aceleración de $\alpha = 0,7 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$. Calcular su ω y sus vueltas dadas luego de 4 s.

1. Física 2

1.1. Capacidad

$$C = \frac{q}{V}$$

$$E = \frac{1}{2} \cdot q \cdot V = \frac{1}{2} C \cdot V^2 = \frac{q^2}{2C}$$

Asociación en serie:

Al asociar capacitores en serie, la carga total será igual a la carga en cada capacitor. En base a esto se pueden calcular las tensiones en cada uno.

Asociación en paralelo:

La diferencia de tensión en cada uno es igual, en base a la capacidad obtener las cargas.