

Aula 14 - Combinação de Variáveis Aleatórias

Combinações de variáveis aleatórias

Lembremos que:

Se $f(x)$ for uma função de densidade de probabilidade contínua

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

E que a variância:

$$V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x)dx$$

E que ainda vale a propriedade:

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X^2) - \mu^2$$

Propriedades da esperança

Lembremos da aula 08 que, para o valor esperado ou esperança, vale, se c e d forem constantes:

$$E(X + d) = E(X) + d$$

$$E(cX) = cE(X)$$

Combinando as expressões acima:

$$E(cX + d) = cE(X) + d$$

E para a variância vale:

$$V(X + d) = V(X)$$

$$V(cX) = c^2V(X)$$

$$V(cX + d) = c^2V(X)$$

Propriedades de combinações de variáveis aleatórias

Propriedades da esperança

Sejam a e b constantes e X e Y variáveis aleatórias

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

Estes resultados são sempre válidos, sejam X e Y dependentes ou independentes

Propriedades da variância

Sejam X e Y variáveis aleatórias

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(X, Y)$$

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2Cov(X, Y)$$

Sendo que, como visto nas aulas de análise bidimensional, a covariância é definida como:

$$Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E(XY) - \mu_X\mu_Y$$

Dado que $\mu_X = E(X)$ e $\mu_Y = E(Y)$

Variáveis independentes

$$X \text{ e } Y \text{ independentes} \implies Cov(X, Y) = 0$$

Entretanto:

$$Cov(X, Y) = 0 \not\Rightarrow X \text{ e } Y \text{ independentes}$$

Se as variáveis X e Y forem independentes:

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y)$$

$$E(X)E(Y) = \mu_X\mu_Y$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - \mu_X\mu_Y$$

Variância com coeficientes:

Sejam a e b constantes e X e Y variáveis aleatórias:

$$V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) + 2abCov(X, Y)$$

$$V(aX - bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) - 2abCov(X, Y)$$

Se as variáveis X e Y forem independentes:

$$V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$$

$$V(aX - bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$$

Exemplo - soma de v.a

Um semiconductor tem 3 camadas. Supondo que as variâncias de espessura da primeira, segunda e terceira camada sejam 25, 40 e 30 nm^2 , respectivamente, e

que as espessuras sejam independentes, qual é o desvio padrão da espessura do produto final?

Sejam X_1 , X_2 e X_3 as variáveis aleatórias que denotam as espessuras.

Então:

$$X = X_1 + X_2 + X_3$$

Temos então que:

$$V(X) = V(X_1) + V(X_2) + V(X_3) = 95nm^2$$

Consequentemente, o desvio padrão do produto final é: $9.747nm$

Exemplo

Um gerente quer melhorar o desempenho de sua fábrica. Para isso, ele quer comparar:

Uma máquina que leva um tempo médio para concluir um processo de $E(X)$ e tem variância $V(X)$ versus duas máquinas independentes que têm tempo médio e variância iguais à metade de $E(X)$ e $V(X)$.

É vantagem para ele realizar esta troca?

Média e variância de uma média

Seja $\bar{X} = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)/n$, com $E(X_i) = \mu$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$

Temos que $E(\bar{X}) = \mu$

Se X_1, X_2, \dots, X_n forem independentes com $V(X_i) = \sigma^2$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$, temos:

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Propriedade reprodutiva da normal

Sejam X_1, X_2, \dots, X_n variáveis aleatórias normais com $E(X_i) = \mu_i$ e $V(X_i) = \sigma_i^2$, para $i = 1, 2, \dots, n$

Então:

$Y = c_1X_1 + c_2X_2 + \dots + c_nX_n$ será uma variável aleatória normal, com $E(Y)$ e $V(Y)$ definidos conforme

$$E(Y) = c_1\mu_1 + c_2\mu_2 + \dots + c_n\mu_n$$

$$V(Y) = c_1^2 \sigma_1^2 + c_2^2 \sigma_2^2 + \cdots + c_n^2 \sigma_n^2$$