

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

École de Santé Publique de Kinshasa

Protocole de recherche

**ENQUETE SUR LA COUVERTURE VACCINALE CHEZ LES
ENFANTS DE 6-23 MOIS**

ET SUR LES INDICATEURS DU PALUDISME

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, 2023

Préparé par :

Prof LUSAMBA DIKASSA Paul Samson, Investigateur Principal

Prof NYANDWE KYLOKA Jean, Co-Investigateur

Prof MAFUTA MUSALU Eric, Co-Investigateur

Prof LULEBO MAMPASI Aimée, Co-Investigatrice

Dr MVUAMA Nono, Associé de Recherche

Novembre 2023

Table des matières

ACRONYMES	4
RESUME	5
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	8
2. QUESTIONS DE RECHERCHE.....	13
3. OBJECTIFS	15
3.1. OBJECTIF GENERAL.....	15
3.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES.....	15
4. METHODOLOGIE	18
4.1. TYPE D'ETUDE.....	18
4.2. CADRE D'ETUDE	18
4.3. ECHANTILLONNAGE.....	18
4.3.1. Population d'étude	18
4.3.2. Estimation de la taille d'échantillon.....	19
4.3.3. Technique d'échantillonnage	20
4.4. VARIABLES-CLES	26
4.4.1. Volet enquête dans les ménages	26
4.4.2. Volet enquête dans les centres de santé :.....	26
4.4.3. Volet paludisme :.....	27
4.5. TECHNIQUE DE COLLECTE DES DONNEES	27
Données quantitatives	27
Enquête qualitative.....	29
4.6. PLAN DE COLLECTE DES DONNEES.....	31
4.6.1. Obtention de l'approbation du Comité d'Ethique	31
4.6.2. Recrutement, formation et organisation des équipes de terrain	31
4.6.3. Programmation de la tablette avec les instruments de collecte de données.....	32
4.6.4. Enregistrement des données qualitatives.....	32
4.6.5. Obtention des autorisations.....	32
4.6.6. Collecte de données à l'aide de tablettes/ téléphones androides.....	33
4.7. PLAN DE TRAITEMENT ET D'ANALYSE DES DONNEES.....	34
4.8. DEFINITION DES CONCEPTS	37
4.9. CONSIDERATIONS ETHIQUES.....	38
4.10. PRE-TEST	39
5. PLAN DE GESTION DU PROJET ET D'UTILISATION DES RESULTATS	40
5.1. ADMINISTRATION ET SUIVI DU PROJET	40
5.2. PLAN ET CALENDRIER DE TRAVAIL	40
5.3. PLAN D'UTILISATION ET DE DIFFUSION DES RESULTATS.....	41
BIBLIOGRAPHIE	43
ANNEXE 1. ESTIMATION DE LA TAILLE DE L'ECHANTILLON	45
ANNEXE 2. COLLECTE ET EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES.....	46
ANNEXE 3. CHRONOGRAMME DE L'ECV2023.....	48

ANNEXE 4. MAQUETTES DE TABLEAUX	51
ANNEXE 5. QUESTIONNAIRE D'ENQUETE.....	55
ANNEXE 6. OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES QUALITATIVES.....	110

ACRONYMES

AS	Aire de santé
ASV	Activité(s) supplémentaire(s) de vaccination
BCG	Bacille de Calmette-Guérin (vaccin antituberculeux)
CE	Comité éthique
CPECV	Comité de pilotage de l'enquête de couverture vaccinale
CPN	Consultation prénatale
CTA	Combinaison thérapeutique à base d'artémisinine
DTCoq	Diphtérie, tétanos et coqueluche
ECV	Enquête de couverture vaccinale
EDS	Enquête Démographique et de Santé
ESP	Ecole de Santé Publique
GE	Goutte épaisse
HepB	Hépatite B
Hib	<i>Haemophilus influenzae</i> de type b
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey (enquête en grappes à indicateurs multiples)
NV	Naissances vivantes
ODD	Objectifs de Développement Durable
ODK	Open Data Kit
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
PAO	Plan d'Action Opérationnel
PCV	Pneumocoque conjugué
PEV	Programme Elargi de Vaccination
Penta	Pentavalent (DTCoq + Hib + Hib)
PNDS	Plan National de Développement Sanitaire
PNLP	Programme National de Lutte contre le Paludisme
PPAC	Plan Pluri Annuel Complet du PEV
PSN	Plan Stratégique National
RDC	République Démocratique du Congo
ROR	Vaccin combinant la rougeole avec les oreillons et la rubéole
TDR	Test de diagnostic rapide
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
VAA	Vaccin anti-amaril
VPI	Vaccin antipoliomyélitique inactivé
VPO	Vaccin antipoliomyélitique Oral
ZS	Zone de santé

RESUME

L'Organisation Mondiale de la Santé estime que la vaccination permet d'éviter chaque année 2,5 millions de décès d'enfants. Toutefois, malgré ce succès, des millions d'enfants vivant dans des pays en développement – près de 20% du total annuel des naissances – ne reçoivent pas la totalité des vaccins prévus au cours de leur première année de vie. Le paludisme demeure encore l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants âgés de moins de cinq ans en Afrique. Depuis octobre 2021, l'Organisation Mondiale de la Santé a approuvé l'utilisation du vaccin antipaludique RTS, S/A SO1 dans l'arsenal des méthodes de lutte contre le paludisme.

En République Démocratique du Congo, en dépit des progrès réalisés dans la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui est passée selon l'Enquête Démographique et de Santé de 158 décès pour 1000 naissances vivantes en 2007 à 104 décès pour 1000 naissances vivantes en 2013, et à 70 pour 1000 naissances vivantes en 2017 selon MICS, la situation demeure préoccupante quand on se réfère à la situation mondiale et à l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030. Cet excès de mortalité est dû en grande partie à des causes évitables par la vaccination. En effet, la couverture vaccinale estimée en 2013 pour tous les antigènes était faible car seulement 41,0% d'enfants de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés. Une enquête couvrant 18 provinces de la RDC en 2020, a permis une estimation de la couverture vaccinale pour l'ensemble des provinces enquêtées à 52,5% d'enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés avec 13 antigènes. Les taux de couverture vaccinale variaient de 26,1% à 72,8%. L'enquête de couverture vaccinale de 2021 a estimé la couverture vaccinale pour tous les antigènes à 41,5% d'enfants de 12 à 23 mois, tandis qu'en 2022, celle-ci est remontée à 45,3%, avec d'importantes disparités provinciales, allant de 8,5% dans la Tshopo, à 89,0% dans le Haut-Lomami. Les disparités étaient également importantes entre les différents antigènes. Par exemple, la couverture du vaccin anti rougeoleux était estimée en 2022 à 17,0% dans la Tshopo contre 93,0% dans le Haut-Lomami.

La République Démocratique du Congo a exprimé son intérêt à introduire le vaccin antipaludique R21/MATRIX-M en 2024. D'autre part, l'enquête de couverture vaccinale couvrant l'année 2022 a intégré des indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des activités de la lutte antipaludique dans les communautés de la République Démocratique du Congo.

La République Démocratique du Congo a récemment pris l'option d'assurer la couverture santé universelle à sa population. Dans ce cadre, la vaccination de routine jouera un rôle de premier plan pourvu que les cibles fixées au niveau national et international soient atteintes. Le but de l'enquête de couverture vaccinale et des indicateurs du paludisme pour l'année 2023 est de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination et au paludisme, en récoltant les

données de base pour orienter les interventions en matière de vaccination des nourrissons et de lutte contre le paludisme.

Cette enquête utilisera la méthode d'échantillonnage en grappes recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé modifiée pour s'adapter au contexte de la RDC. Elle ciblera 30 ménages ayant en leur sein des enfants âgés de 6 à 23 mois dans chacune des cinq aires de santé sélectionnées par zone de santé. Ainsi, dans son volet vaccination, l'enquête couvrira au total 87720 enfants âgés de 6 à 23 mois dans les 26 provinces de la République Démocratique du Congo. Le volet paludisme couvrira en plus les enfants âgés de moins de cinq ans et les femmes enceintes.

Afin d'explorer en profondeur les facteurs qui influencent les performances des zones de santé en matière de vaccination de routine, deux zones de santé seront particulièrement ciblées dans chaque province, à savoir une zone de santé parmi celles ayant montré les plus faibles performances, et une autre zone de santé parmi celles ayant montré les meilleures performances en 2022. Dans ces zones de santé, soit 52 au total, le nombre d'aires de santé (grappes) à visiter sera porté à 10. Les sections spécifiques du questionnaire individuel des enfants de 6 à 23 ans, à savoir la section 4 « Echec de la vaccination », la section 5 « Niveau d'information des mères/gardiennes d'enfants de 6 à 23 mois sur la vaccination », et la section 6 « Perception des mères/gardiennes d'enfants de 6 à 23 mois sur la vaccination », seront davantage détaillées et complétées par des outils qualitatifs. Il en sera de même pour le « Questionnaire d'enquête dans les centres de santé ». Ainsi, outre les données quantitatives, des données qualitatives seront collectées au travers de *focus groups* avec les IT (si possible), de *focus groups* avec les mères/gardiennes d'enfants de 6 à 23 mois, de *focus groups* avec les RECO ; au travers des interviews approfondies auprès des IT, des Médecins Chefs de Zone de Santé, et des Infirmiers Superviseurs du PEV ; et au travers des interviews des informateurs clés au niveau provincial et au niveau central.

Les données quantitatives seront collectées à l'aide de tablettes électroniques/téléphones androïdes et seront transférées, après un contrôle systématique de qualité, vers un serveur virtuel sécurisé avant traitement et analyse. L'analyse des données permettra de calculer les indicateurs-clés de couverture vaccinale et ceux de la lutte contre le paludisme au niveau de la communauté. Les données qualitatives seront collectées à l'aide de guides d'entretiens approfondis et de focus group et enregistrées sur dictaphones. Leur analyse permettra de ressortir les facteurs qui influencent la performance des zones de santé en matière de vaccination de routine.

Les résultats de l'enquête seront utilisés par le Programme Elargi de Vaccination et le Programme National de Lutte contre le Paludisme pour suivre les performances de la vaccination de routine et de la

lutte contre le paludisme au niveau provincial et au niveau de la zone de santé, étant donné que les rapports de routine accusent des faiblesses de qualité. Ces données serviront aussi à mesurer l'efficacité des interventions mises en œuvre dans les zones de santé, en vue d'améliorer la couverture vaccinale et de renforcer la lutte contre le paludisme.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la vaccination est l'une des plus fructueuses et des plus rentables des interventions à caractère sanitaire du fait qu'elle a fait reculer de manière drastique la mortalité infanto-juvénile et la prévalence de plusieurs maladies. La vaccination a conduit à l'éradication de la variole, et a permis de réduire l'incidence de la poliomyélite de plus de 99,0%, et celle du tétanos néonatal de 94,0% dans le monde (OMS, 2016).

L'apport de la vaccination est particulièrement déterminant s'agissant de la réalisation du troisième objectif pour le développement durable (ODD) relatif à la santé et au bien-être, plus précisément le 2^{ème} sous-objectif ou cible ci-après : d'ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans. Tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes (NV) au plus, et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 NV au plus (ONU, 2018).

La couverture santé universelle

La conférence d'Astana (2018) a rétabli la place des soins de santé primaires et s'est enrichi de la réalité des menaces actuelles et à venir dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale pour bâtir un système de santé résilient comme fondement de la Couverture Santé Universelle (CSU).

La CSU consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services de soins préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces, sans que leur coût n'entraîne des difficultés financières pour les usagers. Ceci suppose de mettre en place des systèmes de soins de santé fonctionnels qui offrent des soins de qualité raisonnable dans un contexte d'un système efficace et équitable de protection sociale en santé.

La CSU figure parmi les cibles du troisième Objectif de Développement Durable (ODD) relatif à l'accès aux soins. Ainsi, la mise en place de la CSU demeure un grand défi pour la RDC. Ce défi réside en la mise en œuvre des stratégies techniquement faisables et politiquement acceptables pour assurer un équilibre entre les 3 dimensions de la CSU qui sont : la population à couvrir, les services à offrir, et le niveau d'allègement de la charge financière des personnes couvertes.

La CSU figure parmi les cibles du troisième Objectif de Développement Durable (ODD) relatif à l'accès aux soins. Ainsi, la mise en place de la CSU demeure un grand défi pour la RDC. Ce défi réside en la mise en œuvre des stratégies techniquement faisables et politiquement acceptables pour assurer un

équilibre entre les 3 dimensions de la CSU qui sont : la population à couvrir, les services à offrir, et le niveau d'allègement de la charge financière des personnes couvertes. Des services de vaccination efficaces, efficients et résilients accessibles à tous les bénéficiaires en tant que composante essentielle des soins de santé primaires, contribueront ainsi à la couverture sanitaire universelle.

Au cours de la dernière décennie, les programmes de vaccination ont ajouté aux six vaccins initiaux – diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole, poliomyélite et tuberculose – un certain nombre de vaccins nouveaux ou encore sous-utilisés. Il s'agit de vaccins contre l'hépatite B, les infections à *Haemophilus influenzae* type b (Hib), les oreillons, les pneumocoques, les rotavirus, la varicelle, l'hépatite, la méningite à méningocoque et la rubéole – avec, en plus, dans les pays où ils sont nécessaires, des vaccins contre la fièvre jaune et l'encéphalite japonaise. Le calendrier actuel de vaccination des nourrissons de la RDC comprend huit vaccins contenant 13 antigènes, à savoir : BCG, VPO, DTC-HepB-Hib, PCV, ROTA, VAR, VAA, et VPI. Ces vaccins sont normalement administrés au cours des 11 premiers mois de vie.

Il est estimé que la vaccination permet d'éviter chaque année 2,5 millions de décès d'enfants. Toutefois, malgré ce succès, des millions d'enfants vivant dans des pays en développement – près de 20% du total annuel des naissances – ne reçoivent pas la totalité des vaccinations prévues au cours de leur première année de vie (OMS, UNICEF, Banque mondiale, 2010).

En République Démocratique du Congo (RDC), en dépit de progrès réalisés dans la réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, qui est passée de 158 pour 1000 NV en 2007 (EDS, 2007) à 104 pour 1000 NV en 2013 (EDS 2013), et à 70 pour 1000 NV en 2017 (MICS 2017-2018), la situation demeure préoccupante quand on se réfère à la situation mondiale et à l'atteinte de l'ODD 3. Cet excès de mortalité chez les enfants est attribuable en grande partie à des maladies évitables par la vaccination. En 2013, l'estimation de la couverture vaccinale à partir des informations tirées du carnet de vaccination a montré que seulement 41,0% des enfants de 12 à 23 mois avaient été complètement vaccinés avant l'âge de 12 mois en RDC. Lorsque l'on prend en compte les renseignements fournis par la mère, ce pourcentage passait à 45,0% (EDS 2013-2014). Le rapport notait des disparités de couverture vaccinale entre le milieu rural (53,0%) et urbain (42,0%), et entre les provinces du pays. La province de Kinshasa et du Nord Kivu avaient les meilleures couvertures avec, respectivement, 68,0% et 71,0% d'enfants ayant reçu tous les vaccins recommandés par le Programme Elargi de Vaccination (PEV). L'étude MICS 2018 a montré une couverture vaccinale de 35,0% (enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés). Ce chiffre global cachait des disparités importantes au niveau des provinces. A titre d'exemple, la couverture

vaccinale était de 8,2% à la Mongala, 15,4% à la Tshuapa, 41,9% à Kinshasa, 48,0% au Kongo central, et 79,2% au Nord Kivu.

En vue d'améliorer la couverture vaccinale dans le pays, le PEV, avec l'appui des différents partenaires impliqués dans la vaccination en RDC, avait élaboré un Plan Pluri Annuel Complet du PEV (PPAC) couvrant la période de 2015 à 2019 et qui a pris en compte les recommandations issues des revues externes du PEV ainsi celles issues des enquêtes de couverture vaccinale. Ce plan était aligné sur le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2016-2020) et s'inscrivait dans le cadre du renforcement du système de santé. Il mettait un accent particulier sur le maintien des acquis pour l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage et la pré-validation de l'élimination du tétanos néonatal (Ministère de la Santé-PEV, 2017). Ce plan a été actualisé pour la période de 2020 à 2024.

La stratégie nationale de la vaccination

L'objectif de la vaccination est d'atteindre toutes les cibles afin de protéger les enfants contre les maladies évitables par la vaccination sur toute l'étendue du pays. Les journées nationales de vaccination (JNV), les campagnes de vaccination, aident les responsables de la santé publique à garantir que la sensibilisation et les doses du vaccin à administrer aux enfants de moins de cinq ans les atteignent. Cela, en plus de leurs vaccinations de routine. Il en est surtout des enfants « zéro dose », les enfants non ou insuffisamment vaccinés. Tout ceci dans le but de prioriser les investissements dans la résilience communautaire.

En RDC, l'autorité suprême, s'est engagé à fournir à tous les enfants du pays et aux communautés les vaccins sûrs et efficaces dont ils ont besoin pour grandir en bonne santé. La vaccination est un outil puissant qui aide à prévenir les maladies et les décès et à renforcer la résilience à travers tout le pays.

D'autre part, les autorités sanitaires du pays, avec l'appui de leurs partenaires, mettent également en évidence l'utilisation de la technologie de 'Open Data Kit', (ODK). De sorte que lors des activités de vaccination, qu'ils puissent accélérer la remontée des alertes et l'intensification de la riposte aux cas potentiels par exemple de polio ou de rougeole dans des zones d'accès difficile. Ce fait permettra de réduire la propagation des virus.

Par ailleurs, d'après le rapport annuel du PEV de 2017, basé sur les données administratives, les objectifs de la vaccination avaient été atteints pour la plupart des antigènes à l'exception du BCG, VPI et VAA pour lesquels le pays avait connu des ruptures de stock au niveau central et dans presque toutes les provinces. Seulement six provinces (23,0%) avaient réalisé une CV inférieure à l'objectif de 90,0% pour la troisième dose du vaccin pentavalent (Equateur, Kasai, Kasai Central, Kongo Central, Lualaba et Tshuapa). Le nombre d'enfants non vaccinés est passé de 254.179 en 2016 à 218.043 en 2017. Dans ce même rapport, il a été recommandé notamment d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité des données de routine pour

avoir des indicateurs crédibles (Ministère de la Santé-PEV, 2017). Toutefois, la survenue récente, dans de nombreuses zones de santé (ZS), d'épidémies de maladies évitables par la vaccination invite à une interprétation prudente des couvertures vaccinales présentées dans les rapports administratifs.

Déclaration de l'épidémie généralisée de rougeole en 2023

Dans la déclaration de l'épidémie généralisée de rougeole en RDC, les autorités sanitaires ont souligné que le pays connaissait une augmentation des cas de rougeole dans toutes les 26 provinces du pays. Cette situation a fait suite au dernier pic observé en 2019 causant 6045 décès sur 311417 cas suspects enregistrés, soit une létalité de 1,9%. Malgré l'existence d'un plan d'élimination de la rougeole élaboré et mis en place depuis 2011.

Vu l'ampleur que présenté de l'épidémie, le nombre des zones de santé en épidémie et tenant compte de la contagiosité de la rougeole avec risque élevé d'expansion vers d'autres zones de santé indemnes voire en dehors du pays, des mesures et des actions de santé publique urgentes ont été indispensables pour contrôler la situation et poursuivre avec le processus d'élimination déjà en cours. Ces mesures ont consisté en une activation du Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique en sigle COUSP par la mise en place d'un système de gestion de l'incidence pour la coordination de la réponse. Le système de gestion visait l'organisation des campagnes de vaccination de masse contre la rougeole ciblant tous les enfants de 6 à 59 mois dans les 26 provinces du pays. De ce fait, les autorités sanitaires du pays ont déclaré depuis le 16 août 2023, l'épidémie généralisée de la rougeole dans 275 zones de santé des 26 provinces de la RDC avec appel immédiat aux actions de santé publique.

Le COUSP a été activé en mode réponse avec conséquences immédiates de couper la chaîne de transmission et réduire ainsi la mortalité due à la rougeole dans les 26 provinces du pays.

En vue de remédier aux situations décrites ci-dessus, il est nécessaire d'obtenir des données fiables de couverture vaccinale désagrégées par zone de santé. Ainsi, l'enquête de couverture vaccinale réalisée à Kinshasa en 2018 par Okitolonda et Mvumbi a révélé que seuls 68,0% d'enfants âgés de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés, avec des disparités importantes entre les zones de santé de la capitale. Les mêmes investigateurs ont trouvé que respectivement 38,2% et 50,7% d'enfants de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés dans les provinces du Kasai et du Kwilu en 2019. En outre, en 2018 et 2019, Rimoin et Hoff ont trouvé, pour le même groupe d'âge, une proportion d'enfants complètement vaccinés de 39,0% et 54,0% respectivement dans les provinces du Haut-Lomami et Tanganyika.

En 2020, Lusamba et al. ont trouvé dans trois provinces, pour ce groupe d'âge, une proportion d'enfants complètement vaccinés de 58,9% à Kinshasa, 23,6% à la Mongala, et 21,7% à la Tshuapa. Dans une enquête couvrant 18 provinces de la RDC en 2020, ces auteurs ont estimé la couverture vaccinale pour

l'ensemble des provinces couvertes par l'enquête à 52,5% d'enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés avec 13 antigènes. Dans ces provinces, les taux de couverture vaccinale variaient de 26,1% (Mongala) à 72,8% (Kinshasa). Ces enquêtes comportaient des données désagrégées au niveau de la zone de santé, niveau opérationnel du système sanitaire, permettant ainsi de mieux identifier les disparités locales et de mieux cibler les interventions.

Dans une enquête couvrant toutes les 26 provinces de la RDC en 2021, les mêmes chercheurs ont montré une baisse globale de performance, avec un recul de la couverture vaccinale pour l'ensemble des provinces couvertes par l'enquête à 41,5% d'enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés avec 13 antigènes. Toutefois, la province du Haut-Lomami avait amélioré ses performances par rapport à 2021, soit une couverture de 88,9% comparativement à 62,0% en 2020. La plus faible couverture vaccinale était observée dans la province de la Tshuapa (11,1%). Dans l'enquête couvrant toutes les 26 provinces de la RDC en 2022, les chercheurs ont montré une augmentation globale de performance, un gain de 3,8 point par rapport à 2021. Pour ECV2022, la couverture vaccinale pour l'ensemble des provinces couvertes par l'enquête était de 45,3% pour les enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés avec 13 antigènes.

La province du Haut-Lomami avait continué à améliorer ses performances par rapport à 2021. La couverture vaccinale qui était de 88,9% en 2021 est passée à 89,8% en 2022. La plus faible couverture vaccinale était enregistrée dans la province de la Tshopo avec une couverture vaccinale de 8,5%. Le but de l'enquête de couverture vaccinale et des indicateurs du paludisme de 2023 (ECV2023) est de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination et au paludisme, en récoltant les données de base pour orienter les interventions en matière de vaccination des nourrissons et de lutte contre le paludisme.

2. QUESTIONS DE RECHERCHE

- 2.1. Quelle proportion d'enfants âgés de 12 à 23 mois est complètement vaccinée dans les ZS selon le calendrier vaccinal de la RDC ?
- 2.2. Quelle proportion d'enfants âgés de 6 à 11 mois est vaccinée dans les ZS selon le calendrier vaccinal de la RDC ?
- 2.3. Quelle est la proportion d'enfants âgés de 12 à 23 mois qui n'a reçu aucune dose de vaccin dans les ZS de la RDC ?
- 2.4. Quelle proportion d'enfants de 12 à 23 mois abandonne la vaccination ?
- 2.5. Quels facteurs sont associés à la vaccination incomplète et à la non vaccination d'enfants âgés de 12 à 23 mois dans les provinces et dans les ZS de la RDC ?
- 2.6. Quelle est la proportion des femmes ayant accouché au cours des 12 mois précédant l'enquête qui ont été vaccinées contre le tétanos ?
- 2.7. Quelle est la proportion des ménages enquêtés qui possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide ?
- 2.8. Quel est le nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide disponibles par ménage ?
- 2.9. Quel est le nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide utilisées par ménage ?
- 2.10. Quelle est la proportion des femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit précédant l'enquête ?
- 2.11. Quel est le pourcentage de ménages possédant une bonne connaissance de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide ?
- 2.12. Quel est le pourcentage des femmes enceintes ayant reçu au moins une dose de SP sous supervision pour la protection contre le paludisme pendant la grossesse ?
- 2.13. Quel est le pourcentage des femmes enceintes ayant reçu au moins deux doses de SP sous supervision pour la protection contre le paludisme pendant la grossesse ?
- 2.14. Quel est le pourcentage des femmes enceintes ayant reçu trois doses ou plus de SP sous supervision pour la protection contre le paludisme pendant la grossesse ?
- 2.15. Quel est le pourcentage des ménages avec une mère qui a cherché des soins médicaux 48 heures après le début de la fièvre ?
- 2.16. Pourquoi le traitement a-t-il été retardé ?
- 2.17. Où les enquêtés sont-ils allés chercher les soins (centre privé, public ou agent de santé communautaire) ?
- 2.18. Quelle est la proportion d'enfants malades ayant bénéficié d'un test rapide de paludisme ou encore d'un examen microscopique pour confirmer le paludisme ?

- 2.19. Quelle est la proportion d'enfants malades qui ont reçu un traitement adéquat ?
- 2.20. Où les malades ont-ils obtenu les ACT ?
- 2.21. Quel est le coût du TDR et des ACT ?

3. OBJECTIFS

3.1. Objectif général

L'enquête de couverture vaccinale et des indicateurs du paludisme de 2023 (ECV2023) a pour objectif général de mesurer la performance des zones de santé de l'ensemble des provinces de la RDC en ce qui concerne la fourniture des services de vaccination des nourrissons et de lutte contre le paludisme, et d'identifier les obstacles à l'utilisation des services offerts aux communautés en vue de mieux cibler les interventions pouvant contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination et au paludisme.

3.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, l'enquête de couverture vaccinale de 2023 (ECV2023) poursuit les objectifs ci-après :

3.2.1. Calculer les indicateurs de performance des services de vaccination de routine dans les ZS de la RDC:

- La proportion d'enfants de 12 à 23 mois qui sont complètement vaccinés par ZS;
- La proportion d'enfants de 12 à 23 mois ayant reçu le nombre requis de doses de vaccin pour chaque antigène recommandé par le calendrier vaccinal de la RDC par ZS;
- Le taux de déperdition/abandon par antigène pour les vaccins à plusieurs doses ;
- La proportion d'enfants de 12 à 23 mois n'ayant reçu aucune dose de vaccin pour chaque antigène recommandé par le calendrier vaccinal de la RDC par ZS;
- La proportion d'enfants âgés de 6 à 11 mois qui sont vaccinés dans les ZS selon le calendrier vaccinal de la RDC ;
- La proportion des femmes ayant accouché au cours des 12 mois précédant l'enquête qui ont été vaccinées contre le tétanos.

3.2.2. Déterminer la disponibilité des intrants-clés de la vaccination de routine à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;

- La disponibilité des intrants-clés de la vaccination aux niveaux central, provincial, et périphérique (zone de santé, centre de santé et autres sites de vaccination) au cours des 12 derniers mois;
- La proportion des CS ayant connu des ruptures de stock de vaccins selon les différents antigènes au cours des 12 derniers mois ;

- La proportion des CS qui possèdent des cartes de vaccination en stock.
- La proportion des CS qui détiennent les cartes de vaccination des enfants et des femmes enceintes vaccinés

3.2.3. Identifier les facteurs systémiques liés à la non-vaccination ou à la vaccination incomplète des enfants de 12 à 23 mois et des femmes ayant accouché au cours des 12 mois précédant l'enquête :

- L'adéquation de la logistique de stockage, distribution et conservation des vaccins ;
- L'existence et l'adéquation de directives et procédures opérationnelles standard de gestion des intrants de la vaccination ;
- L'adéquation de la formation des vaccinateurs ;
- L'adéquation de la supervision des activités de vaccination de routine ;
- L'adéquation de l'organisation des séances de vaccination ;
- La facilité d'accès aux sites de vaccination ;
- La disponibilité de cartes et de registres de vaccination aux niveaux central (PEV) et provincial (DPS)

3.2.3. Identifier les facteurs individuels liés à la non-vaccination ou à la vaccination incomplète des enfants de 12 à 23 mois et des femmes ayant accouché au cours des 12 mois précédant l'enquête :

:

- La proportion des mères/gardiennes (ou des pères) qui connaissent le calendrier vaccinal de leur enfant ;
- La proportion des mères/gardiennes (ou des pères) qui connaissent les modes et site d'administration des vaccins de leur enfant ;
- La proportion des mères/gardiennes (ou des pères) qui présentent la carte de vaccination de leur enfant ;

Les raisons de la non-vaccination ou de la vaccination incomplète d'enfants de 12 à 23 mois selon les mères/gardiennes (ou les pères), et les raisons de la non-vaccination des femmes ayant accouché au cours des 12 mois précédant l'enquête :

3.2.4. Calculer les indicateurs de performance des services de la lutte contre le paludisme dans les ZS de la RDC:

- La proportion des ménages enquêtés qui possède au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide
- La proportion des femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée la nuit précédant l'enquête
- Le pourcentage de ménages possédant une bonne connaissance de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide
- Le pourcentage des femmes enceintes ayant reçu au moins une dose de SP sous supervision pour la protection contre le paludisme pendant la grossesse
- Le pourcentage des femmes enceintes ayant reçu au moins deux doses de SP sous supervision pour la protection contre le paludisme pendant la grossesse
- Le pourcentage des femmes enceintes ayant reçu trois doses ou plus de SP sous supervision pour la protection contre le paludisme pendant la grossesse
- Le pourcentage des ménages avec une mère qui a cherché des soins médicaux 48 heures après le début de la fièvre
- Les raisons du retard de traitement ?
- Le lieu de recherche des soins
- Quelle est la proportion des enfants malades ayant bénéficié d'un test rapide de paludisme ou encore d'un examen microscopique pour confirmer le paludisme ?
- La proportion des enfants malades qui ont reçu un traitement adéquat ?
- Le lieu d'acquisition des ACT
- Le coût du TDR et des ACT?

3.2.5. Formuler des recommandations pour cibler les ZS à faible performance avec des interventions visant l'augmentation de la couverture vaccinale et à renforcer la lutte contre le paludisme.

4. METHODOLOGIE

4.1. Type d'étude

Pour évaluer la couverture vaccinale, comme pour les enquêtes menées en 2020, 2021, et 2022, l'ECV2023 utilisera la méthodologie recommandée par l'OMS pour les enquêtes de couverture vaccinale¹. Il s'agira d'une étude transversale visant l'estimation de la couverture vaccinale chez les enfants de 12 à 23 mois principalement, et subsidiairement chez les enfants de 6 à 11 mois. Des données seront aussi collectées au sein des ménages visités en vue d'évaluer les indicateurs de succès de la lutte contre le paludisme.

A l'approche quantitative d'évaluation de la couverture vaccinale, l'ECV2023 associera une approche qualitative afin de mieux cerner les raisons de faible performance de la couverture vaccinale.

4.2. Cadre d'étude

L'enquête quantitative se déroulera dans toutes les zones de santé de 26 provinces de la RDC, à savoir : Bas-Uélé, Equateur, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uélé, Ituri, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maindombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa.

L'étude qualitative sera réalisée aux différents niveaux de la pyramide sanitaire ; tant au niveau central (PEV) ; au niveau intermédiaire (DPS, antennes PEV) ; qu'au niveau périphérique (ZS, CS, AS).

4.3. Echantillonnage

4.3.1. Population d'étude

L'enquête de couverture vaccinale aura comme cibles les enfants de 6 à 23 mois et les femmes ayant accouché au cours des 12 mois précédant l'enquête :

. Pour la lutte contre le paludisme, la population d'étude sera constituée d'enfants âgés de moins de cinq ans, de femmes enceintes, et de femmes ayant accouché au cours des deux dernières années avant l'enquête.

Pour l'étude qualitative, les responsables du niveau central, ceux du niveau provincial, les MCZS, les IS PEV, les IT/ITA, le RECO et les mères/gardiennes (ou les pères) d'enfants âgés de moins de cinq ans seront interviewés.

¹ OMS. Enquête de couverture vaccinale par sondage en grappe : Manuel de référence. 2018

4.3.2. Estimation de la taille d'échantillon

Pour l'enquête de couverture vaccinale la taille de l'échantillon a été estimée selon la procédure préconisée par l'OMS pour le calcul de la taille de l'échantillon en grappe en vue de l'estimation de la couverture vaccinale.

- Nombre de strates couvertes par l'enquête (A) = 26 (26 provinces) ;
- Taille effective de l'échantillon (B) : 110 par ZS ;
- Effet du plan de sondage (EPS) : 1,5 ;
- Nombre moyen de ménages à visiter pour trouver un enfant éligible (D) : 8 ;
- Facteur d'inflation pour prendre en compte les non-réponses et les enfants âgés de 6 à 11 mois (E) : 15 %.

La taille minimale de la cible, c'est-à-dire le nombre d'enfants de 6 à 23 mois à enquêter au niveau de la zone de santé (taille effective d'échantillon) a été calculée en considérant comme couverture attendue la couverture vaccinale trouvée dans l'ECV2021. Cette tranche d'âge constitue le point d'entrée de l'ECV2023. Supposant que, dans la même zone de santé, l'hétérogénéité des grappes par rapport à la couverture vaccinale est minime, un effet de grappe de 1,5 est appliqué. Le coefficient de confiance est fixé au seuil de confiance de 95 %, et le degré de précision à 10%. La taille minimale de l'échantillon obtenue est majorée de 15% pour prendre en compte les enfants âgés de 6 à 11 mois et les non-réponses. Le nombre d'enfants à enquêter par grappe (aire de santé) a été obtenu en divisant la taille de l'échantillon de la zone de santé par 5, qui est le nombre minimum d'aires de santé devant être sélectionnées de manière aléatoire dans chaque zone de santé. Ce nombre est fixé pour une raison pratique, liée d'une part au nombre quotidien de 6 enfants à couvrir par enquêteur, au nombre moyen de 24 jours de collecte des données, et d'autre part aux ressources financières dévolues à l'enquête pour l'ensemble des zones de santé de la RDC. L'annexe 3 fournit des détails sur la taille de l'échantillon calculée par aire de santé, par zone de santé et par province. La taille majorée de l'échantillon varie entre un minimum de 110 et un maximum de 144 enfants par zone de santé. Pour des raisons pratiques et organisationnelles, la taille de l'échantillon a été standardisée à 150 enfants par ZS, soit 30 enfants par aire de santé, portant ainsi l'échantillon total à 83.250 pour les 26 provinces à couvrir (Annexe 4).

Au niveau de la zone de santé, la formule ci-après a été appliquée pour calculer la taille minimale de l'échantillon :

$$n \geq \frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 pq}{d^2} \text{ deff}$$

La signification des paramètres utilisés dans la formule est la suivante :


- $Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$: coefficient de confiance pour un seuil de confiance de 95%
- p : proportion d'enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés en RDC = 0,415 (ECV2021) ;
- q : proportion d'enfants de 12 à 23 mois n'ayant pas été complètement vaccinés ($q = 1-p$);
- $deff$: effet de grappe (design effect = 1,5) ;
- d : degré de précision (= 0,10) ;

4.3.3. Technique d'échantillonnage

4.3.3.1 Technique d'échantillonnage

Prenant en compte le besoin d'estimer la couverture vaccinale et les indicateurs du paludisme par zone de santé, l'enquête utilisera un échantillonnage probabiliste en grappes à trois degrés. Toutes les provinces étant concernées et, dans chaque province, toutes les zones de santé étant également concernées, l'étude utilisera comme base de sondage la liste tirée de la base de données du Système National d'Information Sanitaire (SNIS), qui répertorie toutes les zones de santé de la République Démocratique du Congo avec leurs aires de santé. Cette base de sondage sera obtenue par l'application DHIS2. En effet, fonctionnel depuis plusieurs années, le DHIS2 répertorie toutes les aires de santé programmées dans la base des données actuellement active. Le choix d'utiliser la base du SNIS de préférence par rapport à la base du MICS ou celle de l'EDS est guidé par deux considérations méthodologiques.

Echantillonnage



Légende. UEP : unité primaire d'échantillonnage ; UES : unité secondaire d'échantillonnage ; UET : unité tertiaire d'échantillonnage

Figure 1. Procédure d'échantillonnage à différents niveaux

Premièrement, par le fait que la base du SNIS est modélisée sur la configuration du système de santé en zones de santé, laquelle diffère de la configuration politico-administrative. Deuxièmement, souvent il n'y a qu'une grappe dans la base EDS/MICS pour un territoire, alors que pour l'ECV une zone de santé comprend plusieurs grappes constituées par les aires de santé, ce qui confère une plus grande sensibilité aux estimations. La procédure d'échantillonnage est résumée dans la Figure 1.

Dans l'approche de sondage, chaque zone de santé (ZS) sera considérée comme un domaine d'étude. Il y aura autant d'enquêtes que des ZS, c'est-à-dire 519 enquêtes distinctes dont les données seront agrégées par province (strate) et pour l'ensemble du pays.

Dans chaque ZS, les aires de santé (AS) constitueront des grappes. L'unité d'échantillonnage primaire (UEP) sera la grappe. L'échantillonnage sera réalisé à trois degrés :

- au 1er degré (UEP): dans chaque ZS, il y aura un tirage aléatoire stratifié de 5 grappes (AS) au minimum sur base de la liste exhaustive des AS. Dans chaque province, une aire de santé sera sélectionnée dans la ZS la plus performante et une aire de santé sera sélectionnée dans la ZS la moins performante pour les études de cas. dans les ZS ayant plus de 20 AS, une AS sera ajoutée pour chaque cinq AS additionnelles dans la ZS. Chaque zone de santé sera segmentée sur base géographique en zone de cinq aires de santé. Dans chacune de ces zones, un tirage aléatoire d'une AS sera réalisé sur les cinq AS présentes, de manière à éviter les effets de poche et obtenir une distribution plus prononcée des aires de santé à sélectionner dans la zone de santé. Ce tirage utilisera la base DHIS2, modélisée dans une application de cartographies rapportant chaque ZS avec ses AS ;
- au 2^{ème} degré (UES) : dans chaque AS sélectionnée, il sera tiré de manière aléatoire simple six (6) segments sur 16 contenant les avenues/villages sur base d'un découpage géographique de l'aire de santé en 16 segments réalisé sur une carte de l'aire de santé trouvée au niveau de l'aire de santé ;
- au 3^{ème} degré (UET) : dans chacun des 6 segments sélectionnés de l'aire de santé, les ménages habitant les avenues/villages constituent la base de sondage. Une énumération sera réalisée à l'aide d'un relevé parcellaire de ménages. Elle consistera à identifier les ménages éligibles contenant au moins un enfant de 6 à 23 mois parmi les ménages dans chaque segment sélectionné. L'énumération sera conduite par l'équipe de recherche jusqu'à atteindre la taille de 15 ménages éligibles et il y aura un tirage aléatoire systématique de 5 ménages avec au-moins un enfant de 6 à 23 mois, totalisant au moins 30 ménages par aire de santé, c'est-à-dire pour les

six segments sélectionnés de l'aire de santé. Lors de l'ECV2022, il a été constaté que le nombre moyen d'enfants éligibles dans un ménage était de 1,2. Il est attendu de théoriquement trouver 36 enfants éligibles dans 30 ménages éligibles.

Le choix aléatoire stratifié des AS se fera au niveau central par l'équipe de recherche. Un générateur de nombres aléatoires sera utilisé pour sélectionner une aire de santé dans chaque bloc géographique de cinq aires de santé sur le nombre total d'aires de santé se trouvant dans chaque zone de santé. L'équipe de recherche sélectionnera également pour chaque zone de santé deux aires de santé de remplacement à utiliser en cas de problèmes d'accessibilité (Figure 2). Normalement toutes les aires de santé sont accessibles. Dans le cadre de l'ECV2023, sont considérées comme aires de santé inaccessibles celles situées dans les zones actuellement en proie à l'insécurité, à l'activisme de groupes armés, ou aux activités de braconnage. Les informations sur la sécurité dans les aires de santé seront obtenues au niveau des Divisions Provinciales de la Santé (DPS). Dans le cas où la sécurité ne peut être garantie, la première parmi les aires de santé figurant dans la liste de réserve remplacera directement l'aire de santé insécure, et l'équipe de coordination notifiera cette décision au superviseur de pool provincial et à l'équipe d'enquête concernée.





Figure 2. Exemple de la distribution des aires de santé sélectionnées dans une zone de santé rurale

Les données en rapport avec les villages ou les avenues/rues des aires de santé seront collectées au niveau de zones de santé et auprès des autorités politico-administratives et sanitaires (Infirmier titulaire) locales au niveau de l'aire de santé. En effet, les zones de santé et les autorités politico-administratives

et sanitaires locales disposent des listes actualisées annuellement de tous les villages et avenues/rues par aire de santé. Il est aussi courant que la zone de santé et le centre de santé dispose d'une carte, même manuscrite de chaque aire de santé. C'est à partir de ces cartes que les échantillons aléatoires des UES seront tirés par les chefs d'équipe. Toutefois, l'Ecole de Santé Publique de Kinshasa utilisera les cartes disponibles au niveau central pour réaliser l'échantillonnage des segments au niveau de certaines aires de santé. Au sein de la coordination, les cartes disponibles des aires de santé seront segmentées et envoyées aux équipes de terrain.

- En milieu urbain, les chefs d'équipe, orientés par les superviseurs de pool, visiteront les bureaux des quartiers et le centre de santé afin d'obtenir la carte de l'aire de santé et la liste exhaustive des avenues/rues ;
- En milieu rural, les chefs d'équipe, orientés par les superviseurs de pool, visiteront les bureaux des secteurs et le centre de santé afin d'obtenir la carte de l'aire de santé et la liste exhaustive des villages mais aussi des avenues/rues existantes dans certaines cités ;
- L'équipe de recherche tracera, si cela n'est pas réalisée au niveau central par la coordination, en utilisant la carte disponible trois droites parallèles verticales et trois droites parallèles horizontales, équidistantes en commençant par le centre de la carte, de manière à diviser l'aire de santé en 16 segments, numérotés de 1 à 16 en commençant du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. De ces 16 segments, 6 segments seront choisis préalablement sélectionnés par la coordination (segments 2, 4, 5, 10, 12, 14). (Figure 3). Une partie importante de ce découpage sera réalisée au niveau de la coordination sur base des fiches cartographiques existantes. Dans le cas où une aire de santé découpée ne présente pas les segments sélectionnés ou présente un segment sélectionné non habité, les segments manquants ou non habités seront remplacés respectivement par les segments 7, puis 11 puis 15. L'équipe de recherche conférera avec les autorités locales pour identifier et délimiter les segments sélectionnés notamment en termes d'avenues/rues en milieu urbain, de villages en milieu rural. Une fois les avenues/rues ou villages identifiés en entier ou en partie, l'équipe de recherche procédera au relevé parcellaire de ménages de manière à identifier 15 ménages éligibles par segment en utilisant une fiche de relevé parcellaire. Si un segment ne permet pas d'atteindre le nombre minimum de 15 ménages éligibles, après énumération, le nombre atteint sera utilisé pour tirer 5 ménages. Si le nombre est inférieur à 5, l'équipe complétera l'énumération dans un autre segment sélectionné ou de remplacement.



Figures 3. Exemples de découpage d'une aire de santé urbaine et d'une aire de santé rurale en 16 segments et indication des segments présélectionnés et des segments de remplacement.

- Une fois, le relevé parcellaire effectué, l'équipe de recherche procédera à la sélection par tirage systématique de cinq (5) ménages dans chaque segment de manière à totaliser 30 ménages par aire de santé et 150 par zones de santé au minimum, susceptibles de permettre de collecter les données pour 36 enfants éligibles par aire de santé totalisant 180 enfants éligibles par zone de santé.
- Chaque équipe de terrain sera composée de quatre enquêteurs et d'un superviseur de terrain. L'équipe sera munie de fiches de relevé parcellaire permettant de réaliser le dénombrement des ménages. La fiche de relevé parcellaire indique la route principale du village ou la rue/avenue, les éléments physiques caractéristiques comme les écoles, les églises ou autres reliefs. Parmi les éléments à collecter lors du dénombrement se trouvent les ménages ayant en leur sein des enfants âgés de 6 à 23 mois. Le relevé parcellaire sera fait par blocs selon la configuration du

village ou de l'avenue. Les blocs sont séparés par la route principale qui traverse le village/avenue. A partir de cette base de sondage, le dénombrement sera réalisé avec l'aide de relais communautaires ou de guides locaux habitant les villages ou les rues concernés. Les données découlant du dénombrement réalisé sur la base du relevé parcellaire sera enregistré dans la tablette pour chaque segment de l'aire de santé (nombre de ménages relevés, nombre de ménages éligibles) pour générer les pondérations. Toutes les équipes de collecte des données seront formées à cette méthode d'échantillonnage. Les bases de sondage ainsi constituées seront transmises au superviseur de pool provincial qui, à son tour, les ramènera à l'équipe de coordination au niveau central.

Dans les ménages avec enfant de 6 à 23 mois sélectionnés, l'enquêteur procédera à des interviews avec le chef de ménage, la mère/gardienne de l'enfant de 6 à 23 mois pour tous les enfants de 6 à 23 mois présents dans le ménage. Toutes les personnes éligibles présentes dans un ménage seront enquêtées. Concernant l'enquête paludisme, tous les enfants âgés de moins de 5 ans dans le ménage (0 à 59 mois), les femmes enceintes et les femmes ayant accouché dans les 2 dernières années seront concernés dans la collecte de données.

Pour les études de cas, dans chaque province, deux zones de santé, une zone de santé performante et une zone de santé non performante, seront sélectionnées sur base d'un échantillonnage raisonné sur base de leur couverture vaccinale (notamment une $CV \geq 80\%$). Dans chacune de ces zones de santé, une aire de santé sera tirée de manière raisonnée pour constituer une étude de cas. Dans chaque aire de santé sélectionnée, deux focus groups seront organisés, un avec les mères/gardiennes et un avec relais communautaires, sélectionnés de manière raisonnée. Une interview individuelle sera conduite avec l'infirmier titulaire (IT). Dans cette zone de santé, trois interviews individuelles semi-structurées seront conduites avec le Médecin Chef de zone, l'Infirmier superviseur en charge du PEV et avec l'Animateur communautaire.

Au niveau de la province, des interviews individuelles seront organisées avec le Chef de la DPS, le Médecin Chef de Coordination PEV ou de l'Antenne PEV, l'Infirmier superviseur et le logisticien.

4.3.3.2 Technique d'échantillonnage des formations sanitaires (FOSA)

Toutes les FOSA offrant le service de vaccination des nourrissons dans les aires de santé sélectionnées pour l'enquête ménage seront enquêtées pour évaluer l'offre des services de vaccination et obtenir des informations sur la disponibilité des intrants de la vaccination. C'est également auprès de celles-ci que les équipes de terrain compléteront les données du statut vaccinal des enfants enquêtés au niveau de

ménages et dont les cartes de vaccination ne sont pas disponibles dans le ménage.

4.4. Variables-clés

4.4.1. Volet enquête dans les ménages

L'ECV va mesurer les mêmes variables que celles du MICS dans son volet vaccination.

De manière spécifique, les informations sur les variables ci-après seront collectées :

- *Caractéristiques sociodémographiques du ménage et du chef de ménage* : milieu de localisation du ménage, sexe et âge du chef de ménage, religion du chef de ménage, ethnie du chef de ménage, occupation du chef de ménage, nombre de personnes dans le ménage, nombre d'enfants de moins de 5 ans, nombre d'enfants de 6 à 11 mois, nombre d'enfants de 12 à 23 mois, possession des biens (électricité, radio, TV, téléphone fixe, réfrigérateur, lit, groupe électrogène, etc.),
- *Caractéristiques sociodémographiques de la mère/gardiennne* : âge, statut matrimonial, niveau d'instruction, religion, profession, ethnie ;
- *Caractéristiques sociodémographiques de l'enfant* : âge, sexe ; périmètre brachial

Variables liées à la vaccination : possession de la carte de vaccination, statut vaccinal de l'enfant pour chaque antigène ; date de la vaccination pour chaque antigène reçu (jour, mois, année), participation à une campagne de vaccination, vaccins reçus au cours des campagnes de vaccination, raisons de la non-vaccination, attitude vis-à-vis de la vaccination des enfants, utilisation des services de vaccination depuis l'apparition du Covid-19 en RDC, statut de vaccination antitétanique des femmes ayant accouché au cours des 12 mois précédant l'enquête, raisons de la non-vaccination antitétanique et attitude vis-à-vis de la vaccination antitétanique des femmes ayant accouché au cours des 12 mois précédant l'enquête :

- *Données démographiques* : Répartition de la population par âge.
- *Biomarqueurs* : présence et/ou de la concentration sérique des anticorps contre les antigènes vaccinaux chez les enfants dans les provinces sélectionnées (voir Annexe 2).
- *Paludisme* : présence de la moustiquaire imprégnée d'insecticide, utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide ; connaissance de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide ; traitement à la SP chez la femme enceinte ; prise en charge du paludisme.

4.4.2. Volet enquête dans les centres de santé :

- *Disponibilité des vaccins et autres intrants de la vaccination au cours des 12 mois précédant l'enquête* ;

- *Disponibilité de la carte de vaccination au cours des 12 mois précédant l'enquête ;*
- *Détention de la carte de vaccination au niveau du CS.*

4.4.3. Volet paludisme :

L'enquête de couverture vaccinale 2023 a la spécificité d'intégrer quelques indicateurs paludisme à savoir : la disponibilité d'au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action (MILDA) dans les ménages ; le nombre des MILDA disponibles dans les ménages ; le nombre des MILDA utilisés dans les ménages ; l'utilisation la nuit précédant l'enquête des MILDA par les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes ; le pourcentage des ménages ayant une bonne connaissance de l'utilisation des MILDA ; le pourcentage des femmes enceintes ayant reçu au moins une dose de SP supervisée pour la prévention du paludisme durant la grossesse ; le pourcentage des femmes enceintes ayant reçu au moins deux doses de SP supervisées pour la prévention du paludisme durant la grossesse ; le pourcentage des femmes enceintes ayant reçu au moins trois doses de SP supervisées pour la prévention du paludisme durant la grossesse ; le pourcentage des ménages avec des mères ayant cherché les soins dans les 48 heures après le début de fièvre de l'enfant ; les raisons de la recherche tardive de soins ; les lieux de recherche de soins en cas de fièvre des enfants ; le pourcentage d'enfants ayant bénéficié de TDR ou microscopie après un épisode de fièvre ; le pourcentage d'enfants ayant bénéficié d'un traitement adéquat contre le paludisme ; le lieu d'obtention des ACT ; les coûts des TDR et des ACT ; la disponibilité des sites de soins communautaires.

4.5. Technique de collecte des données

Données quantitatives

Pour collecter les données de l'ECV2023, trois principales techniques seront utilisées : l'interview, l'observation et la revue documentaire. Dans les provinces sélectionnées, les données en rapport avec la présence et/ou la concentration sérique des anticorps contre les antigènes vaccinaux seront obtenues par prélèvement (Annexe 5). L'interview sera réalisée avec les chefs de ménage, les mères/gardiennes d'enfants âgés de 6 à 23 mois, et les infirmiers titulaires des centres de santé ou leurs adjoints. L'observation portera sur le carnet/carte de vaccination en vue de relever les dates auxquelles les vaccins ont été reçus. La revue documentaire portera sur les registres de vaccination, les fiches de stock, et les rapports mensuels des centres de santé.

La couverture vaccinale dans la présente enquête sera mesurée par trois méthodes :

- a. L'observation des données sur la carte de vaccination ou fiches conservées à domicile
- b. Le recours à la mémoire ou histoire verbale de la vaccination
- c. Les registres des établissements de santé : cette méthodologie a comme avantages de rechercher davantage des preuves documentées de la vaccination.

Il sera nécessaire d'examiner les registres de vaccination des centres de santé si dans la grappe on trouve un ou plusieurs enfants pour lesquels les mères/gardiennes affirment que ceux-ci ont été vaccinés et si :

- La personne prenant soin de l'enfant ne produit pas une carte de vaccination ;
- La carte montre des doses sans dates, avec une encoche ou ;
- La carte ne montre pas les vaccinations mentionnées par la personne prenant soin de l'enfant.

Les équipes visiteront tous les centres de santé qui vaccinent dans les grappes pour initier des contacts, se procurer les documents à l'avance (photocopies des registres) et apprécier la qualité des registres (leur lisibilité). Ainsi, avant le début de la collecte des données, les équipes devront obtenir les listes des vaccinateurs (y compris ceux du secteur privé), centres de santé et cliniques avec leurs zones de couverture géographiques. Il est préférable de les obtenir du MCZ ou du médecin chef d'antenne PEV. Les équipes devront collaborer avec des guides locaux pour faciliter l'identification et la localisation des sites de vaccination fréquentés par la population de la grappe. Si les enfants se font vacciner par des sources privées, les enquêteurs visiteront aussi leurs centres pour obtenir les renseignements absents des cartes de vaccination.

Il sera inefficace de rencontrer chaque vaccinateur et d'attendre la fin de sa journée de travail pour consulter ses registres. Il sera préférable d'emprunter les registres pour quelques heures et de les photocopier. Si possible, il faudra demander au MCZ de convoquer tous ses vaccinateurs avec leurs registres au même endroit. Si les photocopies sont obtenues à l'avance, la recherche des informations pourra commencer le jour suivant le remplissage des questionnaires. Dans le cas où une photocopieuse n'est pas disponible, les équipes de collecte des données devront visiter les établissements sanitaires après la fin de la collecte des données dans une grappe en vue de compléter les données sur le statut vaccinal des enfants. Au cas où les données d'un registre seraient difficiles à déchiffrer, les équipes devront requérir la collaboration de celui qui les a inscrites.

Pour faciliter la recherche des données de vaccination dans les registres des établissements sanitaires les enquêteurs devront suivre les étapes ci-après pour retrouver les enfants dans le registre :

- Faire coïncider le mois et l'année de naissance avec les pages équivalentes du registre;
- Si les entrées comportent un numéro de série de même type que les cartes, il faut chercher dans le registre le numéro de la carte ;
- Essayer de faire coïncider le nom du village, ou de l'unité administrative du questionnaire avec celui du registre ; et

- Essayer de faire coïncider le nom de l'enfant et de ses parents inscrits sur la carte avec ceux du registre. Souvent les enfants ont deux noms (un nom familial et le nom officiel), ce qui rend la recherche difficile.

Après avoir retrouvé l'enfant dans le registre, il faudra rechercher une date pour chaque vaccination que l'enfant a effectivement reçue et enregistrer l'information sur le formulaire VSCS extrait du manuel de l'enquête par grappe de couverture vaccinale de l'OMS (voir Annexe 5).

Les données sur les indicateurs du paludisme seront obtenues par l'interview des chefs des ménages, des mères des enfants âgés de 0 à 59 mois et des femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans dans les ménages visités.

Enquête qualitative

Pour la partie qualitative, les mères/gardiennes d'enfants de moins de cinq ans, les RECO, les IT, les MCZS et les IS PEV seront interviewés. Des informateurs-clés seront également interrogés au niveau central et au niveau provincial.

L'étude qualitative portera sur les facteurs systémiques et individuels pouvant influencer la couverture vaccinale. Les facteurs systémiques seront explorés au niveau central, provincial et périphérique de la pyramide sanitaire. Il s'agira essentiellement de la disponibilité des intrants de la vaccination, de leur stockage et de leur transport et distribution, ainsi que de l'existence des directives et procédures opérationnelles standards relatives aux activités de vaccination de routine. Au niveau des sites de vaccination, c'est-à-dire au niveau des centres et postes de santé, outre la disponibilité des intrants de la vaccination, il s'agira de l'adéquation de la formation des agents vaccinateurs, de la motivation et de la supervision de ces derniers, de l'organisation des séances de vaccination, de l'accessibilité des sites de vaccination, ainsi que de la disponibilité des cartes et registres de vaccination. Au niveau de la communauté (dans les aires de santé) les données qualitatives seront collectées auprès des RECO et des mères/gardiennes d'enfants dans quelques zones de santé choisies dans les provinces les plus performantes et dans les provinces les moins performantes sur la base des résultats de l'ECV2022. A ce niveau, il sera organisé des focus groups des RECO d'une part et des focus groups des mères/gardiennes d'autre part. Les discussions porteront essentiellement sur les obstacles à la vaccination, les connaissances des mères en rapport avec le calendrier vaccinal de leurs enfants et le mode ou site d'administration des différents vaccins, ainsi que sur leurs attitudes vis-à-vis des vaccins et de la vaccination des enfants. Des guides d'interviews des informateurs-clés et de focus groups seront préparés en vue de la collecte des données qualitatives. Le Tableau 1 présente les éléments-clés de l'étude qualitative selon le niveau de la pyramide sanitaire.

Tableau 1. Eléments-clés de l'étude qualitative selon les niveaux de la pyramide sanitaire

	Niveau central	Niveau provincial	Zone de santé	Centre de santé	Aire de santé
Cadre de l'étude	Ministère SPHP (SG) INSP PEV central Dépôt central PEV	DPS Antenne PEV	Médecin Chef de ZS Infirmier superviseur PEV	IT ou ITA	RECO Mères/gardiennes d'enfants
Nombre de répondants	5	2	2	2	8 RECO par ZS choisie 8 mères/gardiennes dans une AS choisie par ZS choisie
Méthode d'échantillonnage	Choix raisonné	Choix raisonné	Choix raisonné	Choix raisonné	Choix raisonné des ZS et AS
Technique de collecte des données	Interviews des informateurs-clés et interviews approfondies	Interviews des informateurs-clés et interviews approfondies	Interviews des informateurs-clés et interviews approfondies	Interviews approfondies	Focus group des RECO Focus group des mères/gardiennes
Variables-clés	• Disponibilité des intrants de la vaccination • Stockage des intrants • Transport des intrants • Disponibilité des directives et procédures standards	• Disponibilité des intrants de la vaccination • Stockage des intrants • Transport des intrants • Disponibilité des directives et procédures standards	• Disponibilité des intrants de la vaccination • Stockage des intrants • Transport des intrants • Disponibilité des directives et procédures standards	• Disponibilité des intrants de la vaccination • Formation des agents vaccinateurs • Supervision des agents vaccinateurs • Motivation des agents vaccinateurs • Organisation des séances de vaccination • Accessibilité des sites de vaccination • Disponibilité des cartes/registres de vaccination	• Connaissances du calendrier vaccinal de l'enfant • Connaissance mode/site d'administration des différents vaccins • Attitudes vis-à-vis des vaccins et de la vaccination

4.6. Plan de collecte des données

4.6.1. Obtention de l'approbation du Comité d'Ethique

Avant la collecte des données, le protocole de recherche validé par le Comité de pilotage de l'enquête de couverture vaccinale (CPECV) sera soumis au Comité d'Ethique. Le point 4.9 fournit de plus amples détails concernant les aspects éthiques de cette étude.

4.6.2. Recrutement, formation et organisation des équipes de terrain

L'équipe de coordination de l'ECV2023 procédera au recrutement de 26 superviseurs de pools provinciaux parmi les personnes expérimentées des deux sexes ayant participé aux études similaires. Ces personnes bénéficieront d'une formation de sept jours à Kinshasa sur les objectifs et la méthodologie de l'ECV2023, l'encadrement et la supervision des superviseurs de terrain et des enquêteurs, ainsi que le contrôle de la qualité des données. Dans chaque province, les données seront recueillies par 10 à 30 enquêteurs de deux sexes dirigés par quatre superviseurs de terrain de deux sexes. Des équipes de quatre personnes, dont trois enquêteurs et un superviseur de terrain seront constituées. Le superviseur de terrain sera chargé d'assurer la mise en œuvre de l'enquête dans les ZS d'affectation. Il sera responsable de la préparation, de l'organisation et de la direction du travail sur le terrain. Ainsi, il devra s'assurer que la collecte des données se fasse conformément aux procédures détaillées dans le protocole de recherche et que les données collectées soient de bonne qualité.

En vue d'assurer la qualité du travail, les superviseurs de terrain et les enquêteurs seront recrutés parmi le personnel ayant l'habitude de travailler avec l'ESPK au cours des études de recherche. Au niveau de chaque province, une formation de quatre jours sera organisée à l'intention des enquêteurs sous l'encadrement de l'équipe de coordination et du superviseur de pool. Cette formation comprendra un volet théorique et un volet pratique. Les aspects importants de la formation sont : (1) Les objectifs de l'enquête, le contenu du questionnaire et (2) l'utilisation de la tablette électronique pour la collecte des données. Le premier jour de la formation sera consacré aux techniques d'interview, aux procédures d'obtention du consentement éclairé, et au contenu du questionnaire. Les jours suivants seront mis à profit pour apprendre/rappeler l'utilisation de la tablette pour l'encodage des données, la technique d'échantillonnage, l'extraction des données dans les cartes de vaccination et dans les registres de CS. La sélection des superviseurs de terrain se fera sur base de la performance des enquêteurs lors de la formation, par des tests de contrôle de connaissance. Un pré-test sera organisé en fin de formation dans une aire de santé non sélectionnée pour l'étude.

4.6.3. Programmation de la tablette avec les instruments de collecte de données

Les données seront collectées sur tablettes électroniques en utilisant l'application Survey CTO. Quatre masques de saisie seront développés. Ces masques de saisie seront conçus de sorte à pouvoir ressembler aux questionnaires d'enquête. Le premier masque sera celui de l'enquête auprès des ménages. Vu que dans un ménage on peut trouver plus d'un enfant éligible, ce masque principal du ménage sera relié à des masques secondaires pour collecter les données sur chaque enfant éligible du ménage. Le deuxième, le troisième masque et le quatrième seront destinés respectivement à la collecte des données des indicateurs paludisme, dans les registres des établissements sanitaires pour compléter les informations sur le statut vaccinal des enfants, et à la collecte des données sur l'offre de services de vaccination au niveau des établissements sanitaires.

La programmation de l'outil de collecte des données sur tablette sera réalisée par le gestionnaire des données de l'équipe de coordination de l'enquête. Un nombre suffisant de tablettes sera rendu disponible selon le nombre des enquêteurs et superviseurs dans l'ensemble des provinces.

Le questionnaire standard du MICS pour les enfants de moins de cinq ans dans son volet lié à la vaccination contextualisé pour la RDC sera adapté en y ajoutant d'autres questions relatives aux raisons de la non-vaccination et à la connaissance de l'importance de la vaccination. En outre, des questions sur les caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage et de la mère/gardienne de l'enfant ayant l'âge de 6 à 23 mois seront tirées de deux autres questionnaires du MICS notamment celui du « Ménage » (caractéristiques du ménage) et celui « Individuel Femme de 15 à 49 ans » dans son volet caractéristique de la femme. Le questionnaire paludisme sera également tiré de l'enquête MICS et adapté en y ajoutant certaines questions sur les coûts des tests, des ACT, la connaissance sur l'utilisation correcte des moustiquaires imprégnées d'insecticides, disponibilité des sites de soins communautaires, etc.

4.6.4. Enregistrement des données qualitatives

Différents outils seront employés lors de la collecte des données qualitatives, notamment, les guides d'interview des informateurs-clés, les guides d'interviews approfondies et les guides des discussions de groupe (focus group). Les interviews et les discussions de groupe seront enregistrées à l'aide de dictaphones et des notes seront prises par les enquêteurs au cours des interviews et des discussions en vue de compléter les enregistrements audios.

4.6.5. Obtention des autorisations

L'ESPK mènera les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations (ordre de service) du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Sur le terrain les équipes de collecte des données prendront contact avec les autorités sanitaires, à savoir le Chef de Division provinciale de la santé et les Médecins

chef des zones de santé. Ces visites seront mises à profit pour informer les autorités sur les objectifs et les autres aspects importants de l'étude et pour collecter les données sur la taille et la composition par âge de la population dans les zones et aires de santé.

Au niveau des aires de santé, les équipes de collecte des données prendront contact avec les responsables des bureaux de quartier ou les chefs de village pour les informer du début de la collecte des données dans leur circonscription administrative.

Au niveau des centres de santé, les superviseurs de terrain procéderont à l'interview de l'infirmier titulaire (IT) ou de son adjoint (ITA).

4.6.6. Collecte de données à l'aide de tablettes/ téléphones androïdes

De manière quotidienne, les coordonnées des ménages sélectionnés (grappe, avenue/village et numéro) seront mises à la disposition des chefs d'équipe qui les transmettront à leur tour aux enquêteurs. Pour assurer la qualité des données collectées, le principe d'une moyenne de 10 ménages/enquêteur/jour a été retenu. En présence de la personne à interviewer, l'enquêteur expliquera le but et les procédures de l'étude et obtiendra son consentement éclairé avant de mener l'interview. Il est important de noter que la collecte des données se fera de manière anonyme.

Toutes les données à recueillir pour l'enquête seront encodées sur une tablette androïde à l'aide de l'application «Survey CTO » largement utilisé actuellement dans les programmes de collecte de données de santé publique en Afrique. Toutes les données, y compris les coordonnées GPS, seront transmises à partir de la tablette de l'enquêteur à un serveur virtuel sécurisé après leur collecte. Cependant, en vue d'assurer le contrôle de qualité, les données collectées seront enregistrées jusqu'à ce que leur exactitude soit vérifiée par le superviseur de terrain qu'il vérifie l'exactitude des données. Ce n'est qu'après cette étape, que le superviseur de terrain pourra soumettre le formulaire dûment rempli au serveur. L'accès au serveur sera protégé par un mot de passe. Seule l'équipe des investigateurs et certains membres du Comité de pilotage auront accès au serveur.

Contrôle de qualité de la collecte des données sur terrain :

C'est un processus permanent tout le long de la collecte qui doit être effectué par le superviseur de terrain, et par l'enquêteur, tout en veillant à respecter la procédure ci-après :

- *Au début de chaque journée de travail* : le superviseur de terrain devra désigner à chaque enquêteur de son équipe, tous les ménages qu'il doit interviewer. Il doit également insister qu'aucun ménage ne peut être remplacé de manière unilatérale et sans son autorisation ;
- *Au cours de la journée de travail* : le superviseur de terrain devra sélectionner au hasard sur la liste des ménages à interviewer pour ce jour, quelques ménages devant être enquêtés et ensuite les visiter

personnellement afin de vérifier l'effectivité du passage de l'enquêteur et de l'administration du questionnaire à une personne éligible ;

- *A la fin de la journée de travail* : le superviseur de terrain devra vérifier avec chaque enquêteur toutes les données encodées au cours de la journée et éventuellement de corriger les erreurs, soit directement ou après un deuxième passage dans le ménage. Ce n'est qu'après avoir effectué toutes ces vérifications que le superviseur de terrain pourra soumettre le formulaire rempli au serveur.
- *Au cours du traitement et de l'analyse des données* un contrôle additionnel sera réalisé.

4.7. Plan de traitement et d'analyse des données

Traitement et analyse des données quantitatives

Pour cette enquête cinq bases des données seront générées à savoir : (1) la base des données des ménages, (2) la base des données des enfants de 6 à 23 mois, (3) la base des données relatives au statut vaccinal des enfants extraits des registres des établissements de santé, (4) la base des données de l'évaluation de l'offre de services de vaccination dans les établissements sanitaires, et (5) la base des données relative aux indicateurs du paludisme. Ces bases des données seront ensuite exportées sur Stata pour nettoyage, traitement et analyse. Au cas où des changements des valeurs devraient être effectués dans les bases des données lors du nettoyage, ces changements seront consignés dans un do-file de nettoyage. Tout changement effectué sur Stata ne modifiera pas les valeurs dans la base de données originale. Le do-file inclura soit des commentaires soit des paramètres permettant de comprendre les raisons du changement de la valeur. Les erreurs les plus fréquemment rencontrées (duplication des données, non-respect des sauts, des données incohérentes) seront minimisées en recourant à la collecte des données électronique par l'usage des masques de saisie comportant des contraintes et relevances. La commande *deduplicate* report sera utilisée pour rechercher d'éventuels doublons dans la base des données.

Après le nettoyage, les trois premières bases des données seront fusionnées grâce aux identifiants qui seront créés avant l'analyse. La structure des bases des données sera testée avec les données du pré-test afin de pouvoir développer d'emblée les programmes de traitement et d'analyse des données. Une liste complète des variables de l'enquête, dénommée *Dictionnaire de Données* ou *Livre de Codes* sera élaborée lors de la création de la base de données. Pour chaque variable il sera défini le type (alphabétique ou numérique), le label et les valeurs. A la fin de la collecte des données le livre de codes sera mis à jour par un résumé de chaque variable de la base de données. Vu que les données seront analysées à l'aide du logiciel « Indicateurs de la qualité de la couverture vaccinale » (VCQI) de l'OMS, les noms de variables et les conventions de codage énumérées dans le document *VCQI Forms and*

Variable List (FVL) seront utilisés dans le dictionnaire des codes (OMS, 2017).

Le gestionnaire de données sera responsable pour le suivi de l'envoi des données au serveur et du téléchargement des bases des données. Le coordonnateur chargé de l'analyse des données sera responsable du nettoyage, du traitement et de l'analyse des données.

Pour minimiser les erreurs d'échantillonnage, une pondération des données sera effectuée. Elle se fera en trois étapes, comme indiqué ci-dessous :

- Première étape : calcul de la probabilité de sélection des AS dans une ZS
- Deuxième étape : calcul de la probabilité de sélection d'un segment de l'aire de santé dans une AS
- Troisième étape : calcul de la probabilité de sélection d'un ménage éligible dans un segment de l'aire de santé.
- Ensuite la pondération sera calculée :
$$\frac{1}{(PSAS \times PS_{segment} \times PSménage)}$$

Les tableaux des fréquences des indicateurs ci-après seront produits (inclus les IC à 95%) :

- Possession de la carte de vaccination ;
- Couverture vaccinale selon la carte de vaccination ; selon la déclaration de la mère et selon les deux sources à la fois ;
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu le vaccin BCG à la naissance ;
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu toutes les doses du vaccin VPO ;
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu les 3 doses du vaccin Pentavalent (Penta 3)
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu le vaccin VPI
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, de 9 mois et plus, ayant reçu le vaccin anti rougeoleux VAR ;
- Proportion d'enfants, de 9 mois et plus, ayant reçu le vaccin anti amaril ;
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu les trois doses du vaccin anti pneumococcique PCV13 ;
- Proportion d'enfants, de 9 mois et plus, ayant reçu tous les vaccins (enfants complètement vaccinés);
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, n'ayant reçu aucun vaccin ;

- Taux de déperdition entre la 1ère et la 3ème dose de VPO, Pentavalent et PCV ;*
- Proportion des ménages enquêtés qui possède au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide ;
- Nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide disponibles par ménage ;
- Nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide utilisées par ménage ;
- Proportion des femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans qui ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ;
- Pourcentage de ménages possédant une bonne connaissance de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide ;
- Pourcentage des femmes enceintes recevant trois doses ou plus de SP sous supervision pour la protection contre le paludisme pendant la grossesse ;
- Pourcentage des ménages avec une mère qui a cherché les soins médicaux 48 heures après le début de la fièvre de l'enfant ;
- Proportion d'enfants malades bénéficiant d'un test rapide de paludisme ou encore d'un examen microscopique pour confirmer le paludisme ;
- Proportion d'enfants malades recevant un traitement adéquat contre le paludisme.

Les proportions seront produites avec la méthode de linéarisation ; les IC à 95% seront calculées par la méthode de Wilson.

L'annexe 4 présente les maquettes des principaux tableaux qui seront utilisés pour résumer les résultats de l'enquête par zone de santé, province et pour l'ensemble du pays.

Les variables sociodémographiques du chef de ménage et de la mère/gardienne de l'enfant seront les principales variables qui seront croisées avec le statut vaccinal de l'enfant. La disponibilité des vaccins et des intrants-clés de la vaccination au cours des 12 mois précédant l'ECV2023 sera croisée avec le statut vaccinal des enfants dans chaque ZS.

Traitement et analyse des données qualitatives

Pour le traitement et l'analyse des données qualitatives, nous allons procéder en trois étapes. La première, est la préanalyse ou l'organisation des données. Ceci implique une segmentation et une décontextualisation. La seconde étape consiste à procéder aux opérations de codage, décompte ou énumération : c'est l'exploitation du matériau recueilli, dont le processus consiste à « découper le contenu du discours ou du texte en unités d'analyse qui sont représentées par des mots, phrases, thèmes etc. Nous allons ensuite les intégrer au sein de catégories sélectionnées en fonction de l'objet de la

recherche ». La dernière étape consiste à interpréter les résultats, les synthétiser et en tirer des inférences. Le codage, ou lemmatisation, va consister en un processus de déstructuration puis de restructuration, à une décontextualisation puis une recontextualisation. L'exploitation du matériau va nous aider à découper le texte en unités d'analyse ou unités de sens (mots ou segments), puis à procéder à l'étude qualitative ou quantitative de ces unités. L'analyse que nous allons effectuer est une analyse de contenu qui est une analyse thématique, consistant à lire l'ensemble d'un corpus, tout en identifiant les thèmes qu'il contient, pour ensuite produire du verbatim par thème. A la fin, nous allons procéder à une analyse statistique des thèmes.

Le logiciel d'aide à l'analyse de données qualitatives que nous allons utiliser est le Nvivo qui est adapté pour gérer, mettre en forme et donner un sens aux données qualitatives. Ce logiciel est conçu selon une approche manuelle, celle de « l'analyse papier-crayon ». Il s'agit de ranger des données brutes dans des catégories données à priori ou constituées au fur et à mesure, selon le principe des outils dictionnaires-registres.

4.8. Définition des concepts

- Enfant complètement vacciné : un enfant sera considéré complètement vacciné s'il a reçu une dose de BCG (protection contre la tuberculose), trois doses de vaccin contre la poliomyélite, trois doses de Pentavalent (contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, hépatite B et Hib) et une dose du vaccin contre la rougeole. À ceux-ci s'ajoutent, depuis quelques années, une dose de vaccin contre la poliomyélite donnée à la naissance, une dose de vaccin contre la fièvre jaune, le VPI et les 3 doses du PCV.

Les données de vaccinations seront issues de deux sources : le carnet/carte de vaccination ou la déclaration de la mère. Les indicateurs de couverture vaccinale seront calculés de manière séparée c'est-à-dire si l'on prend pour illustration la proportion d'enfants complètement vaccinés, elle sera calculée comme la proportion d'enfants de 12 à 23 mois ayant reçu tous les vaccins recommandés sur base de la carte de vaccination et sur base de la déclaration de la mère. Ils seront également calculés en faisant la somme des deux sources.

- Ménage : un groupe de personnes qui vivent et qui prennent leur repas ensemble. Ils reconnaissent tous l'autorité d'une même personne dénommée le « chef de ménage ».
- Mère ou gardienne de l'enfant : le répondant principal au cours de cette ECV sera la mère ou la principale personne en charge des enfants, pour la simple et bonne raison que ce sont ces personnes qui sont le plus susceptibles de mieux connaître les informations en rapport avec la santé de l'enfant.

- Enfant ayant reçu un traitement adéquat contre le paludisme : le traitement adéquat sera considéré comme l'utilisation de la combinaison artésunate Amodiaquine ou Artemether Lumefantrine lors de l'épisode fièvre avec un TDR positif ou une GE positive.
- Connaissance sur l'utilisation correcte des MILD : quatre questions seront posées pour mesurer cet indicateur.

4.9. Considérations éthiques

Avant de débiter l'interview un consentement éclairé verbal sera obtenu des participants à l'étude. Le consentement est intégré au questionnaire de collecte des données (Annexe 5). Une certification écrite et signée par l'enquêteur sera consignée sur la copie qui sera remise aux répondants. L'équipe de recherche devra fournir à ceux-ci des informations portant sur les éléments ci-après : la nature de l'étude, ses objectifs, les risques et les bénéfices encourus, la liberté de participer ou non sans aucun préjudice, la confidentialité, les coordonnées du responsable de l'étude pour des contacts ultérieurs en cas de besoin. Ainsi, sur chaque questionnaire configuré sur la tablette sera repris le formulaire de consentement éclairé qui contiendra toutes les informations citées ci-haut. La confidentialité et l'anonymat des participants seront protégés de la manière suivante :

- (i) Lors des interviews, les prénoms des enfants ne seront mentionnés que pour faciliter la conversation. Ils ne figureront pas dans les rapports. Seuls les membres de l'équipe de recherche auront un accès momentané à ces informations.
- (ii) L'accès au serveur sera protégé par un mot de passe. Seule l'équipe des investigateurs et certains membres du Comité de pilotage auront accès au serveur.

Par ailleurs, aucun risque ne sera encouru par les sujets participant à l'étude à l'exception peut-être du temps qu'ils pourraient accorder à répondre aux questions. L'équipe de recherche aura la responsabilité de minimiser le temps mis pour administrer le questionnaire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle bénéficiera d'une formation au début de l'étude pour maîtriser les questions et le remplissage du questionnaire.

Les bénéfices attendus de cette étude seront, entre autres, l'amélioration de la couverture vaccinale pour les enfants des zones de santé de la RDC et la protection des enfants et des femmes enceintes contre le paludisme et le tétanos. En effet les données actualisées de couverture vaccinale seront utilisées pour réduire les disparités dans l'offre de services de vaccination de qualité et par là réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination. Les données sur les indicateurs du paludisme seront utilisées pour renforcer les activités de prévention dans les ménages en général et particulièrement aux bénéfices des enfants et des femmes enceintes.

Les questions et les inquiétudes des participants à l'étude seront aussi prises en considération et ils pourront à tout moment les adresser soit à l'équipe de recherche locale, soit à l'un des investigateurs de l'étude dont les coordonnées figureront sur tous les questionnaires.

Il n'y a aucun avantage direct pour les participants à l'étude. Toutefois, les informations de cette étude serviront à éclairer les futures décisions et politiques concernant les maladies évitables par la vaccination, le système de vaccination de routine en RDC, et le renforcement de la lutte contre le paludisme. Ces résultats peuvent également avoir des implications pour la lutte contre la maladie dans d'autres pays de la région et dans le monde.

4.10. Pré-test

Le dernier jour de la formation des enquêteurs sera mis à profit pour pratiquer, en situation réelle, le relevé parcellaire, la sélection des ménages et la collecte des données à l'aide de la tablette électronique. Les enquêteurs devront réaliser des entretiens individuels sur des cibles réelles dans une aire de santé et dans un centre de santé qui ne seront pas inclus dans l'enquête. Les résultats du pré-test permettront de juger de la maîtrise de la méthodologie de l'enquête par les enquêteurs et de corriger les erreurs.

5. PLAN DE GESTION DU PROJET ET D'UTILISATION DES RESULTATS

5.1. Administration et suivi du projet

L'ECV2023 sera coordonnée par des Investigateurs de l'Ecole de Santé Publique de Kinshasa. Il s'agit du Professeur Paul Samson LUSAMBA DIKASSA comme Investigateur principal (IP), des Professeurs Jean NYANDWE KYLOKA, Eric MAFUTA MUSALU, Aimée LULEBO MAMPASI comme Co-investigateurs (Co-IP), du Dr Nono MVUAMA MAZANGAMA comme associé de recherche, de Mr Maurice MUTUALE KABANGO comme gestionnaire des données électroniques, de M. Joël NDEMBE MABIALA comme Administrateur Gestionnaire, de quatre assistants de recherche, d'un logisticien et d'un comptable. L'IP sera responsable de la réalisation de l'enquête conformément au protocole de recherche et il représentera l'équipe de recherche aux discussions avec les parties prenantes (bailleurs de fonds, PEV, UNICEF, GAVI, etc.).

La gestion des fonds de l'ECV2023 respectera les procédures administratives et financières de l'ESPK et se fera en harmonie avec les procédures de l'UNICEF en la matière. Par ailleurs, l'ECV2023 sera coordonnée par un Comité de pilotage (CPECV) composé du Programme Elargi de Vaccination (PEV), du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), de l'OMS, de l'UNICEF, des représentants des partenaires, et de l'ESPK.

Le CPECV sera chargé des tâches principales ci-après : (i) approbation du protocole de recherche, y compris la méthodologie, les outils de collecte des données, ainsi que le calendrier ; (ii) suivi de la mise en œuvre de l'enquête ; (iii) approbation du rapport préliminaire sur les résultats-clés et du rapport final.

Dans le cadre du suivi du projet, l'ESPK tiendra des réunions régulières avec le CPECV au cours desquelles sera discuté l'état d'avancement de l'enquête.

5.2. Plan et calendrier de travail

Activité-clé	Période/échéance
1. Actualisation du protocole de recherche	20-25/11/2023
2. Présentation du protocole de recherche au Comité de pilotage de l'enquête et validation	23/01/2024
3. Soumission du protocole de recherche au Comité d'éthique et obtention de l'approbation	24/01 – 08/02/2023

Activité-clé	Période/échéance
4. Organisation de l'atelier de planification de l'équipe de recherche	19 - 27 /02/2024
5. Recrutement et formation des superviseurs de pools provinciaux à Kinshasa	04 - 9/03/2024
6. Paramétrage des tablettes androïdes pour la collecte des données	04 - 9/03/2024
7. Déploiement des superviseurs de pools provinciaux	11 - 16/03/2024
8. Recrutement et formation des enquêteurs dans les provinces	18 - 28/03/2024
9. Déploiement des enquêteurs dans les ZS	29/03 - 05/04/2024
10. Collecte des données dans les ZS	29/03 - 05/05/2024
11. Traitement et analyse des données du volet VACCINATION	01 - 31/05/2024
12. Calcul et transmission des indicateurs relatifs à la VACCINATION	01 - 31/05/2024
13. Traitement et analyse des données du volet PALUDISME	03 - 29/06/2024
14. Transmission et présentation du rapport préliminaire VACCINATION et PALUDISME au Comité de pilotage	01/07 – 06/07/2024
15. Elaboration du rapport final VACCINATION	08/07 - 09/08/2024
16. Transmission du rapport final du volet VACCINATION au Comité de pilotage	12/08/2024
17. Elaboration du rapport final du volet PALUDISME	08/07 - 09/08/2024
18. Transmission du rapport final du volet PALUDISME au Comité de pilotage	12/08/2024
19. Dissémination des résultats	19/08 - 19/09/2024

5.3. Plan d'utilisation et de diffusion des résultats

La mesure des taux de couverture vaccinale par ZS dans les provinces de la DRC sera utilisée pour les objectifs suivants: (i) suivre les performances du programme de vaccination de routine au niveau provincial et périphérique, étant donné que les rapports de routine accusent quelques faiblesses de qualité; (ii) mesurer l'efficacité des interventions mises en œuvre dans ces provinces y compris les activités supplémentaires de vaccination (ASV) au cours de ces dernières années et visant à augmenter la couverture vaccinale; (iii) éclairer les éléments faibles des programmes, en documentant, par exemple, le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin (souvent un indicateur d'accès aux soins de santé), en estimant le taux d'abandon entre la première et la dernière vaccination (un taux élevé militant en faveur

d'obstacles au retour et au suivi des enfants au sein du système de santé et en estimant la fréquence des occasions manquées de vaccination causées par l'absence de vaccinations simultanées); (iv) mesurer la couverture des vaccins récemment introduits dans le calendrier vaccinal national et la comparer à la couverture des vaccins plus anciens (si la couverture des nouveaux vaccins est plus basse, cela peut suggérer des problèmes d'approvisionnement et/ou des carences dans les activités de sensibilisation, éducation et communication liées à l'introduction du nouveau vaccin).

Les résultats de l'étude qualitative serviront à explorer les facteurs systémiques et individuels concourant à la réalisation de bonnes ou faibles performances en matière de vaccination de routine des nourrissons en RDC. L'analyse plus complète de la situation de la vaccination ainsi réalisée pourra permettre d'identifier des actions appropriées afin d'atteindre les cibles du Programme Elargi de Vaccination.

En vue de faciliter l'appropriation des résultats de cette enquête par les bénéficiaires principaux, le PEV et le PNLP, dont les représentants devront s'impliquer dans la conception de cette étude. Ils pourront aussi observer à leur convenance le déroulement de la collecte des données sur terrain. En outre, les résultats de l'étude seront présentés aux parties prenantes au cours d'un atelier pour identifier les ZS avec des faibles performances afin de les cibler prioritairement avec des interventions appropriées et basées sur des évidences.

BIBLIOGRAPHIE

- Gavi. Rapport annuel de la situation, Gavi, Alliance du Vaccin, 2017.
- Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Plan national de développement sanitaire 2016-2020. 2017.
- Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Programme Elargi de Vaccination. Rapport annuel du PEV, RDC, 2017.
- Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Programme Elargi de Vaccination. Plan d'Action opérationnel 2018, RDC, 2018.
- Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Programme Elargi de Vaccination. Plan d'urgence pour la relance de la vaccination de routine (Plan Mashako) Juillet 2018.
- Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Programme Elargi de Vaccination. Plan Pluri Annuel Complet du PEV de la République Démocratique du Congo 2015-2019.
- Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Programme Elargi de Vaccination. Plan Pluri Annuel Complet du PEV de la République Démocratique du Congo 2020-2024.
- Ministère du Plan et suivi de la révolution de la modernité, Ministère de la Santé Publique. Enquête Démographique et de Santé, EDS RDC II, 2013-2014.
- Nations Unies. Objectifs de Développement Durable (en ligne). 2015. Disponible sur <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/> (consulté le 26 juillet 2018).
- OMS, Unicef, Banque mondiale. Vaccins et vaccination: la situation dans le monde, 3ème édition, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.
- OMS. Enquêtes de couverture vaccinales par sondage en grappes: Manuel de référence, Organisation Mondiale de la Santé, 2015.
- OMS. Stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique, Document complémentaire du Plan d'Action mondial pour les vaccins, Organisation Mondiale de la Santé, 2016.
- OMS. Enquêtes de couverture vaccinale par sondage en grappe : Manuel de référence. 2018
- Unicef, République Démocratique du Congo, MICS-PALU. 2018.
- Institut National de la Statistique, Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2017-2018, rapport de résultats de l'enquête Kinshasa. République Démocratique du Congo.
- Okitolonda E et Mvumbi P. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants de 10-23 mois dans les zones de santé de la province de Kinshasa en 2018. Janvier 2019.
- Okitolonda E. et Mvumbi P. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants de 10-23 mois dans les zones de santé des provinces du Kwilu et de Kasai en 2019. Juin 2019.
- PNLP. Plan stratégique National de Lutte contre le Paludisme 2020-2023 , Janvier 2020

- Lusamba P. et Nyandwe J. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants de 10-23 mois dans les zones de santé de Kinshasa, Mongala et Tshuapa. Avant-projet de rapport. Juin 2020
- Lusamba P, Nyandwe J, Mafuta E, Lulebo A. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants âgés de 6 à 23 mois en République Démocratique du Congo. Rapport d'étude. Janvier 2021.
- Lusamba P, Nyandwe J, Mafuta E, Lulebo A. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants âgés de 6 à 23 mois en République Démocratique du Congo. Rapport d'étude. Juin 2023.

Annexe 1. ESTIMATION DE LA TAILLE DE L'ECHANTILLON

Nombre d'enfants par enquêteur par jour : 6-7

Nombre de jours de collecte des données dans les ménages : 24

Nombre d'aires de santé (grappes) à couvrir : au moins cinq par ZS

N°	Province	deff	Z	p (%)	q = (100-p) (%)	d (%)	n minimum par ZS	n + 15% = Enfants nombre à enquêter par ZS	nombre de ZS	nombre minimum de grappes par ZS	nombre estimé à enquêter par grappe	n par Province	Nombre estimé des 6-11 mois	Nombre estimé des 12-23 mois	Nombre de personnes*jour	Nombre minimum d'enquêteurs pour 24 jours de travail
1	Haut - Katanga	1,5	1,96	45,5	54,5	10	142,9	170	27	5	34	4590	1530	3060	459	19
2	Haut - Lomami	1,5	1,96	35,7	64,3	10	132,3	170	16	5	34	2720	907	1813	272	11
3	Kasaï Central	1,5	1,96	41,3	58,7	10	139,7	170	26	5	34	4420	1503	2917	442	18
4	Kasaï Oriental	1,5	1,96	27,9	72,1	10	115,9	170	19	5	34	3230	1077	2153	323	13
5	Kasaï	1,5	1,96	13,9	86,1	10	69,0	170	18	5	34	3060	1020	2040	306	13
6	Kinshasa	1,5	1,96	41,9	58,1	10	140,3	170	35	5	34	5950	1983	3967	595	25
7	Kongo Central	1,5	1,96	48,0	52	10	143,8	170	31	5	34	5270	1757	3513	527	22
8	Kwango	1,5	1,96	16,3	83,7	10	78,6	170	14	5	34	2380	793	1587	238	10
9	Kwilu	1,5	1,96	14,3	85,7	10	70,6	170	24	5	34	4080	1360	2720	408	17
10	Lomami	1,5	1,96	26,9	73,1	10	113,3	170	16	5	34	2720	907	1813	272	11
11	Ituri	1,5	1,96	40,0	60	10	138,3	170	36	5	34	6120	2040	4080	612	26
12	Maniema	1,5	1,96	6,6	93,4	10	35,5	170	18	5	34	3060	1020	2040	306	13
13	Mongala	1,5	1,96	8,2	91,8	10	43,4	170	12	5	34	2040	680	1360	204	9
14	Sankuru	1,5	1,96	2,6	97,4	10	14,6	170	14	5	34	2720	925	1795	272	11
15	Sud Kivu	1,5	1,96	48,9	51,1	10	144,0	170	34	5	34	5780	1927	3853	578	24
16	Tanganyika	1,5	1,96	21,2	78,8	10	96,3	170	11	5	34	1870	623	1247	187	8
17	Tshopo	1,5	1,96	20,7	79,3	10	94,6	170	23	5	34	3910	1303	2607	391	16
18	Lualaba	1,5	1,96	21,1	78,9	10	95,9	170	14	5	34	2380	793	1587	238	10
19	Maindombe	1,5	1,96	11,9	88,1	10	60,4	170	14	5	34	2380	793	1587	238	10
20	Bas-Uele	1,5	1,96	23,8	76,2	10	104,5	170	11	5	34	1870	623	1247	187	8
21	Haut-Uele	1,5	1,96	17,5	82,5	10	83,2	170	13	5	34	2210	737	1473	221	9
22	Nord-Kivu	1,5	1,96	79,2	20,8	10	94,9	170	34	5	34	5780	1927	3853	578	24
23	Sud-Ubangi	1,5	1,96	26,9	73,1	10	113,3	170	16	5	34	2720	907	1813	272	11
24	Nord-Ubangi	1,5	1,96	16,6	83,4	10	79,8	170	11	5	34	1870	623	1247	187	8
25	Equateur	1,5	1,96	28,5	71,5	10	117,4	170	18	5	34	3060	1020	2040	306	13
26	Tshuapa	1,5	1,96	15,4	84,6	10	75,1	170	12	5	34	2040	680	1360	204	9
	Total								519			88230				

Annexe 2. COLLECTE ET EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

Les enquêtes sérologiques mesurant des anticorps IgG spécifiques peuvent permettre de vérifier directement si les vaccins administrés ont induit l'immunité. Ces enquêtes peuvent ainsi fournir une information critique sur les lacunes en matière d'immunité et de l'efficacité opérationnelle du programme. Bien que les Enquêtes démographiques et de santé (EDS) aient fourni des estimations de l'immunité représentatives à l'échelle nationale, il peut y avoir des besoins additionnels de données sur l'immunité au niveau provincial et au niveau des zones de santé. Ces données, si nécessaire, peuvent aider à identifier d'autres lacunes en matière de vaccination qui ne sont pas prises en compte dans les enquêtes standardisées de couverture vaccinale.

Un niveau élevé d'immunité de la population doit être atteint et maintenu pour réduire la transmission de la maladie. L'immunité est particulièrement importante chez les enfants et chez les femmes en âge de procréer, car des anticorps maternels acquis passivement sont nécessaires pour protéger les nourrissons contre les agents pathogènes circulant jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'éligibilité à la vaccination. Aussi, des enquêtes sérologiques périodiques visant à évaluer l'immunité de la population et la performance des programmes sont de plus en plus recommandées comme indicatrices de processus en vue de l'atteinte des cibles d'éradication de la poliomyélite. Au cours des dernières années, quatre enquêtes sur la séroprévalence menées en Égypte, en Indonésie, en Inde et au Pakistan ont fourni des profils d'immunité chez les jeunes enfants spécifiques à chaque pays qui ont mené à des actions programmatiques appropriées et ont fourni des critères d'immunité pour l'éradication de la poliomyélite.

En fonction des financements disponibles et si des tests sont demandés par des partenaires, des bailleurs de fonds ou le gouvernement, le consentement des participants peut être obtenu pour recueillir des échantillons de taches de sang séchées (DBS). Tous les échantillons prélevés seront organisés en sous-ensembles à Kinshasa. Les tests possibles pour les maladies évitables par la vaccination comprennent des tests d'anticorps neutralisant de la poliomyélite, de la rougeole, du tétanos, de la diphtérie, de l'hépatite B et de la rubéole. Un aliquote de chaque échantillon prélevé sera conservé dans un local de l'INRB à Kinshasa, en RDC, pour une utilisation et des tests futurs, tel qu'indiqué au cours de la procédure de consentement éclairé. Toutes les personnes inscrites dans les provinces sélectionnées pour la collecte d'échantillons seront en bonne santé au moment de l'inscription. Au cours de la formation, tous les enquêteurs recevront une formation spéciale sur tous les aspects et procédures de la collecte du DBS et de l'élimination des déchets biologiques dangereux.

Collecte de taches de sang séchées (DBS)

Tous les échantillons de DBS seront obtenus par l'utilisation de lancettes de sécurité jetables et de cartes ad hoc. Nous prendrons jusqu'à 60 µg de sang chez les participants consentants, en utilisant jusqu'à 2 mm/21 g lancettes. Les trousses seront préemballées et porteront des codes à barres pour l'identification des échantillons. Les personnes qui vont recueillir

des échantillons de DBS seront formées sur la façon de positionner l'enfant, de réchauffer la main de l'enfant, de placer la lancette pour une utilisation correcte afin de réduire la douleur et de recueillir un maximum d'échantillon. Une fois la piqûre terminée, l'enquêteur élimine la première goutte de sang, qui peut contenir un excès de tissu, puis commence à tourner la main de l'enfant et recueille les gouttes restantes de sang - en étant sûr d'éviter tout contact du doigt avec la carte. Une fois que cinq taches auront été recueillies, les échantillons seront mis à sécher dans un conteneur en plastique pendant au moins 3 heures avant d'être emballés avec du dessiccateur et une carte indicatrice d'humidité pour un stockage optimal du DBS jusqu'à ce qu'il soit expédié à Kinshasa pour être stocké au congélateur à moins 20°C (ou -80°C pour un stockage à long terme). Si nécessaire, la personne qui recueille l'échantillon utilisera une piqûre au talon de l'enfant au lieu d'une piqûre de doigt en appliquant la même technique de réchauffement préalable.

Annexe 3. CHRONOGRAMME DE L'ECV2023

ACTIVITES	RESPONSABLE	Nov-23					Déc-23					Jan-24					Fév-24					Mar-24					Avr-24					Mai-24					Juin-24					Juillet-24					
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	
1. Actualisation du protocole de recherche	IP et les 3 Co-IP				X																																										
2. Soumission du protocole de recherche au CPECV et validation	IP					X	X																																								
3. Sollicitation des autorisations administratives	IP					X	X	X																																							
4. Atelier de planification de l’’équipe de recherche	IP et les 3 Co-Investigateurs																		X	X																											
5. Soumission du protocole de recherche au Comité éthique et approbation	IP															X	X																														
6. Paramétrage des tablettes androïdes	Data manager											X	X	X																																	
7. Recrutement et formation des superviseurs des pools provinciaux	Coordonnateur de la collecte des données																			X	X																										
8. Déploiement des superviseurs des pools	IP																				X	X																									
9. Recrutement et formation des enquêteurs dans les provinces	Coordonnateur de la collecte des données																					X	X																								
10. Déploiement des enquêteurs dans les ZS	Coordonnateur de la collecte des données Superviseurs de pools provinciaux																						X	X																							

ACTIVITES	RESPONSABLE	Nov-23					Déc-23					Jan-24					Fév-24					Mar-24					Avr-24					Mai-24					Juin-24					Juillet-24								
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5				
11. Collecte des données dans les ZS	Superviseurs de pools provinciaux																									X	X	X	X	X	X	X																		
12. Traitement des données	Coordonnateur de la collecte des données, superviseurs de pool et terrain, enquêteurs																															X	X	X	X	X														
13. Analyse des données	Coordonnateur de l'analyse des données																															X	X	X	X	X														
14. Elaboration du rapport préliminaire	Coordonnateur de l'analyse des données																																												X	X				

Annexe 3. CHRONOGRAMME DE L'ECV2023 (SUITE)

ACTIVITES	RESPONSABLE	Juillet-24					Août-24					Sept-24				
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5
15. Transmission et présentation du rapport préliminaire au CPECV	Equipe de coordination	X														
16. Elaboration du rapport final	Equipe de coordination		X	X	X	X	X	X								
17. Transmission du rapport final au CPECV	Equipe de coordination								X							
18. Organisation des ateliers de diffusion des résultats de l'ECV	Equipe de coordination et PEV									X	X	X	X	X		

Annexe 4. MAQUETTES DE TABLEAUX

Annexe 4a. Couverture vaccinale brute par source d'information et âge lors de l'enquête, parmi (N=*) enfants âgés de 12 à 23 mois, Province de...

Vaccin/dose	Documenté par carte à domicile (a)	Documenté par carte ou registre (b)	En l'absence de carte, selon l'histoire verbale (c)	Total (b+c)	N Non- pondéré	N Pondéré
	% (IC 95 %)	% (IC 95 %)	% (IC 95 %)	% (IC 95 %)	N	N

Annexe 4b. Couverture vaccinale brute et valide, Province de...

Vaccin, dose	Couverture brute % estimé (IC 95 %)	Couverture de doses valides % estimé (IC 95 %)

Annexe 4c. Taux pondérés de déperdition entre différentes associations de doses de vaccins, par source d'information, Province de...

Déperdition entre	Toute dose (documentée ou rapportée) % estimé (IC 95 %)	Doses valides (avec documentation) % estimé (IC 95 %)

Annexe 4d. Couverture vaccinale valide par zone de santé, pourcentage et IC à 95%, enfants de 6 à 11 mois, Province de ...

Z	BC	VPO	VPO	VPO	VPO	PENT	PENT	PENT	PCV	PCV	PCV	V	ROT	ROT	ROT	VA	VA
S	G	0	1	2	3	A1	A2	A3	1	2	3	PI	A1	A2	A3	R	A
a																	
b																	
c																	
d																	
e																	
f																	
g																	
h																	
..																	
z																	

Annexe 4e. Couverture vaccinale valide par Province, pourcentage et IC à 95%, enfants de 6 à 11 mois

Provinc	BC	VP	VP	VP	VP	PENT	PENT	PENT	PC	PC	PC	V	ROT	ROT	ROT	VA	VA
e	G	O0	O1	O2	O3	A1	A2	A3	V1	V2	V3	PI	A1	A2	A3	R	A
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
.																	
26																	
Ensem																	
ble																	

Annexe 4f. Couverture vaccinale brute par zone de santé, pourcentage et IC à 95%, enfants de 6 à 11 mois, Province de ...

Z S	BC G	VPO 0	VPO 1	VPO 2	VPO 3	PENT A1	PENT A2	PENT A3	PCV 1	PCV 2	PCV 3	V PI	ROT A1	ROT A2	ROT A3	VA R	VA A
a																	
b																	
c																	
d																	
e																	
f																	
g																	
h																	
..																	
z																	

Annexe 4g. Couverture vaccinale brute par Province, pourcentage et IC à 95%, enfants de 6 à 11 mois

Provinc e	BC G	VP O0	VP O1	VP O2	VP O3	PENT A1	PENT A2	PENT A3	PC V1	PC V2	PC V3	V PI	ROT A1	ROT A2	ROT A3	VA R	VA A
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
.																	
26																	
Ensem ble																	

Annexe 4h. Couverture vaccinale valide par zone de santé, pourcentage et IC à 95%, enfants de 12 à 23 mois, Province de ...

Z S	BC G	VP O0	VP O1	VP O2	VP O3	PEN TA1	PEN TA2	PEN TA3	PC V1	PC V2	PC V3	V PI	RO TA1	RO TA2	RO TA3	V A R	V A A	Couve rture compl ète	Couve rture de base
a																			
b																			
c																			
d																			
e																			
f																			
g																			
h																			
..																			
z																			

Annexe 4i. Couverture vaccinale valide par province, pourcentage et IC à 95%, enfants de 12 à 23 mois

Province	B C G	VP O0	VP O1	VP O2	VP O3	PEN TA1	PEN TA2	PEN TA3	PC V1	PC V2	PC V3	V PI	RO TA1	RO TA2	RO TA3	V A R	V A A	Couv erture compl ète	Couv erture de base
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
...																			
26																			
Ensemble																			

Annexe 4j. Couverture vaccinale brute par zone de santé, pourcentage et IC à 95%, enfants de 12 à 23 mois, Province de ...

Z S	B C G	VP O0	VP O1	VP O2	VP O3	PEN TA1	PEN TA2	PEN TA3	PC V1	PC V2	PC V3	V PI	RO TA1	RO TA2	RO TA3	V A R	V A A	Couv erture compl ète	Couv erture de base
a																			
b																			
c																			
d																			
e																			
f																			
g																			
h																			
...																			
z																			

Annexe 4k. Couverture vaccinale brute par province, pourcentage et IC à 95%, enfants de 12 à 23 mois

Province	B C G	VP O0	VP O1	VP O2	VP O3	PEN TA1	PEN TA2	PEN TA3	PC V1	PC V2	PC V3	V PI	RO TA1	RO TA2	RO TA3	V A R	V A A	Couv erture compl ète	Couv erture de base
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
...																			
26																			
Ensemble																			

Annexe 5. QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTION
UNICEF/PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (PEV)
ENQUETE SUR LA COUVERTURE VACCINALE ET LES INDICATEURS DU
PALUDISME DANS TOUTES LES ZONES DE SANTE DE LA RDC (2021)

I. QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL ENFANTS DE 6-23 MOIS

SECTION 0 : FORMULAIRE D'ENUMERATION

Section 0	Identification du ménage		Saut
M01	N° d'Identifiant de la strate (de la Province)		
M02	Nom de la strate (de la province)		
M02a	N° d'Identifiant de la zone de santé		
M02b	Nom de la zone de santé		
M03	N° d'Identifiant de la grappe* (de l'aire de santé)		
M04	Nom de la grappe (de l'Aire de santé)		
M04a	N° d'Identifiant de l'avenue/rue/village*		
M04b	Nom de l'Avenue /rue/village		
M04c	Milieu de localisation du ménage	1. Urbain 2. Rurale	
M05	Numéro de l'enquêteur		
M06	Nom de l'enquêteur		
M07	Numéro du superviseur de terrain		
M08	Nom du superviseur de terrain		
M09	Date de la visite		
M10	Heure de la visite		
M11	N° d'Identifiant du bâtiment	Nombre	
M12	Occupation : cette construction héberge des ménages ? <i>[Si « Non », passez au prochain bâtiment et à la prochaine ligne du formulaire.]</i>	1 : Oui ; 2 : Non	
M13	Numéro d'ordre du ménage (F) dans le bâtiment		
M14	N° d'Identifiant du ménage	N° d'Identifiant du bâtiment - Numéro d'ordre du ménage (p.ex. 44-3)	
M15	Adresse ou description	Texte ouvert	
M16	Latitude	##,####	
M17	Longitude	##,####	
M18	Les informations proviennent d'un résident ou d'un voisin ?	1 = résident 2 = voisin 3 = incapable de recenser	
M19	Nom du chef de famille / ménage	Texte ouvert	

M20	N° de téléphone pour coordonner l'heure de visite	Texte ouvert	
M22	Nombre total de résidents dans le ménage	Nombre	
M23	Nombre de répondants éligibles de 6 à 23 mois	Nombre	

Bonjour, je m'appelle _____ Je travaille pour le compte du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Nous sommes en train d'interroger les mères/gardiennes des enfants âgés de 6 à 23 mois ainsi que celles des enfants âgés de 6 à 11 mois dans cette localité dans le but de connaître la proportion des enfants qui sont protégés contre les maladies et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants ne sont pas vaccinés. Nous aimerions vous poser des questions à propos des caractéristiques de votre ménage, des caractéristiques des mères/gardiennes d'enfants, de vaccins reçus par l'enfant ainsi que de l'impact de la COVID-19 sur la vaccination des enfants. Les informations vous concernant pourront être utilisées pour des activités et services en rapport avec la vaccination en République Démocratique du Congo en vue d'en déterminer la couverture vaccinale. Les données collectées seront également analysées par des chercheurs, mais votre nom sera retiré de toutes les analyses, pour que vos informations restent anonymes.

Vous pouvez refuser de répondre aux questions qui vous seront posées autant de fois que vous le souhaitez, et décider d'arrêter l'enquête à tout moment. Votre participation est volontaire et il n'y aura aucune prime qui vous sera allouée du fait de votre participation à cette étude. Avez-vous des questions sur cette enquête ?

A. Informations de contact des chercheurs

Prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour prendre votre décision de participer ou non à cette étude. Nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourrez vous poser à propos de cette étude. Si vous avez des questions additionnelles, si vous souhaitez exprimer une préoccupation à propos de cette recherche, ou si vous avez un problème lié à la recherche, vous pouvez contacter l'Investigateur Principal (IP) de cette étude ou son adjoint. Je vous remettrai également une copie de ce formulaire contenant les informations de contact de l'IP de cette étude, que vous pourrez contacter directement pour toutes questions concernant cette enquête.

Prof. Lusamba Paul-Samson Tél. +243 975 012 791. e-mail : luspauls@gmail.com ou pour son adjoint :

Prof. Nyandwe Kyloka Jean Tél. +243 810 759 142. e-mail : jnyandwe@gmail.com.

Acceptez-vous de participer à l'étude ? 1. Oui 2. Non

Je certifie que chaque enquêté a été informé de la nature, du but de l'étude et qu'il a donné librement son consentement verbal pour participer dans cette étude.

Signature de l'enquêteur

SECTION 1 : Identification du ménage

N°	QUESTIONS	REPONSES	Saut
Q100	N° d'Identifiant de la strate (de la Province)		
Q101	Nom de la strate (de la province)		
Q102	N° d'Identifiant de la zone de santé		
Q103	Nom de la zone de santé		
Q104	N° d'Identifiant de la grappe* (de l'aire de santé)		
Q105	Nom de la grappe (de l'Aire de santé)		
Q106	N° d'Identifiant de l'avenue/rue/village*		
Q107	Nom de l'Avenue /rue/village		
Q108	Milieu de localisation du ménage	1. Urbain 2. Rurale	
Q109	Numéro de l'enquêteur		
Q110	Nom de l'enquêteur		
Q111	Numéro du superviseur de terrain		
Q112	Nom du superviseur de terrain		
Q113	N° d'Identifiant du ménage	Recopier le N° du formulaire d'inventaire des ménages	
Q114	Nom du chef de famille / ménage	Texte ouvert	
Q115	Latitude	##,####	
Q116	Longitude	##,####	
Q117	Date de début de l'interview lors de la visite 1	Date	
Q118	Heure de début de l'interview lors de la visite 1	Heure	
Q119	Date de début de l'interview lors de la visite 2	Date	
Q120	Heure de début de l'interview lors de la visite 2	Heure	
Q121	Date de début de l'interview lors de la visite 3	Date	
Q122	Heure de début de l'interview lors de la visite 3	Heure	
Q123	Code conduite à tenir : visite 1	1 : Revenir plus tard : absents du ménage (remplissez le nombre de répondants éligibles si vous l'obtenez par les voisins) 2 : À compléter : interview débutée mais non achevée 3 : Refus : quelqu'un est présente, mais refus de participer 4 : Terminé : toutes les informations nécessaires ont été recueillies	
Q124	Code conduite à tenir : visite 2	1 : Revenir plus tard : absents du ménage (remplissez le nombre de	

		répondants éligibles si vous l'obtenez par les voisins) 2 : À compléter : interview débutée mais non achevée 3 : Refus : quelqu'un est présente, mais refus de participer 4 : Terminé : toutes les informations nécessaires ont été recueillies	
Q125	Code conduite à tenir : visite 2	1 : Revenir plus tard : absents du ménage (remplissez le nombre de répondants éligibles si vous l'obtenez par les voisins) 2 : À compléter : interview débutée mais non achevée 3 : Refus : quelqu'un est présente, mais refus de participer 4 : Terminé : toutes les informations nécessaires ont été recueillies	
Q126	N° d'identifiant personnel	Nombre	
Q127	Nom	Texte ouvert	

Section 2 : Caractéristiques du ménage

QA201	Sexe du chef de ménage	Masculin	1
		Féminin	2
QA202	Quel est l'état civil actuel du chef de ménage ?	Marié (e)	1
		Union de fait	2
		Séparé	3
		Célibataire	4
		Divorcé	5
		Veuf (ve)	6
QA203	En quel jour, mois (*) et année le chef de ménage est – il né ?	Jour	
		Ne connaît pas	99
		Mois(*)	
		Ne connaît pas le mois	98
		Non- réponse	99

		Année	
		Ne connaît pas l'année	99
		Non – réponse	99
QA204	Quel âge a le chef de ménage actuellement ? Comparez et corrigez si besoin en fonction de QA203. Estimez la meilleure réponse	Age en années révolues	
		Ne sait pas	98
		Non- réponse	99
QA205	Quel est le plus haut niveau d'étude atteint par le chef du ménage ? <i>L'enquêteur posera la question préliminaire de savoir si le chef de ménage a fréquenté l'école ?</i> Encercler une seule réponse	N'a jamais été à l'école	0
		Primaire	1
		Secondaire	2
		Supérieur	3
		Ne sait pas	8
		Non-réponse	9
QA206	Quelle est la profession du chef de ménage ? Encercler une seule réponse	Sans occupation	0
		Enseignant	1
		Fonctionnaire	2
		Agriculteur/éleveur	3
		Pêcheur	4
		Commerçant	5
		Ouvrier	6
		Autres (à préciser)	7

QA207	Actuellement, quelle est la religion du chef de ménage ? Encercler une seule réponse	Pas de religion	1
		Catholique	2
		Protestante	3
		Kimbanguiste	4
		Musulmane	5
		Eglise de réveil/indépendante	6
		Autre religion (à préciser)	7
		Ne sait pas	8

		Pas de réponse	9
QA208	Quelle est l'ethnie du chef de ménage	1. Luba 2. Kongo 3. Swahili 4. Mungala	
QA209	Est-ce qu'il y a dans ce ménage : [A] une télévision ? [B] une radio ? [C] un réfrigérateur ?	Oui Non 1 2 1 2 1 2	
QA210	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [A] une montre-bracelet ? [B] une bicyclette ? [C] une motocyclette ? [D] une voiture, un camion ou une camionnette ? [E] charrette avec animal ? [F] Bateau avec moteur ? [G] pirogue ?	Oui Non 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	
QA211	Est-ce qu'un membre de ce ménage a un ordinateur ?	1. Oui 2. Non	
QA212	Est-ce qu'un membre de ce ménage a un téléphone mobile ?	1. Oui 2. Non	

QA213	Avez-vous accès à Internet à la maison ?	1. Oui 2. Non	
QA214	Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre vivant dans ce ménage est propriétaire de ce logement ? Si « Non » demander : Louez-vous ce logement de quelqu'un d'autre qui ne vit pas dans ce ménage ? Si « Loué de quelqu'un d'autre » enregistrer « 2 ». Pour « autres réponses » , enregistrer « 6 » et préciser	Propriétaire 1 Locataire 2 Autre (précisez) 6 _____ _____	
QA215	Est-ce qu'un membre de ce ménage a un compte en banque ?	1. Oui 2. Non	
QA216	Etes-vous couvert par une assurance santé ?	1. Oui 2. Non	2 → QA218

QA217	Par quels types d'assurance santé êtes-vous couverts ?	ORGANISATION MUTUELLE DE SANTE / ASSURANCE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE A ASSURANCE SANTE DE L'EMPLOYEUR B SECURITE SOCIALE C AUTRE ASSURANCE SANTE COMMERCIALE PRIVEE ACHETEE..... D AUTRE (<i>préciser</i>)X		
QA218	Votre ménage possède-t-il des terres ?	1. OUI 2. NON		2 → QA220
QA219	Si oui, combien de mètres-carré possède-t-il ?			
QA220	Votre ménage possède-t-il des bétails ?	1. OUI 2. NON		2 → QA222
QA221	Si oui, pour chacun des bétails suivants, dites combien le ménage en possède.	BÉTAILS BOVINS (VACHES, BŒUFS) MOUTONS/CHEVRES PORCINS VOLAILLES AUTRES A PRECISER	NOMBRE 	
QA222	Nombre total de membre du ménage ?		NOMBRE	
QA223	Nombre d'enfants de moins de 5 ans ?		NOMBRE	
QA224	Nombre d'enfants de 6-23 mois ?		NOMBRE	
QA225	S'il existe plus d'un enfant de 6 à 23 mois dans le ménage est-ce tous ont une même mère gardienne ?	OUI 1 NON 2		Si 1---> section 3
QA226	Si non, combien de mères gardiennes de 6 à 23 mois y-a-t-il dans ce ménage ?			

SECTION 3 : CARACTERISTIQUES SOCIO – DEMOGRAPHIQUES DE LA MERE/GARDIENNE DE L'ENFANT DE 06-23 MOIS

Consentement éclairé Mère/et mères gardiennes

Bonjour, je m'appelle _____ Je travaille pour le compte du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Nous sommes en train d'interroger les mères/gardiennes des enfants âgés de 6 à 23 mois dans cette localité dans le but de connaître la proportion des enfants qui sont protégés contre les maladies et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants ne sont pas vaccinés. Nous aimerions vous poser des questions sur vous et à propos de vaccins reçus par l'enfant ainsi que de l'impact de la COVID-19 sur la vaccination des enfants. Les informations vous concernant pourront être utilisées pour des activités et services en rapport avec la vaccination en République Démocratique du Congo en vue d'en déterminer la couverture vaccinale. Les données collectées seront également analysées par des chercheurs, mais votre nom sera retiré de toutes les analyses, pour que vos informations restent anonymes.

Vous pouvez refuser de répondre aux questions qui vous seront posées autant de fois que vous le souhaitez, et décider d'arrêter l'enquête à tout moment. Votre participation est volontaire et il n'y aura aucune prime qui vous sera allouée du fait de votre participation à cette étude. Avez-vous des questions sur cette enquête ?

B. Informations de contact des chercheurs

Prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour prendre votre décision de participer ou non à cette étude. Nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourrez vous poser à propos de cette étude. Si vous avez des questions additionnelles, si vous souhaitez exprimer une préoccupation à propos de cette recherche, ou si vous avez un problème lié à la recherche, vous pouvez contacter l'Investigateur Principal (IP) de cette étude ou son adjoint. Je vous remettrai également une copie de ce formulaire contenant les informations de contact de l'IP de cette étude, que vous pourrez contacter directement pour toutes questions concernant cette enquête.

Prof. Lusamba Paul-Samson Tél. +243 975 012 791. e-mail : luspauls@gmail.com ou pour son adjoint :

Prof. Nyandwe Kyloka Jean Tél. +243 810 759 142. e-mail : jnyandwe@gmail.com.

Acceptez-vous de participer à l'étude ? 1. Oui 2. Non

Je certifie que chaque enquêté a été informé de la nature, du but de l'étude et qu'il a donné librement son consentement verbal pour participer dans cette étude.

Signature de l'enquêteur

Note : Enquêteur, « posez les questions suivantes pour chaque mère gardienne »

QA100	Quelle est la relation entre la répondante et l'enfant sélectionné ?	1. Mère de l'enfant 2. Gardienne de l'enfant	
QA101	Quel est l'état civil actuel de la mère/gardienne de l'enfant ?	Mariée	1
		Union de fait	2
		Séparée	3
		Célibataire	4
		Divorcée	5
		Veuve	6
QA102	En quel jour, mois (*) et année la mère/gardienne de l'enfant est-elle née ?	Jour	
		Ne connaît pas	98
		Non- réponse	99
		Mois (*)	
		Ne connaît pas le mois	98
		Non- réponse	99
		Année	
		Ne connaît pas l'année	98
		Non – réponse	99
QA103	Quel âge a la mère/gardienne de l'enfant? Comparez et corrigez si besoin en fonction de QA102	Age en années révolues	
		Ne sait pas	98
		Non- réponse	99
QA104	Quel est le plus haut niveau d'étude atteint par la mère/gardienne de l'enfant ? L'enquêteur posera la question préliminaire de savoir si la mère/ gardienne de l'enfant a fréquenté l'école ? Encercler une seule réponse	N'a jamais été à l'école	0
		Primaire	1
		Secondaire	2
		Supérieur	3
		Ne sait pas	8
		Non-réponse	9
QA105	Actuellement, quelle est la profession de la mère/gardienne de l'enfant ?	Sans profession	0
		Enseignant	1

	Encercler une seule réponse	Fonctionnaire	2
		Agriculteur/éleveur	3
		Pêcheur	4
		Commerçant	5
		Ouvrier	6
		Autres (à préciser)	7
QA106	Actuellement, quelle est la religion de la mère/gardienne de l'enfant ? Encercler une seule réponse	Pas de religion	1
		Catholique	2
		Protestante	3
		Kimbanguiste	4
		Musulmane	5
		Eglise de réveil/indépendante	6
		Autre religion (à préciser)	7
		Ne sait pas	8
		Pas de réponse	9

***Mois** : 01=Janvier, 02=Février, 03=Mars, 04=Avril, 05=Mai, 06=Juin, 07= Juillet, 08=Aout, 09=Septembre, 10=Octobre, 11=Novembre, 12=Décembre.

SECTION 3 : VACCINATION DES ENFANTS DE 06-23 MOIS

Section 0	Identification du ménage		Saut
	QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL ENFANT DE 6-23 MOIS		
VS01	N° d'Identifiant de la strate (de la Province)		
VS02	Nom de la strate (de la province)		
VS02a	N° d'Identifiant de la zone de santé		
VS02b	Nom de la zone de santé		
VS03	N° d'Identifiant de la grappe* (de l'aire de santé)		
VS04	Nom de la grappe (de l'Aire de santé)		
VS04a	N° d'Identifiant de l'avenue/rue/village*		
VS04b	Nom de l'Avenue /rue/village		
VS04c	Milieu de localisation du ménage	1. Urbain 2. Rurale	
VS05	Numéro de l'enquêteur		
VS06	Nom de l'enquêteur		
VS07	Numéro du superviseur de terrain		
VS08	Nom du superviseur de terrain		
VS09	Date de la visite		
VS10	Heure de la visite		
VS12	N° personnel de l'enfant (tiré du formulaire MM)	Recopier le N° du formulaire d'inventaire des ménages	
VS15	Latitude	##,####	
VS16	Longitude	##,####	
VS17	Nom complet de l'enfant	Texte ouvert	
VS18	Nom du père de l'enfant	Texte ouvert	
VS19	Nom de la mère de l'enfant	Texte ouvert	
VS20	SEXE DE L'ENFANT	1. MASCULIN 2. FEMININ	

	NOTE : AVANT QUE JE COMMENCE L'INTERVIEW, POURRIEZ-VOUS APPORTER, SVP, <i>le certificat de naissance de (nom), sa carte/carnet de vaccination ou toute carte de vaccination d'un agent de santé privé ? Nous aurons besoin de nous référer à ces documents.</i>		
VS21	DATE DE NAISSANCE En quel jour,	JOUR	Si 99, passez à VS24
VS22	En Quel mois	MOIS __ __	
VS23	En quelle année (nom) est-il/elle né(e) ?	ANNÉE <u>2 0</u> __ __	
	<i>Insister:</i> Quand est son anniversaire ?	NSP JOUR 99	

	Si la mère/gardien(ne) connaît la date de naissance exacte, enregistrer aussi le jour de naissance ; sinon, enregistrer '98' pour jour. Les Mois et Année <u>doivent</u> être enregistrés. Insérer le 30 Juin 2000 si ne connais pas la date de naissance		
VS24	Quel âge a (nom) en année ?	ANNEE 20_____	
VS25	Quel âge a (nom) en mois ? Insister : Quel âge a eu (nom) à son dernier anniversaire ? Enregistrer l'âge en mois révolus. Si les réponses à VS21, VS22 et VS23 sont incohérentes, insister et corriger.	MOIS	
VS25A	. Vérifier VS25 : Age de l'enfant ? SI L'ENFANT N'EST PAS ELIGIBLE POUR LE QUESTIONNAIRE DE 6-23 MOIS. CLOTURER L'ENTRETIEN. SI ELIGIBLE PASSEZ A VS25B	6-23 MOIS 1 MOINS DE 6 MOIS 2 PLUS DE 23 MOIS 3	2 → FIN 3 → FIN
VS25b	. Est-ce que (nom) est couvert(e) par une assurance santé ?	OUI 1 NON 2	2 → VS25d
VS25c	Par quel type d'assurance santé (nom) est-il/elle couvert (e) ? Enregistrer tout ce qui est mentionné.	ORGANISATION MUTUELLE DE SANTE / ASSURANCE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE A ASSURANCE SANTE DE L'EMPLOYEUR B SECURITE SOCIALE C AUTRE ASSURANCE SANTE COMMERCIALE PRIVEE ACHETEE D AUTRE (préciser) X	
VS25d	Est-ce que (nom) a un certificat de naissance ? Si 'Oui', demander : Puis-je le voir SVP ?	OUI, VU 1 OUI, PAS VU 2 NON 3 NSP 99	
VS25e	La naissance de (nom) a-t-elle été enregistrée/déclarée auprès de l'autorité civile / l'état civil ?	OUI 1 NON 2 NSP 99	
VS25f	Savez-vous comment enregistrer la naissance de (nom) ?	OUI 1 NON 2	
VS25g	Vérifier VS25 : Age de l'enfant ?	6-23 MOIS 1 MOINS DE 6 MOIS.....2 PLUS DE 23 MOIS 3	2 → FIN 3 → FIN
VS26	Avez-vous un(e) carnet/carte de vaccinations ou un document d'un agent de	OUI, A SEULEMENT UN CARNET/CARTE 1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT 2 OUI, A UN CARNET/CARTE ET AUTRE DOCUMENT3 NON, N'A NI CARNET/CARTE NI AUTRE DOCUMENT 4	1 → VS27 2 → VS27 3 → VS27

	santé privé où les vaccinations de (nom) sont enregistrées ?										
VS26a	Avez-vous déjà eu un(e) carnet/carte de vaccinations ou un document d'un agent de santé pour (nom) ?	OUI NON	1 2								2--> VS69a.
VS26 b	Vérifier VS26 :	A SEULEMENT AUTRE DOCUMENT, VS26=2 1 NI CARNET/CARTE NI AUTRE DOCUMENT DISPONIBLE, VS26=4 2								2 → VS27d	
VS27	Puis-je voir le carnet/carte (et/ou) l'autre document ?	OUI, CARNET/CARTE SEULEMENT VU 1 OUI, AUTRE DOCUMENT SEULEMENT VU 2 OUI, CARNET/CARTE ET AUTRE DOCUMENT VUS3 NI CARNET/CARTE NI AUTRE DOCUMENT VU4								4 → VS27a	
	(a) Copier les dates de chaque vaccination à partir de la/le carte/carnet. (b) Ecrire '30 juin 1960 si a reçu le vaccin mais la date n'est pas marquée et notez le 30 juin 2000 si la date n'est pas visible. Si seul le jour n'est pas visible, notez 15 pour le jour.	DATE DE VACCINATION									
		JOUR	MOIS	ANNÉE							
VS33	BCG BCG				2	0					
VS37	Polio (VPOb) (à la naissance) VPOb0				2	0					
VS43	Polio (VPOb) 1 VPOb1				2	0					
VS39	Pentavalent (DTC_Hepb_ Hib 1) Penta1				2	0					
VS41	Pneumo 1 PCV1				2	0					
VS45	Rotavirus 1 Rota 1				2	0					
VS51	Polio (VPOb2) 2 VPOb2				2	0					
VS47	Pentavalent (DTC_Hepb_ Hib 2) Penta2				2	0					
VS49.	Pneumo 2 PCV2				2	0					
VS53	Rotavirus 2 Rota 2				2	0					

VS59	Polio (VPOb) 3	VPOb3				2	0			
VS63	VPI	VPI				2	0			
VS55	Pentavalent (DTC_Hepb_ Hib 3)	Penta3				2	0			
VS57	Pneumo 3	PCV3				2	0			
VS61	Rotavirus 3	Rota3				2	0			
VS65	Rougeole	VAR				2	0			
VS67	Fièvre jaune	VAA				2	0			
VS27b	Vérifier VS27a : Tous les vaccins (BCG à VAA) enregistrés ?				OUI1 NON2					
VS27c	<i>. Retourner à IM6 et insister pour ces vaccinations.</i> <i>Enregistrer '66' dans la colonne jour correspondante pour chaque vaccin reçu.</i> <i>Pour les vaccinations <u>pas</u> reçues, enregistrer '00'.</i> <i>Quand <u>c'est fait</u>, aller à la fin du module.</i>								→Fin	
VS69	L'enfant a-t-il reçu tous les vaccins de l'enquête				OUI 1 NON 2 NSP 99				1 ⇒ VS103 2 ou 99 ⇒ VS89	
VS27a	Pourquoi la carte n'est plus disponible ?				CARTE PERDUE 1 CARTE DETRUITE 2					
VS69a	Pourquoi l'enfant n'a pas reçu de carte de vaccination ?				<i>carte gardée au centre</i> 1 <i>Rupture de stock au centre</i> 2 <i>Ne sait pas</i> 99 <i>Autre à préciser</i> 3				Si 3 →VS70	
VS70	L'enfant a-t-il déjà reçu un vaccin - gouttes ou injection - dans le passé ?				Oui 1 Non 2 NSP 99					
VS71	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose – c'est-à-dire une injection faite dans l'avant-bras gauche et qui laisse habituellement une cicatrice ?				OUI1 NON 2 NSP 99					
VS72	Si l'enfant est présent, recherchez la cicatrice et notez le résultat				1. Cicatrice présente 2. Pas de cicatrice 3. Enfant non accessible afin de vérifier					

VS72a	Est-ce que (nom) a déjà reçu un vaccin contre l'hépatite B – une injection à la cuisse ou à la fesse – pour lui éviter de contracter l'Hépatite B dans les 24 h après sa naissance ?	OUI, DANS LES 24 HEURES1 OUI, MAIS PAS DANS LES 24 HEURES 2 NON3 NSP99	
VS73	Est-ce que (nom) a déjà reçu un vaccin sous forme de gouttes dans la bouche pour le/la protéger contre la polio ? <i>Insister en indiquant que la première goutte est généralement donnée à la naissance et les autres en même temps que des injections contre d'autres maladies.</i>	OUI1 NON 2 NSP99	2 ⇒ VS76 99 ⇒ VS76
VS74	Combien de fois le vaccin antipolio at-il été administré au centre de santé ?	NOMBRE DE FOIS — NSP.....99	
VS74a	La dernière fois que (nom) a reçu des gouttes de Polio, est-ce qu'il/elle a également reçu une injection pour le/la protéger contre la Polio ? <i>Insister pour s'assurer que les deux, gouttes et injection, ont été données.</i>	OUI1 NON 2 NSP 99	
VS75	Combien de fois le vaccin antipolio at-il été administré au cours d'une grande campagne dirigée sur un grand nombre d'enfants (tous les moins de 5 ans), et possiblement des vaccinations à domicile ?	NOMBRE DE FOIS — NSP.....99	
VS76	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin Pentavalent– c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour l'empêcher d'attraper le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, l'hépatite B et l'Haemophilus influenzae de type b ? <i>Insister en indiquant que le vaccin Pentavalent est parfois donné en même temps que les gouttes de Polio.</i>	OUI1 NON 2 NSP 99	2 ⇒ VS78 99 ⇒ VS78
VS77	Combien de fois le vaccin Pentavalent a été donné ?	NOMBRE DE FOIS — NSP99	
VS78	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin Pneumocoque Conjugué - PCV– c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour l'empêcher d'attraper une maladie pneumococcique, y compris les infections d'oreille et la méningite causée par le pneumocoque?	OUI1 NON 2 NSP 99	99 ⇒ VS80 2 ➔ VS80

	<i>Insister en indiquant que le vaccin PCV est parfois donné en même temps que le Pentavalent</i>		
VS79	Combien de fois le vaccin Pneumocoque Conjugué PCV a été donné ?	NOMBRE DE FOIS NSP99 —	
VS80	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin VAR – c'est-à-dire une injection dans le bras à l'âge de 9 mois ou plus pour l'empêcher d'attraper la rougeole	OUI1 NON 2 NSP99	2 ⇨ VS86 99 ⇨ VS86
VS81	Combien de fois le vaccin VAR a été donné ?	NOMBRE DE FOIS NSP 99 —	
VS82	Combien de fois le vaccin anti-rougeoleux a-t-il été administré au cours d'une grande campagne dirigée sur un grand nombre d'enfants (tous les moins de 5 ans ou mois de 15 ans) ?	NOMBRE DE FOIS NSP99 —	
VS86.	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin Rotavirus – c'est-à-dire du liquide dans la bouche pour prévenir la diarrhée ? <i>Insister en indiquant que le vaccin Rotavirus est parfois donné en même temps que le Pentavalent</i>	OUI1 NON 2 NSP 99	2 ⇨ VS83 99 ⇨ VS83
VS87	Combien de fois le vaccin Rotavirus a été donné ?	NOMBRE DE FOIS NSP 99	
VS83	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin contre la fièvre jaune – c'est-à-dire une injection dans le bras à l'âge de 9 mois ou plus - pour l'empêcher d'attraper la fièvre jaune ? <i>Insister en indiquant que le vaccin contre la fièvre jaune est parfois donné en même temps que le VAR.</i>	OUI1 NON 2 NSP 99	2 ⇨ VS85A 99 ⇨ VS85A
VS84	Combien de fois le vaccin a-t-il été administré au centre de santé ?	NOMBRE DE FOIS NSP 99	
VS85	Combien de fois le vaccin a-t-il été administré au cours d'une grande campagne dirigée sur un grand nombre d'enfants (tous les moins de 5 ans), et possiblement des vaccinations à domicile ?	NOMBRE DE FOIS NSP 99	
VS85a	Comment jugez-vous la qualité des services de vaccination fournis dans le centre de santé que vous avez l'habitude de fréquenter ?	Bonne1 Mauvaise2 NSP 99	
VS85 b	Si mauvaise, pourquoi ?		

VS85c	Y a-t-il des séances de vaccination dans un des centres de santé les plus proches de vous ?	OUI1 NON2 NSP99	
VS85d	où avez-vous l'habitude d'amener (nom) pour recevoir le vaccin ? notez le nom de la formation sanitaire.		
VS85e	où se situe cette formation sanitaire (village/quartier) ?	1. Dans le même village/quartier que le ménage 2. Dans un autre village/quartier que le ménage	
VS85f	Combien de séances de vaccination sont organisées chaque semaine dans le centre de santé que vous fréquentez ?	0 séance1 1 séance2 2 séances3 3 séances4 4 séances5 5 séances6 6 séances7 NSP99	
VS85g	Combien de fois avez-vous amené votre enfant aux séances de vaccination ? Ne sera pas pris en compte les vaccins reçus à la naissance avant la sortie de la maternité. Il s'agit des visites pour la vaccination que l'enfant ait été vacciné ou pas.		
VS85h	Le centre de santé que vous avez fréquenté pour la vaccination de votre enfant disposait-t-il de tous les vaccins/intrants à chaque séance ?	1. Oui 2. Non	
VS85i	Est-ce qu'une séance de stratégie avancée (séance de vaccination organisée dans votre village ou quartier en dehors des centres de santé) a été organisée lors du mois passé dans votre quartier / village ?	OUI1 NON2 NSP99	
VS85j	Avez-vous reçu une carte de vaccination lors d'une séance de vaccination ?	OUI1 NON2 NSP99	
VS85k	Avez-vous déjà payé une carte de vaccination ?	OUI1 NON2 NSP99	2 ⇒ VS85m 99 ⇒ VS85m
VS85l	Combien avez-vous payé la dernière fois en (FC) pour la carte de vaccination ?	Moins de 500 Francs.....1 500 -1500 Francs2 Plus de 1500 Francs3 NSP99	
VS85m	Avez-vous déjà payé pour un autre service lié à la vaccination ?	OUI1 NON2 NSP99	2 ⇒ VS88 99 ⇒ VS88

VS85 n	Combien de fois avez-vous payé pour les services de vaccination ?	Première vaccination.....1 Chaque vaccination2 Quelques fois.....3 Jamais4 NSP 99	
VS85 o	Si oui, quels sont les services de vaccination pour lesquels vous avez payé la dernière fois?	1. Fiche/jeton 2. Pesée 3. Pourboire 4. Seringues 5. Médicaments 6. Transport prestataire pour récupération de vaccins 7. Autres à préciser	
VS85 p	Combien avez-vous payé au total la dernière fois?		

SECTION 4 : ECHEC DE LA VACCINATION DES ENFANTS AGES DE 06-23 MOIS

VS88	État vaccinal	Pas vacciné1 partiellement vacciné.....2 Complètement vacciné3	1→ 106
VS89	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas reçu tous les vaccins recommandés ? (Plusieurs réponses possibles)	Site de vaccination trop éloigné 1 Horaire de la vaccination non connu 2 Mère trop occupée 3 Problèmes familiaux, dont maladie de la mère 4 Enfant malade, non envoyé 5 Enfant malade, envoyé mais non vacciné 6 Longue attente 7 Rumeurs 8 Ne crois pas en la vaccination 9 Peur des effets secondaires 10 Site et / ou horaire de la vaccination non connu 11 Ignore la nécessité de la vaccination 12 Ignore la nécessité de revenir pour la 2 ^{ème} ou la 3 ^{ème} dose 13 Mauvaises idées sur les contre-indications 14 Moment de vaccination inopportun 15 Vaccinateur absent 16 Vaccin non disponible 17 Séance de Vaccination annulée 18 Coût élevé de la vaccination ou de la séance de CPS 19 Enfant malade – amené mais n'a pas reçu la vaccination 20 Censure religieuse 21 Attitude négative du conjoint, père ou tuteur de l'enfant face à la vaccination 21 Attitude négative du conjoint, père ou tuteur de l'enfant face à la vaccination 22 Autres (précisez ci-dessous) 23	
VS102	Parmi les raisons précédentes, quelle est la raison la plus importante ? Cocher une seule réponse	Site de vaccination trop éloigné 1 Horaire de la vaccination non connu 2 Mère trop occupée 3 Problèmes familiaux, dont maladie de la mère 4 Enfant malade, non envoyé 5 Enfant malade, envoyé mais non vacciné 6 Longue attente 7 Rumeurs 8 Ne crois pas en la vaccination 9 Peur des effets secondaires 10 Site et / ou horaire de la vaccination non connu 11 Ignore la nécessité de la vaccination 12 Ignore la nécessité de revenir pour la 2 ^{ème} ou la 3 ^{ème} dose 13 Mauvaises idées sur les contre-indications 14 Moment de vaccination inopportun 15	

		Vaccinateur absent 16 Vaccin non disponible 17 Séance de Vaccination annulée 18 Coût élevé de la vaccination ou de la séance de CPS 19 Enfant malade – amené mais n'a pas reçu la vaccination 20 Censure religieuse 21 Attitude négative du conjoint, père ou tuteur de l'enfant face à la vaccination 21 Attitude négative du conjoint, père ou tuteur de l'enfant face à la vaccination 22 Autres (précisez ci-dessous) 23	
VS106	Où votre enfant a-t-il reçu son dernier vaccin ?	1 : Clinique de santé publique locale 2 : Consultation médicale privée locale 3 : Autre ressource locale 4 : Clinique de santé publique autre que (1), plus loin 5 : Consultation médicale privée autre que (2), plus	
VS107	Vous est-il arrivé d'amener un enfant au centre de santé pour le vacciner et qu'il ne l'ait pas été ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne se souvient pas	Si 2 ou 99, passez à VS118
VS108	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ? Poliment et avec discernement notez toutes les raisons mentionnées	Pas de vaccins 1 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS109	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	. Personnel absent (mais le service était ouvert) 2 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS110	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	Centre de santé fermé lorsque j'y suis allé 3 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS111	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	Enfant malade 4 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS112	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	Pas assez d'enfants présents pour ouvrir un flacon de vaccin 5 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS113	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	La visite n'était pas un jour de vaccination 6 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS114	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	Attente trop longue 7 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS115	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	Autres (précisez ci-dessous) 8: 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS116	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	9. Ne sait pas 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS117	Autre, précisez svp	Texte ouvert	
VS118	Connaissez-vous un enfant (le vôtre ou d'un voisin, etc.) qui ai eu un abcès après une vaccination ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	Si 2 ou 99, passez à VS123
VS119	Qui était cet enfant ?	1 : Le sien 2 : Enfant d'un voisin 3 : Enfant d'amis 4 : Enfant de sa famille 5 : Camarade de son enfant 6 : Autre (spécifiez ci-dessous)	Si autre que 6, passez à VS121
VS120	Autre, précisez svp	Texte ouvert	

VS121	Où se trouvait l'abcès ?	1 : Au bras 2 : A la cuisse 3 : Autre (précisez ci- dessous)	Si autre que 3, passez à VS123
VS122	Autre, précisez svp	Texte ouvert	
VS123	Si votre enfant devait se faire vacciner et qu'il soit fébrile, l'emmèneriez-vous se faire vacciner ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	
VS124	S'il toussait ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	
VS125	S'il avait des boutons ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	
VS126	S'il avait la diarrhée ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	
VS127	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination	les campagnes (p. ex. dates, groupe d'age cibles) : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS128	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	2. Importance de la vaccination systématique 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS129	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	3. Où se faire vacciner 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS130	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	4. Âge pour les vaccins systématiques 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS131	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	5. Revenir pour les doses suivantes des vaccins systématiques 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS132	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	6. Nouveaux vaccins (anti- pneumococcique et -rotavirus) 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS133	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	7. Autre (précisez ci-dessous) 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS134	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	99 : Ne sais pas 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS135	Autre, précisez svp	TEXTE OUVERT	

	Question sur la mobilité <i>Les questions qui suivent peuvent aider à identifier les familles qui sont mobiles ou au sein desquelles les personnes prenant soin de l'enfant voyagent une partie de l'année. Si une part significative des familles est mobile d'une façon ou d'une autre, pour des raisons culturelles ou économiques, cela peut valoir la peine d'inclure ces questions et d'effectuer un test d'hypothèse pour voir si les niveaux de couverture varient entre ménages mobiles et immobiles.</i>		
VS136	Dans l'année passée, des membres du ménage ont-ils été vivre ou travailler ailleurs pendant une partie de l'année ? (Dormir ailleurs pendant plus d'un mois)	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	Si 2 ou 99, passez à VS142
VS137	Si oui, combien de fois ?	1 : Une fois 2 : 2-3 fois 3 : 4 fois ou plus 99 : Ne sais pas	
VS138	Si oui, quelle a été la durée du séjour le plus long ?	1 : 1-2 mois 2 : 3-6 mois 3 : Plus de 6 mois 99 : Ne sait pas	
VS139	Qui est parti ?	1 : Tout le ménage 2 : Un adulte seul 3 : Deux adultes ou plus 4 : Les enfants seuls 5 : Un groupe d'adultes et d'enfants 99 : Ne sait pas	
VS140	Quel était le but du voyage ?	1 : Travailler 2 : Visiter la famille 3 : Loisirs ou congés 4 : Autre, précisez ci- dessous 99 : Ne sait pas	Si autre que 4, passez à VS142
VS141	Autre, précisez svp	Texte	

SECTION 5 : NIVEAU D'INFORMATION DES MERES/GARDIENNES D'ENFANT DE 6-23 MOIS SUR LA VACCINATION

			Oui	Non
QA501	Connaissez-vous les maladies des enfants que l'on peut éviter par la vaccination ? si oui, citez-les. Enquêteur, ne suggérez pas des réponses.	• Tuberculose	1	2
		• Diphtérie	1	2
		• Coqueluche	1	2
		• Hépatite	1	2
		• Haemophilus influenzae b	1	2
		• Poliomyélite	1	2
		• Rougeole	1	2
		• Fièvre jaune	1	2
		• Tétanos	1	2
		• Pneumonie	1	2
		• Méningite	1	2
		• Diarrhée	1	2
		• NSP	1	2
		• Autre (à préciser)	1	2
QA502	Quelles sont, selon vous les personnes les mieux indiquées pour vous parler de la vaccination?	• Personnel de santé	1	2
		• Parents	1	2
		• Grands parents	1	2
		• Autres parents	1	2
		• Amis/collègues/voisins	1	2
		• Mobilisateurs sociaux /relais communautaire	1	2
		• Chef quartier/village/coutumier	1	2
		• Journaliste	1	2
		• Leader d'opinion	1	2
		• Acteur de théâtre	1	2
		• Pasteur/prêtre/imam	1	2
		• Tradipraticien	1	2
QA503	Quels sont les canaux d'information que vous préférerez pour être informé sur la vaccination de routine?	• Autre (à préciser)	1	2
		• NSP	1	2
		• Télé	1	2
		• Radio	1	2
		• Associations/ réunions	1	2
		• Mobilisateurs sociaux/relais communautaire	1	2
		• Affiches/banderoles	1	2
		• Journaux	1	2
		• Église/mosquée	1	2
		• Personnel de santé	1	2
		• Amis/collègues voisins	1	2
		• Véhicules sonorisés	1	2
		• SMS	1	2
		• Internet	1	2
		• Panneaux publicitaires	1	2

		• Autre (à préciser)	1	2
		• NSP	1	2
QA504	A quel moment de la journée aimeriez-vous avoir une information sur la vaccination ?	1. Matin 2. Midi 3. Soir 4. N'importe quand		
QA505	Recevez-vous des visites à domicile des relais communautaires ?	1. Oui 2. Non		

**SECTION 6 : PERCEPTION DES MERES/GARDIENNES D'ENFANT DE 06-23
MOIS SUR LA VACCINATION** (*enquêteur, proposez les modalités de réponses au répondant*)

BeSD4	Dans quelle mesure les vaccins sont-ils importants, d'après vous, pour la santé de votre enfant ? Diriez-vous...	1. Qu'ils ne sont pas du tout importants, 2. Qu'ils sont quelque peu importants, 3. Qu'ils sont moyennement importants, 4. Qu'ils sont très importants
QA601	Dans quelle mesure pensez-vous que les vaccins sont bons pour votre enfant ?	1. Très bon 2. Bon 3. Mauvais 4. Très mauvais 5. Ne sait pas
BeSD6	Dans quelle mesure faites-vous confiance aux agents de santé qui administrent les vaccins aux enfants ? Diriez-vous...	1. Que vous ne leur accordez aucune confiance, 2. Que vous leur accordez une confiance limitée, 3. Que vous leur accordez une confiance moyenne, 4. Que vous leur accordez une grande confiance
BeSD7	Un agent de santé a-t-il recommandé que votre enfant soit vacciné ?	NON OUI
BeSD8	Vous a-t-on déjà contacté(e) pour vous dire que votre enfant était attendu pour la vaccination ?	NON OUI
BeSD5	Dans quelle mesure les vaccins sont-ils sûrs, d'après vous, pour votre enfant ? Diriez-vous...	1. Qu'ils ne sont pas du tout sûrs, 2. Qu'ils sont un peu sûrs, 3. Qu'ils sont moyennement sûrs 4. Qu'ils sont très sûrs
QA602	Dans quelle mesure pensez-vous que les vaccins sont sûrs pour votre enfant ?	Très sûr Sûr Peu sûr Pas du tout sûr Ne sait pas
QA603	Dans quelle mesure pensez-vous que les vaccins protègent votre enfant contre les maladies ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA604	Dans quelle mesure avez-vous confiance dans votre capacité à emmener votre enfant pour les visites de vaccination prévues ?	Très capable Capable Peu capable Pas du tout capable Ne sait pas
QA605	Dans quelle mesure encourageriez-vous les autres à faire vacciner leurs enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas

QA606	Dans quelle mesure les habitants de votre communauté apprécient-ils les services de vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA607	Dans quelle mesure votre conjoint ou partenaire/père ou tuteur de l'enfant approuve-t-il la vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
BeSD9	Pensez-vous que la plupart des parents que vous connaissez fassent vacciner leurs enfants ?	1. NON 2. OUI
QA608	Dans quelle mesure les autres parents de votre communauté approuvent-ils la vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
BeSD10	Pensez-vous que la plupart de vos parents et amis proches veuillent que vous fassiez vacciner votre enfant ?	NON OUI
BeSD11	Pensez-vous que vos dirigeants locaux veuillent que vous fassiez vacciner votre enfant ?	NON OUI
BeSD12	Pensez-vous que vos responsables religieux veuillent que vous fassiez vacciner votre enfant ?	NON OUI
QA609	Dans quelle mesure les leaders de votre communauté approuvent-ils la vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA610	Dans quelle mesure votre religion influence-t-elle la décision de faire vacciner votre enfant ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
BeSD13	Si c'était le moment de faire vacciner l'enfant, sa mère aurait-elle besoin de demander la permission de l'emmener au dispensaire ?	NON OUI

QA611	Dans quelle mesure diriez-vous que la vaccination des enfants va de pair avec vos croyances religieuses ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA612	Dans quelle mesure pensez-vous que la rougeole constitue une menace pour la santé des enfants qui ne sont pas vaccinés ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA613	Dans quelle mesure pensez-vous que les maladies évitables par la vaccination sont graves ?	Très grave Grave

		Peu grave Pas du tout grave Ne sait pas
MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION et qualité de services		
QA614	Connaissez-vous un enfant de votre famille ou de votre communauté qui a été infecté par la rougeole au cours de 12 derniers mois ?	Non Incertain Oui
QA615	Lors de votre dernière visite de vaccination pour cet enfant, avez-vous été traité avec respect par le personnel de vaccination ?	Non Incertain Oui
QA616	Lors de votre dernière visite de vaccination pour cet enfant, avez-vous été satisfait de la façon dont l'enfant a été traité par le personnel de vaccination ?	Non Incertain Oui
QA616a	Lors de votre dernière visite pour la vaccination de votre enfant, comment avez-vous apprécié l'accueil ?	Très bon Bon Mauvais Très mauvais Ne sait pas
QA617	Si vous avez un autre enfant à l'avenir, prévoyez-vous d'accepter de le vacciner selon le calendrier vaccinal ? (Recommandations du Ministère de la santé)	Non Incertain Oui

ACCEPTATION		
QA618	Connaissez-vous un enfant de votre famille ou de votre communauté qui a présenté des problèmes de santé suite à la vaccination ces 12 derniers mois ?	Non Incertain Oui Si non ou incertain aller à QA619
QA618a	Si oui, Quel problème?	1. fièvre 2. Abscès 3. autres à préciser
QA619	Avez-vous déjà refusé de recevoir un vaccin recommandé pour votre enfant ?	Non Incertain Oui
QA620	Avez-vous déjà tardé à recevoir un vaccin recommandé pour votre enfant ?	Non Incertain Oui

QA621	Combien de vaccins jugez-vous acceptables pour être reçus par votre enfant en une seule visite ?	Une Deux Trois ou plus
QA622	Comment les gens de votre communauté parlent-ils généralement des services de vaccination des enfants ?	Négativement Certains négativement et d'autres positivement Positivement Ne sait pas

BeSD15	Savez-vous où aller pour faire vacciner votre enfant ?	NON OUI
BeSD16	Avez-vous déjà emmené personnellement votre enfant le plus jeune se faire vacciner ?	NON OUI
BeSD17	Dans quelle mesure est-il facile d'obtenir des services de vaccination pour votre enfant ? Diriez-vous que...	1. Ce n'est pas du tout facile, 2. C'est assez peu facile, 3. C'est moyennement facile 4. C'est très facile
Voir les questions des coûts A REMONTER VERS LES COÛTS BeSD18	Dans quelle mesure est-il facile de payer la vaccination ? Quand vous pensez au coût, veuillez considérer les paiements dans la formation sanitaire, les frais pour s'y rendre, plus le coût lié au fait de s'absenter du travail. Diriez-vous que...	1. Ce n'est pas du tout facile, 2. C'est assez peu facile, 3. C'est moyennement facile, 4. C'est très facile
BeSD19	Qu'est-ce qui rend difficile l'accès aux services de vaccination pour votre enfant ? Diriez-vous... [LIRE À VOIX HAUTE TOUTES LES OPTIONS DE RÉPONSE, EN MARQUANT DES PAUSES APRÈS CHACUNE D'ELLES POUR PERMETTRE À LA PERSONNE INTERROGÉE DE RÉPONDRE « OUI » OU « NON ». LA PERSONNE INTERROGÉE PEUT SÉLECTIONNER PLUSIEURS OPTIONS DE RÉPONSE.]	Rien, ce n'est pas difficile, [SI LA RÉPONSE EST « RIEN », SAUTER LES AUTRES RÉPONSES] Il est difficile de se rendre dans la formation sanitaire, Les horaires d'ouverture de la formation sanitaire ne sont pas pratiques, La formation sanitaire refoule parfois les gens sans les vacciner, Le temps d'attente à la formation sanitaire est trop long, Y a-t-il autre chose ? [NOTER LA RÉPONSE :]
BeSD20	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des services de vaccination ? Diriez-vous que...	Vous n'êtes pas du tout satisfait(e), Vous êtes un peu satisfait(e), Vous êtes moyennement satisfait(e), ou Vous êtes très satisfait(e)
BeSD21	Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant au sujet des services de vaccination ? Diriez-vous... [LIRE À VOIX HAUTE TOUTES LES OPTIONS DE RÉPONSE, EN MARQUANT DES PAUSES APRÈS CHACUNE D'ELLES POUR PERMETTRE À LA PERSONNE INTERROGÉE DE RÉPONDRE « OUI » OU « NON ». LA PERSONNE INTERROGÉE PEUT SÉLECTIONNER PLUSIEURS OPTIONS DE RÉPONSE.]	1. Rien, vous êtes satisfait(e), [SI LA RÉPONSE EST « RIEN », SAUTER LES AUTRES RÉPONSES] 2. Le vaccin n'est pas toujours disponible, 3. La formation sanitaire n'ouvre pas à l'heure, 4. Les temps d'attente sont longs, 5. La formation sanitaire n'est pas propre, 6. Le personnel est mal formé, 7. Le personnel n'est pas respectueux, 8. Le personnel ne passe pas ☐ assez de temps avec les gens, ou

		9. Y a-t-il autre chose ? [NOTER LA RÉPONSE]
--	--	--

SECTION 7: IMPACT DE LA COVID 19 SUR L'OFFRE ET L'UTILISATION DES SERVICES DE VACCINATION

QA701	Avez-vous utilisé le service de vaccination pour un enfant depuis le mois de Mars 2020 jusqu'à aujourd'hui ?	1. oui 2. non 2⇒ QA705
QA702	Est-ce que le personnel chargé de la vaccination des enfants était disponible le jour du rendez-vous ?	1. oui, toujours disponible 2. oui, quelques fois disponible 3. non, pas disponible 4. ne sait pas
QA703	Est-ce que les vaccins/intrants dont vous aviez besoin pour votre enfant à cette séance étaient disponibles le jour du rendez-vous ?	1. oui, tous les vaccins/intrants étaient disponibles 2. oui, quelques vaccins/intrants étaient disponibles 3. non, aucun vaccin/intrant n'était disponible 4. ne sait pas
QA704	S'il vous était demandé de comparer la période avant le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020 à la période de mars 2020 à ce jour, diriez-vous que le nombre de jours d'offre des services de vaccination par semaine... Enquêteur, veuillez lire des options de réponse proposées	1. A augmenté 2. N'a pas changé 3. A diminué 4. ne sait pas
QA705	Diriez-vous que le nombre de séances de vaccination dans la communauté.... Enquêteur, veuillez lire des options de réponse proposées	1. A augmenté 2. N'a pas changé 3. A diminué 4. ne sait pas
QA706	Vous est-il arrivé de ne pas amener votre enfant à un rendez-vous de vaccination depuis le début de la pandémie en mars 2020 jusqu'à aujourd'hui ?	1. Oui 2. Non 2⇒QA801
QA707	Si oui, combien de fois cela vous est-il arrivé pendant cette période ?	 fois
QA708	Pourquoi ne l'aviez-vous pas amené à la vaccination ? Enquêteur, ne pas suggérer les réponses	1. à cause du confinement 2. par manque de moyen de transport 3. par peur d'être contaminé par la COVID-19 4. la formation sanitaire avait fermé 5. autres à préciser

II. ENQUETE DANS LES CENTRES DE SANTE

Consentement éclairé IT/ITA

Bonjour, je m'appelle _____ Je travaille pour le compte du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Nous sommes en train d'interroger les mères/gardiennes des enfants âgés de 6 à 23 mois, et les responsables des FOSA dans cette aire de santé dans le but de connaître la proportion des enfants qui sont protégés contre les maladies évitables par la vaccination, et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants ne sont pas vaccinés ou sont vaccinés de manière incomplète.

Dans un premier temps, nous aimerions nous entretenir avec vous à propos de la disponibilité des vaccins, matériel et fournitures nécessaires pour la vaccination au cours des 12 derniers mois, ainsi que de l'organisation des activités de vaccination dans votre aire de santé. Ensuite, étant donné que les mères/gardiennes de certains enfants n'ont pas été en mesure de nous montrer les cartes de vaccination des enfants, nous aurons besoin de retrouver les données de vaccins reçus par ces enfants dans le registre de vaccination de votre FOSA.

Les informations reçues auprès des mères/gardiennes et dans les FOSA seront utilisées pour déterminer la couverture vaccinale et pour planifier les activités et services en rapport avec la vaccination en République Démocratique du Congo. Les données collectées seront également analysées pour identifier les causes de la non vaccination ou de la vaccination incomplète des enfants dans différentes zones de santé de notre pays. Les noms des personnes ayant fourni les informations seront retirés de toutes les analyses, pour que ces informations restent anonymes.

Votre participation est volontaire. Vous pouvez refuser de répondre à certaines questions qui vous seront posées si vous le souhaitez, et décider d'arrêter l'entretien à tout moment. Il n'y aura aucune prime qui vous sera allouée du fait de votre participation à cette étude. De même, il n'y aura pas de sanction en cas de refus. Cependant, nous vous encourageons à participer à cette étude car vous contribuerez de cette manière aux efforts visant à protéger les jeunes enfants contre les maladies évitables par la vaccination en RDC. Avez-vous des questions sur cette enquête ?

Informations de contact des chercheurs

Prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour prendre votre décision de participer ou non à cette étude. Nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourrez vous poser à propos de cette étude. Si vous avez des questions additionnelles, si vous souhaitez exprimer une préoccupation à propos de cette recherche, ou si vous avez un problème lié à la recherche, vous pouvez contacter l'Investigateur Principal (IP) de cette étude ou son adjoint. Je vous remettrai également une copie de ce formulaire contenant les informations de contact de l'IP de cette étude, que vous pourrez contacter directement pour toutes questions concernant cette enquête.

Prof. Lusamba Paul-Samson Tél. +243 975 012 791. e-mail : luspauls@gmail.com ou pour son adjoint :

Prof. Nyandwe Kyloka Jean Tél. +243 810 759 142. e-mail : jnyandwe@gmail.com.

Acceptez-vous de participer à l'étude ? 1. Oui 2. Non

Je certifie que chaque enquêté a été informé de la nature, du but de l'étude et qu'il a donné librement son consentement verbal pour participer dans cette étude.

Signature de l'enquêteur

	DONNEES DEMOGRAPHIQUES											
QA801	Dans cette aire de santé, donner : 1. Population totale : 2. Nombre d'enfants âgés de 0 à 59 mois 3. Nombre d'enfants âgés de 0 à 5 mois 4. Nombre d'enfants âgés de 6 à 11 mois 5. Nombre d'enfants âgés de 12 à 23 mois 6. Combien des villages/rues/avenues comptent l'aire de santé	Nbre ou leur proportion en % <table border="0"> <tr> <td> ____ </td> <td> ____ </td> </tr> <tr> <td> ____ </td> <td> ____ </td> </tr> <tr> <td> ____ </td> <td> ____ </td> </tr> <tr> <td> ____ </td> <td> ____ </td> </tr> <tr> <td> ____ </td> <td> ____ </td> </tr> </table>	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
____	____											
____	____											
____	____											
____	____											
____	____											
QA802	DISPONIBILITE DES VACCINS AU COURS DES 12 MOIS PRECEDANT L'ENQUETE											
	1. Y-a-t-il eu, dans la Zone de santé, au cours des 12 derniers mois : - Rupture de stock de vaccin ?..... - Si oui, préciser le (s) quel(s) vaccin(s) (liste d'antigènes) (liste des intrants à ajouter): _____ _____ _____	1. Oui 2. Non										
	2. Y-a-t-il eu au cours de 12 derniers mois dans votre aire de santé des villages/rues/avenue qui sont inaccessibles ? Si oui, combien sont – elles ? Si oui préciser la(les) raison(s) de l'inaccessibilité	1. Oui 2. Non ____ _____ _____										
	3. Au cours de 12 derniers mois la chaine du froid était-elle fonctionnelle ? Si non, préciser le(s) problème(s) de la chaine du froid :	1. Oui 2. Non _____ _____ _____										
	4. Y-a-t-il des partenaires qui apportent un appui à la vaccination dans votre aire de santé ? Si oui indiquer le(s) nom(s) de ce(s) Partenaire (s) : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	1. Oui 2. Non										

	Si oui, combien de séances de vaccination étaient organisées chaque mois dans d'autres sites au cours des 12 derniers mois (de novembre 2020 à novembre 2021) ?	Nombre de séances de vaccination par mois	
	Si oui, combien de séances de vaccination étaient organisées chaque semaine dans d'autres sites au cours des 12 derniers mois (de novembre 2020 à novembre 2021) ?	Nombre de séances de vaccination par semaine	

I. SERVICES DE VACCINATION

7. Cet établissement propose-t-il des services de vaccination ?

- ☐ OUI
☐ NON

DEMANDEZ À ÊTRE INDIQUÉ À L'ENDROIT DE L'ÉTABLISSEMENT OÙ LES SERVICES DE VACCINATION SONT FOURNIS. TROUVEZ LA PERSONNE LA PLUS BIEN INFORMÉE SUR LES SERVICES DE VACCINATION DANS L'ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ LE BUT DE L'ENQUÊTE ET POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES.

8. Cet établissement fournit-il des services de vaccination aujourd'hui ?

- ☐ OUI
☐ NON

9. Cet établissement fournit-il l'un des services de vaccination suivants dans l'établissement uniquement, en tant que sensibilisation à poste fixe uniquement, ou les deux ? * LE CALENDRIER DES VACCINS DOIT ÊTRE SPÉCIFIÉ DANS LE CADRE DE L'ADAPTATION AU PAYS	À LA FOIS DANS L'INSTALLATION ET COMME EXTENSION	DANS L'INSTALLATION UNIQUEMENT	SENSIBILISATION UNIQUEMENT	SERVICE NON OFFERT
a) Doses de naissance (ex hepB0, BCG, OPV0, ...)	☐	☐	☐	☐
b) Vaccins infantiles (moins de 1 an)	☐	☐	☐	☐
c) Vaccins adolescents/adultes (p. ex. VPH, tétanos, grippe)	☐	☐	☐	☐

10. À quelle fréquence cet établissement propose-t-il des services complets de vaccination systématique des enfants dans l'établissement ?

- ☐ DU QUOTIDIEN

- ☐ HEBDOMADAIRE
- ☐ MENSUEL
- ☐ TRIMESTRIEL
- ☐ AUTRE PRÉCISEZ)

11. À quelle fréquence cet établissement propose-t-il des services complets de vaccination systématique des enfants dans le cadre de la sensibilisation ?

- ☐ DU QUOTIDIEN
- ☐ HEBDOMADAIRE
- ☐ MENSUEL
- ☐ TRIMESTRIEL
- ☐ AUTRE PRÉCISEZ)

12. Avez-vous les directives nationales pour la vaccination systématique des enfants disponibles dans cet établissement aujourd'hui ? *SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT*

- ☐ OUI, OBSERVÉ
- ☐ OUI, SIGNALÉ NON VU
- ☐ NON

13. Est-ce que vous ou un(des) prestataire(s) de prestation de services de vaccination avez reçu une formation sur l'un des services de vaccination infantile suivants au cours des deux dernières années ? <i>SI OUI : Veuillez préciser si c'était par le biais d'une formation formelle ou d'une supervision formative</i>	OUI, FORMATION FORMELLE	OUI, SUPERVISION FORMATIVE	PAS DE FORMATION
a) Prestation de services de vaccination (immunisation en pratique (IIP) ou similaire)			
b) Gestion/manipulation des vaccins et chaîne du froid			
c) Communication des données et suivi de la prestation de services (par exemple, auto-évaluation de la qualité des données (DQS))			
d) Surveillance et notification des maladies			
e) Sécurité des injections et gestion des déchets			
f) ROUGE (atteindre chaque district)			
g) Formation sur le nouveau vaccin* avant l'introduction * LE NOUVEAU VACCIN DOIT ÊTRE SPÉCIFIÉ DANS LE CADRE DE L'ADAPTATION AU PAYS			

14. J'aimerais savoir si les articles suivants pour la vaccination sont disponibles dans cette zone de service aujourd'hui. Pour chaque article, merci de me dire s'il est disponible aujourd'hui. <i>DEMANDEZ À VOIR LES ARTICLES</i>	OBSERVÉ	SIGNALÉ NON VU	INDISPONIBLE

a) Seringues autobloquantes			
b) Conteneur pour objets tranchants/boîte de sécurité			
c) Porte-vaccins/Glacière			
d) Ensemble de blocs réfrigérants pour porte-vaccins (Remarque : 4 à 5 blocs réfrigérants forment un ensemble)			
e) Cartes de vaccination (ou carnet de santé de l'enfant)			
f) Feuilles de pointage officielles de vaccination ou feuille de pointage intégrée			
g) Registres officiels de vaccination ou équivalent			

15. Cet établissement dispose-t-il d'un réfrigérateur disponible et fonctionnel pour le stockage des vaccins ? *REMARQUE : POUR QU'UN RÉFRIGÉRATEUR FONCTIONNE, IL DOIT AVOIR UNE CAPACITÉ SUFFISANTE POUR ACCUEILLIR TOUS LES VACCINS NÉCESSAIRES.*

- ☐ DISPONIBLE ET FONCTIONNEL
☐ DISPONIBLE NON FONCTIONNEL
☐ DISPONIBLE JE NE SAIS PAS SI FONCTIONNE
☐ INDISPONIBLE *PASSEZ À LA QUESTION #22*

16. Quel type de source d'énergie est utilisé pour le réfrigérateur à vaccins ?

- ☐ ÉLECTRICITÉ (RÉSEAU OU GÉNÉRATEUR)
☐ SOLAIRE (AVEC OU SANS BATTERIES)
☐ GAZ
☐ KÉROSÈNE
☐ MIXTE (ÉLECTRIQUE AVEC GAZ KÉROSÈNE)
☐ AUTRE

17. Cette source d'énergie alimente-t-elle le réfrigérateur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ?

- ☐ OUI
☐ NON

18. Parmi les dispositifs suivants de surveillance de la température du réfrigérateur, lesquels sont disponibles et fonctionnent dans le réfrigérateur aujourd'hui : <i>DEMANDEZ À VOIR LES ARTICLES</i>	A) DISPONIBLE			B) FONCTIONNEMENT		
	OBSERVÉ	SIGNALÉ NON VU	INDISPONIBLE	OUI	NON	NE SAIT PAS
a) Thermomètre	☐	☐	☐	☐	☐	☐
b) Enregistreur/enregistreur de température en continu	☐	☐	☐	☐	☐	☐

19. La température du réfrigérateur est-elle contrôlée deux fois par jour ? *SI OUI : VEUILLEZ DEMANDER À VOIR LE JOURNAL UTILISÉ POUR ENREGISTRER LA TEMPÉRATURE*
- ☐ OUI, LOG OBSERVÉ
- ☐ OUI, JOURNAL SIGNALÉ NON VU
- ☐ NON
20. Le journal des températures a-t-il été rempli au cours des 30 derniers jours ? *VEUILLEZ CONSULTER LE JOURNAL ET VÉRIFIER QU'IL SOIT COMPLET (TEMPÉRATURE ENREGISTRÉE 2 FOIS/JOUR AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS)*
- ☐ OUI
- ☐ OUI, PARTIELLEMENT
- ☐ NON
21. La température a-t-elle été hors de la plage de 2 à 8 oC inclus au cours des 30 derniers jours ? *VEUILLEZ VÉRIFIER LE REGISTRE DE TEMPÉRATURE ET VÉRIFIER LA TEMPÉRATURE DES 30 DERNIERS JOURS OUVRABLES AFIN DE RÉPONDRE À LA QUESTION*
- ☐ OBSERVÉ DANS LA GAMME
- ☐ SIGNALÉ DANS LA GAMME MAIS PAS VU
- ☐ HORS DE PORTÉE
- ☐ ENREGISTREMENT NON DISPONIBLE

22. SI L'ETABLISSEMENT OFFRE DES SERVICES DE VACCINATION AUJOURD'HUI (Q7 = "OUI") OU DISPOSE D'UN REFRIGERATEUR FONCTIONNEL POUR LE STOCKAGE DES VACCINS (Q15 = "DISPONIBLE ET FONCTIONNEL"), <i>PASSEZ À LA QUESTION #24</i>	23. L'ETABLISSEMENT N'OFFRE PAS DE SERVICES DE VACCINATION AUJOURD'HUI (Q7 = "NON") ET N'A PAS DE REFRIGERATEUR FONCTIONNEL POUR LE STOCKAGE DES VACCINS (Q15= "DISPONIBLE NON FONCTIONNEL OU DISPONIBLE NE SAIT PAS SI FONCTIONNE OU NON DISPONIBLE"), <i>PASSEZ À LA QUESTION #25</i>
---	---

24. L'un des vaccins suivants est-il disponible sur ce site de service aujourd'hui ? <i>* LA LISTE DES VACCINS CI-DESSOUS DOIT ÊTRE SPÉCIFIÉE SELON LE CALENDRIER NATIONAL PENDANT LE PROCESSUS D'ADAPTATION DU PAYS. SÉLECTIONNEZ UN VACCIN DE CHAQUE VACCIN AU HASARD ET VÉRIFIEZ SI LE VACCIN EST VALIDE : 1. LE MONITEUR DE FLACON (VVM) SUR LE FLACON DE VACCIN N'A PAS TOURNÉ ET 2. LA DATE DE</i>	OBSERVÉ DISPONIBLE		PAS OBSERVÉ		
	AU MOINS UN VALIDE	DISPONIBLE NON VALIDE	SIGNALÉ DISPONIBLE MAIS PAS VU	NON DISPONIBLE AUJOURD'HUI	JAMAIS DISPONIBLE

<i>PÉREMPTION N'EST PAS DÉPASSÉE</i>					
a) Vaccin et diluant contre la rougeole					
b) DTC-Hib+HepB (pentavalent)					
c) Vaccin antipoliomyélitique oral					
d) Vaccin et diluant BCG					
e) Vaccin antirotavirus					
f) Vaccin antipneumococcique					
g) VPI (vaccin antipoliomyélitique inactivé)					
h) VPH (vaccin contre le papillomavirus humain)					

25. Au cours des trois derniers mois, n'avez-vous pas pu administrer l'un des vaccins énumérés ci-dessous en raison d'un stock indisponible ? <i>POUR CHACUN DES ARTICLES SUIVANTS, VEUILLEZ VÉRIFIER DANS LES DOSSIERS DE L'ÉTABLISSEMENT S'IL Y A EU UNE RUPTURE DE STOCK AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS</i> <i>* LA LISTE DES VACCINS CI-DESSOUS DOIT ÊTRE SPÉCIFIÉE SELON LE CALENDRIER NATIONAL PENDANT LE PROCESSUS D'ADAPTATION DU PAYS</i>	OUI, RUPTURE DE STOCK	PAS DE RUPTURE DE STOCK	NON INDIQUÉ	PRODUIT NON OFFERT	ENREGISTREMENT DE L'INSTALLATION NON DISPONIBLE
a) Vaccin et diluant contre la rougeole					
b) DTC-Hib+HepB (pentavalent)					
c) Vaccin antipoliomyélitique oral					
d) Vaccin et diluant BCG					
e) Vaccin antirotavirus					

f) Vaccin antipneumococcique					
g) VPI (vaccin antipoliomyélitique inactivé)					
h) VPH (vaccin contre le papillomavirus humain)					

Nous vous remercions pour le temps que vous avez accordé à cette interview.

Nom de l'enquêteur _____ Signature _____

III. OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES DE COUVERTURE VACCINALE A PARTIR DES REGISTRES DES FOSA

Consentement éclairé IT/ITA

Bonjour, je m'appelle _____ Je travaille pour le compte du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Nous sommes en train d'interroger les mères/gardiennes des enfants âgés de 6 à 23 mois, et les responsables des FOSA dans cette aire de santé dans le but de connaître la proportion des enfants qui sont protégés contre les maladies évitables par la vaccination, et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants ne sont pas vaccinés ou sont vaccinés de manière incomplète.

Dans un premier temps, nous aimerions nous entretenir avec vous à propos de la disponibilité des vaccins, matériel et fournitures nécessaires pour la vaccination au cours des 12 derniers mois, ainsi que de l'organisation des activités de vaccination dans votre aire de santé. Ensuite, étant donné que les mères/gardiennes de certains enfants n'ont pas été en mesure de nous montrer les cartes de vaccination des enfants, nous aurons besoin de retrouver les données de vaccins reçus par ces enfants dans le registre de vaccination de votre FOSA.

Les informations reçues auprès des mères/gardiennes et dans les FOSA seront utilisées pour déterminer la couverture vaccinale et pour planifier les activités et services en rapport avec la vaccination en République Démocratique du Congo. Les données collectées seront également analysées pour identifier les causes de la non vaccination ou de la vaccination incomplète des enfants dans différentes zones de santé de notre pays. Les noms des personnes ayant fourni les informations seront retirés de toutes les analyses, pour que ces informations restent anonymes.

Votre participation est volontaire. Vous pouvez refuser de répondre à certaines questions qui vous seront posées si vous le souhaitez, et décider d'arrêter l'entretien à tout moment. Il n'y aura aucune prime qui vous sera allouée du fait de votre participation à cette étude. De même, il n'y aura pas de sanction en cas de refus. Cependant, nous vous encourageons à participer à cette étude car vous contribuerez de cette manière aux efforts visant à protéger les jeunes enfants contre les maladies évitables par la vaccination en RDC. Avez-vous des questions sur cette enquête ?

Informations de contact des chercheurs

Prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour prendre votre décision de participer ou non à cette étude. Nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourrez vous poser à propos de cette étude. Si vous avez des questions additionnelles, si vous souhaitez exprimer une préoccupation à propos de cette recherche, ou si vous avez un problème lié à la recherche, vous pouvez contacter l'Investigateur Principal (IP) de cette étude ou son adjoint. Je vous remettrai également une copie de ce formulaire contenant les informations de contact de l'IP de cette étude, que vous pourrez contacter directement pour toutes questions concernant cette enquête.

Prof. Lusamba Paul-Samson Tél. +243 975 012 791. e-mail : luspauls@gmail.com ou pour son adjoint :

Prof. Nyandwe Kyloka Jean Tél. +243 810 759 142. e-mail : jnyandwe@gmail.com.

Acceptez-vous de participer à l'étude ? 1. Oui 2. Non

Je certifie que chaque enquêté a été informé de la nature, du but de l'étude et qu'il a donné librement son

consentement verbal pour participer dans cette étude.

Signature de l'enquêteur

Numéro	Questions	Réponses	Sauts
VSCS01	N° d'Identifiant de la strate* (Province)		
VSCS02	Nom de la strate (Province)		
VSCS02a	N° d'identifiant de la Zone de santé		
VSCS02b	Nom de la zone de santé		
VSCS03	N° d'identifiant de la grappe (Aire de santé)		
VSCS04	Nom de la grappe (Aire de santé)		
VSCS04a	N° d'Identifiant de l'avenue/rue/village*		
VSCS04b	Nom de l'Avenue /rue/village		
VSCS05	N° d'identifiant de l'enquêteur		
VSCS06	Nom de l'enquêteur		
VSCS07	N° d'identifiant de du superviseur		
VSCS08	Nom du Superviseur		

VSCS09	Nom de la formation sanitaire		
VSCS10	Coordonnées GPS		
VSCS12	Date de l'arrivée dans la formation sanitaire		
VSCS13	Heure de début de la revue des registres de vaccination		
VSCS14	N° d'Identifiant du ménage		
VSCS15	N° personnel de l'enfant (tiré du questionnaire ménage)		
VSCS16	Nom de l'enfant (complet)		
VSCS17	Nom du père de l'enfant		

VSCS18	Nom de la mère de l'enfant		
VSCS19	Sexe de l'enfant	1 = M 2 = F	
VSCS20	Nom du chef de ménage		
VSCS21	Date de naissance (de préférence sur la carte vue au domicile, ou selon le souvenir de la personne prenant soin de l'enfant figurant sur l'inventaire des ménages)		
VSCS22	Date de naissance (selon le registre)		
<i>Note : les vaccins et leurs doses, ainsi que l'ordre dans lequel ils apparaissent peut varier entre les enquêtes, donc la section suivante peut être adaptée pour correspondre au formulaire pour VS de votre enquête)</i>			
VSCS23	BCG	Date	Si date sur la carte, passez à VSC26
	BCG - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	

VSCS24			
VSCS25	Hépatite B (dose à la naissance)	Date	
VSCS26	Hépatite B (dose à la naissance) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS27	Polio à la naissance (VPO0)	Date	Si date sur la carte, passez à VSC29
VSCS28	Polio à la naissance (VPO0) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS29	Penta/DTC-Hib-Hep 1		Si date sur la carte, passez à VSC31
VSCS30	Penta/DTC-Hib-Hep 1 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS31	Pneumocoque 1 (PCV-1)	Date	Si date sur la carte, passez à VSC33
VSCS32	Pneumocoque 1 (PCV-1) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	

VSCS33	Polio 1 (VPO1)	Date	Si date sur la carte, passez à VSC35
VSCS34	Polio 1 (VPO1) - coché sur la carte	1. Oui ; 2. Non	
VSCS35	Rotavirus 1	Date	Si date sur la carte, passez à VSC37
VSCS36	Rotavirus 1 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS37	Penta/DTC-Hib-Hep 2	; ; ; ;	Si date sur la carte, passez à VSC39
VSCS38	Penta/DTC-Hib-Hep 2 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS39	Pneumocoque 2 (PCV2)	Date	Si date sur la carte, passez à VSC41
VSCS40	Pneumocoque 2 (PCV-2) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : non	

VSCS41	Polio 2 (VPO2)		Si date sur la carte, passez à VSC43
VSCS42	Polio 2 (VPO2) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS43	Rotavirus 2	Date	Si date sur la carte, passez à VSC45
VSCS44	Rotavirus 2 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS45	Penta/DTC-Hib-Hep 3	Date	Si date sur la carte, passez à VSC47
VSCS46	Penta/DTC-Hib-Hep 3 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS47	Pneumocoque 3 (PCV-3)		Si date sur la carte, passez à VSC49
VSCS48	Pneumocoque 3 (PCV-3) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	

VSCS49	Polio 3 (VPO3)		Si date sur la carte, passez à VSC51
VSCS50	Polio 3 (VPO3) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS51	Rotavirus 3	Date	Si date sur la carte, passez à VSC53
VSCS52	Rotavirus 3 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS53	Polio (VPI)		Si date sur la carte, passez à VSC55
VSCS54	Polio (VPI) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS55	Rougeole (VAR)	Date	Si date sur la carte, passez à VSC57
VSCS56	Rougeole - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	

VSC57	Fièvre Jaune	Date	Si date sur la carte, passez à VSC59
VSC58	Fièvre Jaune - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSC59	Nom du fichier des photos numériques ou des registres scannés du PEV		
VSC60	Date de fin de l'interview		
VSC61	Heure de fin de l'interview	Heure	
VSC62	Commentaires de l'enquêteur		
VSC63	Commentaires du superviseur		

IV. INDICATEURS DU PALUDISME
SECTION 1 : COMPOSITION DES MENAGES

Numéro	Nom	Age	Sexe	Si femme, est-elle enceinte ?

SECTION 2 : POSSESSION ET UTILISATION DES MILD

	Questions	Réponses	Instructions	
q200	Est-ce qu'il y a des moustiquaires dans votre ménage ?	1. Oui 2. Non	Si non allez à	
q201	Combien de moustiquaires avez-vous dans votre ménage ?	NOMBRE DE MOUSTIQUAIRES _____		
q202	Demander au répondant de montrer les moustiquaires	Moustiquaire 1 1. Observée 2. Non observée	Moustiquaire 2 1. Observée 2. Non observée	Moustiquaire 3 1. Observée 2. Non observée
q203	Depuis combien de mois votre ménage a cette moustiquaire? Si moins d'un mois, enregistrer '00'.	MOIS PLUS DE 36 MOIS 95 NSP / pas sur98	MOIS PLUS DE 36 MOIS 95 NSP / pas sur98	MOIS PLUS DE 36 MOIS 95 NSP / pas sur98
q204	Observer ou demander la marque de la moustiquaire. Si la marque est inconnue et si observation de la moustiquaire n'est pas possible, montrer des photos des différents types et marques de moustiquaires au répondant.	MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE A LONGUE DUREE D'ACTION (MILDA) PERMANET(SERENA)11 OLISET12 NET PROTECT13 DURANET.....14 INTERCEPTOR.....15 DAWA PLUS.....17 MAGNET.....19 AUTRE MARQUE (préciser)16 NSP MARQUE.....18 AUTRE TYPE (préciser) 36 NSP MARQUE /TYPE98	MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE A LONGUE DUREE D'ACTION (MILDA) PERMANET(SERENA)11 OLISET12 NET PROTECT13 DURANET.....14 INTERCEPTOR.....15 DAWA PLUS.....17 MAGNET.....19 AUTRE MARQUE (préciser)16 NSP MARQUE.....18 AUTRE TYPE (préciser) 36 NSP MARQUE /TYPE98	MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE A LONGUE DUREE D'ACTION (MILDA) PERMANET(SERENA)11 OLISET12 NET PROTECT13 DURANET.....14 INTERCEPTOR.....15 DAWA PLUS.....17 MAGNET.....19 AUTRE MARQUE (préciser)16 NSP MARQUE.....18 AUTRE TYPE (préciser) 36 NSP MARQUE /TYPE98
q205	Est-ce que la moustiquaire est une MILDA (q204=11-19)?	OUI1/ q206 NON.....2	OUI1/ q206 NON.....2	OUI1/ q206 NON.....2
q206	Avez-vous obtenu cette moustiquaire au cours d'une des campagnes de distribution locale de masse de 2020, 2021 ou 2022) ; durant une consultation prénatale ou durant une visite de vaccination ?	OUI, CAMPAGNE 2020.....1 OUI, CAMPAGNE 2021.....2 OUI, CAMPAGNE 2022.....3 OUI, CPN.....4 OUI, VACCINATION5 NON.....6 NSP.....8	OUI, CAMPAGNE 2020.....1 OUI, CAMPAGNE 2021.....2 OUI, CAMPAGNE 2022.....3 OUI, CPN.....4 OUI, VACCINATION5 NON.....6 NSP.....8	OUI, CAMPAGNE 2020.....1 OUI, CAMPAGNE 2021.....2 OUI, CAMPAGNE 2022.....3 OUI, CPN.....4 OUI, VACCINATION5 NON.....6 NSP.....8
q207	Vérifier q206: Est-ce que = 6 ?	OUI1 NON.....2/ q209	OUI1 NON.....2/ q209	OUI1 NON.....2/ q209
q208	Où avez-vous eu cette moustiquaire ?	CENTRE DE SANTÉ PUBLIC...01	CENTRE DE SANTÉ PUBLIC...01	CENTRE DE SANTÉ PUBLIC...01

		CENTRE DE SANTE PRIVE.....02 PHARMACIE.....03 BOUTIQUE/ MARCHE.....04 AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE.....05 INSTITUTION RELIGIEUSE.....06 ECOLE.....07 AUTRE96 NSP.....98	CENTRE DE SANTE PRIVE.....02 PHARMACIE.....03 BOUTIQUE/ MARCHE.....04 AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE.....05 INSTITUTION RELIGIEUSE.....06 ECOLE.....07 AUTRE96 NSP.....98	CENTRE DE SANTE PRIVE.....02 PHARMACIE.....03 BOUTIQUE/ MARCHE.....04 AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE.....05 INSTITUTION RELIGIEUSE.....06 ECOLE.....07 AUTRE96 NSP.....98
q209	Est-ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ?	OUI1 NON.....2 NSP / PAS SUR.....8	OUI1 NON.....2 NSP / PAS SUR.....8	OUI1 NON.....2 NSP / PAS SUR.....8
q210	Est-ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire (q209=1) ?	OUI1 NON.....2 / section 3	OUI1 NON.....2 / section 3	OUI1 NON.....2 / section 3
q211	Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ? Enregistrer les numéros de ligne des personnes sur la LISTE DES MEMBRES DU MENAGE <i>Si la personne qui a dormi sous la moustiquaire n'est pas dans la LISTE DES MEMBRES DU MENAGE, enregistrer '00'.</i>	NOM #1 _____ NUM. DE LIGNE_____ NOM #2 _____ NUM. DE LIGNE_____ NOM #3 _____ NUM. DE LIGNE_____ NOM #4 _____ NUM. DE LIGNE_____	NOM #1 _____ NUM. DE LIGNE_____ NOM #2 _____ NUM. DE LIGNE_____ NOM #3 _____ NUM. DE LIGNE_____ NOM #4 _____ NUM. DE LIGNE_____	NOM #1 _____ NUM. DE LIGNE_____ NOM #2 _____ NUM. DE LIGNE_____ NOM #3 _____ NUM. DE LIGNE_____ NOM #4 _____ NUM. DE LIGNE_____

SECTION 3 : FEMMES ENCEINTES ET CELLES AYANT ACCOUCHE LES DEUX DERNIERES ANNEES

Q300	Q301	Q302	Q303	Q304	Q305	Q306	Q307	Q308	Q309	Q310
A-elle déjà fréquenté la CPN ou avait-elle fréquenté la CPN lors de sa dernière grossesse ? 1.Oui 2.Non 2 → allez à 304	Si Oui Nombre de visite CPN réalisée	A-t-elle reçu de MILD à la CPN ? 2 → allez à 304	A quelle visite de CPN a-t-elle reçu la MILD ?	Durant votre grossesse de (nom), avez-vous pris du SP/Fansidar pour vous éviter de contracter le paludisme ?	Combien de fois avez-vous pris du SP/Fansidar durant votre grossesse de (nom) ?	Cette prise de Fansidar était-elle faite en présence d'un prestataire de soins ?	Si oui, combien de fois avez-vous pris le Fansidar en présence d'un prestataire de soins ?	Posez les questions 308, 309 et 310 uniquement pour les femmes enceintes. A-t-elle dormi dans ce ménage la nuit dernière ? 2 → allez à Q400	A dormi sous MILD la dernière nuit précédant la visite ? 1 → Q400	Si Non , pourquoi ?
1. Oui 2. Non	1. CPN 1 2. CPN 2 3. CPN 3 4. CPN 4 ou plus	1. Oui 2. Non	1. CPN 1 2. CPN 2 ou plus 3. Ne se rappelle plus		NOMBRE DE FOIS — — NSP98	1. Oui 2. Non		1. oui 2. Non 3. NSP	1. Oui 2. Non 3. NSP	1. Pas de MILD 2. MILD non installée 3. MILD abimée 4. Chaleur 5. Etouffement 6. Autre (à

SECTION 4 : ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS

Ces questions seront posées pour tous les enfants de moins de 5 ans des ménages

Q400	Q401	Q402	Q403	Q404	Q405	Q406	Q407
A n'importe quel moment au cours des deux dernières semaines, est-ce que (nom) a eu de la fièvre ?	À n'importe quel moment durant sa maladie, est-ce que (nom) a eu du sang prélevé au bout de son doigt ou au talon pour effectuer un test ?	De quel (s) test (s) l'enfant a-t-il bénéficié ? Enquêteur montrez l'image des tests du paludisme et cochez ce qui correspond au choix du répondant	Quel était le résultat du TDR ?	Quel était le résultat de la GE?	Avez-vous payé pour le test de paludisme ?	Si oui, combien avez-vous payé en Francs Congolais pour le TDR ?	Si oui, combien avez-vous payé en Francs Congolais pour la GE ?
1. Oui 2. Non 3. NSP Si 2 ou 3 allez à Q500	1. Oui 2. Non 3. NSP Si 2 ou 3 allez à Q408	1. TDR 2. GE 3. Les deux tests 4. Ne sait pas	1. Positif 2. Négatif 3. Indéterminé 4. Ne sait pas 5. NA	1. Positif 2. Négatif 3. Indéterminé 4. Ne sait pas 5. NA	1. Oui 2. Non 3. Ne sait pas	1. FC 2. NA	1. FC 2. NA

Q408	Q409	Q410	Q411	Q412
Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part ?	Où avez-vous recherché des conseils ou un traitement ? <i>Insister : Quelque part d'autre ? Encercler tous les fournisseurs mentionnés mais ne pas faire de suggestions. Insister pour identifier chaque type de fournisseur. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit et enregistrer temporairement X jusqu'à trouver la catégorie appropriée pour la réponse.</i> _____ (Nom de l'endroit)	Si oui, Après combien de jour avez-vous recherché les soins ? Enquêteur : mettre 00si le même jour	Pourquoi vous n'avez pas recherché des conseils ou traitement le même jour ?	A n'importe quel moment de sa maladie, est-ce que (nom) a reçu un médicament pour cette maladie ?
1. Oui 2. Non ☐ Q500 3. NSP ☐ Q500	SECTEUR MEDICAL PUBLIC HOPITAL GOUVERNEMENTALA CENTRE DE SANTE GOUVERNEMENTAL..... B POSTE DE SANTE GOUVERNEMENTAL C AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE . (SITE DES SOINS COMMUNAUTAIRES) D CLINIQUE MOBILE/STRATEGIE AVANCEE..... E AUTRE MEDICAL PUBLIC (préciser) _____ H SECTEUR MEDICAL PRIVE HOPITAL PRIVE / CLINIQUEI MEDECIN PRIVEJ PHARMACIE PRIVEE..... K AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE (non gouvernemental)..... L CLINIQUE MOBILE M AUTRE MEDICAL PRIVE (préciser) _____ O AUTRE SOURCE FAMILLE/AMIS.....P BOUTIQUE/MARCHE/RUE.....Q PRATICIEN TRADITIONNEL.....R AUTRE SOURCE (préciser) _____ X		1. La fièvre n'était pas importante 2. On a attendu que la fièvre parte 3. Pas d'argent pour le traitement 4. Pas de moyen de transport 5. L'endroit où se trouvait le traitement se trouvait trop loin 6. Personne dans le ménage n'avait le temps d'aller chercher le traitement 7. On ne savait pas où aller pour trouver un traitement 8. Médicaments non disponibles au point de vente 9. Toujours malade, attend que la fièvre augmente pour chercher un traitement 10. La fièvre est partie 96. Autres (spécifiez) [_____] 99. Ne sait pas	1. Oui 2. Non 3. Ne sait pas
		/ _ _ /jours		
		/ _ _ /jours		
		/ _ _ /jours		
		/ _ _ /jours		
		/ _ _ /jours		

° Quest/	Q413	Q414	Q415	
Questi on	Quel médicament (nom) a-t-il/elle reçu ? Insister : Rien d'autre ? Si impossible de déterminer le type de médicament, noter le nom / la marque et enregistrer temporairement X jusqu'à trouver la catégorie appropriée pour la réponse. _____ (Nom/marque) _____ (Nom/marque)	Où avez-vous obtenu (nom du médicament de CA23, codes L à O)? Insister pour identifier le type de source. Si 'l'avait déjà à la maison', insister pour savoir si la source est connue. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit et enregistrer temporairement X jusqu'à trouver la catégorie appropriée pour la réponse. _____ (Nom de l'endroit)	A combien avez-vous acheté ce médicament Gratuit 0000	Combien de temps après le début de la fièvre(nom) a-t-il/elle commencé à prendre ce médicament ?
Code	ANTI-PALUDIQUES COMBINAISON THERAPEUTIQUE A BASE D'ARTEMISININE (CTA) ARTESUNATE + AMODIAQUINEA ARTEMETHER + LUMEFANTRINE...B SP / FANSIDAR.....C CHLOROQUINED AMODIAQUINE.....E QUININE COMPRIMES.....F QUININE INJECTION/IV.....G ARTESUNATE INJECTION/ IV.....H ARTESUNATE EN SUPPOSITOIRE ..J AUTRE INJECTION/IV.....J AUTRE ANTI-PALUDIQUE (préciser) _____K ANTIBIOTIQUES AMOXICILLIN.....L COTRIMOXAZOLE.....M AUTRES COMPRIMES OU SIROP ANTIBIOTIQUEN AUTRE INJECTION/IV ANTIBIOTIQUEO AUTRE MEDICAMENTS PARACETAMOL/PANADOL/ ACETAMINONPHEN.....R ASPIRINE.....S IBUPROFENT Autre (préciser) _____X	SECTEUR MEDICAL PUBLIC HOPITAL GOUVERNEMENTALA CENTRE DE SANTE GOUVERNEMENTAL..... B POSTE DE SANTE GOUVERNEMENTALC AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRED CLINIQUE MOBILE/STRATEGIE AVANCEE..... E AUTRE MEDICAL PUBLIC (préciser) _____H SECTEUR MEDICAL PRIVE HOPITAL PRIVE / CLINIQUEI MEDECIN PRIVEJ PHARMACIE PRIVEE..... K AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE (non gouvernemental)..... L CLINIQUE MOBILEM AUTRE MEDICAL PRIVE (préciser) _____O AUTRE SOURCE FAMILLE/AMIS..... . P BOUTIQUE/MARCHE/RUE..... .Q PRATICIEN TRADITIONNEL.....R AUTRE Coute en FC.....[] [] [] [] [] [] FC Client mutualiste9999 Refus9997 Ne sait pas	MEME JOUR.....0 JOUR SUIVANT1 2 JOURS APRES LE DEBUT DE LA FEVRE.....2 3 JOURS OU PLUS APRES LE DEBUT DE LA FEVRE3 NSP.....	

SECTION 5 : CONNAISSANCE SUR L'UTILISATION DES MILD

Numéro	Questions	Réponses	Instructions
Q500	Quand faut-il dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides ?	- Tous les jours - Quand il y a la présence des moustiques dans la maison - Pendant la saison sèche uniquement - Pendant la saison de pluie uniquement - Autres à préciser	
Q501	Que faut-il faire avant d'utiliser une moustiquaire imprégnée d'insecticides pour la première fois ?	- Il faut l'exposer sous l'ombre pendant 24 heures - Il faut l'exposer au soleil pendant 24 heures	

		3. Il faut le laver 4. Autres à préciser	
Q502	Quelles précautions doit-on prendre lors de l'installation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides ?	1. On doit s'assurer qu'elle couvre bien l'espace de couchage (lit ou natte) 2. S'assurer qu'il n'y a aucun moustique à l'intérieur 3. Autres à préciser	
Q503	Comment doit-on nettoyer la moustiquaire imprégnée d'insecticides pour son entretien ?	1. Laver avec de l'eau et du savon ordinaire 2. Laver avec de l'eau et du savon en poudre 3. Laver avec de l'eau et du javel 4. Laver avec de l'eau chaude 5. Autres à préciser	

SECTION 6 : DISPONIBILITE DES SITES DE SOINS COMMUNAUTAIRES

Q600. Dans votre communauté, existe-t-il des personnes non prestataires de soins qui soignent les enfants malades?

1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas

Annexe 6. OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES QUALITATIVES

Outils à insérer :

1. Guide d'entretien pour informateurs-clés
2. Guide d'entretiens approfondis
3. Guides de discussion de groupe (Focus group)