

Quais os cuidados que devemos ter após aplicação do Bioestimulador de colágeno.

- * Recomenda-se ao paciente não se maquiar as 24 horas seguintes após a aplicação;
- * Evitar atividades extenuantes nas 24 horas.
- * Em casos que os processos inflamatórios subclínicos perdurem, suspender até melhora total da pele;
- * Evitar exposição ao sol;
- * Não use saunas e banhos muito quentes até recuperação total da pele pós tratamento;
- * Compressas frias podem ser realizadas após a aplicação.
- * Mantenha contato para avaliações de inflamação subclínicas;
- * Em caso de sensibilidade leve, analgésicos podem ser administrados.
- * É de obrigação do paciente informar seu histórico clínico de reações alérgicas a medicamentos;
- * Posteriormente ao tratamento devido injeções por agulhas ou cânulas, equimose e/ou hematomas podem aparecer mediante a lesões/traumas nos tecidos.
- * Pomadas de uso tópica/uso externo podem ser recomendadas;
- * Aconselhamos intervalos de 45 a 60 dias entre uma sessão e outra na utilização de Ácido Poli-L-Láctico (PLLA).
- * Não ultrapassando 4 sessões anuais;
- * Orientamos intervalos de 25 a 30 dias para associação de outros procedimentos de tratamento posteriores físicos ou químico (Laser, Radiofrequência, Peeling);
- * Em casos de procedimentos corporais, é fundamental o cuidado com a higiene e roupas limpas.
- * **ATENÇÃO:** Para os resultados satisfatórios desejados, as massagens vigorosas durante as injeções são de fundamental importância. Já posteriormente ao tratamento (home care/em casa),
- * **ORIENTAMOS 5 MINUTOS DE MASSAGEM EM CADA LOCAL DE APLICAÇÃO, 5 VEZES AO DIA, POR 5 DIAS.**

São Paulo, _____ de _____ de 2026



Maria Geny de Freitas
Enfermeira Esteta
COREN 119649

