

# 数学分析 (甲) II (H)

CXC

## 1 数分 I

**Leibniz 公式**  $f, g \in D(R) \Rightarrow [fg]^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)} g^{(k)}$

**Hölder 不等式**

$$f(x), g(x) \in C[a, b], \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p, q \in R^*: \int_a^b |f(x)g(x)|dx \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left( \int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

**Schwarz 不等式**  $\left[ \int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx$

**基本积分表**

$$\begin{aligned} \int \sec(x)dx &= \ln|\sec(x) + \tan(x)| + C & \int \sqrt{a^2 - x^2}dx &= \frac{1}{2}(x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin(\frac{x}{a})) + C \\ \int \csc(x)dx &= \ln|\csc(x) - \cot(x)| + C & \int \sqrt{x^2 \pm a^2}dx &= \frac{1}{2}(x\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm a^2 \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}|) + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \arcsin(\frac{x}{a}) + C & \int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} &= \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C & \int \frac{dx}{x^2 + a^2} &= \frac{1}{a} \arctan(\frac{x}{a}) + C \end{aligned}$$

**Euler 第一、二、三替换**

$$\begin{aligned} a > 0: \sqrt{ax^2 + bx + c} &= \pm \sqrt{ax} + t & c > 0: \sqrt{ax^2 + bx + c} &= xt + \sqrt{c} \\ ax^2 + bx + c &= a(x - \alpha)(x - \beta): \sqrt{ax^2 + bx + c} &= (x - \alpha)t \end{aligned}$$

**Stirling 公式**  $n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n (n \rightarrow +\infty)$

$$\text{练习} \cdot \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx \quad \int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx = \frac{\pi}{8} \ln 2$$

## 2 级数

**练习** . 求  $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n \cos n\theta (|q| < 1)$

**证明** .  $\sum \sqrt[n]{2} + \frac{1}{\sqrt[n]{2}} - 2$  收敛

### 常见泰勒展开公式

$$(1+x)^x = 1 + x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{5}{6}x^4 + o(x^5) \quad (1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + o(x)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^4) \quad \arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^6) \quad \sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6)$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5) \quad \tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6)$$

练习 . 考查极限的敛散性:  $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(\ln n)^p}$ ,  $\sum_{n=1}^{+\infty} [e - (1 + \frac{1}{n})^n]^p (p > 0)$

证明 . D'Alembert 判别法, Cauchy 判别法, Gauss 判别法

问题 . 已知  $f(x)$  在  $x=0$  处  $(n+k)$  次可微, 且  $f^{(n+i)}(0) = 0 (i = 1, 2, \dots, k-1)$ ,  $f^{(n+k)}(0) \neq 0$ , 若  $f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n (0 < \theta < 1)$ , 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$

证明 . 设  $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$ , 则  $\lambda > 0$  时  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$  收敛

证明 . 设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上二阶可导, 则  $\forall x \in (0,1), \exists \xi \in (0,1) \text{ s.t. } \frac{1}{2}f''(\xi) = \frac{f(0)}{x} - \frac{f(x)}{x(1-x)} + \frac{f(1)}{1-x}$

证明 . 设  $\{a_n\}$  满足  $a_n = \sum_{k=1}^{+\infty} a_{n+k}^2 (n = 0, 1, \dots)$ , 若  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$  收敛则  $a_n \equiv 0$

证明 . 设  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  为收敛的正项函数,  $\{a_n - a_{n+1}\}$  严格单调递减, 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}) = +\infty$

证明 . 设正数  $\{a_n\}$  单调减小, 且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = \rho$ , 则  $\rho < \frac{1}{2}$  时  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  收敛, 则  $\rho > \frac{1}{2}$  时  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  发散。

证明 .  $\{a_n\}$  是正数列,  $s_n = \sum \frac{a_n}{n}$ ,  $r_n = \sum \frac{1}{na_n}$ , 已知  $\sum_{n=1}^{+\infty} s_n$  与  $\sum_{n=1}^{+\infty} r_n$  均存在, 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n \lim_{n \rightarrow +\infty} r_n \geq 1$

证明 . 设正项级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  满足  $\{\sum_{k=1}^n (a_k - a_n)\}$  对  $n$  有界,  $\{a_n\}$  单调递减且趋于 0, 则  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  收敛

证明 . 设数列  $\{a_n\}$  单调递减趋于 0, 且  $b_k = a_k - 2a_{k+1} + a_{k+2} \geq 0$ , 则  $\sum_{k=1}^{+\infty} kb_k = a_1$

证明 . Abel 变换, Abel 引理, Abel 判别法, Dirichlet 判别法

练习 . 求极限  $\lim_{m,n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}$  类似含参变量积分

证明 . 已知级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_n}{n}$  收敛, 其中  $c_n \geq 0$ , 则级数  $\sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_n}{k^2 + n^2}$  收敛

**证明** .  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n}$  收敛

**证明** . 设  $\{\lambda_n\}$  和  $\psi(x)$  均正值非减, 使  $\int_{\lambda_1}^{+\infty} \frac{dt}{t\psi(t)} < +\infty$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda_n}{\psi(\lambda_n)} \left( \frac{1}{\lambda_n} - \frac{1}{\lambda_{n+1}} \right)$  收敛

### Mertens 定理

设级数  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$  绝对收敛到 A, 级数  $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$  收敛到 B, 则它们的柯西乘积必定存在且  $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n$  收敛到 AB

**证明** . 设级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ ,  $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$  和它们的柯西乘积  $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n$  都收敛, 则有  $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n = \left( \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \right) \left( \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \right)$

**证明** . 设  $\{f_n(x)\}$  关于  $x \in (a, b)$  一致收敛,  $\lim_{x \rightarrow a^+} f_n(x)$  存在, 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow a^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$

**证明** . 设  $f(x) \in [-a, a]$ ,  $|f(x)| < |x|$ , 当  $x \neq 0$  时定义  $f_1(x) = f(x)$ ,  $f_{n+1}(x) = f[f_n(x)]$ , 则  $\{f_n(x)\}$  在  $[-a, a]$  一致收敛于 0

**证明** . 设  $\{a_n\}$  正值递减, 则  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \sin nx$  在  $\mathbb{R}$  上一致收敛充要于  $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0$  **Abel 引理**

### 一致收敛的等价定义

$\forall \epsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall x \in D, |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$

Cauchy 准则:  $\forall \epsilon > 0, \exists N, \forall m > n > N, \forall x \in D, |f_m(x) - f_n(x)| < \epsilon$

确界极限:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$

点列极限:  $\forall \{x_n\} \subseteq D, \lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = 0$

**证明** . 设  $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$ , 令  $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f(x + \frac{k}{n})$ , 则  $\{f_n\}$  在任意有界闭区间内一致收敛

**定理** . Abel 判别法: 函数项级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n(x)b_n(x) (x \in D)$  一致收敛的充分条件:

Dirichlet 判别法:  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n(x)$  关于  $x$  一致收敛,  $b_n(x)$  关于  $n$  单调且关于  $x$  一致有界

$\sum_{k=1}^n a_k(x)$  关于  $x$  一致有界,  $b_n(x)$  关于  $n$  单调且关于  $x$  一致趋向于 0

### \*Weierstrass 第一逼近定理

设  $f(x) \in C[a, b]$ , 则  $\forall \epsilon > 0, \exists$  多项式  $p(x)$  使得  $|f(x) - p(x)| < \epsilon, \forall x \in [a, b]$ , 且  $p(a) = f(a), p(b) = f(b)$   
或者等价地叙述为: 存在多项式函数列  $\{p_n(x)\}$  在区间  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(x)$

**证明** . 设函数列  $\{f_n(x)\}$  在  $(a, x_0) \cup (x_0, b)$  内一致收敛于  $f(x)$ , 且  $\forall n \in \mathbb{N}, \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n \in \mathbb{R}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$  与  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  都存在且相等

**证明** . 连续性定理, 逐项积分定理, 逐项求导定理, Dini 定理

**证明** .  $f_n(x)$  在  $[a,b]$  上连续可微, 则在  $[a,b]$  上  $\{f_n(x)\}$  点态收敛  $\Rightarrow \{f_n(x)\}$  一致收敛

**练习** . 计算  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} dx$ ,  $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx$ , 证明  $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}$  **级数转化**

**练习** . 求极限  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \sin(2\pi n!e)$ ; 设  $f(x) = (x \sin x)^2$ , 求  $f^{(2022)}(0)$

**问题** . 设周期为  $2\pi$  的函数  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上的 Fourier 系数为  $a_n$  和  $b_n$ ,

证明  $\int_{-\pi}^{\pi} [\int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x-t)dt] \cos(nx)dx$  积分顺序可交换, 并计算  $F(x)$  的 Fourier 系数  $\tilde{a}_n$  和  $\tilde{b}_n$

**定理** . 定义在任意长度为  $2T$  区间  $[a, a+2T]$  上的  $f(x)$  的 Fourier 级数

$$a_n = \frac{1}{T} \int_a^{a+2T} f(x) \cos \frac{\pi}{T} nx, \quad b_n = \frac{1}{T} \int_a^{a+2T} f(x) \sin \frac{\pi}{T} nx, \quad f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos \frac{\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{\pi}{T} nx$$

**Riemann 引理**

设函数  $\psi(x)$  在  $[a,b]$  上可积或绝对可积, 则成立  $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi(x) \sin p x dx = \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi(x) \cos p x dx = 0$

**Riemann 局部化原理**

$f(x)$  的 Fourier 级数在  $x_0$  收敛于  $A \Leftrightarrow \exists \delta > 0$  s.t.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\delta \frac{f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2A}{t} \sin(n+\frac{1}{2})t dt = 0$

**Dini 收敛定理**

假设  $f(x)$  以  $2\pi$  为周期, 且  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上绝对可积, 则  $\forall x_0, \exists A, \exists \delta > 0$  s.t.  $\int_0^\delta \frac{|f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2A|}{t} dt < +\infty$ , 那么  $f(x)$  的 Fourier 级数在  $x_0$  收敛于  $A$

**另一种表述**

假设  $f(x)$  以  $2\pi$  为周期, 且  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上绝对可积, 则  $\forall x_0, \exists \delta > 0$  s.t. 存在  $f(x_0+), f(x_0-)$ , 且  $\int_0^\delta \frac{f(x_0 \pm t) - f(x_0 \pm)}{t} dt$  绝对收敛, 则  $f(x)$  的 Fourier 级数在  $x_0$  收敛于  $\frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2}$

**Dirichlet 引理** 设函数  $\psi(x)$  在  $[0, \delta]$  上单调, 或分段单调有界, 则成立  $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^\delta \frac{\psi(x) - \psi(0+)}{x} \sin p x dx = 0$ , 或等价形式  $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^\delta \psi(x) \frac{\sin p x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \psi(0+)$

**Fourier 级数收敛的 Dirichlet 判别法**

设函数  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上可积或绝对可积, 且在  $x_0$  某邻域  $O(x_0, \delta)$  上分段单调有界, 或在  $x_0$  处满足指数为  $\alpha \in (0, 1]$  的 Hölder 条件, 则  $f(x)$  的 Fourier 级数在点  $x_0$  处收敛于  $\frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2}$ , 且  $f(x)$  的 Fourier 展开的部分和函数列  $S_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$

**推论** . 若  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上可积或绝对可积, 在点  $x_0$  处两个单侧导数  $f'_-(x), f'_+(x)$  都存在, 或更进一步, 只要两个拟单侧导数  $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 \pm h) - f(x_0 \pm)}{h}$  存在, 则  $f(x)$  的 Fourier 级数在点  $x_0$  处收敛于  $\frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2}$

### \*Weierstrass 第二逼近定理

设  $f(x)$  是以  $2\pi$  为周期的连续函数, 则存在三角多项式  $T_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx)$ ,  $\forall n \in N^*$ , 使得  $\forall \epsilon > 0, \exists n > N, \forall x \in R: |f(x) - T_n(x)| < \epsilon$ , 即函数列  $T_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$

**定理** . Fourier 级数的一致收敛性、逐项积分定理、逐项微分定理、平方逼近性质、Bessel 不等式、Parseval 恒等式、平方收敛性质

## 3 多元函数

**辉爷判别法** 分母不保号则一般地重极限不存在

### Heine 定理

$\lim_{(x \rightarrow x_0) \in E} f(x) = A$  充要于任意  $E$  中收敛于  $x_0$  但是各项都异于  $x_0$  的点列  $\{x_n\}$  有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A$

### Brouwer 定理

设  $D \subset R^2$  是一区域, 向量值函数  $F: D \rightarrow R^2$  在  $D$  上连续、单射, 则  $F(D)$  是一区域, 且  $F(D)$  上的反函数  $F^{-1}$  是连续函数

**问题** . 设  $f: R^n \rightarrow R^m$  为连续映射, 证明: 对于  $R^n$  中的任意子集  $A$ , 成立  $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$ , 并举例说明  $f(\bar{A})$  能够是  $\overline{f(A)}$  的真子集

**证明** . 设函数  $f$  在圆周上有定义并且连续, 证明可以找到一条直径的两个端点  $a$  与  $b$ , 使得  $f(a) = f(b)$

**证明** . 设  $f(x, y)$  满足 (i) :  $\forall y \neq b, \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = \psi(y)$  (ii)  $\exists \eta > 0$  s.t.  $\lim_{y \rightarrow b} f(x, y)$  关于  $x \in E, E = \{x: 0 < |x - a| < \eta\}$  存在一致极限  $\varphi(x)$ , 证明  $\lim_{x \rightarrow a} \lim_{y \rightarrow b} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y)$  夹逼

**证明** . 设有界点列  $z_n = (x_n, y_n)$  满足  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|z_n\| = l, \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty}} \|z_n\| = L, \lim_{n \rightarrow +\infty} \|z_{n+1} - z_n\| = 0$ , 证明  $\forall \mu \in (l, L)$ , 圆周  $x^2 + y^2 = \mu^2$  上至少有  $\{z_n\}$  的一个聚点

**证明** . 设  $f(x, y)$  在某点领域内有连续偏导数  $f'_y(x, y)$ , 且  $f'_x(x, y)$  存在, 则  $f(x, y)$  在该点可微

### 函数分析性质的相互关系

重极限存在  $\xleftrightarrow{X}$  累次极限存在, 累次极限存在  $\xleftrightarrow{X}$  方向极限存在, 但重极限存在  $\longrightarrow$  方向极限存在  
偏导数连续  $\longrightarrow$  可微, 可微  $\longrightarrow$  连续, 可微  $\longrightarrow$  偏导数存在, 可微  $\longrightarrow$  方向导数存在  
但连续  $\xleftrightarrow{X}$  偏导数存在, 连续  $\xleftrightarrow{X}$  方向导数存在, 偏导数  $\xleftrightarrow{X}$  方向导数存在, 可微  $\xleftrightarrow{X}$  偏导数有界

**证明** . 若存在非零实数  $a, b, c$ , 使得  $f(x) \in C^1(R^3)$  满足  $\frac{1}{a} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{b} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial z}$ , 则  $\exists g(x) \in C^1(R)$ , 使得  $f(x, y, z) = g(ax + by + cz)$

**证明** . 设  $z = f(x, y)$  在全平面上有连续偏导数, 且满足  $xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 0$ , 则  $f(x, y)$  为常数

**Hadamard 公式** 设  $n$  元函数  $f$  在  $R^n$  上具有连续偏导数, 则  $\forall \vec{x}, \vec{y} \in R^n$ , 成立:

$$f(\vec{y}) - f(\vec{x}) = \sum_{i=1}^n \int_0^1 (y_i - x_i) f'_i(\vec{x} + t(\vec{y} - \vec{x})) dt$$

**证明** . 设  $f(x, y, z)$  满足  $\forall t, x, y, z: f(tx, ty, tz) = t^q f(x, y, z)$ ,  $z = \psi(x, y)$  是由  $f(x, y, z) = 0$  唯一确定的隐函数, 则  $\psi(x, y)$  是一次齐次函数, 即  $\forall t, x, y: \psi(tx, ty) = t\psi(x, y)$

**定理** . 一元隐函数存在性定理

**定理** . 矩阵的代数余子式  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ , 伴随矩阵  $A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$  是代数余子式

对应矩阵的转置; 无论矩阵  $A$  可逆与否, 成立  $AA^* = A^*A = |A|E$ , 若  $A$  可逆, 则  $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$

**证明** . 设二元函数  $f(x, y): R^2 \rightarrow R$  具有连续偏导数, 则存在一对一的连续的向量值函数  $\vec{G}(t): R \rightarrow R^2$ , 使得  $f \circ \vec{G} \equiv \text{常数}$  **隐函数定理**

**空间曲线的法向量**

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \Rightarrow \vec{n} = \{x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\}$$

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{n} = \left\{ \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}(P_0), \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}(P_0), \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}(P_0) \right\} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ F'_x & F'_y & F'_z \\ G'_x & G'_y & G'_z \end{vmatrix} (P_0)$$

**空间曲面的法向量**

$$z = f(x, y) \Rightarrow \vec{n} = \{f_x(P_0), f_y(P_0), -1\}$$

$$F(x, y, z) = 0 \Rightarrow \vec{n} = \{F_x(P_0), F_y(P_0), F_z(P_0)\}$$

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} \Rightarrow \vec{n} = \left\{ \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}(P_0), \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}(P_0), \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(P_0) \right\} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} (P_0)$$

**证明** . 任一点法平面过定点的曲线必为球面曲线

**证明** . 设  $u(x, y)$  在  $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$  上连续, 且在  $\{x^2 + y^2 < 1\}$  上满足  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u$ , 且在  $\{x^2 + y^2 = 1\}$

上  $u(x, y) > 0$ , 则  $\forall (x, y) \in \{x^2 + y^2 \leq 1\}, u(x, y) \geq 0$   $\text{trace}(H) = \sum_{i=1}^{\dim(H)} \lambda_i$

**问题** . 设  $f(x, y)$  在  $P_0(x_0, y_0)$  处有连续的各个三阶偏导数, 且满足  $\text{grad}(f(P_0)) = 0$ ,  $H_f(P_0)$  半定且存在单位向量  $u = (a, b)^T$  使得  $H_f(P_0)u = 0$ , 同时  $(a\frac{\partial}{\partial x} + b\frac{\partial}{\partial y})^3 f(P_0) \neq 0$ , 则  $P_0$  不是  $f$  的极值点

**问题** . 求  $a, b$  之值, 使椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  包含圆  $(x-1)^2 + y^2 = 1$ , 且面积最小

## 4 重积分

**证明** . 多重积分可积 (定义), 积分中值定理, 累次积分定理

**证明** . 设  $f(x) \in C[a, b]$ , 则  $\left[ \int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b [f(x)]^2 dx$ ,  $\iint_{[a,b] \times [a,b]} e^{f(x)-f(y)} dx dy \geq (b-a)^2$

**重积分变量代换公式**  $\int_{T(\Omega)} f(y_1, \dots, y_n) dy_1 \dots dy_n = \int_{\Omega} f(y_1(\vec{x}), \dots, y_n(\vec{x})) \left| \frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \right| dx_1 \dots dx_n$

**定理** . 第一、二类线、面积分存在性的条件 (载体光滑), 三大公式适用条件 (+ 偏导连续)

**线面积分计算公式、三大公式**

第一类曲线积分:  $\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$

极坐标下:  $\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta$

第二类曲线积分:  $\int_L P dx + Q dy + R dz = \int_a^b [P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma] ds = \int_a^b [P x'(t) + Q y'(t) + R z'(t)] dt$

Gauss 系数:  $S = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv$ ,  $E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$ ,  $F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$ ,  $G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$

曲面面积:  $S = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy = \iint_D \frac{\|\text{grad} H\|}{|H_z|} dx dy$

第一类曲面积分:  $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv$

第二类曲面积分:  $\iint_{\Sigma} [P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma] dS = \pm \iint_D [P \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + R \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}] du dv$

Green 公式:  $\int_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

Gauss 公式:  $\iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{\partial \Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$   
 $= \iint_D P \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + R \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv$

Stokes 公式:  $\int_a^b P x'(t) + Q y'(t) + R z'(t) dt = \int_{\partial \Sigma} P dx + Q dy + R dz$   
 $= \iint_{\Sigma} \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$   
 $= \iint_{\Sigma} \left[ \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS$   
 $= \pm \iint_D \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv$

**练习** . 计算下列积分:

$$\int_0^1 \frac{x^3 - x}{\ln x} dx; \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy; \iiint_{\Omega} \cos(x+y+z) dV (\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1) \quad \text{正交线性变换}$$

$$I(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta) d\theta, \quad 0 < x < +\infty; \quad I(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1 + \alpha \cos x}{1 - \alpha \cos x}\right) \cdot \frac{dx}{\cos x} \quad \text{嵌入法}$$

$$\int_0^1 dx \int_0^x \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2}\right) dy \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy$$

$$\oint_C \frac{xdy - ydx}{ax^2 + by^2}, \quad ab > 0, \quad C: x^2 + y^2 = 1 (\text{逆时针}); \quad \oint_C \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}, \quad C: |x| + |y| = 1 (\text{逆时针});$$

$$\oint_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}, \quad (1) \quad C: x^2 + y^2 = a^2 (\text{逆时针}) \quad (2) \quad C: |x| + |y| = 1 (\text{逆时针})$$

**问题** . 设函数  $f(x, y)$  在  $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$  上有二阶连续偏导, 且满足  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)^2$ , 求

$$I = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy \quad \text{微分算子变换}$$

**问题** .  $f(x, y)$  在  $[0, 1] \times [0, 1]$  上有连续的二阶偏导,  $f(x, 1) = f(1, y) \equiv 0$ , 求证:

$$\iint_D xy f''_{xy}(xy) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy$$

**\* 调和函数** 设  $D$  为平面区域,  $u(x, y) \in C^2(D)$ , 如果  $u$  在  $D$  上满足  $\Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ , 则称  $u$  为调和函数;  $u(x, y)$  为  $D$  上调和函数的充要条件为  $\forall P(x_0, y_0) \in D, \forall 0 < r < \text{dist}(P_0, \partial D): u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta$

**简记 Stokes 公式** 利用行列式记号, 可以将 Stokes 公式  $\int_{\partial \Sigma} P dx + Q dy + R dz$  写成:

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} & \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} & \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} du dv$$

**问题** . 设  $D$  是平面  $R^2$  上的有界闭区域,  $u(x, y)$  在  $D$  上连续,  $u|_{\partial D} = 0$ , 且在  $D$  内每点处存在偏导数, 且满足  $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = u$ , 证明  $\forall (x, y) \in D$  有  $u(x, y) = 0$

**练习** .  $\int_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$ , 其中  $L$  是平面  $x + y + z = 2$  与柱面  $|x| + |y| = 1$  的交线, 从  $Z$  轴正向看去, 方向是逆时针

**问题** . 设  $f$  是单变量函数, 且连续可导, 令  $F(t) = \iint_{[0,t]^2} f(xy) dx dy$ , 求证:

$$(1) F'(t) = \frac{2}{t} \left( F(t) + \iint_{[0,t]^2} xy f'(xy) dx dy \right) \quad (2) F'(t) = \frac{2}{t} \int_0^{t^2} f(s) ds$$



**问题** . 设函数  $f, g$  都是  $[a, b]$  上递增的连续函数, 且都不是常值函数, 证明:

$$(b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx > \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx \quad \text{射影变换}$$

**问题** . 证明函数  $f(x, y) = 1 + \int_0^x \int_0^y f(u, v)dudv$  至多有一个在  $[0, 1]^2$  上连续的解

**问题** . 设  $f$  在区间  $[0, 1]$  上具有连续的导数, 记  $\epsilon_n = \int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\frac{i}{n})$ , 求  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n\epsilon_n$

**练习** . 计算:  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 x)dx$  ( $a > 1$ )

**问题** . 设函数  $f(x)$  在任意有界区间上可积, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$ , 证明  $\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} \sigma \int_0^{+\infty} e^{-\sigma x} f(x)dx = \alpha$

**问题** . 设  $f$  在  $\mathbb{R}$  上连续有界, 令  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{yf(t)}{(x-t)^2 + y^2} dt$  ( $y > 0$ ), 证明  $\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(t)}{(x-t)^2 + y^2} dt = f(x)$

**问题** . 设  $f$  是区间  $[0, A]$  上的单调函数, 证明  $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^A f(x) \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{\pi}{2} f(0+)$