

Мультимоделирование как универсальный способ описания выборки общего вида

Качанов В. В., Адуенко А. А., Стрижов В. В.

kachanov.vv@phystech.edu

В данной работе рассматривается мультимоделирование как универсальный способ описания выборки общего вида. В работу входит построение метода инкрементального уточнения структуры мультимодели при появлении новых объектов. Для достижения поставленных целей предлагается использовать байесовский подход для выбора моделей на основании обоснованности. Новизна данной работы заключается в предложении метода построения оптимальной схемы обновления структуры мультимодели при появлении новых объектов. Достоверность результатов подтверждена экспериментальной проверкой полученных методов на реальных данных из репозитория UCI.

Введение

Решается задача инкрементального уточнения структуры мультимодели.

Постановка задачи

Пусть имеется K моделей, $k \in [1, K]$, $\{\bar{x}_i, y_i\}_{i=1}^m$, - выборка

$$y_i = \bar{w}_k^T \bar{x}_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \beta^{-1})$$

Априорное распределение на $\bar{\pi}$: $p(\bar{\pi}|\mu) = Dir(\bar{\pi}|\mu)$ Априорное распределение моделей: $p(\bar{w}_k) = \mathcal{N}(\bar{w}_k|0, A_k)$

Совместное правдоподобие:

$$p(\bar{y}, \bar{W}, \bar{\pi}|X, A, \beta, \mu) = Dir(\bar{\pi}|\mu) \prod_{k=1}^K \mathcal{N}(\bar{w}_k|0, A_k) \prod_{i=1}^m \sum_{j=1}^K \pi_k \mathcal{N}(y_i|\bar{w}_k^T \bar{x}_i \bar{w}_k, \beta^{-1})$$

Апостериорное распределение пропорционально:

$$p(\bar{W}, \bar{\pi}|X, \bar{y}, A, \beta, \mu) \sim \prod_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^K \pi_k \exp \left(-\frac{\beta}{2} (y_i - \bar{w}_j^T \bar{x}_i)^2 \right) \right) * \\ * \prod_{k=1}^K \pi_k^{\mu-1} \exp(-0.5 \bar{w}_k^T A_k \bar{w}_k)$$

Для решения задачи воспользуемся вариационным ЕМ-алгоритмом со скрытой переменной $Z = ||z_{ik}||$, тогда совместное правдоподобие перепишется в виде

$$p(\bar{y}, \bar{W}, \bar{\pi}, Z|X, A, \beta, \mu) = Dir(\bar{\pi}|\mu) \prod_{k=1}^K \mathcal{N}(\bar{w}_k|0, A_k) \prod_{i=1}^m * \\ * \left(\prod_{j=1}^K \pi_j \mathcal{N}(y_i|\bar{w}_j^T \bar{x}_i \bar{w}_j, \beta^{-1}) \right)^{z_{ij}}$$

Воспользовавшись вариационным приближением: $q(\bar{\pi}, Z, W) = q(\bar{\pi}) q(Z) q(W)$

$$\begin{aligned}
\log q(\bar{\pi}) &= \sum_{k=1}^K \log \pi_k \left(\sum_{i=1}^m \mathbb{E} z_{ik} + \mu - 1 \right) \\
&\Rightarrow q(\bar{\pi}) = Dir(\bar{\pi} | \mu + \bar{\alpha}), \quad \alpha_k = \sum_{i=1}^m z_{ik} \\
\log q(W) &\sim \sum_{i=1}^m -\frac{1}{2} \bar{w}_k^T A_k \bar{w}_k + \sum_{i=1}^m \sum_{l=1}^K \mathbb{E} z_{il} \frac{\beta}{2} (\bar{w}_l^T x_i x_i^T A_k \bar{w}_l - 2 y_i \bar{w}_l^T x_i) \\
q(\bar{w}_k) &= \mathcal{N}(\bar{w}_k | m_k, \Sigma_k^{-1}) \\
\log q(Z) &\sim \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^m z_{ik} \left(\mathbb{E} \log \pi_k - \frac{\beta}{2} (y_i - \bar{w}_k^T \bar{x}_i)^2 \right) \Rightarrow \\
&\Rightarrow p(z_{ik} = 1) = C \exp \left(\mathbb{E} \log \pi_k - \frac{\beta}{2} (y_i - \bar{w}_k^T \bar{x}_i)^2 \right) \\
\mathbb{E}_q \log p(\bar{y}, \bar{p}, W, Z | X, A, \beta, \mu) &= \mathcal{F}(A, \beta) \propto \\
\sum_{k=1}^K ((\mu + 2\alpha_k - 1) \mathbb{E} \log \pi_k - \frac{1}{2} \mathbb{E} \bar{w}_k^T A_k^{-1} \bar{w}_k + \frac{1}{2} \log \det A_k^{-1} + \\
&\sum_{i=1}^m \mathbb{E} z_{ik} (\log \beta - \frac{\beta}{2} \mathbb{E} (y_i - \bar{w}_k^T \bar{x}_i)^2)) \\
\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial A_k^{-1}} = 0 &\Rightarrow \tilde{A}_k = Diag(\mathbb{E} (w_k^i)^2) \\
\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \beta} = 0 &\Rightarrow \tilde{\beta} = \frac{\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^m \frac{1}{2} \mathbb{E} z_{ik} (y_i - \bar{w}_k^T \bar{x}_i)^2}{\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^m \mathbb{E} z_{ik}}
\end{aligned}$$

Литература

- [1] Адуенко А. А. Выбор мультимodelей в задачах классификации, 2017.
- [2] Bishop C.M. Pattern recognition and machine learning Berlin: Springer, 2006.
- [3] MacKay D.J.C The evidence framework applied to classification networks *Neural computation* 4. 5, 1992. Pp. 720–736.
- [4] Gelman A. Bayesian data analysis Florida: Chapman and Hall/CRC, 2013.
- [5] Motrenko A., Strijov V., Weber G.-W. Sample size determination for logistic regression. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 2014. Vol. 255, Pp. 743–752.