

«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (национальный  
исследовательский университет)»  
Физтех-школа прикладной математики и информатики  
Кафедра «Интеллектуальные системы»

Курдюкова Антонина Дмитриевна

## **Снижение размерности фазового пространства в задачах канонического корреляционного анализа**

03.03.01 – Прикладные математика и физика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

**Научный руководитель:**  
д.ф.-м.н. Стрижов Вадим Викторович

Москва  
2022

# Содержание

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>4</b>
1.1	Введение . . . . .	4
1.2	Обзор литературы . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Теоретическая часть</b>	<b>5</b>
2.1	Метод сходящихся перекрестных отображений . . . . .	5
2.2	Метод проекций на латентные структуры . . . . .	5
2.3	Постановка задачи . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Результаты экспериментов</b>	<b>7</b>
3.1	Вычислительный эксперимент . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Заключение</b>	<b>9</b>

## Аннотация

Данная работа посвящена методам канонического корреляционного анализа. Показано, что метод канонического корреляционного анализа является частным случаем метода сходящихся перекрестных отображений Сугихары. А вид прогностических моделей, соответствующих методу, представим в виде условия принадлежности двух аттракторов, восстанавливаемых в исходном и целевом фазовых пространствах, к общей динамической системе. В работе рассмотрены метод PLS-CCA, метод Яушева-Исаченко с автоэнкодерами, NNPLS, seq2seq, Neural ODE. Сформулирован вариант теоремы о вложениях Такенса, пригодный для проверки того, что метод канонического корреляционного анализа или другой метод прогноза удовлетворяет условиям Сугихары. Решается прикладная задача в теоретической постановке. Рассматривается видеоряд ходьбы человека с акселерометром на руке.

**Ключевые слова:** *снижение размерности, фазовое пространство, аттрактор, ССМ, теорема Такенса о вложениях*

# 1 Введение

## 1.1 Введение

В работе исследуется связь между методами корреляционного анализа и методом сходящихся перекрестных отображений (convergent cross mapping, CCM) [1, 2]. Для CCM нет способа выбора собственного подпространства, в котором аппроксимируется многообразие компакта и работает прогностическая модель. На текущий момент выбор собственного пространства осуществляется перебором по главным компонентам, например в [3]. Работа Исаченко [...] по PLS дает возможность перенести методы выбора подпространства с PLS на CCM.

**Определение 1** *Динамическая система – множество элементов, для которого задана функциональная зависимость между временем и положением в фазовом пространстве каждого элемента системы*

Динамическая система представляет собой такую математическую модель некоего объекта, процесса или явления, в которой пренебрегают «флуктуациями и всеми другими статистическими явлениями».

**Определение 2** *Фазовое пространство динамической системы – совокупность всех допустимых состояний динамической системы.*

**Определение 3** *Траектория динамической системы в фазовом пространстве – последовательность состояний*

**Определение 4** *Аттрактор – компактное подмножество фазового пространства динамической системы, все траектории из некоторой окрестности которого стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности.*

**Определение 5** *Многообразие – хаусдорфово топологическое пространство со счётной базой, каждая точка которого обладает окрестностью, гомеоморфной евклидову пространству  $\mathbb{R}^n$*

## 1.2 Обзор литературы

# 2 Теоретическая часть

## 2.1 Метод сходящихся перекрестных отображений

Метод сходящихся перекрестных отображений (convergent cross mapping, СММ) используется для исследования временных рядов на наличие причинно-следственной связи. Корреляция не подразумевает причинно-следственную связь между рядами. Метод основан на теореме Такенса о вложениях. В общем случае многообразие аттрактора динамической системы может быть восстановлено по одной наблюдаемой  $\mathbf{X}$ .

Согласно методу временной ряд  $\mathbf{s}_1 = \{s_i^1\}_{i=1}^{N_1}$  может быть восстановлен по ряду  $\mathbf{s}_2 = \{s_i^2\}_{i=1}^{N_2}$  только если временной ряд  $\mathbf{s}_2$  связан с рядом  $\mathbf{s}_1$ . Временные ряды считаются связанными, если окрестность фазовой траектории  $\mathbf{x}$  временного ряда  $\mathbf{s}_1$  взаимно однозначно отображается в окрестность фазовой траектории  $\mathbf{y}$  ряда  $\mathbf{s}_2$ . Иными словами, аттракторы  $M_{\mathbf{X}}$  и  $M_{\mathbf{Y}}$  наблюдаемых  $\mathbf{X}$  и  $\mathbf{Y}$  диффеоморфны, если  $\mathbf{X}$  и  $\mathbf{Y}$  принадлежат одной динамической системе.

## 2.2 Метод проекций на латентные структуры

Метод проекций на латентные структуры PLS [4, 5] используют для нахождения фундаментальных зависимостей между двумя матрицами  $\mathbf{X}$  и  $\mathbf{Y}$ . Отбираются наиболее значимые признаки. Новые признаки являются их линейными комбинациями. Осуществляется переход в фазовое пространство меньшей размерности. Метод PLS позволяет найти фазовое подпространство, в котором наблюдается связь между главными компонентами исходных временных рядов. Это позволяет исследовать наличие связи между временными рядами.

Пусть  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$  и  $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{m \times r}$  — матрицы двух фазовых пространств, построенных по временному ряду  $\mathbf{s}_1$  и  $\mathbf{s}_2$  соответственно. Требуется построить прогноз временного ряда  $\mathbf{s}_2$  с учетом связи с временным рядом  $\mathbf{s}_1$ . Предполагается линейная зависимость между строками  $\mathbf{X}$  и  $\mathbf{Y}$ :

$$\mathbf{Y}_i = \mathbf{X}_i \cdot \boldsymbol{\Theta} + \varepsilon \quad \mathbf{Y}_i \in \mathbb{R}^r, \mathbf{Y}_i \in \mathbb{R}^n, i = 1, \dots, m, \quad (1)$$

где  $\boldsymbol{\Theta}$  — матрица весов линейной зависимости,  $\varepsilon$  — вектор ошибок.

Ошибка вычисляется по формуле:

$$S(\boldsymbol{\Theta}, \mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \|\mathbf{Y} - \mathbf{X} \cdot \boldsymbol{\Theta}\|_2^2 \quad (2)$$

Алгоритм PLS находит матрицы  $\mathbf{T}, \mathbf{P}, \mathbf{Q}$ , с помощью которых осуществляется переход в латентное пространство согласно формулам:

$$\mathbf{X} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{P}^T + \mathbf{F} \quad (3)$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{Q}^T + \mathbf{E} \quad (4)$$

Матрица  $\mathbf{T}$  наилучшим образом описывает  $\mathbf{X}$  и  $\mathbf{Y}$ . Ее столбцы ортогональны. Матрицами  $\mathbf{P}$  и  $\mathbf{Q}$  определяется переход из латентного пространства в исходное. Матрицы  $\mathbf{X}$  и  $\mathbf{Y}$  — матрицы невязок.

Алгоритм PLS также позволяет определить матрицу  $\mathbf{W}$ , с помощью которой рассчитывается матрица весов  $\mathbf{\Theta}$ :

$$\mathbf{\Theta} = \mathbf{W}(\mathbf{P}^T \mathbf{W})^{-1} \mathbf{Q}^T \quad (5)$$

## 2.3 Постановка задачи

Теорема 1

Лемма 2

Доказательство.

■

### 3 Результаты экспериментов

### 3.1 Вычислительный эксперимент



## 4 Заключение

### Список литературы

- [1] George Sugihara and Robert M May. Nonlinear forecasting as a way of distinguishing chaos from measurement error in time series. *Nature*, 344(6268):734–741, 1990.
- [2] George Sugihara, Robert May, Hao Ye, Chih-hao Hsieh, Ethan Deyle, Michael Fogarty, and Stephan Munch. Detecting causality in complex ecosystems. *science*, 338(6106):496–500, 2012.
- [3] Карина Равилевна Усманова and Вадим Викторович Стрижов. Модели обнаружения зависимостей во временных рядах в задачах построения прогностических моделей. *Системы и средства информатики*, 29(2):12–30, 2019.
- [4] Paul Geladi. Notes on the history and nature of partial least squares (pls) modelling. *Journal of Chemometrics*, 2(4):231–246, 1988.
- [5] Agnar Höskuldsson. Pls regression methods. *Journal of chemometrics*, 2(3):211–228, 1988.