

计算方法作业 #11

陈文轩

KFRC

更新: May 25, 2025

1 题目

1. (5pts) 试利用 Gram-Schmidt 正交化算法, 求 $[0, 1]$ 上的三次多项式关于内积

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) g(x) dx$$

的一组正交基。

2. (5pts) 对下列数据用最小二乘法求形如 $\varphi(x) = \frac{x}{a+bx}$ 的拟合函数。

x_i	2.10	2.50	2.80	3.20
y_i	0.6087	0.6849	0.7368	0.8111

3. (5pts) 试确定常数 $c_0, c_1 \in \mathbb{R}$ 使得 $\int_0^1 |e^x - c_0 - c_1 x|^2 dx$ 达到极小, 并求出极小值。
4. (5pts) 求函数 $f(x) = \cos x$ 在区间 $[0, 1]$ 上关于权函数 $\rho(x) = \sqrt{x}$ 的三次最佳平方逼近多项式。

Deadline: 2025.5.18

2 解答

1. 一组基为 $\{v_i\}_{i=1}^4 = \{1, x, x^2, x^3\}$, $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $u_2 = v_2 - \frac{\langle x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \cdot 1 = x - \frac{3}{5}$,
- $$\|u_2\|^2 = \frac{8}{175}, e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{\sqrt{14}}{4}(5x-3), u_3 = v_3 - \frac{\langle x^2, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \cdot 1 - \frac{\langle x^2, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} \cdot v_2 = x^2 - \frac{10}{9}x + \frac{5}{21},$$
- $$\|u_3\|^2 = \frac{128}{43659}, e_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{\sqrt{11}}{16}(63x^2 - 70x + 15),$$
- $$u_4 = v_4 - \frac{\langle x^3, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \cdot 1 - \frac{\langle x^3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} \cdot v_2 - \frac{\langle x^3, v_3 \rangle}{\langle v_3, v_3 \rangle} \cdot v_3 = x^3 - \frac{21}{13}x^2 + \frac{105}{143}x - \frac{35}{429},$$

$$\|u_4\|^2 = \frac{512}{2760615}, e_4 = \frac{u_4}{\|u_4\|} = \frac{\sqrt{30}}{32}(429x^3 - 693x^2 + 315x - 35), \{e_i\}_{i=1}^4 \text{ 即为所求。}$$

数值结果如下: $e_1 = 1.22474, e_2 = 4.67707x - 2.80624,$

$$e_3 = 4.39726 - 20.5206x + 18.4685x^2, e_4 = -5.99072 + 53.9164x - 118.616x^2 + 73.4291x^3$$

可以在 Mathematica 利用以下代码验证:

```
1 ip[f_, g_] := Integrate[Sqrt[x]*f*g, {x, 0, 1}];
2 basis = {1, x, x^2, x^3};
3 orthonormalBasis = Orthogonalize[basis, ip];
4 Simplify /@ orthonormalBasis
```

2. 令 $u_i = \frac{1}{x_i}, v_i = \frac{1}{y_i}$, 问题化为 $v_i = au_i + b$, 此时数据如下:

u_i	0.4762	0.4000	0.3571	0.3125
v_i	1.6420	1.4603	1.3571	1.2333

拟合得到 $a \approx 2.4867, b \approx 0.4623$ 。

$$\begin{aligned} 3. \int_0^1 |e^x - c_0 - c_1 x|^2 dx &= \int_0^1 (e^x - c_0 - c_1 x)^2 dx \\ &= \int_0^1 (c_0^2 - 2c_0 e^x + e^{2x} + 2c_0 c_1 x - 2c_1 x e^x + c_1^2 x^2) dx \\ &= c_0^2 + (2 - 2e)c_0 + c_0 c_1 - \frac{1}{2} - 2c_1 + \frac{1}{3}c_1^2 + \frac{e^2}{2} := f(c_0, c_1) \end{aligned}$$

$$\nabla f = \left(2c_0 + 2 - 2e + c_1, c_0 + \frac{2}{3}c_1 - 2 \right)^\top = 0 \Rightarrow c_0 = 4e - 10, c_1 = 18 - 6e$$

此时 Hessian 矩阵为 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2/3 \end{bmatrix}$ 正定, 故是极小值点,

$$\text{计算得到极小值为 } -\frac{7}{2}e^2 + 20e - \frac{57}{2}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{ 沿用 1 中记号, } f(x) &= \sum_{i=1}^4 \langle e_i(x), \cos x \rangle e_i(x) = \sum_{i=1}^4 \int_0^1 \sqrt{x} e_i(x) \cos(x) dx \cdot e_i(x) \\ &\approx 0.999046 + 0.0141787x - 0.556365x^2 + 0.0830802x^3 \end{aligned}$$