



计算方法作业答案

作者：陈文轩

组织：KFRC

时间：May 27, 2025

版本：1.0.0.1145



目录

第一章 第一次作业	1
第二章 第二次作业	2
第三章 第三次作业	4
第四章 第四次作业	6
第五章 第五次作业	8
第六章 第六次作业	11
第七章 第七次作业	12
第八章 第八次作业	14
第九章 第九次作业	16
第十章 第十次作业	18

第一章 第一次作业

作业 1.1 (10pts)

对 $a > 0, n \in \mathbb{N}_+$, x 很靠近 0, 给出 $f(x)$ 的可靠数值计算方法, 使其尽量达到更好的精度: $f(x) = (a+x)^n - a^n$ 。



解
$$f(x) = (a+x)^n - a^n = \sum_{k=1}^n C_n^k x^k a^{n-k} = (\cdots ((x + C_n^1 a)x + C_n^2 a^2)x \cdots + C_n^{n-1} a^{n-1})x$$

作业 1.2 (4pts)

对 $a > 0, x$ 很靠近 0, 给出 $f(x)$ 的可靠数值计算方法, 使其尽量达到更好的精度: $f(x) = \cos(a-x) - \cos a$ 。



解

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos(a-x) - \cos a = \cos a \cos x + \sin a \sin x - \cos a \\ &= \cos a (\cos x - 1) + \sin a \sin x \approx -\frac{1}{2}x^2 \cos a + x \sin a \end{aligned}$$

作业 1.3 (4pts)

对 $x \gg a$, 给出 $f(x)$ 的可靠数值计算方法, 使其尽量达到更好的精度: $f(x) = \sqrt{x^2 + a} - x$ 。



解
$$f(x) = \sqrt{x^2 + a} - x = \frac{x^2 + a - x^2}{\sqrt{x^2 + a} + x} = \frac{a}{\sqrt{x^2 + a} + x}$$

作业 1.4 (4pts)

设有精确值 $x^* = 2023.0905$, 则其近似值 $x_1 = 2023.090, x_2 = 2023.0900$ 分别有几位有效数字?



解 x_1 有 7 位有效数字, x_2 有 7 位有效数字。

第二章 第二次作业

作业 2.1 (6pts)

(利用下面的函数值表,作差商表,写出相应的牛顿插值多项式以及插值误差表达式,并计算 $f(1.5)$ 和 $f(4)$ 的近似值:

x	1.0	2.0	3.0	4.5
$f(x)$	2.5	4.0	3.5	2.0

解 先计算各阶差商: $f[x_0] = 2.5, f[x_1] = 4, f[x_2] = 3.5, f[x_3] = 2$;

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = 1.5, f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1} = -0.5, f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2} = -1;$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = -1, f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1} = -0.2;$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_0, x_1, x_2] - f[x_1, x_2, x_3]}{x_3 - x_0} = \frac{8}{35}.$$

因此, 插值多项式 $P_3(x) = 2.5 + 1.5(x - 1) - (x - 1)(x - 2) + \frac{8}{35}(x - 1)(x - 2)(x - 3)$,

完全展开可以得到 $P_3(x) = \frac{8}{35}x^3 - \frac{83}{35}x^2 + \frac{491}{70}x - \frac{83}{35}$.

误差项 $R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4.5), \xi \in [1, 4.5]$.

$$P_3(1.5) = \frac{251}{70}, P_3(4) = \frac{83}{35}.$$

作业 2.2 (6pts)

利用数据 $f(0) = 2.0, f(1) = 1.5, f(3) = 0.25, f'(3) = 1$ 构造出三次插值多项式, 写出其插值余项, 并计算 $f(2)$ 的近似值。

解 设插值多项式 $P_3(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 对应 $P'_3(x) = 3a_3x^2 + 2a_2x + a_1$;

则有 $P_3(0) = a_0 = 2, P_3(1) = a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 1.5, P'_3(3) = 27a_3 + 6a_2 + a_1 = 1$

$$P_3(3) = 27a_3 + 9a_2 + 3a_1 + a_0 = 0.25 \Rightarrow a_3 = \frac{41}{144}, a_2 = -\frac{85}{72}, a_1 = \frac{19}{48}, a_0 = 2$$

所以插值函数为 $P_3(x) = \frac{41}{144}x^3 - \frac{85}{72}x^2 + \frac{19}{48}x + 2$,

余项为 $R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}x(x - 1)(x - 3)^2, \xi \in [0, 3]; P_3(2) = \frac{25}{72}$

作业 2.3 (6pts)

设 $f(x) = 20x^3 - x + 2024$, 求 $f[1, 2, 4]$ 和 $f[1, 2, 3, 4]$;

解 $f[1] = 2043, f[2] = 2182, f[3] = 2561, f[4] = 3300$;

$$f[1, 2] = 139, f[2, 3] = 379, f[3, 4] = 739, f[2, 4] = 559;$$

$$f[1, 2, 3] = 120, f[2, 3, 4] = 180, f[1, 2, 4] = 140;$$

$$f[1, 2, 3, 4] = 20.$$

作业 2.4 (6pts)

设 $\{l_i(x)\}_{i=0}^6$ 是以 $\{x_i = 2i\}_{i=0}^6$ 为节点的 6 次 Lagrange 插值基函数, 求 $\sum_{i=0}^6 (x_i^3 + x_i^2 + 1)l_i(x)$ 和 $\sum_{i=0}^6 (x_i^3 + x_i^2 + 1)l'_i(x)$, 结果需要化简。



解 记 $f(x) = x^3 + x^2 + 1$, 则 $l_i(x)$ 可以看作对 $f(x)$ 插值时的基函数。由于节点数量为 7,

$\deg f(x) = 3$, 所以 $\sum_{i=0}^6 (x_i^3 + x_i^2 + 1)l_i(x) = f(x) = x^3 + x^2 + 1$,

$$\sum_{i=0}^6 (x_i^3 + x_i^2 + 1)l'_i(x) = f'(x) = 3x^2 + 2x.$$

作业 2.5 (6pts)

设 $x_0, x_1, \dots, x_n (n > 2)$ 为互异的节点, $l_k(x) (k = 0, 1, \dots, n)$ 为与其对应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 证明 $\sum_{k=0}^n (x_k - x)^n l_k(x) = 0$ 。



解

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (x_k - x)^n l_k(x) &= \sum_{k=0}^n \sum_{m=0}^n \left(\binom{n}{m} x_k^{n-m} (-x)^m \right) l_k(x) \\ &= \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} (-x)^m \sum_{k=0}^n x_k^{n-m} l_k(x) = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} (-x)^m x^{n-m} \\ &= (x - x)^n \equiv 0 \end{aligned}$$

第三章 第三次作业

作业 3.1 (6pts)

构造积分 $\bar{I}(f) = \int_{-h}^{2h} f(x) dx$ 的数值积分公式 $I(f) = a_{-1}f(-h) + a_0f(0) + a_1f(2h)$, $h > 0$;

解 积分对 $p_0(x) = 1, p_1(x) = x, p_2(x) = x^2$ 无误差, 对应方程组
$$\begin{cases} a_{-1} + a_0 + a_1 = 3h \\ -2a_{-1} + 4a_1 = 3h \\ a_{-1} + 4a_1 = 3h \end{cases}$$

 $\Rightarrow a_{-1} = 0, a_0 = 2.25h, a_1 = 0.75h, I(f) = \frac{9}{4}hf(0) + \frac{3}{4}hf(2h).$

作业 3.2 (6pts)

分别利用梯形公式和 Simpson 公式求如下积分及其误差 (计算结果至少保留小数点后 4 位):

$$\int_0^2 e^{-x} \sin x dx$$

解 准确值: $\int_0^2 e^{-x} \sin x dx = -\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x)\Big|_0^2 \approx 0.46663$;
 $f(0) = 0, f(1) \approx 0.30956, f(2) \approx 0.12306$;
Simpson 公式: $I_1 = \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \approx 0.4538$, 误差约为 0.0128;
梯形公式: $I_2 = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) \approx 0.12306$, 误差约为 0.3436.

作业 3.3 (10pts)

记 $I(f) = \int_{-2}^2 f(x) dx$, 设 $S(f(x))$ 为其数值积分公式, 其中 $I(f) \approx S(f(x)) = Af(-\alpha) + Bf(0) + Cf(\alpha)$.

1. 试确定参数 A, B, C, α 使得该数值积分公式具有尽可能高的代数精度, 并确定该公式的代数精度 (需给出求解过程);
2. 设 $f(x)$ 足够光滑 (可微), 求该数值积分公式的误差

解 取 $A = C$, 积分对 x^{2k+1} 无误差. 积分对 $p_0(x) = 1, p_2(x) = x^2, p_4(x) = x^4$ 无误差,

$$\text{对应方程组} \begin{cases} 2A + B = 4 \\ A\alpha^2 = \frac{8}{3} \\ A\alpha^4 = \frac{32}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = C = \frac{10}{9} \\ B = \frac{16}{9} \\ \alpha = \frac{2}{5}\sqrt{15} \end{cases}, \text{代数精度为 5 次.}$$

$$\text{误差为 } E(f) = \frac{E(x^6)}{6!} f^{(6)}(\xi) = \left(\int_{-2}^2 x^6 dx - S(x^6) \right) \frac{f^{(6)}(\xi)}{216} = \frac{64}{7875} f^{(6)}(\xi), \xi \in [-2, 2]$$

作业 3.4 (8pts)

求满足下表数据以及边界条件 $S''(-2) = S''(2) = 0$ ($n=3$) 的三次样条插值函数 $S(x)$, 并计算 $S(0)$ 的值。注意: n 为小区间个数。

x	-2.00	-1.00	1.00	2.00
$f(x)$	-4.00	2.00	2.50	1.50



解 $S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, i = 0, 1, 2$ 满足 $S(x_i) = f(x_i), i = 0, 1, 2, 3$
 记 $M_i = S''(x_i)$, 则 $\frac{h_{i-1}}{6}M_{i-1} + \frac{h_{i-1} + h_i}{3}M_i + \frac{h_i}{6}M_{i+1} = \frac{f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i-1}, x_i]}{h_i}, i = 1, 2$
 $M_i = 0, i = 0, 3$, 其中 $h_i = x_{i+1} - x_i$ 。现在有 12 个方程与 12 个未知数, 解方程组得到:

$$S(x) = \begin{cases} -4 + 6.25(x+2)^2 - 0.25(x+2)^3, & x \in [-2, -1] \\ 2 + 1.75(x+1) - 0.75(x+1)^2 + 0.09375(x+1)^3, & x \in [-1, 1] \\ 2.5 - 0.9375(x-1) - 0.1875(x-1)^2 + 0.0625(x-1)^3, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

 故 $S(0) = 3.5625 = \frac{57}{16}$

第四章 第四次作业

作业 4.1 (6pts)

给定函数 $f(x)$ 离散值如下:

x	0.00	0.02	0.04	0.06
$f(x)$	2.5	1.0	2.0	3.5

分别用向前、向后以及中心差商公式计算 $f'(0.02)$ 和 $f'(0.04)$;

解 向前差分: $f'(0.02) = \frac{f(0.04) - f(0.02)}{0.02} = 50, f'(0.04) = \frac{f(0.06) - f(0.04)}{0.02} = 75;$
向后差分: $f'(0.02) = \frac{f(0.02) - f(0.00)}{0.02} = -75, f'(0.04) = \frac{f(0.04) - f(0.02)}{0.02} = 50;$
中心差分: $f'(0.02) = \frac{f(0.04) - f(0.00)}{0.04} = -12.5, f'(0.04) = \frac{f(0.06) - f(0.02)}{0.04} = 62.5。$

作业 4.2 (8pts)

用 3 点的 Gauss-Legendre 数值积分公式求积分 $\int_0^2 e^{-x} \sin(x) dx$ 及其积分误差;

解 准确值: 0.4666。先换元 $\int_{-1}^1 e^{-t-1} \sin(t+1) dt$, 记 $g(t) = e^{-t-1} \sin(t+1),$
$$I(g) = \frac{5}{9}g\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}g(0) + \frac{5}{9}g\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \approx 0.4665,$$

作业 4.3 (8pts)

试推导积分 $\int_0^2 (x-1)^2 f(x) dx$ 的 2 点 Gauss 积分公式, 这里 $(x-1)^2$ 为权重函数;

解 先换元为 $\int_{-1}^1 t^2 f(t+1) dt$, 此时 $\alpha_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, \alpha_2 = \sqrt{\frac{3}{5}}$, 由于对称性, 权重相等, 代入
 $f(t) = 1$ 时无误差, 得到 $W_1 = W_2 = \frac{1}{3}$, 故 $I(f) = \frac{1}{3}f\left(1 - \sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{1}{3}f\left(1 + \sqrt{\frac{3}{5}}\right)。$

作业 4.4 (10pts)

设函数 $f(x)$ 充分光滑 (可微), 试推导如下数值微分公式 (即确定常数 A, B, C, D, E), 使其截断误差为 $O(h^4), f'(x) = \frac{1}{h}(Af(x-2h) + Bf(x-h) + Cf(x) + Df(x+h) + Ef(x+2h))。$

解 作 Taylor 展开至 $O(h^5)$, 有:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{1}{2}h^2 f''(x) + \frac{1}{6}h^3 f'''(x) + \frac{1}{24}h^4 f''''(x) + O(h^5) \\ f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \frac{1}{2}h^2 f''(x) - \frac{1}{6}h^3 f'''(x) + \frac{1}{24}h^4 f''''(x) + O(h^5) \end{aligned}$$

$$f(x+2h) = f(x) + 2hf'(x) + 2h^2f''(x) + \frac{4}{3}h^3f'''(x) + \frac{2}{3}h^4f''''(x) + O(h^5)$$

$$f(x-2h) = f(x) - 2hf'(x) + 2h^2f''(x) - \frac{4}{3}h^3f'''(x) + \frac{2}{3}h^4f''''(x) + O(h^5)$$

$$Af(x-2h) + Bf(x-h) + Cf(x) + Df(x+h) + Ef(x+2h)$$

$$= (A+B+C+D+E)f(x) + (-2A-B+D+2E)hf'(x)$$

$$+ (2A + \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}D + 2E)h^2f''(x) + (-\frac{4}{3}A - \frac{1}{6}B + \frac{1}{6}D + \frac{4}{3}E)h^3f'''(x)$$

$$+ (\frac{2}{3}A - \frac{1}{24}B + \frac{1}{24}D + \frac{2}{3}E)h^4f''''(x)$$

$$:= hf'(x) + O(h^5)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B+C+D+E=0 \\ -2A-B+D+2E=1 \\ (2A+\frac{1}{2}B+\frac{1}{2}D+2E=0 \\ -\frac{4}{3}A-\frac{1}{6}B+\frac{1}{6}D+\frac{4}{3}E=0 \\ \frac{2}{3}A-\frac{1}{24}B+\frac{1}{24}D+\frac{2}{3}E=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{12} \\ B=-\frac{2}{3} \\ C=0 \\ D=\frac{2}{3} \\ E=\frac{1}{12} \end{cases}$$

因此数值微分公式为 $f'(x) = \frac{-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)}{12h} + O(h^4)$ 。

第五章 第五次作业

作业 5.1 (12pts)

设有常微分方程初值问题 $\begin{cases} y'(x) = -y(x), 0 \leq x \leq 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$, 假设求解区间 $[0, 1]$ 被 n 等分, 令 $h =$

$$\frac{1}{n}, x_k = \frac{k}{n} (k = 0, 1, \dots, n)$$

1. 分别写出用 **向前 Euler 公式**, **向后 Euler 公式**, **梯形公式** 以及 **改进的 Euler 公式** 求上述微分方程数值解时的差分格式 (即 y_{k+1} 与 y_k 二者之间的递推关系式);
2. 设 $y_0 = y(0)$, 分别求这四种公式 (方法) 下的近似值 y_n 的表达式 (注: 这里的 y_n 即是 $y(x_n) \equiv y(1)$ 的近似值);
3. 当 n 足够大 (即区间长度 $h \rightarrow 0$ 时), 分别判断四种方法下的近似值 y_n 是否收敛到原问题的真解 $y(x)$ 在 $x = 1$ 处的值。

解 显然解析解是 $y = e^{-x}$, 对应 $y(1) = e^{-1}$ 。以下 $n = \frac{1}{h}$ 。

- 向前 Euler 公式: $y_{k+1} = y_k + h(-y_k) = (1 - h)y_k, y_n = (1 - h)^n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e^{-1} = y(1)$;
- 向后 Euler 公式: $y_{k+1} = y_k - hy_{k+1} = \frac{y_k}{1 + h}, y_n = \left(\frac{1}{1 + h}\right)^n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e^{-1} = y(1)$;
- 梯形公式: $y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}(-y_k - y_{k+1}) = \frac{2 - h}{2 + h}y_k, y_n = \left(\frac{2 - h}{2 + h}\right)^n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e^{-1} = y(1)$;
- 改进的 Euler 公式: 预测: $y^* = y_k + h(-y_k) = (1 - h)y_k$,
校正: $y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}(-y_k - y^*) = \left(1 - h + \frac{h^2}{2}\right)y_k, y_n = \left(1 - h + \frac{h^2}{2}\right)^n$, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e^{-1} = y(1)$ 。

作业 5.2 (8pts)

试推导 $p = 1, q = 2$ 显式公式 $y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(7f(x_n, y_n) - 2f(x_{n-1}, y_{n-1}) + f(x_{n-2},$

$y_{n-2}))$ 的 **局部截断误差**, 即验证 $T_{n+1} \equiv y(x_{n+1}) - y_{n+1} = \frac{1}{3}h^4 y^{(4)}(x_{n-1}) + O(h^5)$

(提示: 将差分格式右端点某些项在某点处同时作 Taylor 展开);

解 $y(x_{n+1}) = y(x_{n-1}) + 2hy'(x_{n-1}) + 2h^2y''(x_{n-1}) + \frac{4}{3}h^3y'''(x_{n-1}) + \frac{2}{3}h^4y^{(4)}(x_{n-1}) + O(h^5)$;

$$f(x_n, y_n) = y'(x_n) = y'(x_{n-1}) + hy''(x_{n-1}) + \frac{1}{2}h^2y'''(x_{n-1}) + \frac{1}{6}h^3y^{(4)}(x_{n-1}) + O(h^4)$$

$$f(x_n, y_{n-2}) = y'(x_{n-2}) = y'(x_{n-1}) - hy''(x_{n-1}) + \frac{1}{2}h^2y'''(x_{n-1}) - \frac{1}{6}h^3y^{(4)}(x_{n-1}) + O(h^4)$$

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1} = y(x_{n+1}) - \frac{h}{3}(7f(x_n, y_n) - 2f(x_{n-1}, y_{n-1}) + f(x_{n-2}, y_{n-2}))$$

$$= y(x_{n+1}) - \frac{h}{3}(7y'(x_n) - 2y'(x_{n-1}) + y'(x_{n-2})) - \frac{h}{3}(7hy''(x_{n-1}) - 2hy''(x_{n-1}) + hy''(x_{n-1})) - \frac{h}{3}(7\frac{1}{2}h^2y'''(x_{n-1}) - 2\frac{1}{2}h^2y'''(x_{n-1}) + \frac{1}{2}h^2y'''(x_{n-1})) - \frac{h}{3}(7\frac{1}{6}h^3y^{(4)}(x_{n-1}) - 2\frac{1}{6}h^3y^{(4)}(x_{n-1}) + \frac{1}{6}h^3y^{(4)}(x_{n-1})) - \frac{h}{3}O(h^4) - \frac{h}{3}O(h^5)$$

$$= \frac{h}{3}(7y'(x_{n-1}) + hy''(x_{n-1}) + \frac{1}{2}h^2y'''(x_{n-1}) + \frac{1}{6}h^3y^{(4)}(x_{n-1}) + O(h^4)) - 2y'(x_{n-1})$$

$$\begin{aligned}
& + \left(y'(x_{n-1}) - hy''(x_{n-1}) + \frac{1}{2}h^2y'''(x_{n-1}) - \frac{1}{6}h^3y^{(4)}(x_{n-1}) + O(h^4) \right) \\
& = \frac{1}{3}h^4y^{(4)}(x_{n-1}) + O(h^5) \\
\text{故 } T_{n+1} & = \frac{1}{3}h^4y^{(4)}(x_{n-1}) + O(h^5)。
\end{aligned}$$

作业 5.3 (18pts)

试用线性多步法构造 $p=1, q=2$ 时的隐式差分格式，求该格式局部截断误差的误差主项并判断它的阶，最后为该隐式格式设计一种合适的预估-校正格式。

解 差分格式为 $y_{n+1} = y_{n-1} + \beta_{-1}f(x_{n+1}, y_{n+1}) + \beta_0f(x_n, y_n) + \beta_1f(x_{n-1}, y_{n-1})$;

记 $x = x_{n-1} + \xi, \xi \in [0, 2h]$ ，则对应节点为 $\xi = 0, h, 2h$ ，Lagrange 基函数为：

$$l_0(\xi) = \frac{(\xi - h)(\xi - 2h)}{2h^2}, l_1(\xi) = -\frac{\xi(\xi - 2h)}{h^2}, l_2(\xi) = \frac{\xi(\xi - h)}{2h^2}。 \text{对应权重如下：}$$

$$\beta_1 = \int_0^{2h} l_0(\xi) d\xi = \frac{h}{3}, \beta_0 = \int_0^{2h} l_1(\xi) d\xi = \frac{4h}{3}, \beta_{-1} = \int_0^{2h} l_2(\xi) d\xi = \frac{h}{3},$$

$$\text{故差分格式为 } y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f(x_{n+1}, y_{n+1}) + 4f(x_n, y_n) + f(x_{n-1}, y_{n-1}))。$$

以下记 $x_{n-1} = r, x_n = s, x_{n+1} = t$ ，则 $s = r + h, t = r + 2h$ ，Taylor 展开为：

$$y(t) = y(r) + 2hy'(r) + 2h^2y''(r) + \frac{4}{3}h^3y'''(r) + \frac{4}{2}h^4y^{(4)}(r) + \frac{4}{15}h^5y^{(5)}(r) + O(h^6)$$

$$y'(t) = y'(r) + 2hy''(r) + 2h^2y'''(r) + \frac{4}{3}h^3y^{(4)}(r) + \frac{4}{2}h^4y^{(5)}(r) + O(h^5)$$

$$y'(s) = y'(r) + hy''(r) + \frac{1}{2}h^2y'''(r) + \frac{1}{6}h^3y^{(4)}(r) + \frac{1}{24}h^4y^{(5)}(r) + O(h^5)$$

$$\tau_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1} = y(t) - y(r) - \frac{h}{3}(y'(r) + 4y'(s) + y'(t))$$

$$= y(r) + 2hy'(r) + 2h^2y''(r) + \frac{4}{3}h^3y'''(r) + \frac{4}{2}h^4y^{(4)}(r) + \frac{4}{15}h^5y^{(5)}(r) + O(h^6) - y(r)$$

$$- \frac{h}{3} \left(y'(r) + 4 \left(y'(r) + hy''(r) + \frac{1}{2}h^2y'''(r) + \frac{1}{6}h^3y^{(4)}(r) + \frac{1}{24}h^4y^{(5)}(r) + O(h^5) \right) \right.$$

$$\left. + \left(y'(r) + 2hy''(r) + 2h^2y'''(r) + \frac{4}{3}h^3y^{(4)}(r) + \frac{4}{2}h^4y^{(5)}(r) + O(h^5) \right) \right)$$

$$= -\frac{1}{90}h^5y^{(5)}(r) + O(h^6)$$

因此方法的误差主项为 $-\frac{1}{90}h^5y^{(5)}(r)$ ，阶数为 4。

一种预估-校正方法如下：使用显式公式作为预估：

$$y_{n+1}^{(p)} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(7f(x_n, y_n) - 2f(x_{n-1}, y_{n-1}) + f(x_{n-2}, y_{n-2})),$$

用预估值替代隐式公式中的未知量：

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3} \left(f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(p)}) + 4f(x_n, y_n) + f(x_{n-1}, y_{n-1}) \right)。$$

作业 5.4 (12pts)

试推导如下 Runge-Kutta 公式的局部截断误差及其误差主项，判断该公式/格式的（精度）阶数。

提示：利用二元函数的 Taylor 展开。

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}(3k_1 + k_2) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + 2h, y_n + 2hk_1) \end{cases}$$



解 记 $x = x_n, y = y_n, f = f(x, y), f_x = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y), f_y = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$, 高阶偏导均在 (x, y) 取值。

$$\begin{aligned} k_2 &= f(x + 2h, y + 2hk_1) = f(x + 2h, y + 2hf) \\ &= f + 2hf_x + 2hf_y + \frac{1}{2}(f_{xx}(2h)^2 + 2f_{xy}(2h)(2hf) + f_{yy}(2hf)^2) + O(h^3) \\ &= f + 2hf_x + 2hf_y + 2h^2f_{xx} + 4h^2f_{xy}f + 2h^2f_{yy}f + O(h^3) \\ y_{n+1} &= y(x) + \frac{h}{4}(3f + f(x + 2h, y + 2hk_1)) \\ &= y(x) + \frac{h}{4}(3f + 2hf_x + 2hf_y + 2h^2f_{xx} + 4h^2f_{xy}f + 2h^2f_{yy}f + O(h^3)) \\ &= y(x) + hf + \frac{h^2}{2}(f_x + f_yf) + \frac{h^3}{2}(f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2) + O(h^4) \\ y'(x) &= f(x, y(x)) \Rightarrow y''(x) = f_x + f_yy' = f_x + f_yf, y''' = f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2 + f_yf_x + f_y^2f; \\ y(x+h) &= y(x) + hy'(x) + \frac{1}{2}h^2y''(x) + \frac{1}{6}h^3y'''(x) \\ &= y(x) + hf + \frac{h^2}{2}(f_x + f_yf) + \frac{h^3}{6}(f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2 + f_yf_x + f_y^2f) \\ \text{此时 } \tau &= y(x+h) - y_{n+1} = \frac{h^3}{6}(f_xf_y + f_y^2f - 2f_{xx} - 4f_{xy}f - 2f_{yy}f^2) + O(h^4) \\ \text{故误差主项是 } &\frac{h^3}{6}(f_xf_y + f_y^2f - 2f_{xx} - 4f_{xy}f - 2f_{yy}f^2), \text{ 阶数为 } 2。 \end{aligned}$$

第六章 第六次作业

作业 6.1 (6pts)

利用牛顿迭代公式估算 $\ln 2$ 的值 (可取 $f(x) = e^x - 2 = 0$), 取初值 $x_0 = 0.618$, 迭代 5 次, 列表计算 $x_i, i = 1, 2, \dots, 5$ 。请估计 x_5 的有效数字位数 (计算 x_5 时, 请保留尽量多的小数点位数)。

解 $f(x) = e^x - 2, f'(x) = e^x$, 迭代公式为 $x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} - 2}{e^{x_n}}$ 。

$x_0 = 0.618, x_1 = 0.69600, x_2 = 0.693151, x_3 = 0.69314718056, x_4 = 0.6931471805599453,$

$x_5 = 0.69314718055994530941723212145818$ 。实际上, x_5 的误差在 10^{-45} 量级。

作业 6.2 (6pts)

设 $n > 1$, 给出用牛顿法计算 $\sqrt[n]{a} (a > 0)$ 时的迭代公式, 并用它来计算 $\sqrt[5]{2025}$, 取初值 $x_0 = 5.0$, 求 x_4 。

解 $f(x) = x^n - a, f'(x) = nx^{n-1}$, 迭代公式为 $x_{n+1} = x_n - \frac{x^n - a}{nx^{n-1}}$
 $x_0 = 5, x_1 = 4.648, x_2 = 4.5858, x_3 = 4.58464, x_4 = 4.58443$ 。

作业 6.3 (10pts)

写出对方程 $x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$ 求根时的 Newton 迭代公式 $x_n = \varphi(x_{n-1})$ 。

解 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2, f'(x) = 3x^2 - 8x + 5$, 迭代公式为 $x_{n+1} = x_n + \frac{x_n^3 - 4x_n^2 + 5x_n - 2}{3x_n^2 - 8x_n + 5}$ 。

作业 6.4 (10pts)

设 $f(x)$ 为 \mathbb{R} 上的光滑实值函数, $r \in \mathbb{R}$ 为 $f(x)$ 的一个 p 重根 ($p \geq 2$), 试推导迭代公式 $x_{k+1} = x_k - p \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ 在根 r 附近的收敛阶。

解 设 $f(x) = (x - r)^p g(x), g(r \neq 0), f'(x) = p(x - r)^{p-1} g(x) + (x - r)^p g'(x)$, 令 $e_k = x_k - r$,

则 r 附近 $f(x_k) = e_k^p g(x_k), f'(x_k) = e_k^{p-1} (pg(x_k) + e_k g'(x_k))$, 带入迭代公式,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{e_k^p g(x_k)}{e_k^{p-1} (pg(x_k) + e_k g'(x_k))} = x_k - \frac{e_k g(x_k)}{pg(x_k) + e_k g'(x_k)}, \text{ 两边同时减去 } r,$$

$$e_{k+1} = e_k - \frac{e_k g(x_k)}{pg(x_k) + e_k g'(x_k)} = e_k \left(1 - \frac{pg(x_k)}{pg(x_k) + e_k g'(x_k)} \right) = e_k \cdot \frac{e_k g'(x_k)}{pg(x_k) + e_k g'(x_k)}$$

$$= e_k^2 \cdot \frac{g'(x_k)}{pg(x_k) + e_k g'(x_k)} \stackrel{C := \frac{g'(r)}{pg(r)}}{=} C e_k^2$$

因此迭代公式是二次收敛的。

第七章 第七次作业

作业 7.1 (10pts)

用 Doolittle 分解法解如下线性方程组（请给出详细的解题过程，包括矩阵分解）：

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 10 \end{cases}$$



解 系数矩阵的 LU 分解为 $\begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{14}{5} & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

求解 $Ly = b$ ，得到 $y = \left(2, \frac{18}{5}, \frac{50}{7}\right)^T$ ；求解 $Lx = y$ ，得到 $x = \left(-\frac{4}{7}, 2, \frac{10}{7}\right)^T$ 。

作业 7.2 (10pts)

求如下三对角阵 A 的 Crout 分解：

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$



解 $\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & \frac{15}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{52}{15} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{89}{26} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{8}{15} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{15}{26} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

作业 7.3 (6+4pts)

设有线性方程组

$$\begin{cases} 35.26x_1 + 14.96x_2 = 20.25 \\ 187.30x_1 + 79.43x_2 = 19.75 \end{cases}$$

1. 试求该方程组系数矩阵 A 的条件数 $\text{cond}_1(A)$ （结果保留 2 位小数）；
2. 若方程组右端项 $b = (20.25, 19.75)^T$ 有扰动 $\delta b = (-0.01, 0.01)^T$ ，试给出此时方程组解的相对误差估计（在 $\|\cdot\|_1$ 范数下，结果保留 2 位小数）。



解 $A = \frac{1}{100} \begin{bmatrix} 3526 & 1496 \\ 18730 & 7943 \end{bmatrix}, \|A\|_1 = \frac{5564}{25}, A^{-1} = \frac{1}{6531} \begin{bmatrix} -397150 & 74800 \\ 936500 & -176300 \end{bmatrix},$

$\|A^{-1}\|_1 = \frac{444550}{2177} \Rightarrow \text{cond}_1(A) = \|A\|_1 \cdot \|A^{-1}\|_1 = \frac{98939048}{2177} \approx 45447.43。$

解的相对误差估计为 $\frac{\|\delta x\|_1}{\|x\|_1} \lesssim \text{cond}_1(A) \cdot \frac{\|\delta b\|_1}{\|b\|_1} \approx 22.7237$ ，即相对误差为 2272.37%。

第八章 第八次作业

作业 8.1 (10pts)

设有线性方程组 $Ax = b$, 其中,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

1. 写出 Jacobi 迭代的迭代格式 (分量形式);
2. 求 Jacobi 迭代的迭代矩阵;
3. 讨论此时 Jacobi 迭代法的收敛性 (请给出理由或证明)。

解 迭代格式为
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{2}(2 + x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2}(x_1^{(k)} + x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{2}(2 + x_2^{(k)} + x_4^{(k)}) \\ x_4^{(k+1)} = \frac{1}{2}(4 + x_3^{(k)}) \end{cases}, \quad G = D^{-1}(L + U) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

G 的特征值为 $\frac{\pm 1 \pm \sqrt{5}}{4}$, $\rho(G) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} < 1$, 故迭代收敛。

作业 8.2 (10pts)

设有线性方程组

$$\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 10 \\ -3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 20 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 50 \end{cases}$$

1. 分别写出 Gauss-Seidel 迭代和 SOR 迭代的分量形式;
2. 求 Gauss-Seidel 迭代的分裂矩阵 (splitting matrix) 及迭代矩阵 (iteration matrix);
3. 讨论 Gauss-Seidel 迭代法的收敛性 (请给出理由或证明)。

解 Gauss-Seidel 迭代格式:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{5}(10 + 3x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5}(20 + 3x_1^{(k+1)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{5}(50 - 2x_1^{(k+1)} - 2x_2^{(k+1)}) \end{cases},$$

$$\text{SOR 迭代格式: } \begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1-\omega)x_1^{(k)} + \frac{\omega}{5}(10 + 3x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = (1-\omega)x_2^{(k)} + \frac{\omega}{5}(20 + 3x_1^{(k+1)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = (1-\omega)x_3^{(k)} + \frac{\omega}{5}(50 - x_1^{(k+1)} - 2x_2^{(k+1)}) \end{cases}。$$

$$\text{分裂矩阵 } Q = D + L = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -3 & 5 & 0 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}, G = -(D + L)^{-1}U = \frac{1}{125} \begin{bmatrix} 0 & 75 & -50 \\ 0 & 45 & -80 \\ 0 & -48 & 52 \end{bmatrix}。$$

注意到系数矩阵各阶主子式为 $\Delta_1 = 5, \Delta_2 = \Delta_3 = 16$, 是正定的, 故迭代收敛。

作业 8.3 (10pts)

设有线性方程组 $Ax = b$, 其中, $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 。

利用如下迭代公式解此方程

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha(b - Ax^{(k)}), \quad 0 \neq \alpha \in \mathbb{R}$$

1. 写出此迭代法的迭代矩阵;
2. 求使该迭代法收敛时参数 α 的最大取值范围;
3. 当 α 取何值时, 迭代收敛速度最快。



解 迭代公式可以写为 $x^{(k+1)} = (I - \alpha A)x^{(k)} + \alpha b$, 故迭代矩阵为 $I - \alpha A = \begin{bmatrix} 1 - 3\alpha & -2\alpha \\ -\alpha & 1 - 2\alpha \end{bmatrix}$ 。

特征值为 $1 - \alpha, 1 - 4\alpha$, 收敛条件为 $|1 - \alpha| < 1, |1 - 4\alpha| < 1$, 即 $0 < \alpha < \frac{1}{2}$ 。

当 $\alpha = \frac{2}{5}$ 时, 谱半径 $\rho(G) = \max\{|1 - \alpha|, |1 - 4\alpha|\}$ 最小, 收敛速度最快。

第九章 第九次作业

作业 9.1 (4pts)

设 n 阶实方阵 A 有相异的特征根 $|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n| > 0$ 。对给定的实数 $\alpha \neq \lambda_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ ，利用规范幂法或规范反幂法，设计一个能计算离 α 距离最近的矩阵 A 的特征根的迭代格式（注：不容许对矩阵求逆）。

解 初始化：选择初始向量 $y_0, x_0 = \frac{y_0}{\|y_0\|}$ ；

迭代格式：解方程组 $(A - \alpha I)y_{k+1} = x_k, \sigma_k = x_k^\top y_{k+1}, \lambda_k = \alpha + \frac{1}{\sigma_k}, x_{k+1} = \frac{y_{k+1}}{\|y_{k+1}\|}$ ；

收敛判断： $\|x_{k+1} - x_k\| < \epsilon$ 时结束迭代。

作业 9.2 (8pts)

考虑用 Jacobi 方法计算矩阵 $A = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值。求对 A 作一次 Givens 相似变换时的 Givens (旋转) 变换矩阵 Q (要求相应的计算效率最高) 以及 Givens 变换后的矩阵 B (其中, $B = Q^\top A Q$)。

解 选取模长最大的非对角元 a_{13} 与 a_{31} ，对应 $\varphi = \frac{1}{2} \arctan \frac{2a_{13}}{a_{11} - a_{33}} = \frac{1}{2} \arctan 1 = \frac{\pi}{8}$ ，

$$\text{对应旋转矩阵 } Q = \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} \end{bmatrix},$$

$$B = Q^\top A Q = \begin{bmatrix} 5 & \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} & 4 & \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2} & 5 \end{bmatrix}.$$

作业 9.3 (8pts)

设 $p < q$ ， $Q(p, q, \theta)$ 为 n 阶 Givens 矩阵， θ 为角度。记

$$A = (a_{ij})_{n \times n}, B = (b_{ij})_{n \times n} = Q^\top(p, q, \theta) A Q(p, q, \theta),$$

假设 $a_{pq} \neq 0$ ，证明：当 θ 满足 $\cot 2\theta = \frac{a_{qq} - a_{pp}}{2a_{pq}}$ 时，有

$$\sum_{i=1}^n b_{ii}^2 = \sum_{i=1}^n a_{ii}^2 + 2a_{pq}^2.$$

提示：只需证 $b_{pp}^2 + b_{qq}^2 = a_{pp}^2 + a_{qq}^2 + 2a_{pq}^2$ 。

解 以下记 $t = \tan \theta$, 由 $\frac{a_{qq} - a_{pp}}{2a_{pq}} = \cot 2\theta = \frac{1}{\tan 2\theta} = \frac{1-t^2}{2t}$, 有 $a_{qq} - a_{pp} = \frac{1-t^2}{t}a_{pq}$ 。

$$\begin{aligned} b_{pp}^2 + b_{qq}^2 &= (a_{pp} - ta_{pq})^2 + (a_{qq} + ta_{pq})^2 = a_{pp}^2 + a_{qq}^2 + 2t^2 a_{pq}^2 - 2ta_{pp}a_{pq} + 2ta_{qq}a_{pq} \\ &= a_{pp}^2 + a_{qq}^2 + 2t^2 a_{pq}^2 + 2ta_{pq}(a_{qq} - a_{pp}) \\ &= a_{pp}^2 + a_{qq}^2 + 2t^2 a_{pq}^2 + 2ta_{pq} \cdot \frac{1-t^2}{t}a_{pq} = a_{pp}^2 + a_{qq}^2 + 2a_{pq}^2 \end{aligned}$$

由于其他对角线元素不变, 故 $\sum_{i=1}^n b_{ii}^2 = \sum_{i=1}^n a_{ii}^2 + 2a_{pq}^2$ 。

作业 9.4 (10pts)

设 $A = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 7 & 7 & 24 \\ 0 & 50 & -25 \\ 24 & 24 & -7 \end{bmatrix}$, 利用 Householder 矩阵, 求 A 的正交分解, 即 $A = QR$, 其中 Q 、 R 分别为 Householder 正交阵和上三角阵。

解 取 $x = \frac{1}{25}(7, 0, 24)^\top$, $\|x\| = 1$, $v = x - \|x\|e_1 = \frac{1}{25}(-18, 0, 24)^\top$, $\|v\| = \frac{6}{5}$,

$$H_1 = I - 2 \frac{vv^\top}{v^\top v} = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 7 & 0 & 24 \\ 0 & 25 & 0 \\ 24 & 0 & -7 \end{bmatrix}, H_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 已经是上三角矩阵。}$$

$$\text{因此 } QR \text{ 分解是 } Q = H_1 = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 7 & 0 & 24 \\ 0 & 25 & 0 \\ 24 & 0 & -7 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

第十章 第十次作业

作业 10.1 (6pts)

在最小二乘法原理下求下列矛盾方程组：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 4 \\ x_1 + 6x_2 = 14 \\ 3x_1 + x_2 = 7.5 \\ x_1 + x_2 = 4.5 \end{cases}$$

解 转化为矩阵形式 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 6 \\ 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 14 \\ 7.5 \\ 4.5 \end{bmatrix}$, $x = (A^T A)^{-1} A^T b = \left(\frac{593}{220}, \frac{87}{55} \right)^T$

作业 10.2 (8pts)

利用最小二乘法构造二次多项式 $y = p(x)$ 去拟合下列数据 (这里 x 代表年份, y 为人数), 并计算 $y(2015)$, 结果精确到小数点后一位。

x	2010	2011	2012	2013	2014
y	134091	134735	135404	136072	136782

解 令 $t = x - 2010$, 则矩阵形式为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 16 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 134091 \\ 134735 \\ 135404 \\ 136072 \\ 136782 \end{bmatrix}$ 。

解为 $(A^T A)^{-1} A^T b \approx (9.3571, 634.4714, 134091.71)^T$, 对应 $x = t + 2010$, 有
 $p(x) = 9.3571(x - 2010)^2 + 634.4714(x - 2010) + 134091.71$, $p(2015) \approx 137498.0$ 。

作业 10.3 (8pts)

给出下列数据, 用最小二乘法求形如 $y = a \cos x + b \sin x$ 的经验公式。

x_i	0.20	0.25	0.30	0.50
y_i	1.36	1.20	1.02	0.32

$$\text{解 } A = \begin{bmatrix} \cos 0.2 & \sin 0.2 \\ \cos 0.25 & \sin 0.25 \\ \cos 0.3 & \sin 0.3 \\ \cos 0.5 & \sin 0.5 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.9801 & 0.1987 \\ 0.9689 & 0.2474 \\ 0.9553 & 0.2955 \\ 0.8776 & 0.4794 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1.36 \\ 1.20 \\ 1.02 \\ 0.32 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.00 \\ -3.00 \end{bmatrix}$$

作业 10.4 (10pts)

利用最小二乘法构造一个二次多项式 $p(x)$ ，去拟合下列人口数据 (x 代表年份, $p(x)$ 为人数, 单位: 亿), 并分别预测一下 **2024 年末** 和 **2034 年末** 的人口数, 计算结果精确到小数点后 3 位。

年份	年末人口	出生人口	死亡人口	出生率/‰	死亡率/‰	城镇人口	乡村人口	城镇化率/‰
2018	14.0541	0.1523	0.0993	10.84	7.07	8.6433	5.4108	61.5
2019	14.1008	0.1465	0.0998	10.39	7.08	8.8426	5.2582	62.7
2020	14.1212	0.1202	0.09976	8.51	7.06	9.022	5.0992	63.9
2021	14.1260	0.1062	0.1014	7.52	7.18	9.1425	4.9835	64.7
2022	14.1175	0.0956	0.1041	6.77	7.37	9.2071	4.9104	65.22
2023	14.0967	0.0902	0.1110	6.40	7.87	9.3267	4.7733	66.15

$$\text{解 令 } t = x - 2018, \text{ 则矩阵形式为 } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 16 & 4 & 1 \\ 25 & 5 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 14.0541 \\ 14.1008 \\ 14.1212 \\ 14.1260 \\ 14.1175 \\ 14.0967 \end{bmatrix}.$$

解为 $(A^T A)^{-1} A^T b \approx (-0.00809, 0.0534, 14.058)^T$, 对应 $x = t + 2018$, 有

$$p(x) = -0.00809(x - 2018)^2 + 0.0534(x - 2018) + 14.058$$

$$p(2024) \approx 14.087, p(2034) \approx 12.841.$$