

动力学平均场理论 (Dynamical Mean Field Theory, DMFT) 是一种处理强关联电子体系的近似方法, 将难以求解的晶格问题转化成量子杂质问题, 从而有效降低多体问题的自由度。在处理量子杂质模型时, 由于杂质哈密顿量并不会因为晶格模型的不同类型而发生较大变化, 因此这一方法的优势是可以处理不同的晶格问题, 进一步能够与真实的材料体系计算相结合, 很大程度上扩展了强关联材料的计算领域。利用 DMFT 方法的这一优势, 并进一步将这套技术推广到非平衡体系, 人们就能够在热力学极限下直接处理时间域的量子涨落。在此框架下, 人们更好地理解许多非平衡体系的物理性质, 例如莫特绝缘体中的介电击穿, 光掺杂以及淬火系统中的崩溃和复苏振荡 (collapse-and-revival oscillations) 等。本篇读书报告主要参考 RMP 86,779(2014) 和 RMP 68,13(1996) 两篇综述, 简要介绍非平衡 DMFT 的理论框架。

在处理晶格系统的电子相互作用时, 最简单的方法是做平均场近似。但这种方法得到的是静态的库仑势, 电子因此只能形成静态的长程序, 时间关联的电子涨落无法得到很好描述, 因此人们无法得到例如 Mott 绝缘性相关的强关联物理图像。但因为 DMFT 方法处理的不是电子密度, 而是与频率依赖的格林函数 $G(\omega)$, 因此它能够自然地将时间涨落相关信息包括进来。DMFT 的核心思想是将晶格模型自洽地映射为单杂质模型, 从而把物理问题等效地转化成对单杂质的求解问题。非平衡 DMFT 是对平衡态理论框架的一个直接推广, 利用双时格林函数和相应的时间依赖的 Weiss 场自洽地描述系统的有效作用量。下面从平衡态出发, 对这一方法做简要推导。

为了将晶格模型的性质映射到单杂质模型中, 一个直接的方式是扣除晶格模型的一个格点, 利用路径积分将其他格点积分掉, 得到与单杂质模型数学形式相同的有效作用量。文献中一般称这种推导方法为空腔法 (cavity method)。

Hubbard 模型的哈密顿量为

$$\hat{H} = - \sum_{ij\sigma} t_{ij} c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \quad (0-1)$$

其中, 设 $t_{ii} = 0, t_{ij} = t_{ji} \in \mathbb{R}$ 。

在相干态路径积分下, 有配分函数

$$Z = \int \prod_i \prod_\sigma Dc_{i\sigma}^*(\tau) Dc_{j\sigma}(\tau) e^{-S}, \quad (0-2)$$

其中作用量的表达式为

$$S = \int_0^\infty d\tau \left[\sum_{i\sigma} c_{i\sigma}^*(\tau) \left(\frac{\partial}{\partial \tau} - \mu \right) c_{i\sigma}(\tau) - \sum_{ij} \sum_{\sigma} t_{ij} c_{i\sigma}^*(\tau) c_{j\sigma}(\tau) + U \sum_i n_{i\uparrow}(\tau) n_{i\downarrow}(\tau) \right], \quad (0-3)$$

将作用量划分为空腔 o 格点项 S_o , 剩余格点项 $S^{(o)}$ 以及相互作用项 ΔS , 其中

$$S_o = \int_0^\beta d\tau \left[\sum_{\sigma} c_{o\sigma}^*(\tau) \left(\frac{\partial}{\partial \tau} - \mu \right) c_{o\sigma}(\tau) + U n_{o\uparrow}(\tau) n_{o\downarrow}(\tau) \right], \quad (0-4)$$

$$\Delta S = - \int_0^\beta d\tau \sum_{i\sigma} t_{io} \left[c_{i\sigma}^*(\tau) c_{o\sigma}(\tau) + c_{o\sigma}^*(\tau) c_{i\sigma}(\tau) \right]. \quad (0-5)$$

记 $\eta_{i\sigma}(\tau) \equiv t_{io} c_{o\sigma}(\tau)$, 并对 t_{ij} 作标度变换:

$$t_{ij} = \frac{\tilde{t}_{ij}}{D^{\frac{|i-j|}{2}}}. \quad (0-6)$$

这里的标度变换方式与 Ising 模型的处理不同, D. Vollhardt 证明, 这样的取法可以在大维度极限 $D \rightarrow \infty$ 时得到有限的 $\langle H_T \rangle$, 否则将发散或趋于零 [1]。

定义空腔格点的有效作用量:

$$\frac{1}{Z_{\text{eff}}} e^{-S_{\text{eff}}} \equiv \frac{1}{Z} \int \prod_{i \neq o} \prod_{\sigma} Dc_{i\sigma}^* Dc_{i\sigma} e^{-S}, \quad (0-7)$$

为方便表述, 令 $\eta_1^*, \dots, \eta_N^* \equiv \eta_{N+1}, \dots, \eta_{2N}$, 视为和 η_1, \dots, η_N 相互独立的变量。利用 Grassmann 函数的泰勒展开式:

$$\begin{aligned} S_{\text{eff}}(\eta_1, \dots, \eta_{2N}) &= \int d\tau L_{\text{eff}} \\ &= \int d\tau \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i_1 \dots i_n=1}^{2N} \frac{1}{n!} \frac{\partial^n L_{\text{eff}}}{\partial \eta_{i_1} \dots \partial \eta_{i_n}} \Big|_{\{\eta_1, \dots, \eta_{2N}=0\}} \eta_{i_n} \dots \eta_{i_1}, \end{aligned} \quad (0-8)$$

利用

$$\frac{\partial \eta_{i\sigma}(\tau)}{\partial \eta_{j\sigma'}(\tau')} = \delta_{ij} \delta_{\sigma\sigma'} \delta(\tau - \tau') \quad (0-9)$$

以及有效作用量的定义式, 可以计算各阶偏导数的表达式:

$$\begin{aligned} -e^{-S_{\text{eff}}} \int d\tau \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \eta_{i_1\sigma}} &= \int \prod_{k \neq o} \prod_{\sigma} Dc_{k\sigma}^* Dc_{k\sigma} e^{-S} \left[- \int d\tau c_{i_1\sigma}^* \right] \\ \Rightarrow \int d\tau \left[e^{-S_{\text{eff}}} \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \eta_{i_1\sigma}} \right] &= \int d\tau \left[\int \prod_{k \neq o} \prod_{\sigma} Dc_{k\sigma}^* Dc_{k\sigma} e^{-S} c_{i_1\sigma}^* \right], \end{aligned} \quad (0-10)$$

从中得到

$$\left. \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \eta_{i_1}} \right|_{\{\eta_1, \dots, N, \eta_1^*, \dots, N=0\}} = \frac{\int \prod_{k \neq o} \prod_{\sigma} Dc_{k\sigma}^* Dc_{k\sigma} e^{-S^{(o)}} c_{i_1\sigma}^*}{\int \prod_{k \neq o} \prod_{\sigma} Dc_{k\sigma}^* Dc_{k\sigma} e^{-S^{(o)}}} \quad (0-11)$$

$$= \langle c_{i_1\sigma}^*(\tau_{i_1}) \rangle^{(o)},$$

但是奇数阶 Grassmann 变量的期望值都是 0, 所以这里得到的一阶导为零。再求一次导, 得到

$$\left. \frac{\partial^2 L_{\text{eff}}}{\partial \eta_{i_1} \partial \eta_{j_1}^*} \right|_{\{\eta_1, \dots, N, \eta_1^*, \dots, N=0\}} = - \left. \frac{\partial^2 L_{\text{eff}}}{\partial \eta_{i_1}^* \partial \eta_{j_1}} \right|_{\{\eta_1, \dots, N, \eta_1^*, \dots, N=0\}} \quad (0-12)$$

$$= -\langle c_{j_1\sigma}(\tau_{j_1}) c_{i_1\sigma}^*(\tau_{i_1}) \rangle^{(o)}$$

$$= -G^{(o)}(\tau_{j_1}, \tau_{i_1}).$$

同理, 应有

$$\left. \frac{\partial^{2n} L_{\text{eff}}}{\partial \eta_{j_1\sigma}^* \cdots \partial \eta_{j_n}^* \partial \eta_{i_1} \cdots \partial \eta_{i_n}} \right|_{\{\eta_1, \dots, N, \eta_1^*, \dots, N=0\}} = (-1)^n G^{(o)}(\tau_{j_1} \cdots \tau_{j_n}, \tau_{i_1} \cdots \tau_{i_n}). \quad (0-13)$$

在 Taylor 展开式中, 首先, 只考虑 $\eta\eta^*$ 耦合, 不考虑 $\eta\eta$ 和 $\eta^*\eta$ 耦合, 其次, $2n$ 个 Grassmann 变量换序时会产生符号变化 $(-1)^n$ 与上式的符号抵消, 最后, 对应每一阶 n , 确定了 $i_1, \dots, i_n, j_1, \dots, j_n$ 的取值后, 应有 $n!$ 种排列组合方式, 写成正规形式后可以合并为一项。这样, 展开式可以表示为

$$S_{\text{eff}} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\langle i_1, \dots, i_n=1 \rangle}^N \sum_{\langle j_1, \dots, j_n=1 \rangle}^N \int \frac{\partial^{2n} L_{\text{eff}}}{\partial \eta_{i_1} \cdots \partial \eta_{i_n} \partial \eta_{j_1}^* \cdots \partial \eta_{j_n}^*} \Big|_{\{\eta_1, \dots, \eta_N^*=0\}} \eta_{j_n}^* \cdots \eta_{j_1}^* \eta_{i_n} \cdots \eta_{i_1}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i_1 \cdots j_n} \int \eta_{i_1}^*(\tau_{i_1}) \cdots \eta_{i_n}^*(\tau_{i_n}) \eta_{j_1}(\tau_{j_1}) \cdots \eta_{j_n}(\tau_{j_n}) G_{i_1 \cdots j_n}^{(o)}(\tau_{i_1} \cdots \tau_{i_n}, \tau_{j_1} \cdots \tau_{j_n}) + S_o + \text{const.} \quad (0-14)$$

其中, 忽略了 $\eta_{i\sigma}(\tau)$ 的自旋指标和对 τ 的依赖关系。此即综述中 (34) 式。在大维度极限 $D \rightarrow \infty$ 下, 可以证明, 各阶展开中, 只有 $n=1$ 项保留下来, 其他高阶项快速衰减。于是有效作用量可以简化为

$$S_{\text{eff}} = S_o + \int_0^\beta d\tau \int_0^\beta d\tau' \sum_{\sigma} c_{i\sigma}^*(\tau) \left[\sum_{ij} t_{oi} t_{oj} G_{ij}^{(o)}(\tau - \tau') \right] c_{o\sigma}(\tau'), \quad (0-15)$$

中括号内的表达式被称为动力学平均场。整个积分式描写了周围格点对 o 格点的影响。另外, S_o 的表达式为

$$S_o = \int_0^\beta d\tau \sum_{\sigma} \left[c_{o\sigma}^*(\tau) \left(\frac{\partial}{\partial \tau} - \mu \right) c_{o\sigma}(\tau) \right] + \int_0^\beta d\tau [U n_{o\uparrow}(\tau) n_{o\downarrow}(\tau)]. \quad (0-16)$$

由单杂质安德森模型

$$H_{\text{SAIM}} = \epsilon_d \sum_{\sigma} d_{\sigma}^{\dagger} d_{\sigma} + \sum_{k\sigma} \left[\epsilon_k c_{k\sigma}^{\dagger} c_{k\sigma} + V_k \left(d_{\sigma}^{\dagger} c_{k\sigma} + c_{k\sigma}^{\dagger} d_{\sigma} \right) \right] + U n_{\uparrow}^d n_{\downarrow}^d, \quad (0-17)$$

对应的杂质作用量为

$$S_{\text{imp}}[d_{\sigma}^*, d_{\sigma}] = \int_0^{\beta} d\tau \int_0^{\beta} d\tau' d_{\sigma}^*(\tau) [-G_0^{-1}(\tau - \tau')] d_{\sigma}(\tau') + U \int_0^{\beta} d\tau n_{\uparrow}^d(\tau) n_{\downarrow}^d(\tau). \quad (0-18)$$

上面得到的 S_{eff} 可以写成类似的形式, 即

$$\begin{aligned} S_{\text{eff}} &= \int_0^{\beta} d\tau \int_0^{\beta} d\tau' \sum_{\sigma} c_{o\sigma}^*(\tau) \left[\left(\frac{\partial}{\partial \tau} - \mu \right) \delta(\tau - \tau') + \sum_{ij} t_{oi} t_{oj} G_{ij}^{(o)}(\tau - \tau') \right] c_{o\sigma}(\tau') \\ &\quad + \int_0^{\beta} d\tau U n_{o\uparrow}(\tau) n_{o\downarrow}(\tau) \\ &= \int_0^{\beta} d\tau \int_0^{\beta} d\tau' \sum_{\sigma} c_{o\sigma}^*(\tau) \left[\delta^{(1)}(\tau - \tau') - \mu \delta(\tau - \tau') + \sum_{ij} t_{oi} t_{oj} G_{ij}^{(o)}(\tau - \tau') \right] c_{o\sigma}(\tau') \\ &\quad + \int_0^{\beta} d\tau U n_{o\uparrow}(\tau) n_{o\downarrow}(\tau), \end{aligned} \quad (0-19)$$

对比两式, 得到

$$G_0^{-1}(\tau - \tau') = \delta^{(1)}(\tau - \tau') - \mu \delta(\tau - \tau') + \sum_{ij} t_{oi} t_{oj} G_{ij}^{(o)}(\tau - \tau'), \quad (0-20)$$

人们一般也将这里的无库仑相互作用格林函数 G_0 称为 Weiss 场。这样就将晶格模型映射为了杂质模型。

在一般情况下, 格点自能应该是动量依赖的, 但在无穷维极限下, 格点自能是对角的。在这种近似下, 格点自能函数就等于空腔的自能函数, 没有动量依赖 [2]。此外, 为了自然地讲晶格模型映射到杂质模型, 要求两个体系的格点可观测量和相互作用项都对应相等, 也就是要求两个体系的自能函数相同, 因此就得到杂质自能等于空腔自能, 即

$$\Sigma_{\text{imp}}(\tau - \tau') = \Sigma_{oo}(\tau - \tau'). \quad (0-21)$$

上式等价于

$$G_{\text{imp}}(\tau - \tau') = G_{oo}(\tau - \tau'). \quad (0-22)$$

利用杂质模型的 Dyson 方程, 可以得到

$$G_{\text{imp}}(i\omega_n) = \{G_0^{-1}(i\omega_n) - \Sigma_{\text{imp}}(i\omega_n)\}^{-1}, \quad (0-23)$$

另外，在 $D = \infty$ 极限下，晶格模型的格林函数具有下面的关系式 [3]

$$G_{ij}^{(o)}(i\omega_n) = G_{ij}(i\omega_n) - \frac{G_{io}(i\omega_n)G_{oj}(i\omega_n)}{G_{oo}(i\omega_n)}, \quad (0-24)$$

以上四式已构成封闭方程组。在实际计算中，人们还需要作进一步简化处理，在此暂时不加赘述。

以上是在平衡态体系下推导出的 DMFT 自洽方程。非平衡体系的 DMFT 可以看作在此基础上的一个推广，形式上与平衡态类似，所有的格林函数和自能都表示为双时格林函数。与平衡态对应的杂质自能为

$$\Sigma_{\text{imp}}(t, t') = \Sigma_{oo}(t, t'), \quad (0-25)$$

但非平衡框架下的 DMFT 自洽方程组具有完全不同的物理意义：

参考文献

- [1] Metzner W, Vollhardt D. Correlated lattice fermions in $d = \infty$ dimensions [J/OL]. Phys. Rev. Lett., 1989, 62: 324-327. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.62.324>.
- [2] Müller-Hartmann E. Correlated fermions on a lattice in high dimensions [J/OL]. Zeitschrift für Physik B Condensed Matter, 1989, 74: 507-512. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01311397>.
- [3] Byczuk K, Vollhardt D. Correlated bosons on a lattice: Dynamical mean-field theory for bose-einstein condensed and normal phases [J/OL]. Phys. Rev. B, 2008, 77: 235106. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.77.235106>.