生成AI活用における
データの重要性

～データ初心者の視点から～

松本　隆仁

・自己紹介

- 生物系大学院を修了後、化学分析の業務や人材紹介会社の営業などを経験
- 大前研一氏の著書「50代からの『稼ぐ力』」に影響されてAIの学習を始める
- 当初は全く未経験だったプログラミングの学習に苦労
- 生成AIの登場で、AIアプリやデータサイエンス分野にチャレンジする

ハッカソンに参加

- 「都知事杯オープンデータ・ハッカソン2026」に参加

テーマ：「ツキノワグマ出没予測アプリの開発」

内容：近年ツキノワグマが出没する東京都奥多摩地区を対象に、気象データを基に市町村単位での出没を予測するアプリの開発。

これまではツキノワグマのエサであるブナやクリの量の多少による予測が中心であったが、より精密なデータを提供することによって人への被害を減らすことを目的に行った。

natsu/Desktop/都知事杯ハッカソン26/hinode_kuma_risk.html

入力項目

5 INDICATORS · OKUNO

1 対象月

10月

最も影響の大きい指標です（過去データの季節パターンに基づく）

2 前月の平均気温

25.4 ℃ 平年値を入力

前月が平年より暑いと、当月のリスクがやや上がる傾向

3 今年の夏（6〜8月）の猛暑日数

30 日（最高気温35℃以上）

参考値：2023年24日／2024年29日／2025年39日

4 クリの豊凶

○ 凶作 ● 並作 ○ 豊作

クリが不作の年ほど、クマが人里近くまで食料を探しに出てくる傾向

5 前月の無降水日数

18 日 平年値を入力

補助的な指標。夏場に平年より乾燥した月が続くとわずかにリスクを押し上げます


予測結果
RISK INDEX 0-100
80
リスクインデックス（0〜100の目安値）
リスク：高
内訳（各項目の寄与）
① 対象月 45.0
② 前月気温 9.8
③ 夏の猛暑日数 7.5
④ クリの豊凶 7.5
⑤ 前月無降水日数 2.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.0 5.7 1.7 1.3 6.0 2.3 1.3
参考：大久野地区の月別平均出没件数（2023〜2025年度実績の平均）

結果

- 1次審査にて落選

・落選理由の分析

とにかくデータ不足

ツキノワグマのデータが2023年からの3年分しかなかった
Claudecodeでも少なくとも10年分のデータが必要との指摘

説明変数は適切か

説明変数には天気や気温などの気象データとエサの多少でアプリの作成を試みたが、出没場所の標高や人里か山里かなどのデータが不足なのでは

※このアプリは近日Noteにアップ予定　　Takahito Matsumoto

結論

よりよい分析を行うためには、
・データの量を集めること
・データを幅広く集めること

ご清聴
ありがとうございました