SCHEDA TECNICA DEL RELATORE

# Dall’entropia al controllo

Versione 3.2 · Formule, numeri e limitazioni in una pagina

## 1 | Il dato osservato: iscritti ufficiali per regione

Quota regionale: $s_i$ = $iscritti_i$ / 156.456. Entropia normalizzata: $H(s) = -\Sigma s_i \ln(s_i) / \ln(20)$. Sul dataset regionalizzato: H(s) = 0,898449. L’elettorato di riferimento ha H(q) = 0,886090.

## 2 | Scostamento dal riferimento geografico

$KL(s \,||\, q) = \Sigma s_i \ln(s_i / q_i)$. Per gli iscritti la divergenza è circa 0,0272 nats. Zero indica distribuzioni identiche. Da questa vicinanza non segue alcuna previsione di voto.

## 3 | Scenario matematico, non previsione validata

$p_i = 0{,}35\, f_i + 0{,}25\, v_i + 0{,}25\, s_i + 0{,}15\, m_i$; indice territoriale $w_i = p_i/q_i$; quota di scenario $S_i = S \cdot w_i$, con S = 7,2% rilevato su base nazionale. È una redistribuzione condizionata, non un sondaggio regionale.

## 4 | Monitoraggio dinamico

$\Delta H = H(t) - H(t\text{-}1)$. Con $s_i(t)$ normalizzata, $dH/dt = -\Sigma\, \dot{s}_i \ln(s_i)/\ln(20)$, perché $\Sigma\, \dot{s}_i = 0$. La divergenza Jensen–Shannon misura lo spostamento geografico fra mesi anche a entropia invariata.

## 5 | Come si verifica l’utilità predittiva

Confrontare le stime datate 18/10/2026 con risultati futuri indipendenti e comparabili: errori ponderati (WMAE), benchmark semplice e copertura empirica degli intervalli. Nessun errore di previsione o probabilità di vittoria è oggi misurabile.

### Frase rigorosa per il relatore

«L’entropia descrive la distribuzione degli iscritti e dello scenario ipotizzato. La loro evoluzione nel tempo potrà essere monitorata; il valore predittivo sarà verificato soltanto su dati elettorali indipendenti.»