



DES MÉDICAMENTS DE QUALITÉ, ACCESSIBLES À TOUS

STOMASEPTINE° SOLUTION

Solution pour bain de bouche, 100 ml

Hexétidine 0,1%





INDICATIONS

Aphtes, autres affections de la Muqueuse buccale

POSOLOGIE

Rinçage de la bouche ou gargarisme Pur ou dilué, 2 à 3 fois par jour

PRÉCAUTIONS

Ne pas avaler, Déconseillée pendant Le premier trimestre de la grossesse

Médicament en libre accès

CUKAVIT C

SIROP 100ml





Médicaments en libre accès

INDICATIONS

- Troubles tonus, fatigues, surmenage, convalescence.
- Retards de la marche et de la dentition
- États grippaux, anémies Infections, anorexies
- États de précarence et de carence en vitamine C

POSOLOGIE

- ENFANTS : 1 cuillère à café (5ml),
 2 fois par jour
 (le matin et le soir, de préférence après les repas)
- ADULTES : 1 cuillère à soupe (10 ml),
 2 fois par jour

PRÉCAUTIONS

Ne pas dépasser la dose recommandée, sauf avis médical.

CUKalugel

Suspension

100 ml





Médicaments sur ordonnance

INDICATIONS

- > indigestion
- > Dyspepsie
- > Flatulence
- > Douleur d'estomac

CONSERVATION:

Le médicament doit être conservé Dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière à une température de Moins de 30°C

POSOLOGIE:

Selon la prescription médicale

CUKether

POUR ADULTE

80/480MG





Médicaments par prescriptions médicale

COMPOSITION

Artemether......80/480 mg
Lumefantrine......480mg
Excipients QSP......1 comprimé

INDICATIONS

Antipaludéen curatif, ce Médicaments est indiqué dans le Traitement de la maladie causée Par toute le forme de plasmodium

POSOLOGIE

Adulte et enfant de 35kg et plus 2 x 1 comprimé par jour pendant 3 jours

Conservation

A Conserver à une température De moins de 30°C et tenir hors de La portée des enfants

CUKether

POUR ENFANT

20 mg/120 mg





Médicaments sur ordonnance

COMPOSITION:1 comprimé

Artemether......20/120 mg
Lumefantrine......120mg
Excipients QSP......1 comprimé

INDICATIONS

Antipaludéen curatif, ce Médicaments est indiqué dans le Traitement de la maladie causée Par toute le forme de plasmodium

POSOLOGIE

Enfant de 10 kg et plus 2 x 1 Comprimé par jour pendant 3 jours

CONSERVATION

A Conserver à une température De moins de 30°C et tenir hors de La portée des enfants

KOSOCUK

Sirop

100 ml

CUK Cliniques Universitaires de Kinshasa





INDICATIONS

Contre la toux sèche

COMPOSITION

Chlorphéniramine maléate: 2 mg Chlorure d'ammonium: 100 mg Excipients aromatisés qsp: 5 ml

CONSERVATIONS

Conserver au frais et ne pas laisser à la portée des enfants.

POSOLOGIE

Nourrissons:1½c.à c.2 à 3 fois

par jour

Enfants:1c.à c. 2 à 3 fois par jour Adultes:1c.à s. 2 à 3 fois par jour

CUK

Cliniques Universitaires de Kinshasa

ARGYROL 0,5%

8 ml







INDICATIONS

Décongestionnant nasal

COMPOSITION

Vitellinate d'argent0,5 (P/V)

CONSERVATION

Le médicament doit être conservé dans un endroit frais et sec. À une température de moins de 25°C

POSOLOGIE

Selon la prescription Médicale

CUK

Cliniques Universitaires de Kinshasa

ARGYROL 1%

6 8 ml





MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE

INDICATIONS

Décongestionnant nasal

COMPOSITION

Vitellinate d'argent.....1% (P/V)

CONSERVATION

Le médicament doit être conservé dans un endroit frais et sec. À une température de moins de 25°C

Tenir hors de la portée des enfants

POSOLOGIE


Selon la prescription médicale

CUK

Cliniques Universitaires de Kinshasa

ARGYROL 2% 8 ml





Médicaments sur ordonnance

INDICATIONS

Décongestionnant nasal

COMPOSITION

Vitellinate d'argent.....2% (P/V)

CONSERVATION

Le médicament doit être conservé dans un endroit frais et sec. À une température de moins de 25°C

POSOLOGIE

Selon la prescription médicale