



Асоціація аритмологів України

Ukrainian association of arrhythmologists

03680, МСП м.Київ-151, вул. Народного ополчення, 5

Тел.: +38 044 275-66-22

Факс: +38 044 275-42-09; 249-70-08

E-mail: stragh@bigmir.net

5, Narodnogho opolchenia Str., Kyiv, Ukraine, 03680

Tel: +38 044 275-66-22

Fax.: +38 044 275-42-09; 249-70-08

E-mail: stragh@bigmir.net

Надаємо інформацію щодо дослідження Вашого виробу в багатоцентровому дослідженні **«Досвід застосування води мінеральної лікувально-столової «Джерело Якова» слабогазованої у пацієнтів з пароксизмальною формою фібриляції передсердь та шлунково-кишковими захворюваннями».**

Згідно дослідження можна зробити такі висновки:

1. Додавання до стандартної терапії води мінеральної лікувально-столової “Джерело Якова” слабогазованої у пацієнтів з хронічним гастритом з пониженою та збереженою секреторною і моторноевакуаторною функцією шлунку у стадії субкомпенсації дозволяє значно підвищити ефективність стандартної терапії вже на 10 день її прийому та досягнути відсутності суб’єктивних ознак захворювання у 40 % учасників наприкінці отриманого курсу лікування на фоні високого комплаєнсу та відсутності побічних реакцій.
2. Виявлено, що наявність хронічного гастриту з пониженою та збереженою секреторною і моторноевакуаторною функцією шлунку у стадії субкомпенсації у пацієнтів з міокардіофіброзом та пароксизмальною формою ФП асоціюється з вегетативним дисбалансом за рахунок переваги парасимпатичного впливу, що підтверджується характерними змінами статичних та спектральних показників ВСР.
3. Встановлено, що додавання до стандартної терапії у пацієнтів з міокардіофіброзом та надшлуночковими порушеннями серцевого ритму в сполученні з хронічним гастритом з пониженою та збереженою секреторною і моторноевакуаторною функцією шлунку у стадії субкомпенсації води мінеральної лікувально-столової “Джерело Якова” слабогазованої, сприяє достовірному зниженню показників статичних та спектральних показників ВСР та їх нормалізації наприкінці спостереження порівняно з групою контролю, що асоціюється з нормалізацією симпатовагального балансу та супроводжується достовірним зниженням проявів суправентрикулярних порушень ритму серця через 1 місяць лікування та збільшенню до 75 % пацієнтів з класом I та ІІА за EHRA.
4. Доведено, що використання психометричних шкал у пацієнтів з шлунково-кишковими та серцево-судинними захворюваннями є перспективним та необхідним додатковим методом обстеження даного контингенту, який дозволяє виявити у 70 % хворих наявність психоемоційних розладів, за рахунок корекції яких можливо підвищити ефективність патогенетичної терапії.
5. Призначення води мінеральної лікувально-столової “Джерело Якова” слабогазованої до стандартної терапії у пацієнтів з ознаками вегетативної дисфункції на фоні міокардіофіброзу, НШПР та шлунково-кишкових захворювань сприяє значному зниженню проявів симптомів тривожності та депресії, покращенню соматичного стану за результатами шкали опитування HADS, зниженню психоемоційного напруження, обумовленого наявністю хронічної стресової ситуації.

Наукова стаття додається.

Президент Асоціації аритмологів України
Професор, д.мед. наук

Секретар Асоціації аритмологів України
К.м.н.



О.С. Сичов

О.М. Романова