

题目	名称	Geographical Location(%)		总计	χ^2	p
		East Asia	North America			
Leptomeningeal Dissemination	N	666(87.52)	64(72.73)	730(85.98)	14.315	0.000**
	Y	95(12.48)	24(27.27)	119(14.02)		
	总计	761	88	849		

* p<0.05 ** p<0.01

分析建议

目

卡方分析研究X(定类)与Y(定类)的差异，比如两种药物(旧药和新药)的治疗效果(治愈和未治愈)差异。

第一：分析X分别与Y之间是否呈现出显著性(p 值小于0.05或0.01)；

第二：如果呈现出显著性，具体对比选择百分比(括号内值)，描述具体差异所在；

第三：对分析进行总结。

【特别提示：卡方分析共有Pearson卡方、连续校正Yates卡方和Fisher卡方等统计量；需要结合R*C交叉类型，总样本数，以及期望频数情况选择对应的统计量；这一选择过程已经被SPSS AU自动化处理，详细选择过程可参阅帮助手册】

智能分析

目

从上表可知，利用卡方检验(交叉分析)去研究Geographical Location对于Leptomeningeal Dissemination共1项的差异关系【独立性】，从上表可以看出：不同Geographical Location样本对于Leptomeningeal Dissemination共1项呈现出显著性($p<0.05$)，意味着不同Geographical Location样本对于Leptomeningeal Dissemination共1项均呈现出差异性。


总结可知：不同Geographical Location样本对于Leptomeningeal Dissemination全部均呈现出显著性差异。

【特别提示：卡方分析共有Pearson卡方、连续校正Yates卡方和Fisher卡方等统计量；需要结合R*C交叉类型，总样本数，以及期望频数情况选择对应的统计量；这一选择过程已经被SPSS AU自动化处理，详细选择过程可参阅帮助手册】

Leptomeningeal Dissemination

编辑 堆积柱形图 柱形图 堆积条形图 条形图 数据

Geographical Location和Leptomeningeal Dissemination的交叉图



下载 Aa 样式

卡方检验统计量过程值

项	名称	值
	Pearson卡方	14.315($p = 0.000^{**}$)
	连续校正Yates卡方	13.114($p = 0.000^{**}$)
	Fisher卡方	2.629($p = 0.001^{**}$)
	$E \geq 5$	4(100.00%)
Geographical Location * Leptomeningeal Dissemination(2*2)	$1 \leq E < 5$	0(0.00%)
	$E < 1$	0(0.00%)
	Cnt	4
	n	849
	自由度df 值	1

* p<0.05 ** p<0.01



分析建议



上表格展示信息包括：

统计量值：Pearson卡方、连续校正Yates卡方和Fisher卡方这三个统计量及对应p值；期望频数信息：小于1，介于1~5之间，或者大于5的格式个数及占比；
卡方检验时，需要结合期望频数信息，R*C交叉类型等选择最终的统计量和p值。这一选择过程已经被SPSSAU自动化处理，详细选择过程可参阅帮助手册【非专业用户建议忽略】。

深入分析-效应量指标



分析项	Phi	列联系数	校正列联系数	Cramer V	Lambda
Leptomeningeal Dissemination	0.130	0.129	0.182	0.130	0.000

分析建议



如果卡方检验显示呈现出显著性差异($p<0.05$)，可通过百分比对比具体差异,同时还可使用效应量(Effect size)研究差异幅度情况；

第一：卡方检验时有多种指标(SPSSAU提供五类)可表示效应量，可结合数据类型及交叉表格类型综合选择；

第二：如果是2*2表格，建议使用Phi指标；

第三：如果是3*3,或4*4表格，建议使用列联系数；

第四：如果是n*n(n>4)表格，建议使用校正列联系数；

第五：如果是m*n(m不等于n)表格，建议使用Cramer V指标；

第六：如果X或Y中有定序数据，建议使用Lambda指标；

第七：效应量值越大说明差异幅度越大，通常情况下效应量小、中、大的区分临界点分别是: 0.20,0.50和0.80，可使用建议查阅帮助手册。

Geographical Location*Leptomeningeal Dissemination多重比较



比较	名称	East Asia	North America	χ^2	p
第1次	N	666	64	14.315	0.000**
	Y	95	24		

* $p<0.05$ ** $p<0.01$

比较次数：1

分析建议



卡方检验多重比较指两两类别组合（每个组合共4个数字）重复进行卡方检验；

第一：多重比较的次数= $C(X\text{类别个数}) * C(Y\text{类别个数})$ ，比如X类别为3，Y类别个数为5，则为 $C(3,2) * C(5,2)=30$ 次；

第二：SPSSAU仅针对第1个Y进行，可通过更换Y的位置实现其它分析项的多重比较，X或Y的选项个数大于10时不进行多重比较；

第三：多重比较时提供的是Pearson卡方检验；

第四：多重比较时，检验次数增多会增加一类错误的概率，建议使用校正显著性水平(Bonferroni校正)；

第五：如果显著性水平为0.05，并且两两比较次数为3次，那么Bonferroni校正显著性水平为 $0.05/3=0.0167$ ，即p值需要与0.0167进行对比，而不是0.05；

【特别提示：多重比较通常在医学研究中使用，且类别数量较少时使用】

Cochran-Armitage 趋势卡方检验



项	z值	χ^2 值	df	p值
Geographical Location * Leptomeningeal Dissemination(2*2)	3.781	14.298	1	0.000

分析建议



Cochran-Armitage 趋势卡方检验(Linear-by-Linear)研究k*2(或2*k)列联表数据的趋势差异关系；

第一：Cochran-Armitage 趋势卡方检验通常用于k*2(或2*k)的列联表结构,k为有序定类数据,2指两个类别；

第二：如果p值小于0.05则说明k组间呈现出某种趋势变化；

第三：如果p值大于0.05则说明k组间不会呈现出趋势变化；

第四：SPSSAU默认均提供趋势卡方检验(Linear-by-Linear)结果，但需要注意使用此指标的前提条件。

参考文献



【1】The SPSSAU project (2023). SPSSAU. (Version 23.0) [Online Application Software]. Retrieved from <https://www.spssau.com>.

【2】Clegg F. Introduction to statistics. III: Correlation, chi-square and the choice of statistical procedure.[J]. Br J Hosp Med, 1988, 40(5).

【3】颜虹,徐勇. 医学统计学.第3版[M].人民卫生出版社,2017.