

Cálculo Multivariable: Apuntes de Clase

Levario Medina Sergio
Hernández Jiménez Irmin

12 de julio de 2026

Índice

1. Sistemas coordenados	5
1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$)	5
1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$)	5
1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha	6
1.2.2. Localización de un punto en el espacio	6
2. Vectores	7
2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$	7
2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación	7
2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres	7
2.3. Multiplicación por un escalar	8
2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$	8
2.5. Sustracción de vectores	9
2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$	9
2.7. Propiedades fundamentales de los vectores	10
2.8. Magnitud de un vector	10
2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras	10
2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$	11
2.9. Distancia entre dos vectores	11
2.10. Vectores unitarios	12
2.10.1. Normalización de un vector	12
2.10.2. Vectores unitarios canónicos	13
2.11. Ejercicios	13
3. Producto punto	16
3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$	16
3.0.2. Propiedades del Producto Punto	16
3.1. Ángulo entre Dos Vectores	17
3.1.1. Visualización y Demostración	17
3.2. Vectores ortogonales	18
3.3. Cosenos directores	18
3.4. Proyección Vectorial	19
3.4.1. Magnitud del vector proyección	21
3.5. Ejercicios	21

3.6.	El Producto Vectorial de Gibbs (Producto Cruz)	23
3.6.1.	Naturaleza y Origen Histórico	23
3.6.2.	Dimensionalidad del Producto Vectorial	23
3.6.3.	Definición Algebraica en $\mathbb{R}^3$	23
3.6.4.	Interpretación Geométrica y Regla de la Mano Derecha	24
3.6.5.	Propiedades Algebraicas del Producto Vectorial	25
3.6.6.	Magnitud del Producto Vectorial	25
3.6.7.	Condición de Paralelismo	26
3.7.	Productos Triples	27
3.7.1.	El Triple Producto Escalar	27
3.7.2.	El Triple Producto Vectorial	27
3.8.	Aplicaciones geométricas	30
3.8.1.	Área de un paralelogramo	30
3.8.2.	Volúmen de un paralelepípedo	31
3.9.	Ejercicios	31
4.	Rectas en el espacio	34
4.1.	Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^n$	34
4.1.1.	Ecuación Vectorial	34
4.1.2.	Ecuaciones Paramétricas y Simétricas en $\mathbb{R}^3$	35
4.1.3.	Derivación del Segmento de Recta	35
4.2.	Intersección entre Rectas en $\mathbb{R}^3$	36
4.3.	Distancia de un Punto a una Recta	38
4.4.	Ejercicios	39
5.	Planos en el Espacio	41
5.1.	Ecuación escalar y general	41
5.2.	Determinación de un Plano dados Tres Puntos	41
5.3.	Intersecciones Espaciales	42
5.3.1.	Intersección de un Plano con una Recta	42
5.3.2.	Intersección entre dos Planos	43
5.4.	Distancia de un Punto a un Plano	43
5.5.	Ejercicios	44
6.	Superficies cilíndricas	47
6.1.	Definición	47
6.2.	Cómo graficar una superficie cilíndrica	47
6.2.1.	Cilindro circular: $x^2 + y^2 = 1$	47
6.2.2.	Cilindro parabólico: $z = x^2$	48
6.3.	Ejercicios	48
7.	Superficies cuádricas	51
7.1.	Definición y forma general	51
7.2.	Método de las trazas	51
7.3.	Elipsoide	51
7.4.	Paraboloide elíptico	52
7.5.	Paraboloide hiperbólico	53
7.6.	Cono elíptico	54
7.7.	Hiperboloide de una hoja	55

7.8.	Hiperboloide de dos hojas	55
7.9.	Resumen de superficies cuádricas	56
7.10.	Ejercicios	57
8.	Funciones Vectoriales	60
8.1.	Definición y Dominio	60
8.2.	Límites y Continuidad	60
8.3.	Representación Gráfica	60
8.3.1.	Curvas planas en $\mathbb{R}^2$	61
8.3.2.	La hélice circular en $\mathbb{R}^3$	61
8.4.	Derivadas de Funciones Vectoriales	62
8.4.1.	Interpretación geométrica	62
8.4.2.	Reglas de derivación	62
8.5.	Integrales de Funciones Vectoriales	63
8.6.	Cinemática Vectorial	63
8.6.1.	Posición, velocidad y aceleración	63
8.6.2.	Longitud de arco	65
8.6.3.	Parámetro de longitud de arco	66
8.7.	Los vectores $\hat{T}$, $\hat{N}$ y $\hat{B}$ de Frenet-Serret	66
8.7.1.	Vector tangente unitario $\hat{T}$	67
8.7.2.	Curvatura κ	67
8.7.3.	Vector normal principal $\hat{N}$	67
8.7.4.	Vector binormal $\hat{B}$	68
8.7.5.	Resumen del triedro de Frenet-Serret	68
8.7.6.	Descomposición de la aceleración	68
8.8.	Ejercicios	69
9.	Funciones escalares	72
9.1.	Definición	72
9.2.	Dominio y Rango	72
9.3.	Gráfica de funciones con dominio en $\mathbb{R}^2$	73
9.4.	Curvas de nivel de funciones con dominio en $\mathbb{R}^2$	74
9.5.	Superficies de nivel de funciones con dominio en $\mathbb{R}^3$	75
9.6.	Ejercicios	76
10.	Límites y Continuidad de Funciones Escalares	79
10.1.	Definición formal del límite	79
10.1.1.	Interpretación geométrica de la definición ε - δ	79
10.2.	Propiedades algebraicas del límite	80
10.3.	Cálculo de límites	80
10.3.1.	Estrategia 1: Sustitución directa	80
10.3.2.	Estrategia 2: Método de trayectorias	80
10.3.3.	Estrategia 3: Coordenadas polares	81
10.3.4.	Teorema del emparedado	82
10.4.	Continuidad	83
10.4.1.	Funciones continuas elementales	83
10.4.2.	Extensión continua de una función	83
10.4.3.	Discontinuidades y su clasificación	83
10.5.	Ejercicios	84

11. Derivadas Parciales	87
11.1. Definición	87
11.2. Notaciones	87
11.3. Cálculo de derivadas parciales	88
11.4. Interpretación geométrica y conceptual	88
11.5. Generalización para n variables	89
11.6. Derivadas parciales de orden superior	89
11.7. Teorema de Clairaut	90
11.8. Ejercicios	90
12. Planos Tangentes	92
12.1. Derivación de la ecuación	92
12.2. Aproximación lineal	92
12.3. Diferencial total	93
12.4. Ejercicios	95
13. Regla de la Cadena	97
13.1. Diagrama de árbol	97
13.2. La regla de la cadena	98
13.2.1. Caso 1: una variable paramétrica	98
13.2.2. Caso 2: dos variables paramétricas	98
13.2.3. Caso general	98
13.3. Derivación implícita	99
13.4. Ejercicios	100
14. Derivada Direccional y Vector Gradiente	103
14.1. Derivada direccional	103
14.2. Vector gradiente	104
14.3. Generalización para n variables	105
14.4. Maximización de la derivada direccional	105
14.5. Ejercicios	106
15. Máximos y Mínimos de Funciones de Varias Variables	108
15.1. Máximos y mínimos locales	109
15.2. Criterio de la segunda derivada	109
15.3. Máximos y mínimos absolutos en una región D	110
15.4. Ejercicios	111
16. Multiplicadores de Lagrange	113
16.1. Qué es y para qué sirve	113
16.2. Método para una restricción	113
16.3. Método para dos restricciones	115
16.4. Ejercicios	117

1. Sistemas coordenados

El estudio del cálculo multivariable requiere entender de forma clara los espacios geométricos donde se desarrollan las funciones de varias variables. A continuación, se desarrollan los conceptos del plano y el espacio euclidiano de forma detallada.

1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$)

El sistema de coordenadas rectangulares en el plano se construye mediante dos rectas reales perpendiculares que se intersectan en un punto llamado **origen**.

Definición: El Plano $\mathbb{R}^2$

El conjunto $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Matemáticamente se define como el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:


$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

A cada par ordenado (x, y) se le denomina **punto** en el plano.

Los elementos del par ordenado tienen los siguientes nombres:

- x : Coordenada x o **abscisa**. Representa la distancia dirigida desde el eje vertical.
- y : Coordenada y u **ordenada**. Representa la distancia dirigida desde el eje horizontal.

Los ejes coordenados dividen al plano en cuatro regiones denominadas **cuadrantes**, numerados en sentido antihorario comenzando por el superior derecho (donde ambas semiejes son positivas).



1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$)

Para representar puntos en el espacio tridimensional, extendemos el concepto anterior añadiendo un tercer eje perpendicular a los otros dos.

Definición: El Espacio $\mathbb{R}^3$

El conjunto $\mathbb{R}^3$ es el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha

En ingeniería y física, es estándar utilizar un sistema de coordenadas *dextrógiro* (mano derecha).

Nota: Regla de la Mano Derecha

Si alineas los dedos de tu mano derecha en la dirección del eje x positivo y los cierras hacia el eje y positivo, tu pulgar apuntará en la dirección del eje z positivo.


En este sistema:

- El eje z suele representar la altura o la cota vertical.
- Los tres ejes definen tres **planos coordenados**:
 - **Plano xy** : Formado por los ejes x e y (donde $z = 0$).
 - **Plano xz** : Formado por los ejes x y z (donde $y = 0$).
 - **Plano yz** : Formado por los ejes y y z (donde $x = 0$).

Estos planos dividen el espacio en ocho regiones llamadas **octantes**. El primer octante es aquel donde $x, y, z > 0$.

1.2.2. Localización de un punto en el espacio

Para localizar un punto $P(a, b, c)$ en el espacio: 1. Avanzamos a unidades sobre el eje x . 2. Nos movemos b unidades paralelamente al eje y . 3. Subimos (o bajamos) c unidades paralelamente al eje z .



2. Vectores

En física e ingeniería, muchas cantidades como la temperatura o la masa pueden describirse completamente con un solo número real; a estas cantidades se les llama **escalares**. Sin embargo, cantidades como la fuerza, la velocidad o el desplazamiento requieren de una magnitud (tamaño) y una dirección espacial para estar completamente definidas. A estas cantidades las llamamos **vectores**. Geométricamente, un vector se representa como un segmento de recta dirigido (una flecha). El punto donde comienza la flecha se llama *punto inicial* (u origen) y la punta de la flecha es el *punto final*.

2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$

Aunque es fácil visualizar vectores en 2 o 3 dimensiones, en matemáticas y ciencias de la computación es común trabajar con sistemas que tienen múltiples variables o grados de libertad. Para esto, extendemos la definición geométrica a una definición algebraica de n dimensiones (o n entradas).

Definición: Vector en $\mathbb{R}^n$

Un vector $\vec{v}$ en un espacio n -dimensional ($\mathbb{R}^n$) se define como una lista ordenada de n números reales, llamados las **componentes** o **entradas** del vector. Se denota como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n)$$

Donde cada $v_i \in \mathbb{R}$ representa la magnitud del vector en la dirección del i -ésimo eje coordenado.

2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación

En el estudio del álgebra vectorial, es crucial entender que un vector está completamente definido por solo dos atributos: su **magnitud** y su **dirección**. El punto específico del espacio donde el vector comienza no altera su identidad matemática.


Esta propiedad significa que podemos tomar un vector y trasladarlo libremente a cualquier otra parte del plano o del espacio, siempre y cuando no sea girado ni estirado.

Definición: Vectores libres y equivalentes

Dos o más vectores son **equivalentes** si tienen exactamente la misma magnitud y la misma dirección. En matemáticas y en muchas aplicaciones de ingeniería, los vectores se consideran **vectores libres**, lo que significa que un vector y cualquiera de sus traslaciones en el espacio representan exactamente al mismo objeto matemático.

2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres

Aunque podemos dibujar un vector comenzando en cualquier lugar, para facilitar los cálculos algebraicos es práctica común trasladarlo para que su punto inicial coincida con el origen del sistema de coordenadas $(0, 0)$ o $(0, 0, 0)$. Cuando un vector libre comienza en el origen, se le llama **vector de posición**.




2.3. Multiplicación por un escalar

La multiplicación escalar es la operación de multiplicar un vector por un número real (escalar) κ . Geométricamente, esto altera la longitud (magnitud) del vector.


- Si $\kappa > 1$, el vector se *estira* o dilata.
- Si $0 < \kappa < 1$, el vector se *contrae*.
- Si $\kappa < 0$, el vector cambia a la *dirección opuesta* (invierte su sentido).

Sin embargo, el vector resultante siempre es paralelo al vector original (se mantiene sobre la misma línea de acción).



2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$

Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ geométricamente, se utiliza la **Regla del Paralelogramo** o el método de "punta a cola". Si colocamos el punto inicial de $\vec{v}$ en el punto final de $\vec{u}$, el vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es la flecha que va desde el origen de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$.




2.5. Sustracción de vectores

La resta de dos vectores se define algebraicamente a partir de la suma y la multiplicación escalar. Restar $\vec{v}$ de $\vec{u}$ es lo mismo que sumarle a $\vec{u}$ el negativo de $\vec{v}$:

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

Geométricamente, si graficamos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ desde el mismo origen, el vector $\vec{u} - \vec{v}$ es el vector que va desde la punta de $\vec{v}$ hasta la punta de $\vec{u}$.



2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$

Las operaciones que visualizamos en $\mathbb{R}^2$ se definen algebraicamente componente a componente para cualquier vector en $\mathbb{R}^n$.

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea $\kappa \in \mathbb{R}$ un escalar. Entonces, las operaciones fundamentales se definen como:

Definición: Operaciones vectoriales en $\mathbb{R}^n$ **1. Suma vectorial:**

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

2. Multiplicación por un escalar:

$$\kappa \vec{u} = (\kappa u_1, \kappa u_2, \dots, \kappa u_n)$$

3. Resta vectorial:

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \dots, u_n - v_n)$$

2.7. Propiedades fundamentales de los vectores

Las operaciones que definimos anteriormente siguen axiomas específicos. Estas propiedades son la base para manipular ecuaciones vectoriales en el cálculo multivariable y el álgebra lineal.

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sean κ y λ escalares (números reales). Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Álgebra Vectorial

1. **Conmutatividad de la suma:** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
2. **Asociatividad de la suma:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
3. **Elemento neutro aditivo:** Existe un vector cero $\vec{0} = (0, 0, \dots, 0)$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
4. **Inverso aditivo:** Para cada $\vec{u}$, existe un vector $-\vec{u}$ tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$
5. **Distributividad del escalar sobre suma vectorial:** $\kappa(\vec{u} + \vec{v}) = \kappa\vec{u} + \kappa\vec{v}$
6. **Distributividad del escalar sobre suma escalar:** $(\kappa + \lambda)\vec{u} = \kappa\vec{u} + \lambda\vec{u}$
7. **Asociatividad de la multiplicación escalar:** $\kappa(\lambda\vec{u}) = (\kappa\lambda)\vec{u}$
8. **Elemento neutro multiplicativo:** $1\vec{u} = \vec{u}$


2.8. Magnitud de un vector

La **magnitud**, **longitud** o **norma** de un vector es una medida escalar que representa el “tamaño” del vector. Físicamente, si el vector representa un desplazamiento, su magnitud es la distancia rectilínea entre su punto inicial y su punto final.

2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras

En el plano bidimensional ($\mathbb{R}^2$), cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$ puede visualizarse como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde los catetos están formados por las proyecciones del vector sobre los ejes x e y .

Por lo tanto, la magnitud del vector, denotada como $\|\vec{v}\|$, se calcula aplicando directamente el **teorema de pitágoras**:



2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$

Este mismo principio geométrico se extiende a dimensiones superiores utilizando la distancia euclidiana.

Definición: Norma de un vector en $\mathbb{R}^n$

Sea $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ un vector en el espacio $\mathbb{R}^n$. La magnitud o norma de $\vec{v}$ se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

2.9. Distancia entre dos vectores

En muchas aplicaciones de ingeniería, es necesario calcular la distancia en línea recta entre dos puntos en el espacio. Si consideramos que estos dos puntos están definidos por los extremos de dos vectores que parten del origen $\vec{u}$ y $\vec{v}$, podemos encontrar esta distancia utilizando las herramientas que ya se definieron: la resta de vectores y la magnitud.

Geométricamente, se sabe que la resta vectorial $\vec{v} - \vec{u}$ produce un nuevo vector que va desde la punta de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$, representando el desplazamiento exacto entre ambos puntos.

Por lo tanto, la distancia física entre los extremos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es simplemente la **magnitud de su vector diferencia**.

Definición: Distancia entre vectores en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en el espacio tridimensional. La distancia d entre sus puntos finales se define como la norma del vector diferencia $\vec{u} - \vec{v}$:


$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$$

Dado que la resta de vectores se realiza componente a componente, el vector diferencia es $(u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$. Al aplicarle la definición de magnitud, se obtiene

así por la distancia euclidiana:

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2}$$

Nota: El orden de la resta no importa para el cálculo de la distancia, ya que $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \|\vec{v} - \vec{u}\|$. Al elevar al cuadrado las diferencias de las componentes, cualquier signo negativo se vuelve positivo.



2.10. Vectores unitarios

En muchas aplicaciones de ingeniería, a menudo se requiere únicamente la dirección y el sentido en el que actúa un fenómeno (como la dirección del flujo de un fluido o la línea de acción de una fuerza), independientemente de su magnitud. Para aislar esta información, se utilizan los vectores unitarios.

Definición: Vector unitario

Un vector unitario es aquel cuya magnitud (o longitud) es exactamente igual a 1. Si se denota la magnitud de un vector $\vec{v}$ como $\|\vec{v}\|$, entonces $\vec{v}$ es unitario si:

$$\|\vec{v}\| = 1$$

Para distinguirlos del resto, a los vectores unitarios se les suele denotar con un acento circunflejo en lugar de una flecha, por ejemplo, $\hat{u}$.

2.10.1. Normalización de un vector

Cualquier vector $\vec{v}$ que no sea el vector cero puede transformarse en un vector unitario que apunte exactamente en su misma dirección. A este proceso geométrico se le llama **normalización**.

Para normalizar un vector, simplemente se multiplica por el recíproco de su propia

magnitud:

$$\hat{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

De esta manera, el vector resultante $\hat{u}$ conserva la dirección original, pero su tamaño se ha escalado para que sea exactamente 1.

2.10.2. Vectores unitarios canónicos


En los sistemas de coordenadas rectangulares, definimos vectores unitarios especiales que apuntan a lo largo de las direcciones positivas de los ejes coordenados. Estos son los vectores base fundamentales, ya que nos permiten expresar cualquier vector en el espacio como una combinación de ellos de forma sencilla (aunque existen múltiples bases para un mismo espacio, estos vectores se les considera canónicos ya que son los más comúnmente utilizados).

En el espacio $\mathbb{R}^3$, estos vectores son:

- $\hat{i} = (1, 0, 0)$ en la dirección del eje x .
- $\hat{j} = (0, 1, 0)$ en la dirección del eje y ;
- $\hat{k} = (0, 0, 1)$ en la dirección del eje z .

Gracias a esto, cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ se puede escribir algebraicamente separando sus componentes direccionales:

$$\vec{v} = v_1\hat{i} + v_2\hat{j} + v_3\hat{k}$$



2.11. Ejercicios

Realizar los cálculos en los ejercicios del 1 al 3.

1. $(8a, -2b, 13c) = (52, 12, 11) + \frac{1}{2}(?, ?, ?)$
2. $(-21, 23) - (?, 6) = (-25, ?)$
3. $(2, 3, 5) - 4\hat{i} + 3\hat{j} = (?, ?, ?)$

4. ¿Qué restricciones se deben de tener sobre x , y y z de modo que la terna (x, y, z) represente un punto sobre el eje y ? ¿Y sobre el eje z ? ¿En el plano xz ? ¿En el plano yz ?
5. Trazar los vectores $\vec{v} = (2, 3, -6)$ y $\vec{w} = (-1, 1, 1)$. En esa figura trazar $-\vec{v}$, $\vec{v} + \vec{w}$, $2\vec{v}$ y $\vec{v} - \vec{w}$.
6. Dos personas jalan horizontalmente de cuerdas atadas a un poste; el ángulo entre las cuerdas es de 60° . A jala con una fuerza de 150 lb y B jala con una fuerza de 100 lb.
 - a) La fuerza resultante es la suma vectorial de las dos fuerzas en un sistema coordenado escogido de manera conveniente. Trazar una figura a escala que represente graficamente a las tres fuerzas.
 - b) Usando trigonometría, determinar fórmulas para las componentes vectoriales de las dos fuerzas en un sistema coordenado escogido de manera conveniente. Efectuar la suma algebraica y hallar el ángulo que la fuerza resultante forma con la cuerda de A.
7. La velocidad $\vec{v}_1$ del viento es de $40\frac{mi}{h}$ de este a oeste, mientras que un aeroplano viaja con velocidad en el aire $\vec{v}_2 = 100\frac{mi}{h}$ hacia el norte. La rapidez del aeroplano respecto a la tierra es la magnitud de la suma vectorial $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$.
 - a) Hallar $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$.
 - b) Trazar una figura a escala.
8. Dado el vector $\vec{v} = (3, -4)$, calcular su magnitud $\|\vec{v}\|$ y encontrar el vector unitario $\hat{u}$ que apunta en la misma dirección que $\vec{v}$. Verificar que $\|\hat{u}\| = 1$.
9. Calcular la distancia entre los puntos $P = (1, -2, 4)$ y $Q = (3, 1, -1)$ en $\mathbb{R}^3$. Expresar el vector $\overrightarrow{PQ}$ en términos de los vectores unitarios canónicos $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$.
10. Sean $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (-1, 4, 2)$. Calcular cada una de las siguientes expresiones:
 - a) $3\vec{u} - 2\vec{v}$
 - b) $\|\vec{u} + \vec{v}\|$
 - c) $\|\vec{u}\| - \|\vec{v}\|$¿Por qué en general $\|\vec{u} + \vec{v}\| \neq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$?
11. Un dron parte del punto $A = (0, 0, 0)$ y se desplaza al punto $B = (3, 4, 0)$, luego sube verticalmente hasta el punto $C = (3, 4, 5)$.
 - a) Hallar los vectores de desplazamiento $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$.
 - b) Determinar el desplazamiento total $\overrightarrow{AC}$ como suma vectorial.
 - c) Calcular la distancia total recorrida y la distancia en línea recta entre A y C . ¿Son iguales? ¿Por qué?
12. Encontrar todos los valores del escalar $t \in \mathbb{R}$ para los cuales el vector $\vec{w} = (t, 2t-1, 3)$ tenga magnitud igual a $\sqrt{14}$.

13. Demostrar algebraicamente, usando la definición componente a componente, las siguientes propiedades del álgebra vectorial para vectores en $\mathbb{R}^n$:

a) $\kappa(\vec{u} + \vec{v}) = \kappa\vec{u} + \kappa\vec{v}$ (distributividad del escalar sobre la suma vectorial)

b) $(\kappa + \lambda)\vec{u} = \kappa\vec{u} + \lambda\vec{u}$ (distributividad del escalar sobre la suma escalar)

3. Producto punto

Hasta ahora se ha explorado la multiplicación escalar, donde al multiplicar un vector por un valor escalar se obtiene como resultado otro vector. Sin embargo, en el álgebra vectorial es posible multiplicar dos vectores entre sí.

Existen dos formas principales de multiplicar vectores en cálculo multivariable. La primera de ellas es el **producto punto**, también conocido como **producto escalar** o **producto interno**. Su principal característica es que la operación toma dos vectores y devuelve como resultado un valor escalar, no un vector.

En aplicaciones de ingeniería y física, el producto punto es una herramienta indispensable. Permite determinar de forma cuantitativa qué tanto "puntan" dos vectores en la misma dirección, calcular el trabajo mecánico realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento, o encontrar las proyecciones de un vector sobre otro.

3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$

Desde el punto de vista algebraico, el producto punto es una operación muy directa. Se calcula simplemente multiplicando las componentes correspondientes de ambos vectores y luego sumando esos resultados parciales.

Definición: Producto Punto en $\mathbb{R}^n$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ dos vectores en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$. El producto punto de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, denotado por el símbolo de un punto centrado $\vec{u} \cdot \vec{v}$, se define como el escalar resultante de:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$$

De forma compacta, utilizando la notación de sumatoria, se expresa como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

3.0.2. Propiedades del Producto Punto

Al igual que las operaciones aritméticas básicas, el producto punto obedece a ciertas leyes algebraicas que nos permiten manipular y simplificar ecuaciones vectoriales. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades Algebraicas del Producto Punto

1. **Conmutatividad:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. **Asociatividad con un escalar:** $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (c\vec{v})$
4. **Propiedad del vector cero:** $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$
5. **Relación con la magnitud:** El producto punto de un vector consigo mismo

es igual al cuadrado de su magnitud:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2 \quad \text{o bien} \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

3.1. Ángulo entre Dos Vectores

Aunque definimos el producto punto de forma algebraica multiplicando componentes, su verdadera utilidad en ingeniería y física radica en su interpretación geométrica. El producto punto nos revela la relación angular entre dos vectores.

Si colocamos dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de modo que compartan el mismo origen, estos formarán un ángulo θ entre ellos, donde $0 \leq \theta \leq \pi$.

Teorema: Ángulo entre vectores

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces el producto punto está dado geoméricamente por:


$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

De esta fórmula se puede despejar el ángulo θ para calcularlo a partir de las componentes de los vectores:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

3.1.1. Visualización y Demostración

Para demostrar este teorema, se utilizará la geometría del triángulo formado por los vectores y se aplicará la **Ley de los Cosenos**.



Demostración mediante la Ley de los Cosenos. Considere un triángulo cuyos lados están formados por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y el vector diferencia $\vec{v} - \vec{u}$. Las longitudes de los lados de este triángulo son exactamente las magnitudes de estos vectores: $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ y $\|\vec{v} - \vec{u}\|$.

Aplicando la Ley de los Cosenos a este triángulo para relacionar los lados con el ángulo θ , se tiene:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Ahora, se reescribe el lado izquierdo de la ecuación utilizando la propiedad que relaciona la magnitud con el producto punto ($\|\vec{x}\|^2 = \vec{x} \cdot \vec{x}$):

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = (\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u})$$

Aplicando la propiedad distributiva del producto punto, se desarrolla este binomio:

$$(\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = \vec{v} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{u}$$

Usando la propiedad conmutativa ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$) y convirtiendo de vuelta a magnitudes:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2$$

Se iguala esta expresión algebraica con la ecuación geométrica obtenida de la Ley de los Cosenos:

$$\|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Restando $\|\vec{u}\|^2$ y $\|\vec{v}\|^2$ de ambos lados, la ecuación se simplifica notablemente a:

$$-2(\vec{u} \cdot \vec{v}) = -2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Finalmente, dividiendo ambos lados entre -2 , se llega a que:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

□

3.2. Vectores ortogonales

Una de las consecuencias más útiles del teorema del ángulo entre dos vectores es que nos proporciona una prueba algebraica para determinar si dos vectores son perpendiculares entre sí.

Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales, el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = \frac{\pi}{2}$ radianes.

Sustituyendo este valor en nuestra fórmula geométrica:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

Dado que $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, toda la expresión de la derecha se anula.

Teorema: Condición de ortogonalidad

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales si y solo si su producto punto es igual a cero:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Por convención matemática, se considera que el vector cero ($\vec{0}$) es ortogonal a cualquier otro vector, ya que $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$ para todo $\vec{v}$.

3.3. Cosenos directores

En el espacio $\mathbb{R}^3$, a menudo es necesario describir la dirección exacta de un vector en relación con el sistema de coordenadas. Para ello, se utilizan los **ángulos directores** α , β y γ , que son los ángulos que el vector forma con los ejes positivos x , y y z , respectivamente.

Si se toma un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y se calcula el producto punto de este vector con cada uno de los vectores unitarios canónicos ($\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$), es posible encontrar los cosenos de estos ángulos, conocidos como **cosenos directores**.

Por ejemplo, para el ángulo α con el eje x :

$$\vec{v} \cdot \hat{i} = \|\vec{v}\| \|\hat{i}\| \cos(\alpha)$$

Sabiendo que $\vec{v} \cdot \hat{i} = (v_1)(1) + (v_2)(0) + (v_3)(0) = v_1$ y que $\|\hat{i}\| = 1$, se obtiene:

$$v_1 = \|\vec{v}\| \cos(\alpha) \implies \cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}$$

Definición: Cosenos directores

Para cualquier vector no nulo $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, sus cosenos directores son:


$$\cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\beta) = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\gamma) = \frac{v_3}{\|\vec{v}\|}$$

Una propiedad importante es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre es igual a 1:

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$$


Un hecho interesante, es que los cosenos directores son exactamente las componentes del **vector unitario** que apunta en la dirección de $\vec{v}$. Es decir:

$$\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$



3.4. Proyección Vectorial

Una aplicación práctica del producto punto es averiguar qué parte de un vector actúa exactamente en la misma dirección que otro vector. Imagina que tienes una fuente de luz que brilla directamente sobre un vector $\vec{u}$, perpendicular a un segundo vector $\vec{v}$. La "sombra" que $\vec{u}$ proyecta sobre la línea de acción de $\vec{v}$ es lo que se conoce como **proyección vectorial**.



Para encontrar la fórmula matemática de este nuevo vector proyección, $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u}$, debe construirse paso a paso utilizando su geometría. Todo vector requiere dos cosas: una dirección y una magnitud.

1. La Dirección: Se sabe que la proyección debe estar sobre la misma línea que el vector $\vec{v}$. Por lo tanto, compartirá su mismo vector unitario direccional.

$$\text{Dirección} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

2. La Magnitud: Si se observa el triángulo rectángulo formado en el gráfico anterior, la hipotenusa es la magnitud de nuestro vector original ($\|\vec{u}\|$). La longitud de la sombra (nuestra proyección) corresponde al cateto adyacente al ángulo θ . Usando trigonometría básica ($\cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$), se tiene que:

$$\text{Magnitud} = \|\vec{u}\| \cos(\theta)$$

3. Construcción del Vector: Multiplicando la magnitud por la dirección se obtiene la definición geométrica de la proyección:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = (\|\vec{u}\| \cos \theta) \left(\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \right)$$

Dado que rara vez se conoce el ángulo θ , se puede utilizar la propiedad del producto punto de ángulo entre vectores ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$) para despejar el término del coseno ($\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$) y sustituirlo en la ecuación:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\|\vec{u}\| \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \right) \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Al simplificar, cancelando $\|\vec{u}\|$ y multiplicando los denominadores, se llega a la fórmula algebraica final que es la que se utiliza para calcular proyecciones en $\mathbb{R}^n$:

Definición: Proyección Vectorial

La proyección vectorial de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ se calcula únicamente usando el producto punto y la magnitud del vector base:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}$$

3.4.1. Magnitud del vector proyección

En muchas ocasiones, no es de interés el vector completo resultante de la proyección, sino únicamente su longitud. A esta longitud se le conoce como **proyección escalar** o **componente** de $\vec{u}$ a lo largo de $\vec{v}$.

Como se realizó en el desarrollo geométrico, esta magnitud está dada por $\|\vec{u}\| \cos \theta$. Al igual que antes, si sustituimos el coseno utilizando el producto punto, se obtiene su fórmula directa.

Definición: Proyección Escalar

La proyección escalar o componente del vector $\vec{u}$ en la dirección del vector $\vec{v}$ se denota como $\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u}$ y es un número real definido como:

$$\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u} = \|\vec{u}\| \cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Nota: Aunque se habla de longitud, la componente escalar puede ser un número negativo. Si el ángulo θ entre los vectores es mayor a $\frac{\pi}{2}$, el coseno será negativo. Geométricamente, esto significa que la proyección sombra está apuntando en la dirección opuesta al vector $\vec{v}$.

3.5. Ejercicios

1. Calcular el producto punto de cada par de vectores:

a) $\vec{u} = (3, -2)$ y $\vec{v} = (1, 4)$

b) $\vec{a} = (1, -3, 2)$ y $\vec{b} = (4, 1, -2)$

2. Sea $\vec{v} = (2, -3, 6)$. Verificar la propiedad $\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$ calculando ambos lados de la igualdad por separado.

3. Sean $\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (3, 0, 2)$ y $c = 4$. Verificar las siguientes propiedades del producto punto usando los valores dados:

a) Conmutatividad: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

b) Asociatividad con escalar: $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{u}) \cdot \vec{v}$

4. Determinar cuáles de los siguientes pares de vectores son ortogonales entre sí:

a) $\vec{u} = (2, -3)$ y $\vec{v} = (3, 2)$

b) $\vec{a} = (1, -1, 2)$ y $\vec{b} = (2, 0, -1)$

c) $\vec{p} = (4, 2, -1)$ y $\vec{q} = (1, -3, -2)$

5. Encontrar el ángulo θ (en grados) que forman los siguientes pares de vectores:

a) $\vec{u} = (1, 0, 0)$ y $\vec{v} = (1, 1, 0)$

b) $\vec{a} = (2, -1, 3)$ y $\vec{b} = (1, 2, -1)$

6. Encontrar el valor o los valores del parámetro k para que los siguientes vectores sean ortogonales:

a) $\vec{u} = (k, 3)$ y $\vec{v} = (2, -k)$

b) $\vec{a} = (1, k, -2)$ y $\vec{b} = (3, -1, k)$

7. Dado el vector $\vec{v} = (1, 2, -2)$:

a) Calcular los ángulos directores α , β y γ (en grados).

b) Verificar la identidad $\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$.

c) Escribir el vector unitario en la dirección de $\vec{v}$ en términos de sus cosenos directores.

8. Sean $\vec{u} = (2, 3, -1)$ y $\vec{v} = (4, -1, 2)$. Calcular:

a) La proyección escalar $\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u}$.

b) La proyección vectorial $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u}$.

9. Dado $\vec{u} = (1, -2, 3)$ y $\vec{v} = (2, 1, 1)$, descomponer $\vec{u}$ en dos componentes: una paralela a $\vec{v}$ y otra perpendicular a $\vec{v}$, de modo que:

$$\vec{u} = \vec{u}_{\parallel} + \vec{u}_{\perp}$$

Verificar que $\vec{u}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$.

10. Una fuerza $\vec{F} = (3, -2, 5)$ N actúa sobre un objeto que se desplaza del punto $A = (1, 0, -1)$ al punto $B = (4, 2, 3)$ (distancias en metros).

a) Encontrar el vector desplazamiento $\vec{d} = \overrightarrow{AB}$.

b) Calcular el trabajo $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ realizado por la fuerza (en joules).

c) Determinar el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento.

11. Demostrar algebraicamente, usando la definición componente a componente, la propiedad distributiva del producto punto para vectores en $\mathbb{R}^n$:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

Usar la demostración para verificar con $\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (3, 0, 1)$, $\vec{w} = (-1, 2, 4)$.

12. Un sensor de temperatura está ubicado en el punto $P = (2, 1, 3)$. El gradiente de temperatura en ese punto apunta en la dirección $\vec{g} = (4, -2, 1)$. Un robot puede moverse en cualquiera de las siguientes tres direcciones:

$$\vec{d}_1 = (1, 2, -1), \quad \vec{d}_2 = (-1, 3, 2), \quad \vec{d}_3 = (2, 0, -3)$$

a) Calcular la proyección escalar del gradiente sobre cada dirección de movimiento posible.

b) ¿En qué dirección debe moverse el robot para maximizar el incremento de temperatura? ¿Y para minimizarlo?

3.6. El Producto Vectorial de Gibbs (Producto Cruz)

3.6.1. Naturaleza y Origen Histórico

A diferencia del producto escalar, el cual produce un número real, se define una segunda forma de multiplicación vectorial cuyo resultado es un nuevo vector. A esta operación se le denomina **producto vectorial** o **producto cruz**. La característica geométrica fundamental del vector resultante es que este es simultáneamente ortogonal a los dos vectores originales que fueron multiplicados.

Históricamente, el producto vectorial moderno fue formulado de manera independiente a finales del siglo XIX por el físico estadounidense Josiah Willard Gibbs y el ingeniero británico Oliver Heaviside. Este operador matemático surge como una extracción y simplificación del álgebra de los cuaterniones (desarrollada previamente por William Rowan Hamilton). Fue diseñado específicamente para facilitar el análisis espacial en áreas como el electromagnetismo y la mecánica clásica.

3.6.2. Dimensionalidad del Producto Vectorial

Es importante mencionar una particularidad matemática sobre esta operación. El producto cruz tradicional, entendido como una operación binaria que toma dos vectores y devuelve un tercer vector ortogonal a ambos, es un fenómeno algebraico que está estrictamente definido solo en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ (y, de forma excepcional, en $\mathbb{R}^7$).

No obstante, el concepto de producto vectorial sí existe y es generalizado para vectores en un espacio de N dimensiones ($\mathbb{R}^n$). Esta generalización es formalizada mediante el álgebra exterior (utilizando el producto cuña o *wedge product*, $\wedge$), donde el resultado no es un vector tradicional, sino una entidad matemática de dimensión superior llamada bivector o multivector.

Sin embargo, para los objetivos y el alcance del cálculo multivariable a este nivel, el estudio del producto vectorial se limitará exclusivamente a la multiplicación de dos vectores en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$.

3.6.3. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^3$

El cálculo algebraico del producto cruz se realiza a partir de las componentes rectangulares de los vectores. Se utiliza como herramienta mnemotécnica el cálculo del determinante de una matriz de 3×3 , en cuya primera fila se colocan los vectores unitarios canónicos.

Definición: Producto Cruz en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. El producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ (léase “ $\vec{u}$ cruz $\vec{v}$ ”) es el vector definido por el siguiente determinante formal:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Al expandir el determinante por los cofactores de la primera fila, se obtiene la fórmula algebraica:


$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\hat{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\hat{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\hat{k}$$

3.6.4. Interpretación Geométrica y Regla de la Mano Derecha

Como se estableció anteriormente, el vector resultante $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular tanto al vector $\vec{u}$ como al vector $\vec{v}$. Por consiguiente, es perpendicular al plano que contiene a ambos vectores.

El sentido de este nuevo vector es determinado por la **Regla de la Mano Derecha**. Si se extienden los dedos de la mano derecha en la dirección del primer vector ($\vec{u}$) y se flexionan hacia el segundo vector ($\vec{v}$), el pulgar extendido indicará la dirección y sentido del vector resultante $\vec{u} \times \vec{v}$. Esta dependencia del orden implica que el producto cruz no es conmutativo, se cumple que $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.



Para verificar que dos vectores son perpendiculares, basta con demostrar que su producto punto es igual a cero. Por lo tanto, si $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$, se debe cumplir de manera simultánea que $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ y $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$.

Demostración de Ortogonalidad. Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. A partir de la definición algebraica del producto cruz obtenida por los cofactores, se tiene el vector resultante:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

Se evaluará primero el producto punto entre el vector resultante y el vector original $\vec{u}$:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = (u_2v_3 - u_3v_2)(u_1) + (u_3v_1 - u_1v_3)(u_2) + (u_1v_2 - u_2v_1)(u_3)$$

Distribuyendo cada componente de $\vec{u}$ en los binomios correspondientes:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = (u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2) + (u_2u_3v_1 - u_1u_2v_3) + (u_1u_3v_2 - u_2u_3v_1)$$

Al eliminar los paréntesis y reorganizar los términos, se observa que todos los componentes se cancelan mutuamente:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2 - u_1u_3v_2 + u_1u_3v_2 + u_2u_3v_1 - u_2u_3v_1$$

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$$

Este resultado demuestra algebraicamente que el vector $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular al vector $\vec{u}$. Realizando el mismo desarrollo para el producto $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v}$ resultará también 0, demostrando que el vector resultante es ortogonal a ambos vectores base de manera simultánea. $\square$

3.6.5. Propiedades Algebraicas del Producto Vectorial

Al igual que las otras operaciones vectoriales, el producto cruz posee propiedades matemáticas definidas. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^3$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Producto Vectorial

1. **Anticonmutatividad:** $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$
3. **Asociatividad escalar:** $c(\vec{u} \times \vec{v}) = (c\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (c\vec{v})$
4. **Producto con el vector cero:** $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$
5. **Producto consigo mismo:** $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$

3.6.6. Magnitud del Producto Vectorial

De manera análoga al producto punto, existe una relación entre la magnitud del producto vectorial y el ángulo θ que se forma entre los dos vectores originales (donde $0 \leq \theta \leq \pi$). Mientras que el producto punto se relaciona con el coseno del ángulo, la magnitud del producto cruz está directamente vinculada con la función seno.

Teorema: Magnitud del Producto Cruz

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces la magnitud de su producto cruz es:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Demostración. Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. A partir de la definición algebraica del producto cruz, se calcula el cuadrado de su magnitud elevando al cuadrado cada una de sus componentes:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$$

Se desarrollan los tres binomios al cuadrado:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$$

Para agrupar estos términos, se suma y se resta la misma cantidad, específicamente la suma de los cuadrados de los productos de componentes homólogas ($u_1^2 v_1^2 + u_2^2 v_2^2 + u_3^2 v_3^2$), lo cual no altera el valor de la ecuación:

$$+u_1^2 v_1^2 + u_2^2 v_2^2 + u_3^2 v_3^2 - (u_1^2 v_1^2 + u_2^2 v_2^2 + u_3^2 v_3^2)$$

Al reorganizar la expresión, se agrupan todos los términos positivos por un lado y los negativos por otro:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= (u_1^2 v_1^2 + u_1^2 v_2^2 + u_1^2 v_3^2 + u_2^2 v_1^2 + u_2^2 v_2^2 + u_2^2 v_3^2 + u_3^2 v_1^2 + u_3^2 v_2^2 + u_3^2 v_3^2) \\ &\quad - (u_1^2 v_1^2 + u_2^2 v_2^2 + u_3^2 v_3^2 + 2u_1 v_1 u_2 v_2 + 2u_1 v_1 u_3 v_3 + 2u_2 v_2 u_3 v_3) \end{aligned}$$

El primer grupo de términos positivos corresponde exactamente al desarrollo del producto de las magnitudes al cuadrado de los vectores originales. El segundo grupo corresponde al trinomio cuadrado perfecto del producto punto. Por lo tanto, se factoriza la expresión como:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3)^2$$

Sustituyendo por las definiciones formales de magnitud y producto escalar:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

A partir del teorema del producto punto, se sabe que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta)$. Sustituyendo esta expresión geométrica en la ecuación:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta))^2$$

Distribuyendo el exponente cuadrado en el segundo término y factorizando el elemento común $\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \cos^2(\theta) \\ \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 (1 - \cos^2(\theta)) \end{aligned}$$

Aplicando la identidad trigonométrica pitagórica fundamental ($1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$):

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \sin^2(\theta)$$

Finalmente, al extraer la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, y considerando que $\sin(\theta) \geq 0$ para ángulos comprendidos entre 0 y π ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$), se concluye la demostración:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

□

3.6.7. Condición de Paralelismo

Este teorema sobre la magnitud ofrece una herramienta algebraica directa para determinar si dos vectores son paralelos. Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos (o colineales), el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = 0$ (si apuntan en la misma dirección) o $\theta = \pi$ (si apuntan en direcciones opuestas).

En ambos casos, el seno del ángulo es cero. Sustituyendo este valor en la fórmula de la magnitud:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| (0) = 0$$

Dado que el único vector cuya magnitud es cero es el vector nulo ($\vec{0}$), se deduce el siguiente criterio:

Teorema: Vectores Paralelos

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si y solo si su producto vectorial es el vector cero:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$

3.7. Productos Triples

En el análisis vectorial y sus aplicaciones físicas, es frecuente encontrarse con operaciones que involucran tres vectores simultáneamente. Existen dos formas principales de combinar tres vectores utilizando los productos escalar y vectorial: el triple producto escalar y el triple producto vectorial.

3.7.1. El Triple Producto Escalar

El triple producto escalar es una operación que toma tres vectores en $\mathbb{R}^3$ y produce un único número real. Se define combinando un producto vectorial seguido de un producto escalar.

Definición: Triple Producto Escalar

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en el espacio tridimensional. El triple producto escalar se define como:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

Algebraicamente, esta operación puede ser calculada de manera directa mediante el cálculo del determinante de una matriz de 3×3 formada por las componentes de los tres vectores. Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$, entonces:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Una propiedad algebraica del triple producto escalar es que los operadores de punto y cruz pueden intercambiarse sin alterar el resultado, siempre y cuando se mantenga el orden de los vectores. Es decir, se cumple que $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

3.7.2. El Triple Producto Vectorial

A diferencia del caso anterior, el triple producto vectorial es una operación que devuelve como resultado un nuevo vector en el espacio. Se obtiene al realizar el producto cruz de un vector con el resultado de un producto cruz previo.

Definición: Triple Producto Vectorial

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. El triple producto vectorial se denota formalmente como:

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$$

Es crucial recalcar que, debido a que el producto vectorial no goza de la propiedad asociativa, la colocación de los paréntesis es estrictamente obligatoria, pues se cumple que $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) \neq (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w}$.

Desde un análisis geométrico, el vector resultante de $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$ yace exactamente en el mismo plano que está siendo formado por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Esto se debe a que el resultado de la operación debe ser ortogonal al vector $(\vec{v} \times \vec{w})$, y dado que este último es ortogonal al plano de $\vec{v}$ y $\vec{w}$, el vector final se ve forzado a existir dentro de dicho plano inicial.

Regla de BAC-CAB Para calcular este producto sin necesidad de evaluar dos determinantes matrices de forma consecutiva, se emplea una identidad matemática conocida como la Fórmula de Expulsión o regla BAC-CAB. Esta identidad permite expresar el vector resultante de forma mucho más directa, como una combinación lineal de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$, utilizando únicamente operaciones de producto punto y escalado:

Teorema: Identidad del Triple Producto Vectorial

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Demostración mediante Notación Tensorial La demostración analítica tradicional de la regla BAC-CAB mediante el cálculo de determinantes resulta en un proceso algebraico sumamente extenso y propenso a errores. Para simplificar esta demostración, se emplea la notación tensorial.

Antes de proceder con la demostración, es necesario definir dos operadores fundamentales en esta notación:

1. **La Delta de Kronecker (δ_{ij}):** Es un operador que vale 1 si los índices son iguales ($i = j$) y 0 si son diferentes ($i \neq j$). Al multiplicar un vector por la delta de Kronecker, ocurre un fenómeno llamado contracción de índices, que simplemente renombra el índice: $\delta_{ij}v_j = v_i$. Además, el producto punto se define como: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_i v_i$.
2. **El Símbolo de Levi-Civita (ϵ_{ijk}):** Es un tensor alternante que vale 1 si los índices (i, j, k) son una permutación cíclica de $(1, 2, 3)$, vale -1 si es una permutación anticíclica, y vale 0 si algún índice se repite. Su utilidad principal es definir el producto cruz en su i -ésima componente:

$$(\vec{u} \times \vec{v})_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k$$

El elemento clave para esta demostración es una identidad matemática que relaciona el producto de dos símbolos de Levi-Civita con deltas de Kronecker, conocida como la identidad epsilon-delta:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \epsilon_{kij}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$$

Con estas herramientas, se procede a la demostración del teorema.

Demostración de la Regla BAC-CAB. Sea el vector resultante $\vec{R} = \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$. Se buscará aislar la i -ésima componente de este vector, es decir, R_i .

Paso 1: Aplicación del primer producto cruz. Se aplica la definición tensorial del producto cruz al operador externo, asignando los índices i, j, k :

$$R_i = [\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})]_i = \epsilon_{ijk} u_j (\vec{v} \times \vec{w})_k$$

Paso 2: Aplicación del segundo producto cruz. Ahora se aplica la misma definición para el producto cruz interno, cuya componente es k . Para evitar confusión, se utilizan nuevos índices l, m para los vectores internos:

$$(\vec{v} \times \vec{w})_k = \epsilon_{klm} v_l w_m$$

Paso 3: Sustitución y reordenamiento. Se sustituye el resultado del paso 2 en la ecuación del paso 1. Como los escalares conmutan, se agrupan los símbolos de Levi-Civita al inicio de la expresión:

$$R_i = \epsilon_{ijk} u_j (\epsilon_{klm} v_l w_m) = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} u_j v_l w_m$$

Debido a que el símbolo de Levi-Civita permite permutaciones cíclicas sin alterar su signo ($\epsilon_{ijk} = \epsilon_{kij}$), se reescribe el primer símbolo para preparar la aplicación de la identidad:

$$R_i = \epsilon_{kij} \epsilon_{klm} u_j v_l w_m$$

Paso 4: Aplicación de la identidad epsilon-delta. Se sustituye el producto de los tensores de Levi-Civita por la identidad de deltas de Kronecker ($\epsilon_{kij} \epsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$):

$$R_i = (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) u_j v_l w_m$$

Paso 5: Distribución algebraica. Se distribuyen los componentes vectoriales dentro del paréntesis:

$$R_i = (\delta_{il} \delta_{jm} u_j v_l w_m) - (\delta_{im} \delta_{jl} u_j v_l w_m)$$

Paso 6: Contracción de índices. Se aplica la propiedad de la delta de Kronecker para colapsar los índices. En el primer término:

- $\delta_{il} v_l$ transforma el índice l en i , resultando en v_i .
- $\delta_{jm} u_j w_m$ filtra las componentes donde $j = m$, resultando en $u_j w_j$.

En el segundo término:

- $\delta_{im} w_m$ transforma el índice m en i , resultando en w_i .
- $\delta_{jl} u_j v_l$ filtra las componentes donde $j = l$, resultando en $u_j v_j$.

Sustituyendo estas contracciones en la ecuación:

$$R_i = v_i (u_j w_j) - w_i (u_j v_j)$$

Paso 7: Conversión a notación vectorial estándar. Se reconoce que los términos con índices repetidos ($u_j w_j$ y $u_j v_j$) corresponden a la definición del producto escalar (producto punto). Por lo tanto:

$$R_i = v_i (\vec{u} \cdot \vec{w}) - w_i (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Dado que esta igualdad se cumple para cualquier componente i arbitraria, se generaliza para todo el vector, concluyendo así la demostración matemática:

$$\vec{R} = \vec{v} (\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w} (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

□

3.8. Aplicaciones geométricas

El producto cruz tiene dos aplicaciones geométricas importantes: el cálculo de áreas y el cálculo de volúmenes. En ambos casos, la magnitud del producto cruz se relaciona directamente con la medida geométrica que se desea calcular.

3.8.1. Área de un paralelogramo

Una de las aplicaciones geométricas del producto vectorial radica en su capacidad para calcular áreas en el espacio tridimensional. Específicamente, se establece que la magnitud del producto cruz de dos vectores es igual al área del paralelogramo que estos forman cuando se sitúan con un origen común.

Para comprender el origen de esta propiedad, es necesario recurrir a la geometría euclidiana clásica. El área de cualquier paralelogramo se calcula mediante el producto de la longitud de su base por su altura perpendicular:

$$\text{Área} = (\text{base}) \times (\text{altura})$$

Supóngase que se tienen dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ separados por un ángulo θ . Si estos vectores se utilizan para definir los lados adyacentes de un paralelogramo, se puede realizar la siguiente deducción geométrica:

1. **La base:** Se define arbitrariamente al vector $\vec{u}$ como la base de la figura. Por lo tanto, la longitud de la base es exactamente la magnitud de este vector: $\text{base} = \|\vec{u}\|$.
2. **La altura (h):** La altura del paralelogramo es la distancia perpendicular trazada desde la punta del vector $\vec{v}$ hasta la línea de acción del vector $\vec{u}$. Esto forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la magnitud de $\vec{v}$ ($\|\vec{v}\|$). Utilizando la definición de la función seno, se despeja la altura:

$$h = \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Al sustituir estos dos componentes en la fórmula geométrica del área, se obtiene:


$$\text{Área} = \|\vec{u}\|(\|\vec{v}\| \sin \theta)$$

Como se demostró anteriormente, la expresión $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin \theta$ corresponde a la magnitud del producto cruz entre dichos vectores. Por consiguiente, se tiene el siguiente teorema:

Teorema: Área del Paralelogramo

El área A del paralelogramo definido por los vectores adyacentes $\vec{u}$ y $\vec{v}$ está dada por la magnitud de su producto vectorial:

$$A = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$



Corolario: Área de un Triángulo Una consecuencia inmediata de este teorema es su aplicación para encontrar el área de un triángulo en el espacio tridimensional. Dado que cualquier paralelogramo puede ser dividido en dos triángulos congruentes trazando una diagonal desde el origen hasta el vértice opuesto, el área del triángulo formado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es exactamente la mitad del área del paralelogramo:

$$\text{Área del triángulo} = \frac{1}{2} \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

3.8.2. Volúmen de un paralelepípedo


Mientras que la magnitud del producto cruz simple ($\|\vec{v} \times \vec{w}\|$) proporciona el área de un paralelogramo bidimensional, el triple producto escalar añade una tercera dimensión al cálculo. El valor absoluto de esta operación representa geoméricamente el volumen del paralelepípedo tridimensional que se forma al considerar a los tres vectores como aristas adyacentes que comparten un mismo origen.

La justificación geométrica de esto radica en la fórmula del volumen de un prisma.

- El área de la base, conformada por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$, está dada por $\|\vec{v} \times \vec{w}\|$.
- La altura h del sólido corresponde a la componente del vector $\vec{u}$ sobre el eje ortogonal a la base. Esta altura es igual a $\|\vec{u}\| \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre $\vec{u}$ y el vector resultante de $\vec{v} \times \vec{w}$.

Por lo tanto, al multiplicar la base por la altura, se recupera exactamente la definición del producto punto:

$$\text{Volumen} = \|\vec{v} \times \vec{w}\| (\|\vec{u}\| \cos \theta) = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$



3.9. Ejercicios

1. Calcular el producto cruz $\vec{u} \times \vec{v}$ para cada par de vectores:

a) $\vec{u} = (1, 2, 3)$ y $\vec{v} = (4, 5, 6)$

b) $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (0, 4, -2)$

2. Sean $\vec{u} = (3, -1, 2)$ y $\vec{v} = (1, 4, -1)$. Calcular $\vec{u} \times \vec{v}$ y $\vec{v} \times \vec{u}$. Verificar que $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.
3. Sean $\vec{u} = (2, 1, -3)$ y $\vec{v} = (-1, 3, 2)$. Calcular $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ y verificar algebraicamente que $\vec{w}$ es ortogonal tanto a $\vec{u}$ como a $\vec{v}$, es decir, que $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ y $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$.
4. Determinar, usando el producto cruz, si los siguientes pares de vectores son paralelos:
 - a) $\vec{u} = (2, -4, 6)$ y $\vec{v} = (-1, 2, -3)$
 - b) $\vec{a} = (1, 2, 3)$ y $\vec{b} = (2, 5, 3)$
5. Sean $\vec{u} = (1, 2, 2)$ y $\vec{v} = (3, 0, 4)$. Usando la relación $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$, encontrar el ángulo θ (en grados) entre los dos vectores. Comparar el resultado obtenido usando la relación análoga con el producto punto.
6. Encontrar el valor del parámetro k tal que los vectores $\vec{u} = (1, k, 2)$ y $\vec{v} = (3, 1, k)$ sean paralelos.
7. Calcular el área del paralelogramo y del triángulo formados por los vectores $\vec{u} = (3, -1, 4)$ y $\vec{v} = (2, 2, -1)$ cuando se sitúan con un origen común.
8. Dados los tres puntos $A = (1, 0, 2)$, $B = (3, 1, 0)$ y $C = (0, 2, 1)$ en $\mathbb{R}^3$:
 - a) Encontrar los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.
 - b) Calcular el área del triángulo ABC .
9. Sean $\vec{u} = (1, 0, 2)$, $\vec{v} = (-1, 3, 1)$ y $\vec{w} = (2, 1, -1)$.
 - a) Calcular el triple producto escalar $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ usando el determinante 3×3 .
 - b) Verificar que $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$.
 - c) Interpretar geoméricamente el resultado: ¿cuál es el volumen del paralelepípedo que forman los tres vectores?
10. Sean $\vec{u} = (2, 0, 1)$, $\vec{v} = (1, -1, 2)$ y $\vec{w} = (3, 1, 0)$. Verificar la regla BAC-CAB calculando ambos lados de la identidad para el triple producto vectorial:

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})$$
11. Una llave ejerce una fuerza $\vec{F} = (0, -20, 0)$ N sobre una tuerca ubicada en el punto $Q = (0, 3, 0, 0)$ m respecto al punto de pivote P (en metros). El torque mecánico es el producto cruz $\vec{\tau} = \overrightarrow{PQ} \times \vec{F}$.
 - a) Calcular el vector de torque $\vec{\tau}$.
 - b) Determinar la magnitud del torque en N·m.
 - c) Describir la dirección de rotación que produce el torque usando la regla de la mano derecha.
12. Dados los cuatro vértices de un tetraedro $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, 2, 0)$ y $D = (1, 1, 2)$:
 - a) Encontrar los vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ y $\overrightarrow{AD}$.

- b)* Calcular el volumen del paralelepípedo definido por estos tres vectores usando el triple producto escalar.
- c)* Sabiendo que el volumen de un tetraedro es $\frac{1}{6}$ del volumen del paralelepípedo que lo contiene, calcular el volumen del tetraedro $ABCD$.

4. Rectas en el espacio

4.1. Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^n$

Hasta este punto, se han estudiado los vectores de manera estática. Sin embargo, al introducir un parámetro escalar variable (usualmente denotado por t), los vectores permiten describir trayectorias o conjuntos continuos de puntos. Al hacer esto, se ingresa al dominio de las funciones vectoriales.

Uno de los casos más fundamentales de una función vectorial es la recta. En la geometría de un espacio de n dimensiones, una recta L no se define usualmente por una ecuación algebraica simple, sino que queda completamente determinada si se conocen dos elementos espaciales:

1. Un punto fijo sobre la recta, representado por su vector de posición $\vec{r}_0$.
2. Un vector no nulo $\vec{v}$ que indica la dirección en la que se extiende la recta, conocido como vector director.

4.1.1. Ecuación Vectorial


Para localizar cualquier punto arbitrario P sobre la recta, a partir de $\vec{r}_0$ se avanza una cierta distancia a lo largo de la dirección de $\vec{v}$. Esto equivale a sumar un múltiplo escalar t del vector director.

Definición: Ecuación Vectorial de la Recta

La ecuación vectorial de una recta L en $\mathbb{R}^n$ que pasa por el punto con vector de posición $\vec{r}_0$ y es paralela al vector director $\vec{v}$ se expresa como:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$

Donde $t \in \mathbb{R}$ es el parámetro. Conforme t toma todos los valores reales desde $-\infty$ hasta ∞ , el vector $\vec{r}(t)$ traza todos los puntos infinitos de la recta.



4.1.2. Ecuaciones Paramétricas y Simétricas en $\mathbb{R}^3$

Aunque la forma vectorial es válida para cualquier dimensión, en ingeniería frecuentemente se requiere analizar cómo se comporta cada variable espacial de manera independiente. Si se trabaja específicamente en el espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), se pueden descomponer los vectores en sus componentes: Sea $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y el vector director $\vec{v} = (a, b, c)$.

Al sustituir estos componentes en la ecuación vectorial $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$ e igualar componente a componente, se obtienen las **ecuaciones paramétricas**:

$$x = x_0 + at$$

$$y = y_0 + bt$$

$$z = z_0 + ct$$

Si ninguna de las componentes del vector director es igual a cero, es posible despejar el parámetro t de cada una de las ecuaciones paramétricas:

$$t = \frac{x - x_0}{a}, \quad t = \frac{y - y_0}{b}, \quad t = \frac{z - z_0}{c}$$

Al igualar estas expresiones, se elimina el parámetro t y se obtiene la forma conocida como ecuaciones simétricas de la recta:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Nota: Si alguna de las componentes del vector director es cero (por ejemplo, $a = 0$), esto significa que la recta no cambia en esa dirección. La ecuación simétrica se escribiría como $x = x_0$, $\frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$.

4.1.3. Derivación del Segmento de Recta

En diversas aplicaciones, no se requiere la descripción de una recta infinita, sino únicamente la de un segmento finito que conecte un punto de inicio con un punto de destino.

Sean P_0 y P_1 dos puntos en el espacio, definidos por sus respectivos vectores de posición $\vec{r}_0$ y $\vec{r}_1$. El objetivo es construir una función vectorial $\vec{r}(t)$ que describa exactamente el camino rectilíneo desde P_0 hasta P_1 .

Para trazar una recta que pase por ambos puntos, se requiere un vector director $\vec{v}$ que indique la dirección y el sentido desde $\vec{r}_0$ hacia $\vec{r}_1$. Como se definió en las operaciones básicas, el desplazamiento exacto entre dos posiciones se obtiene calculando su vector diferencia:

$$\vec{v} = \vec{r}_1 - \vec{r}_0$$

Se toma la ecuación vectorial general de la recta ($\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$) y se sustituye el vector director que acaba de ser deducido:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t(\vec{r}_1 - \vec{r}_0)$$

Al distribuir el parámetro t y factorizar los vectores comunes, se obtiene:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{r}_1 - t\vec{r}_0$$

$$\vec{r}(t) = (1 - t)\vec{r}_0 + t\vec{r}_1$$

La ecuación obtenida aún describe una recta infinita. Para garantizar que la función vectorial describa única y exclusivamente el segmento entre los dos puntos de interés, se debe restringir el dominio del parámetro t al intervalo cerrado $[0, 1]$. Esta restricción se justifica evaluando el comportamiento de la ecuación en los extremos del intervalo:

- Al evaluar en el límite inferior ($t = 0$):

$$\vec{r}(0) = (1 - 0)\vec{r}_0 + (0)\vec{r}_1 = \vec{r}_0$$

La trayectoria comienza exactamente en el vector de posición inicial.

- Al evaluar en el límite superior ($t = 1$):

$$\vec{r}(1) = (1 - 1)\vec{r}_0 + (1)\vec{r}_1 = \vec{r}_1$$


La trayectoria finaliza exactamente en el vector de posición de destino.

- Cualquier valor intermedio ($0 < t < 1$) arroja un punto posicionado proporcionalmente a lo largo del segmento. Por ejemplo, si $t = 0,5$, se obtendrá exactamente el punto medio del segmento $(\frac{\vec{r}_0 + \vec{r}_1}{2})$.

Definición: Ecuación del Segmento de Recta

El segmento de recta dirigido que conecta el vector de posición inicial $\vec{r}_0$ con el vector de posición final $\vec{r}_1$ se parametriza mediante la función:

$$\vec{r}(t) = (1 - t)\vec{r}_0 + t\vec{r}_1, \quad 0 \leq t \leq 1$$



4.2. Intersección entre Rectas en $\mathbb{R}^3$

En el plano bidimensional, dos rectas solo pueden ser paralelas o intersectarse en un punto. Sin embargo, en el espacio tridimensional, la relación entre dos rectas es más compleja. Existen tres casos posibles:

1. **Rectas Intersecantes:** Existe exactamente un punto P que pertenece a ambas rectas.
2. **Rectas Paralelas:** Los vectores directores son proporcionales ($\vec{v}_1 = k\vec{v}_2$) y no comparten puntos comunes.
3. **Rectas Cruzadas:** Las rectas no son paralelas pero tampoco se intersectan. Esto ocurre porque yacen en planos distintos.

Para determinar si dos rectas L_1 y L_2 se intersectan, se deben igualar sus ecuaciones paramétricas. Es fundamental utilizar parámetros distintos (por ejemplo, t para L_1 y s para L_2) para evitar el error común de asumir que ambos parámetros son iguales, lo cual no es necesariamente cierto.

Sean las rectas:

$$L_1 : \vec{r}_1(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}_1 \implies \begin{cases} x = x_1 + a_1t \\ y = y_1 + b_1t \\ z = z_1 + c_1t \end{cases}$$

$$L_2 : \vec{r}_2(s) = \vec{q}_0 + s\vec{v}_2 \implies \begin{cases} x = x_2 + a_2s \\ y = y_2 + b_2s \\ z = z_2 + c_2s \end{cases}$$

Para hallar el punto de contacto, se resuelve el sistema de ecuaciones lineales:

$$x_1 + a_1t = x_2 + a_2s \quad (1)$$

$$y_1 + b_1t = y_2 + b_2s \quad (2)$$

$$z_1 + c_1t = z_2 + c_2s \quad (3)$$

Teorema: Análisis del Sistema

Este sistema consta de tres ecuaciones con solo dos incógnitas (t y s). Por lo tanto:

- Si existe un par (t, s) que satisface las tres ecuaciones simultáneamente, las rectas se intersectan. El punto de intersección se obtiene evaluando t en L_1 o s en L_2 .
- Si el sistema es inconsistente (los valores de t y s hallados en las primeras dos ecuaciones no satisfacen la tercera), las rectas no se intersectan.


Nota: Cómo distinguir rectas cruzadas de paralelas

Si el sistema es inconsistente:

- Son paralelas si los vectores directores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ son múltiplos entre sí.
- Son cruzadas si los vectores directores no son múltiplos.

4.3. Distancia de un Punto a una Recta

Dado que la distancia más corta entre un punto y una recta se mide a lo largo del segmento que es estrictamente perpendicular a dicha recta, el cálculo se facilita enormemente al aprovechar las propiedades geométricas del producto vectorial.



Sea una recta L en el espacio tridimensional definida por un punto conocido P_0 y un vector director no nulo $\vec{v}$. Sea S un punto arbitrario en el espacio cuya distancia a la recta se desea calcular. Se busca encontrar la distancia perpendicular d desde el punto S hasta la recta L .

Se traza un vector que inicie en el punto conocido de la recta, P_0 , y termine en el punto exterior S . A este vector de desplazamiento se le denominará $\vec{P_0S}$.

Al trazar una línea perpendicular desde S hasta la recta L , se forma un triángulo rectángulo. En este triángulo, la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector $\|\vec{P_0S}\|$, y el cateto opuesto al ángulo θ corresponde a la distancia d .

Utilizando la definición del seno, se deduce que:

$$d = \|\vec{P_0S}\| \sin(\theta)$$

Para expresar la distancia puramente en términos de los vectores involucrados, se multiplica y se divide la expresión anterior por la magnitud del vector director $\|\vec{v}\|$:

$$d = \frac{\|\vec{P_0S}\| \|\vec{v}\| \sin(\theta)}{\|\vec{v}\|}$$

Al observar el numerador de la fracción resultante, se reconoce que esta es la definición formal de la magnitud del producto cruz entre los vectores $\vec{P_0S}$ y $\vec{v}$.

Definición: Distancia de un Punto a una Recta en $\mathbb{R}^3$

La distancia mínima d desde un punto exterior S a una recta L se calcula como el cociente entre la magnitud del producto vectorial y la magnitud del vector director:

$$d = \frac{\|\vec{P_0S} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

4.4. Ejercicios

1. Escribir la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $P_0 = (2, -1, 4)$ con vector director $\vec{v} = (3, 1, -2)$. Verificar que el punto $Q = (8, 1, 0)$ pertenece a la recta.
2. Encontrar la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos $A = (1, 3, -2)$ y $B = (4, 1, 5)$.

a) Escribir las ecuaciones paramétricas y simétricas.

b) Determinar si el punto $C = (-2, 5, -9)$ pertenece a la recta.

3. Dada la forma simétrica de la recta L :

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z}{5}$$

a) Identificar un punto sobre la recta y su vector director.

b) Convertir a forma paramétrica y a forma vectorial.

c) Determinar si la recta L pasa por el punto $(7, -9, 10)$.

4. Dados los puntos $P = (1, 0, 3)$ y $Q = (5, 2, -1)$:

a) Parametrizar el segmento de recta $\overrightarrow{PQ}$ con $t \in [0, 1]$.

b) Encontrar el punto medio del segmento evaluando $t = \frac{1}{2}$.

c) Encontrar el punto que divide el segmento en proporción 1 : 3 desde P .

5. Determinar la relación entre las rectas L_1 y L_2 (paralelas, intersecantes o cruzadas). Si se intersectan, encontrar el punto de intersección.

$$L_1 : \vec{r}_1(t) = (1, -1, 0) + t(1, 2, -1)$$

$$L_2 : \vec{r}_2(s) = (3, 1, -2) + s(2, 1, 1)$$

6. Determinar la relación entre las rectas L_1 y L_2 (paralelas, intersecantes o cruzadas).

$$L_1 : x = 1 + 2t, \quad y = -t, \quad z = 3 + t$$

$$L_2 : x = 3 + s, \quad y = 2 + s, \quad z = -1 + 2s$$

Justificar la respuesta resolviendo el sistema de ecuaciones correspondiente.

7. Dadas las rectas:

$$L_1 : \vec{r}_1(t) = (0, 1, 2) + t(4, -2, 6)$$

$$L_2 : \vec{r}_2(s) = (3, 0, -1) + s(-6, 3, -9)$$

Usar el producto cruz de los vectores directores para determinar si L_1 y L_2 son paralelas. Si lo son, determinar si coinciden o son líneas distintas.

8. Encontrar el ángulo agudo θ de intersección entre las rectas L_1 y L_2 , sabiendo que el ángulo entre dos rectas se calcula como el ángulo entre sus vectores directores (usando el producto punto).

$$L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z}{-1}$$

$$L_2 : \frac{x}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{2}$$

9. Calcular la distancia del punto $S = (1, 2, 3)$ a la recta definida por el punto $P_0 = (0, 0, 1)$ y el vector director $\vec{v} = (1, -1, 2)$.

$$\text{Recordatorio: } d = \frac{\|\overrightarrow{P_0S} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$


10. Determinar si los tres puntos $A = (2, 1, -1)$, $B = (5, 3, 1)$ y $C = (-1, -1, -3)$ son colineales (es decir, si pertenecen a una misma recta). Justificar la respuesta usando el producto cruz de los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.
11. Un dron parte del punto $A = (0, 0, 10)$ y se desplaza en línea recta con velocidad $\vec{v} = (3, 4, -1)$ m/s. Otro dron parte del punto $B = (12, 8, 6)$ con velocidad $\vec{w} = (-1, 2, 1)$ m/s, ambos en el instante $t = 0$.
- Escribir la trayectoria vectorial de cada dron como función del tiempo t .
 - Determinar si los drones se encuentran en algún instante (es decir, si sus trayectorias se intersectan con los *mismos* valores de t). En caso afirmativo, encontrar el punto y el instante de encuentro.
 - Si no se encuentran, ¿sus trayectorias se cruzan en algún punto del espacio (con valores distintos de t)?
12. Un rayo de luz viaja en línea recta desde el punto $O = (0, 0, 0)$ en la dirección $\vec{d} = (1, 2, 2)$. Una varilla delgada está representada por el segmento que une los puntos $P = (3, 1, 0)$ y $Q = (3, 5, 4)$.
- Parametrizar la trayectoria del rayo y el segmento de la varilla.
 - Determinar si el rayo intersecta el segmento de la varilla. Si es así, encontrar el punto exacto de intersección.
 - Calcular la distancia del origen O a la recta que contiene la varilla.
 - Normalizar el vector director $\vec{d}$ del rayo y usar los cosenos directores para describir el ángulo que forma con cada eje coordenado.

5. Planos en el Espacio

Un plano en $\mathbb{R}^3$ se define como una superficie formada por el conjunto de todos los puntos (x, y, z) tales que la función $f(x, y, z) = ax + by + cz$ toma un valor constante k .

Un plano se define de manera única si se conocen:

1. Un punto de referencia $P_0(x_0, y_0, z_0)$ que pertenezca a la superficie.
2. Un vector no nulo $\vec{n} = (a, b, c)$ que sea perpendicular a la superficie en todos sus puntos, denominado **vector normal**.



5.1. Ecuación escalar y general

Si $P(x, y, z)$ es un punto arbitrario en el plano, el vector $\vec{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ yace en la superficie. Por definición de vector normal, $\vec{n}$ debe ser perpendicular a $\vec{P_0P}$, lo que implica que su producto punto es 0:

$$\vec{n} \cdot \vec{P_0P} = 0 \implies (a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

Al desarrollar el producto punto, se obtiene la ecuación escalar del plano:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Agrupando las constantes en un solo término $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, se llega a la ecuación general del plano:

$$ax + by + cz + d = 0$$

5.2. Determinación de un Plano dados Tres Puntos

Si se conocen tres puntos no colineales A, B y C , es posible determinar la ecuación del plano que los contiene.

Primero, Se definen dos vectores directores que unan los puntos dados:

$$\vec{u} = \vec{AB} = B - A$$


$$\vec{v} = \vec{AC} = C - A$$

Puesto que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ yacen sobre el plano, su producto vectorial generará un vector perpendicular a ambos y, por lo tanto, normal al plano:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (a, b, c)$$

Con el vector normal (a, b, c) y utilizando el punto $A(x_1, y_1, z_1)$ como referencia, se aplica la ecuación escalar:

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$



5.3. Intersecciones Espaciales

5.3.1. Intersección de un Plano con una Recta

Sea la recta $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$ y el plano $ax + by + cz + d = 0$.

Expresando las coordenadas de la recta en su forma paramétrica: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$.


Sustituyendo estas expresiones en la ecuación del plano:

$$a(x_0 + v_1t) + b(y_0 + v_2t) + c(z_0 + v_3t) + d = 0$$

Despejando el parámetro t :

$$t = \frac{-(ax_0 + by_0 + cz_0 + d)}{av_1 + bv_2 + cv_3} = \frac{-(\vec{n} \cdot \vec{r}_0 + d)}{\vec{n} \cdot \vec{v}}$$

Si $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, la recta es paralela al plano, por lo tanto, no hay intersección o está contenida en él. Si hay un valor finito de t , se sustituye en la ecuación de la recta para hallar el punto exacto.




5.3.2. Intersección entre dos Planos

Dos planos no paralelos se intersectan siempre formando una línea recta. Para definir dicha recta L :

1. La recta debe ser perpendicular a los dos vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$. Por lo tanto, su dirección es:

$$\vec{v}_L = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

2. Se resuelve el sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Usualmente, se asigna un valor arbitrario a una variable y se resuelve el sistema de 2×2 resultante para x e y para encontrar un punto en común en ambos planos.



5.4. Distancia de un Punto a un Plano

Sea un punto exterior $S(x_1, y_1, z_1)$ y un plano definido por $ax + by + cz + d = 0$. La distancia mínima D entre el punto y el plano es la longitud del segmento perpendicular desde S hasta el plano.

Definase $P(x_0, y_0, z_0)$ como un punto cualquiera que pertenezca al plano. Se define el vector $\vec{PS} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$. La distancia D es la magnitud de la proyección escalar de $\vec{PS}$ sobre el vector normal $\vec{n}$:

$$D = |\text{proy}_{\vec{n}} \vec{PS}| = \frac{|\vec{PS} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

Al desarrollar el producto punto en el numerador:

$$\vec{PS} \cdot \vec{n} = a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) + c(z_1 - z_0) = ax_1 + by_1 + cz_1 - (ax_0 + by_0 + cz_0)$$


Sustituyendo la condición del punto P ($ax_0 + by_0 + cz_0 = -d$):

$$\vec{PS} \cdot \vec{n} = ax_1 + by_1 + cz_1 - (-d) = ax_1 + by_1 + cz_1 + d$$

Definición: Fórmula de Distancia Punto-Plano

La distancia D del punto $S(x_1, y_1, z_1)$ al plano $ax + by + cz + d = 0$ está dada por:

$$D = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



5.5. Ejercicios

1. Escribir la ecuación escalar y la ecuación general del plano que pasa por el punto $P_0 = (3, -1, 2)$ y tiene vector normal $\vec{n} = (4, -2, 5)$. Verificar que el punto $Q = (7, -3, 2)$ también pertenece al plano.
2. Dado el plano $2x - y + 3z - 6 = 0$:
 - a) Identificar un vector normal $\vec{n}$ al plano.

- b) Determinar cuáles de los siguientes puntos pertenecen al plano: $A = (3, 3, 1)$, $B = (0, 0, 2)$, $C = (1, -4, 0)$.
- c) Encontrar los tres puntos donde el plano corta a los ejes coordenados (interceptos).
3. Encontrar la ecuación general del plano que pasa por los tres puntos $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$ y $C = (0, 0, 3)$.
Sugerencia: Calcular $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ y aplicar la ecuación escalar con el punto A .
4. Encontrar la ecuación del plano que pasa por los puntos $P = (2, 1, -1)$, $Q = (0, -1, 3)$ y $R = (1, 3, 2)$. Verificar que los tres puntos satisfacen la ecuación encontrada.
5. Determinar la relación entre los planos Π_1 y Π_2 (paralelos o no). En caso de que se intersecten, determinar si son perpendiculares. Usar el producto punto y el producto cruz de sus vectores normales.
- a) $\Pi_1 : 2x - y + 3z = 5$ y $\Pi_2 : 4x - 2y + 6z = 1$
- b) $\Pi_1 : x + 2y - z = 3$ y $\Pi_2 : 3x - y + z = 1$
6. Sea la recta $L : \vec{r}(t) = (1, 2, -1) + t(2, -1, 3)$ y el plano $\Pi : x + 2y - z = 5$.
- a) Determinar si la recta es paralela, perpendicular o interseca al plano.
- b) Si se interseca, encontrar el punto exacto de intersección.
7. Calcular la distancia del punto $S = (1, -2, 4)$ al plano $3x - y + 2z - 6 = 0$.
8. Hallar la recta de intersección de los planos $\Pi_1 : x + y + z = 6$ y $\Pi_2 : x - y + 2z = 3$.
- a) Encontrar el vector director $\vec{v}_L = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ de la recta de intersección.
- b) Encontrar un punto sobre la recta fijando $z = 0$ y resolviendo el sistema resultante.
- c) Escribir la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de la recta.
9. Calcular la distancia entre los planos paralelos $\Pi_1 : 2x - y + 2z = 4$ y $\Pi_2 : 2x - y + 2z = -8$.
Sugerencia: Tomar un punto arbitrario sobre Π_1 y calcular su distancia a Π_2 usando la fórmula de distancia punto-plano.
10. Encontrar la ecuación del plano que:
- a) Pasa por el punto $P = (1, 2, 3)$ y es perpendicular a la recta $\vec{r}(t) = (4, -1, 2) + t(3, 1, -5)$.
- b) Pasa por los puntos $A = (1, 0, 1)$ y $B = (2, 3, -1)$, y es paralelo al vector $\vec{w} = (1, -1, 0)$.
Sugerencia: El vector normal al plano debe ser perpendicular a $\overrightarrow{AB}$ y a $\vec{w}$, es decir, $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \vec{w}$.

11. Encontrar el ángulo diedro θ entre los planos $\Pi_1 : x+2y-z = 3$ y $\Pi_2 : 2x-y+3z = 1$, sabiendo que el ángulo entre dos planos se define como el ángulo agudo entre sus vectores normales:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \|\vec{n}_2\|}$$

12. Un radar detecta un avión en $A = (2, 3, 5)$ km y una montaña cuya cara es el plano $\Pi : 3x + 2y + z = 30$ (distancias en km).

- a) Calcular la distancia perpendicular del avión al plano de la montaña.
- b) El avión vuela en línea recta con velocidad proporcional a $\vec{v} = (1, -1, -2)$. Determinar si su trayectoria intersecta la cara de la montaña; si es así, encontrar el punto de impacto.
- c) Encontrar el plano que contiene la trayectoria del avión y es perpendicular a Π .
- d) Calcular el ángulo de aproximación: el ángulo agudo entre la dirección de vuelo $\vec{v}$ y el plano Π .

Sugerencia: El ángulo entre una recta y un plano es el complemento del ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{n}$.

6. Superficies cilíndricas

6.1. Definición

Una superficie cilíndrica en el contexto del cálculo multivariable tiene un significado más general que el cilindro circular de la geometría básica. Engloba cualquier superficie generada por rectas paralelas que barren una curva.

Definición: Superficie cilíndrica

Una superficie cilíndrica es una superficie en $\mathbb{R}^3$ formada por todas las rectas generatrices paralelas a un eje fijo y que pasan a través de una curva plana fija denominada curva directriz.

Ejemplos de identificación:

- $x^2 + y^2 = 1$: falta $z \Rightarrow$ cilindro con eje paralelo al eje z (sección circular).
- $z = x^2$: falta $y \Rightarrow$ cilindro con eje paralelo al eje y (sección parabólica).
- $y^2 - x^2 = 1$: falta $z \Rightarrow$ cilindro con eje paralelo al eje z (sección hiperbólica).


6.2. Cómo graficar una superficie cilíndrica

1. **Identificar la variable ausente.** Esta indica la dirección de las generatrices.
2. **Trazar la curva directriz.** Dibujar la curva en el plano formado por las otras dos variables.
3. **Extender.** Extender la curva directriz en ambas direcciones a lo largo del eje de la variable ausente.

6.2.1. Cilindro circular: $x^2 + y^2 = 1$

La variable z está ausente. La curva directriz en el plano xy es la circunferencia unitaria. Al extruir a lo largo del eje z , obtenemos el cilindro circular recto.


Cilindro circular: $x^2 + y^2 = 1$



6.2.2. Cilindro parabólico: $z = x^2$

La variable y está ausente. La curva directriz en el plano xz es la parábola $z = x^2$. Al extruir a lo largo del eje y , obtenemos el cilindro parabólico.

Cilindro parabólico: $z = x^2$



6.3. Ejercicios

1. Identificar el tipo de cada superficie cilíndrica, señalar la variable ausente, describir la curva directriz y el eje a lo largo del cual se extiende la superficie.

- a) $x^2 + z^2 = 9$
- b) $y = \sin(x)$
- c) $4x^2 + 9y^2 = 36$
- d) $z = e^x$

2. Determinar la ecuación del cilindro cuyas generatrices son paralelas al eje z y cuya curva directriz en el plano xy es la elipse con semiejes $a = 3$ en la dirección x y $b = 2$ en la dirección y , centrada en el origen.

Verificar que los puntos $P_1 = (3, 0, 5)$ y $P_2 = (0, 2, -7)$ pertenecen a la superficie, y determinar si $P_3 = (2, 1, 4)$ pertenece o no.

3. Para el cilindro parabólico $y = x^2 - 4x + 3$:

- a) Completar el cuadrado para escribir la ecuación en la forma $y = (x - h)^2 + k$ e identificar el vértice de la parábola directriz.
- b) Señalar cuál es la variable ausente y describir el eje del cilindro.
- c) Encontrar la intersección del cilindro con el plano $z = 2$ y con el plano $x = 1$.
- d) Determinar si el punto $Q = (2, -1, 100)$ pertenece al cilindro.

4. La recta $L : \vec{r}(t) = (1, 0, -1) + t(0, 1, 3)$ y el cilindro circular $x^2 + y^2 = 5$.

- a) Determinar si la recta es paralela, interseca o está contenida en el cilindro.
- b) Si la recta interseca al cilindro, encontrar todos los puntos de intersección.

c) Encontrar la distancia del eje del cilindro (el eje z) a la recta L .

Sugerencia: Sustituir las expresiones paramétricas de x e y en la ecuación del cilindro y resolver en t .

5. Encontrar la ecuación del cilindro con generatrices paralelas al eje y que contiene a la curva de intersección de las superficies $z = x^2 + 1$ y $z = 4 - x^2$.

a) Encontrar las curvas de intersección igualando las dos ecuaciones.

b) Eliminar la variable z para obtener la ecuación del cilindro en el plano xy .

c) Describir geoméricamente la curva directriz obtenida.

6. Escribir las ecuaciones paramétricas de cada superficie cilíndrica e identificar el rango de los parámetros para cubrir la superficie completa.

a) Cilindro circular $x^2 + z^2 = 4$ (eje y), para $-3 \leq y \leq 3$.

b) Cilindro elíptico $\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$ (eje y), para $y \in \mathbb{R}$.

c) Cilindro parabólico $z = x^2$ (eje y), para $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$.

Sugerencia: Para cónicas en el plano xz , usar una parametrización trigonométrica o explícita según corresponda, y agregar $y = t$ como parámetro libre.

7. Clasificar cada ecuación como cilindro o no. Si es un cilindro, identificar el tipo y la variable ausente. Si no lo es, justificar brevemente.

a) $x^2 + y^2 + z^2 = 16$

b) $x^2 - y^2 = 1$

c) $z = \ln(x^2 + 1)$

d) $xy = 4$

e) $x^2 + y^2 + z = 0$

f) $x^2 + z^2 - 4x + 2z - 4 = 0$

Para el inciso (f), completar el cuadrado en las variables correspondientes y escribir la ecuación en forma estándar.

8. El cilindro hiperbólico $x^2 - y^2 = 1$ tiene generatrices paralelas al eje z .

a) Identificar los vértices y asíntotas de la hipérbola directriz en el plano xy .

b) Determinar la traza del cilindro con el plano $z = k$ para cualquier valor de k .

c) Encontrar la intersección del cilindro con el plano $y = 2$ y describir qué curva se obtiene.

d) Verificar que el punto $P = (\sqrt{2}, 1, -3)$ pertenece al cilindro.

e) Encontrar todos los puntos del cilindro con $x = 2$, $z = 0$.

9. Determinar la ecuación del cilindro con generatrices paralelas al eje z que pasa por la curva C definida por la intersección de:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \text{y} \quad z = 1$$

- a)* Encontrar la curva C sustituyendo $z = 1$ en la ecuación de la esfera.
 - b)* Eliminar la variable z para obtener la ecuación del cilindro proyectado sobre el plano xy .
 - c)* Describir geométricamente la superficie cilíndrica obtenida e indicar su radio.
 - d)* Encontrar la intersección del cilindro obtenido con el plano $y = 0$.
- 10. La región sólida E está acotada por el cilindro circular $x^2 + y^2 = 4$, el plano $z = 0$ y el plano $z = 3$.
 - a)* Describir en palabras la forma del sólido E .
 - b)* Determinar si el punto $Q = (1, 1, 2)$ está dentro, fuera o sobre la frontera de E .
 - c)* Encontrar la longitud del segmento de la recta $\vec{r}(t) = (1, 0, t)$, $t \in \mathbb{R}$, que se encuentra dentro de E .
 - d)* Dos cilindros, $x^2 + y^2 = 4$ y $x^2 + z^2 = 4$, se intersectan. Encontrar y describir la curva de intersección en la región $x \geq 0$.

Sugerencia: En la curva de intersección se cumple $y^2 = z^2$; usar esto para parametrizar.

7. Superficies cuádricas

7.1. Definición y forma general

Las superficies cuádricas son la extensión natural de las cónicas (elipse, parábola, hipérbola) al espacio tridimensional.

Definición: Superficie cuádrica

Una superficie cuádrica es el conjunto de puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que satisfacen una ecuación de la forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

donde $A, B, \dots, J \in \mathbb{R}$ y al menos uno de los coeficientes cuadráticos es distinto de cero.

Aplicando traslaciones y rotaciones de los ejes, toda cuádrica no degenerada se reduce a una de las seis formas estándar que se estudian a continuación.

7.2. Método de las trazas

Definición: Traza de una superficie

La traza de una superficie en un plano P es la curva de intersección entre ambos. Las trazas más útiles son:

- $z = k$: intersección con un plano horizontal.
- $y = k$: intersección con un plano paralelo al plano xz .
- $x = k$: intersección con un plano paralelo al plano yz .

Al variar k , se observa cómo cambia la sección transversal, lo que permite reconstruir la forma tridimensional de la superficie.

7.3. Elipsoide

Definición: Elipsoide

La ecuación estándar del elipsoide centrado en el origen es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Los valores a , b y c son los semiejes en las direcciones x , y y z respectivamente. Si $a = b = c$, el elipsoide es una esfera de radio a .

Trazas: todas las trazas del elipsoide son elipses (o circunferencias en casos especiales).


- $z = k$ (con $|k| < c$): $\frac{x^2}{a^2 \left(1 - \frac{k^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{k^2}{c^2}\right)} = 1$ (elipse)

- $y = 0$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (elipse en el plano xz)

- $x = 0$: $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (elipse en el plano yz)

El elipsoide es la única cuádrica acotada: todos sus puntos están dentro de la caja $[-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c]$.

Elipsoide: $\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ ($a = 2, b = 1, c = 2$)



7.4. Paraboloide elíptico

Definición: Paraboloide elíptico

La ecuación estándar del paraboloide elíptico con vértice en el origen es:

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

La superficie se abre hacia el lado positivo del eje z . Si $a = b$, se obtiene el paraboloide circular (de revolución).

Trazas:


- $z = k > 0$: $\frac{x^2}{a^2k} + \frac{y^2}{b^2k} = 1$ (elipse que crece con k)

- $z = 0$: solo el vértice en el origen

- $y = 0$: $z = \frac{x^2}{a^2}$ (parábola en el plano xz)

- $x = 0$: $z = \frac{y^2}{b^2}$ (parábola en el plano yz)

Paraboloide elíptico: $z = x^2 + y^2$



7.5. Paraboloide hiperbólico

Definición: Paraboloide hiperbólico

La ecuación estándar del paraboloide hiperbólico con punto de silla en el origen es:


$$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$

Esta superficie tiene la característica forma de silla de montar: desde el origen, sube en la dirección y y baja en la dirección x .

Trazas:

- $z = k > 0$: $\frac{y^2}{b^2k} - \frac{x^2}{a^2k} = 1$ (hipérbola abierta en dirección y)
- $z = k < 0$: $\frac{x^2}{a^2|k|} - \frac{y^2}{b^2|k|} = 1$ (hipérbola abierta en dirección x)
- $z = 0$: $y/b = \pm x/a$ (dos rectas que se intersectan — punto de silla)
- $y = 0$: $z = -\frac{x^2}{a^2}$ (parábola hacia abajo)
- $x = 0$: $z = \frac{y^2}{b^2}$ (parábola hacia arriba)

Paraboloide hiperbólico: $z = y^2 - x^2$



7.6. Cono elíptico

Definición: Cono elíptico

La ecuación estándar del cono elíptico con vértice en el origen es:


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

Cuando $a = b$, se obtiene el cono circular recto. La superficie consta de dos napas simétricas respecto al origen.

Trazas:

- $z = k \neq 0$: $\frac{x^2}{(\frac{ak}{c})^2} + \frac{y^2}{(\frac{bk}{c})^2} = 1$ (elipse que se expande con $|k|$)
- $z = 0$: solo el vértice en el origen
- $y = 0$: $z = \pm \frac{c}{a}x$ (dos rectas que se cruzan)
- $x = 0$: $z = \pm \frac{c}{b}y$ (dos rectas que se cruzan)

Cono: $z^2 = x^2 + y^2$



7.7. Hiperboloide de una hoja

Definición: Hiperboloide de una hoja

La ecuación estándar del hiperboloide de una hoja con eje a lo largo de z es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

El hiperboloide de una hoja es una superficie conexa (una sola pieza). Su sección transversal horizontal es siempre una elipse, con tamaño mínimo en $z = 0$ que crece conforme $|z|$ aumenta.


Trazas:

- $z = k$: $\frac{x^2}{a^2(1 + \frac{k^2}{c^2})} + \frac{y^2}{b^2(1 + \frac{k^2}{c^2})} = 1$ (elipse mínima en $k = 0$)
- $y = 0$: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (hipérbola)
- $x = 0$: $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (hipérbola)

Nota: Relación con el cono

El cono y el hiperboloide de una hoja solo difieren en el lado derecho de la expresión $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}$: es 0 para el cono y 1 para el hiperboloide. Las “paredes” del hiperboloide se acercan asintóticamente al cono cuando $|z| \rightarrow \infty$.

Hiperboloide de una hoja: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$



7.8. Hiperboloide de dos hojas

Definición: Hiperboloide de dos hojas

La ecuación estándar del hiperboloide de dos hojas con eje a lo largo de z es:


$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Para que la ecuación tenga solución real se requiere $z^2/c^2 \geq 1$, es decir, $|z| \geq c$. La superficie no existe en la región $-c < z < c$ y consta de dos componentes separadas: una hoja para $z \geq c$ y otra para $z \leq -c$.

Trazas:

- $z = k$ con $|k| > c$: $\frac{x^2}{a^2(\frac{k^2}{c^2} - 1)} + \frac{y^2}{b^2(\frac{k^2}{c^2} - 1)} = 1$ (elipse)
- $|z| < c$: no existe traza (región vacía)
- $y = 0$: $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ (hipérbola abierta en dirección z)
- $x = 0$: $\frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (hipérbola abierta en dirección z)

Hiperboloide de dos hojas: $z^2 - x^2 - y^2 = 1$



7.9. Resumen de superficies cuádricas

Superficie	Ecuación estándar (eje z)	Trazas características
Elipsoide	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	Todas elipses
Paraboloide elíptico	$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$	Elipses (horiz.) / Parábolas (vert.)
Paraboloide hiperbólico	$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$	Hipérbolas / Parábolas
Cono elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$	Elipses / Rectas cruzadas
Hiperboloide de una hoja	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	Elipses / Hipérbolas
Hiperboloide de dos hojas	$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	Elipses (si $ z > c$) / Hipérbolas

7.10. Ejercicios

1. Identificar el tipo de superficie cuádrica de cada ecuación (elipsoide, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, cono, hiperboloide de una hoja o hiperboloide de dos hojas). Justificar la clasificación.

a) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{1} = 1$

b) $z = x^2 + 4y^2$

c) $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

d) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 0$

e) $z^2 - x^2 - y^2 = 4$

f) $z = y^2 - x^2$

2. Completar el cuadrado en las variables correspondientes para llevar cada ecuación a su forma estándar. Identificar el tipo de cuádrica, el centro y los semiejes o vértice según corresponda.

a) $4x^2 + y^2 + 9z^2 - 8x + 2y - 36z + 37 = 0$

b) $z = x^2 - 4x + y^2 + 6y + 13$

c) $x^2 + y^2 - z^2 - 2x + 4y + 2z - 2 = 0$

Sugerencia: Para el inciso (a), completar el cuadrado en x , y y z por separado y verificar si el lado derecho resulta positivo.

3. Para el elipsoide $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} = 1$:

a) Identificar los semiejes a , b y c en las direcciones x , y y z .

b) Encontrar las trazas con los tres planos coordenados ($z = 0$, $y = 0$, $x = 0$) y describir cada cónica obtenida.

c) Encontrar la traza con el plano $z = 2$ y determinar sus semiejes.

d) Determinar si los puntos $P_1 = (3, 0, 0)$, $P_2 = (1, 1, 2)$ y $P_3 = (0, 2, 4)$ están sobre, dentro o fuera del elipsoide.

e) ¿Para qué valores de k el plano $z = k$ interseca al elipsoide?

4. El paraboloide elíptico $z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ tiene su vértice en el origen.

a) Encontrar la traza con el plano $z = 1$ y calcular el área de la elipse obtenida usando $A = \pi ab$.

b) Encontrar las trazas con los planos $y = 0$ y $x = 0$. ¿Qué tipo de curva es cada una?

c) Determinar el punto de la superficie más cercano al origen. ¿Cuál es ese punto?

d) El plano $z = 4$ corta al paraboloide. Encontrar la ecuación de la elipse de intersección y calcular su área.

- e) Describir cómo cambia la forma de las trazas horizontales $z = k$ al aumentar k desde 0 hasta ∞ .
5. El paraboloides hiperbólico $z = x^2 - y^2$ tiene un punto de silla en el origen.
- a) Encontrar las trazas con los planos $z = 1$, $z = -1$ y $z = 0$, e identificar las cónicas obtenidas.
 - b) Las trazas con $y = 0$ y $x = 0$ son parábolas. Determinar en qué dirección se abren.
 - c) Verificar que el origen es un punto de silla: mostrar que a lo largo de la dirección x el origen es un mínimo local de z , y a lo largo de la dirección y es un máximo local.
 - d) Encontrar todos los puntos de la superficie con $z = 0$ (la curva del “ecuador” de la silla). ¿Qué rectas son estas?
 - e) Determinar si el punto $P = (3, 2, 5)$ pertenece a la superficie.
6. Dado el cono elíptico $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z^2$:
- a) Verificar que el vértice se encuentra en el origen.
 - b) Encontrar las trazas con los planos $z = 1$, $z = 2$ y $z = -1$. Identificar qué tipo de curva es cada una e indicar los semiejes.
 - c) Encontrar las trazas con $y = 0$ y $x = 0$ y mostrar que son pares de rectas.
 - d) ¿Cuántas napas (mitades) tiene el cono? Describir la napa superior ($z > 0$) y la inferior ($z < 0$).
 - e) El plano $z = k$ interseca al cono en una elipse para todo $k \neq 0$. Escribir la fórmula de los semiejes en función de k y calcular el área de la sección transversal.
7. Para el hiperboloide de una hoja $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$:
- a) Identificar los semiejes a , b , c y describir la orientación de la superficie.
 - b) Encontrar la traza con $z = 0$ (la “cintura” del hiperboloide) e identificar su tipo y radio.
 - c) Encontrar la traza con $z = 3$ y comparar su tamaño con la traza en $z = 0$.
 - d) Encontrar las trazas con $y = 0$ y $x = 0$. ¿Qué tipo de cónica es cada una?
 - e) Determinar para qué valores de k el plano $z = k$ produce una traza válida (es decir, siempre existe intersección). Comparar con el hiperboloide de dos hojas.
8. Para el hiperboloide de dos hojas $\frac{z^2}{4} - \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{9} = 1$:
- a) Determinar los valores de z para los cuales existe la superficie. ¿Cuál es la región vacía?
 - b) Encontrar los vértices del hiperboloide (los puntos de las hojas más cercanos al origen).

- c) Encontrar la traza con el plano $z = 4$ e identificar su tipo y semiejes.
- d) Encontrar las trazas con $y = 0$ y $x = 0$. ¿Qué hipérbolas se obtienen?
- e) Comparar las ecuaciones del hiperboloide de una hoja y del de dos hojas del ejercicio anterior. ¿Qué diferencia hay en los signos? ¿Cómo afecta esto a la topología (número de componentes conexas)?

9. Una superficie cuádrica tiene la ecuación general:

$$9x^2 + 4y^2 - 36z^2 - 18x + 16y + 72z - 11 = 0$$

- a) Completar el cuadrado en cada variable para llevar la ecuación a su forma estándar.
- b) Identificar el tipo de superficie cuádrica e indicar el centro.
- c) Encontrar los semiejes de la superficie.
- d) Describir las trazas con cada plano coordenado trasladado al nuevo centro.

Sugerencia: Agrupar los términos en x , en y y en z por separado antes de completar el cuadrado.

10. Encontrar la ecuación de la superficie cuádrica que satisface cada descripción. Escribir la ecuación en forma estándar.

- a) **Elipsoide** centrado en el origen que pasa por los puntos $(4, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 0, 3)$.
- b) **Paraboloide elíptico** con vértice en el origen, eje a lo largo de z positivo, que pasa por el punto $(2, 1, 2)$.
- c) **Cono circular** con vértice en el origen y eje a lo largo de z , tal que la traza con el plano $z = 1$ es la circunferencia $x^2 + y^2 = 3$.
- d) **Hiperboloide de una hoja** con eje a lo largo de z , semiejes horizontales $a = b = 2$ y tal que la traza con $z = 2$ tenga semiejes $a' = b' = 2\sqrt{2}$.
- e) **Hiperboloide de dos hojas** con eje a lo largo de z y vértices en $(0, 0, \pm 3)$, con semiejes horizontales $a = b = 2$.

8. Funciones Vectoriales

Una función vectorial generaliza el concepto de función real: en lugar de asignar un número real a cada valor del parámetro, asigna un **vector**. Son la herramienta fundamental para describir curvas y trayectorias en el espacio, y conectan el cálculo univariable con el análisis multivariable.

8.1. Definición y Dominio

Definición: Función vectorial

Una función vectorial en $\mathbb{R}^n$ es una función $\vec{r} : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ que asigna a cada escalar $t \in D$ un único vector en $\mathbb{R}^n$:

$$\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)) = f_1(t)\hat{i}_1 + f_2(t)\hat{i}_2 + \dots + f_n(t)\hat{i}_n$$

Las funciones reales $f_1, f_2, \dots, f_n$ se llaman funciones componentes de $\vec{r}$.

El dominio natural de $\vec{r}$ es la intersección de los dominios de sus componentes:

$$D = \bigcap_{i=1}^n \text{Dom}(f_i)$$

8.2. Límites y Continuidad

Los conceptos de límite y continuidad se trasladan de manera directa a las funciones vectoriales, operando componente a componente.

Definición: Límite de una función vectorial

Si $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$, el límite cuando $t \rightarrow a$ se define como:

$$\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow a} f_1(t), \lim_{t \rightarrow a} f_2(t), \dots, \lim_{t \rightarrow a} f_n(t) \right)$$

siempre que los límites escalares existan.

Definición: Continuidad

Una función vectorial $\vec{r}(t)$ es continua en $t = a$ si:

$$\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \vec{r}(a)$$

Esto ocurre si y solo si cada función componente es continua en $t = a$.


La continuidad de $\vec{r}(t)$ en su dominio garantiza que la curva trazada en el espacio no tiene saltos ni discontinuidades: es una curva *suave por partes*.

8.3. Representación Gráfica

La imagen geométrica de una función vectorial $\vec{r}(t)$, conforme t recorre su dominio, es una curva en $\mathbb{R}^n$. Cada valor de t determina la posición de un punto sobre dicha curva.

8.3.1. Curvas planas en $\mathbb{R}^2$

Si la componente z es cero, la curva yace en el plano xy . Por ejemplo, sea: $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ con $t \in [0, 2\pi]$ traza el círculo unitario.




8.3.2. La hélice circular en $\mathbb{R}^3$

Uno de los ejemplos más representativos de curva en el espacio es la hélice circular:

$$\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R}$$

donde a controla el radio y b el paso. Las proyecciones sobre el plano xy forman un círculo, mientras que la curva asciende de forma uniforme.



8.4. Derivadas de Funciones Vectoriales

Definición: Derivada de una función vectorial

La derivada de $\vec{r}(t)$ se define de manera análoga a la derivada escalar:

$$\vec{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$


Si $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$, entonces:

$$\vec{r}'(t) = (f'_1(t), f'_2(t), \dots, f'_n(t))$$

siempre que las n derivadas componentes existan. En ese caso se dice que $\vec{r}$ es **diferenciable** en t .

8.4.1. Interpretación geométrica

El vector $\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$ une dos puntos de la curva. Al dividirlo entre Δt y tomar el límite, se obtiene un vector que es tangente a la curva en el punto $\vec{r}(t)$, apuntando en la dirección del movimiento.



8.4.2. Reglas de derivación

Teorema: Reglas de derivación vectorial

Sean $\vec{u}(t)$ y $\vec{v}(t)$ funciones vectoriales diferenciables y $c(t)$ una función escalar diferenciable. Entonces:

1. $\frac{d}{dt}[\vec{u} + \vec{v}] = \vec{u}' + \vec{v}'$
2. $\frac{d}{dt}[c \vec{u}] = c' \vec{u} + c \vec{u}'$

3. $\frac{d}{dt}[\vec{u} \cdot \vec{v}] = \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}'$
4. $\frac{d}{dt}[\vec{u} \times \vec{v}] = \vec{u}' \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{v}'$
5. $\frac{d}{dt}[\vec{u}(c(t))] = c'(t) \vec{u}'(c(t))$ (Regla de la cadena)

8.5. Integrales de Funciones Vectoriales

La integral de una función vectorial también se aplica componente a componente.

Definición: Integral indefinida

$$\int \vec{r}(t) dt = \left(\int f_1(t) dt, \int f_2(t) dt, \dots, \int f_n(t) dt \right) + \vec{C}$$

donde $\vec{C} = (C_1, C_2, \dots, C_n)$ es un **vector constante de integración**.

Definición: Integral definida

$$\int_a^b \vec{r}(t) dt = \left(\int_a^b f_1(t) dt, \int_a^b f_2(t) dt, \dots, \int_a^b f_n(t) dt \right)$$

El Teorema Fundamental del Cálculo también aplica: si $\vec{R}(t)$ es una antiderivada de $\vec{r}(t)$, es decir, $\vec{R}'(t) = \vec{r}(t)$, entonces:

$$\int_a^b \vec{r}(t) dt = \vec{R}(b) - \vec{R}(a)$$

8.6. Cinemática Vectorial

La aplicación más natural de las funciones vectoriales es la descripción del movimiento de una partícula en el espacio. Si $\vec{r}(t)$ representa la **posición** de la partícula en el instante t , las sucesivas derivadas codifican cantidades cinemáticas con significado físico preciso.

8.6.1. Posición, velocidad y aceleración


Definición: Cantidades cinemáticas

Sea $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ la función de posición de una partícula. Se definen:

- **Vector velocidad:** $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$
- **Rapidez escalar:** $v(t) = \|\vec{v}(t)\| = \|\vec{r}'(t)\|$
- **Vector aceleración:** $\vec{a}(t) = \vec{v}'(t) = \vec{r}''(t) = (x''(t), y''(t), z''(t))$

Una propiedad importante de la cinemática vectorial es que el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Por definición de derivada, el vector $\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$


une dos posiciones cercanas de la partícula. Al dividir entre Δt y tomar el límite, el resultado apunta exactamente en la dirección en que la curva avanza en ese instante. Por lo tanto, $\vec{v}(t)$ es tangente a la curva y su módulo es la rapidez con la que la partícula la recorre.



La aceleración $\vec{a}(t)$ mide cómo cambia el *vector* velocidad, no solo su magnitud. Esto tiene una consecuencia importante: una partícula puede tener aceleración no nula aunque su rapidez sea constante, simplemente porque está cambiando de dirección.

El caso más ilustrativo es el movimiento circular uniforme: Sea $\vec{r}(t) = (R \cos t, R \sin t)$, con radio R y velocidad angular constante 1 rad/s.

$$\begin{aligned}\vec{v}(t) &= (-R \sin t, R \cos t) & \|\vec{v}(t)\| &= R \quad (\text{rapidez constante}) \\ \vec{a}(t) &= (-R \cos t, -R \sin t) = -\vec{r}(t) & \|\vec{a}(t)\| &= R\end{aligned}$$



La aceleración $\vec{a} = -\vec{r}$ apunta siempre hacia el centro del círculo (aceleración centrípeta), y es perpendicular a la velocidad en todo momento: $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$.

Por otro lado, dado que $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$, se puede recuperar la posición integrando si se conoce la condición inicial:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{v}(u) du$$


De manera análoga, conociendo $\vec{a}(t)$ y las condiciones iniciales $\vec{v}(t_0)$ y $\vec{r}(t_0)$, se puede reconstruir toda la trayectoria.

Utilizando el ejemplo de un proyectil: Una pelota se lanza con velocidad inicial $\vec{v}_0 = (v_0 \cos \alpha, v_0 \sin \alpha)$ desde el origen. La única aceleración es la gravedad: $\vec{a}(t) = (0, -g)$.

Integrando una vez: $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a} \, du = (v_0 \cos \alpha, v_0 \sin \alpha - gt)$.

Integrando de nuevo con $\vec{r}(0) = \vec{0}$:

$$\vec{r}(t) = (v_0 \cos \alpha \cdot t, v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2)$$




8.6.2. Longitud de arco

Intuitivamente, la longitud de una curva es el resultado de “enderezarla”. Para calcularla de forma rigurosa, se utiliza el mismo principio que en el cálculo integral: aproximar con objetos sencillos (segmentos de recta) y tomar un límite.

Dividiendo el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguales mediante los puntos $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, con paso $\Delta t = \frac{b-a}{n}$. Cada t_i define un punto $P_i = \vec{r}(t_i)$ sobre la curva.

Uniendo los puntos consecutivos P_i y P_{i+1} con segmentos de recta, formando una poligonal inscrita en la curva. La longitud del segmento i -ésimo es:

$$\Delta L_i = \|P_{i+1} - P_i\| = \|\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)\|$$




Por la definición de derivada, cuando Δt es pequeño:

$$\vec{r}(t_i + \Delta t) - \vec{r}(t_i) \approx \vec{r}'(t_i) \Delta t$$

Por lo tanto, la longitud de cada cuerda se aproxima por:

$$\Delta L_i = \|\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)\| \approx \|\vec{r}'(t_i)\| \Delta t$$

La siguiente figura ilustra esto geoméricamente: al acercar P_{i+1} a P_i , la cuerda (roja) es casi indistinguible del vector tangente escalado $\vec{r}'(t_i)\Delta t$ (azul).



La longitud total de la poligonal es:

$$L_n = \sum_{i=0}^{n-1} \Delta L_i \approx \sum_{i=0}^{n-1} \|\vec{r}'(t_i)\| \Delta t$$

Esta es una suma de Riemann para la función $\|\vec{r}'(t)\|$. Al hacer $n \rightarrow \infty$ (equivalente a $\Delta t \rightarrow 0$), la poligonal converge a la curva real y la suma converge a la integral:

Definición: Longitud de arco

Sea $\vec{r}(t)$ continuamente diferenciable en $[a, b]$. La longitud de arco de la curva es:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \|\vec{r}'(t_i)\| \Delta t = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt$$

Expandiendo la norma en sus componentes:

$$L = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

8.6.3. Parámetro de longitud de arco

Es posible reparametrizar la curva usando como parámetro la longitud de arco s acumulada desde $t = a$:


$$s(t) = \int_a^t \|\vec{r}'(u)\| du$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, $\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\| = v(t)$. Esto permite cambiar entre los dos parámetros:

- s como función de t : mide cuánta longitud se ha recorrido hasta el instante t .
- t como función de s : invirtiendo la relación, permite localizar en qué punto de la curva se está habiendo recorrido una distancia s .

8.7. Los vectores $\hat{T}$, $\hat{N}$ y $\hat{B}$ de Frenet-Serret

Para analizar la geometría de una curva en el espacio (sin importar cómo se parametrice), se construye un sistema de referencia móvil asociado a cada punto de la curva: el triedro de Frenet-Serret, formado por tres vectores unitarios y mutuamente ortogonales $\hat{T}$, $\hat{N}$ y $\hat{B}$.



$\hat{T}$: tangente (dirección de movimiento) $\hat{N}$: normal principal (hacia donde dobla) $\hat{B}$: binormal ($\hat{T} \times \hat{N}$)

8.7.1. Vector tangente unitario $\hat{T}$

El vector tangente unitario apunta en la dirección del movimiento y se obtiene normalizando la derivada de la posición:

Definición: Vector tangente unitario

$$\hat{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}$$

8.7.2. Curvatura κ

La curvatura mide cuánto cambia la dirección de la curva por unidad de longitud de arco, es decir, qué tan rápido se dobla la curva.

Definición: Curvatura

La curvatura κ de una curva en $\mathbb{R}^3$ se define como:

$$\kappa = \left\| \frac{d\hat{T}}{ds} \right\| = \frac{\|\hat{T}'(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}$$

Una fórmula alternativa, más práctica para el cálculo, es:

$$\kappa = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$$

8.7.3. Vector normal principal $\hat{N}$

El vector normal principal apunta hacia el interior de la curva. Este vector se obtiene normalizando la derivada del vector tangente unitario. Dado que $\hat{T}$ es unitario, su derivada es siempre perpendicular a $\hat{T}$, lo que garantiza que $\hat{N}$ también es perpendicular a $\hat{T}$.

Definición: Vector normal principal

$$\hat{N}(t) = \frac{\hat{T}'(t)}{\|\hat{T}'(t)\|}$$

8.7.4. Vector binormal $\hat{B}$

El vector binormal completa el triedro de Frenet-Serret como un tercer vector ortogonal a los dos anteriores. Es el producto vectorial de $\hat{T}$ y $\hat{N}$, y apunta en la dirección perpendicular al plano osculador formado por $\hat{T}$ y $\hat{N}$.

Definición: Vector binormal

$$\hat{B}(t) = \hat{T}(t) \times \hat{N}(t)$$

El plano determinado por $\hat{N}$ y $\hat{B}$ se llama plano normal, y el plano determinado por $\hat{T}$ y $\hat{B}$ se llama plano rectificante.

8.7.5. Resumen del triedro de Frenet-Serret**Teorema: Fórmulas de Frenet-Serret**

Los tres vectores del triedro satisfacen las siguientes relaciones diferenciales:

$$\frac{d\hat{T}}{ds} = \kappa \hat{N}, \quad \frac{d\hat{N}}{ds} = -\kappa \hat{T} + \tau \hat{B}, \quad \frac{d\hat{B}}{ds} = -\tau \hat{N}$$

donde $\kappa \geq 0$ es la curvatura y τ es la torsión.

8.7.6. Descomposición de la aceleración

Una consecuencia importante del triedro de Frenet-Serret es que la aceleración siempre yace en el plano osculador y se puede descomponer en dos componentes ortogonales:

Teorema: Componentes tangencial y normal de la aceleración


$$\vec{a}(t) = a_T \hat{T} + a_N \hat{N}$$

donde:

$$a_T = \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{\vec{r}'(t) \cdot \vec{r}''(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} \quad (\text{componente tangencial})$$

$$a_N = \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|} \quad (\text{componente normal})$$

La componente a_T refleja el cambio de rapidez; la componente a_N refleja el cambio de dirección.



8.8. Ejercicios

1. Determinar el dominio natural de cada función vectorial:

a) $\vec{r}(t) = \left(\sqrt{9 - t^2}, \ln(t + 1), \frac{1}{t} \right)$

b) $\vec{r}(t) = (e^t, \arcsin(2t - 1), \sqrt{t})$

2. Sea $\vec{r}(t) = \left(\frac{t^2 - 4}{t - 2}, \cos t, t^2 + 1 \right)$.

a) Calcular $\lim_{t \rightarrow 2} \vec{r}(t)$ componente a componente.

b) Determinar si $\vec{r}(t)$ es continua en $t = 2$. Justificar.

c) Redefinir $\vec{r}(2)$ si es necesario para hacer la función continua en ese punto.

3. Identificar y describir la curva trazada por cada función vectorial. En cada caso, encontrar la curva equivalente en forma cartesiana eliminando el parámetro t .

a) $\vec{r}(t) = (2 \cos t, 3 \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$

b) $\vec{r}(t) = (t, t^2 - 1), \quad t \in \mathbb{R}$

c) $\vec{r}(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 3t), \quad t \in [0, 4\pi]$

4. Sea $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$. Calcular $\vec{r}'(t)$ y $\vec{r}''(t)$. Verificar la regla del producto para la función escalar $c(t) = e^t$ y el vector $\vec{u}(t) = (\cos t, \sin t, 1)$, comprobando que:

$$\vec{r}'(t) = c'(t) \vec{u}(t) + c(t) \vec{u}'(t)$$

5. Calcular las siguientes integrales vectoriales:

a) $\int_0^\pi (\cos t, \sin t, t) dt$

b) $\int \left(t^2, e^{2t}, \frac{1}{1+t^2} \right) dt$

c) Verificar el Teorema Fundamental del Cálculo: si $\vec{R}(t) = \left(\frac{t^3}{3}, \frac{e^{2t}}{2}, \arctan t \right)$, comprobar que $\vec{R}'(t) = \left(t^2, e^{2t}, \frac{1}{1+t^2} \right)$.

6. Una partícula tiene función de posición $\vec{r}(t) = (t^2 - 1, 2t, t^3/3)$ con $t \geq 0$ (distancias en metros, t en segundos).

- a) Encontrar el vector velocidad $\vec{v}(t)$ y la rapidez escalar $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$.
 - b) Encontrar el vector aceleración $\vec{a}(t)$.
 - c) Evaluar $\vec{v}(1)$, $v(1)$ y $\vec{a}(1)$. ¿Cuál es la dirección de movimiento en $t = 1$?
 - d) Determinar si existe algún instante $t > 0$ en el que la aceleración sea paralela a la velocidad.
7. Una pelota es lanzada desde el punto $\vec{r}_0 = (0, 1, 5, 0)$ m con velocidad inicial $\vec{v}_0 = (10, 0, 8)$ m/s. La única aceleración es la gravedad: $\vec{a}(t) = (0, 0, -9, 8)$ m/s².
 - a) Determinar $\vec{v}(t)$ y $\vec{r}(t)$ integrando la aceleración con las condiciones iniciales dadas.
 - b) Encontrar el instante t^* en que la pelota alcanza su altura máxima en z .
 - c) Calcular la posición en t^* .
 - d) Encontrar el instante en que la pelota golpea el plano $z = 0$ y el punto de impacto.
8. Calcular la longitud de arco de cada curva en el intervalo indicado:
 - a) $\vec{r}(t) = (3t, 4 \cos t, 4 \sin t)$ en $[0, 2\pi]$.
 - b) $\vec{r}(t) = (t^2, \frac{2}{3}t^3, t)$ en $[0, 1]$.
Sugerencia para (b): Simplificar $\|\vec{r}'(t)\|^2$ buscando un cuadrado perfecto.
9. Para la curva $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$:
 - a) Calcular el vector tangente unitario $\hat{T}(t)$.
 - b) Calcular la curvatura κ usando la fórmula $\kappa = \frac{\|\hat{T}'(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}$.
 - c) Verificar el resultado usando la fórmula alternativa $\kappa = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$.
 - d) ¿La curvatura es constante? ¿Qué dice esto sobre la forma de la curva?
10. Para la curva $\vec{r}(t) = (t, t^2, \frac{2}{3}t^3)$, encontrar en el punto correspondiente a $t = 1$:
 - a) El vector tangente unitario $\hat{T}(1)$.
 - b) El vector normal principal $\hat{N}(1)$.
 - c) El vector binormal $\hat{B}(1) = \hat{T}(1) \times \hat{N}(1)$.
 - d) Verificar que los tres vectores son mutuamente ortogonales y unitarios.
11. Una partícula se mueve según $\vec{r}(t) = (2 \sin t, 2 \cos t, 3t)$ (distancias en metros).
 - a) Calcular la velocidad $\vec{v}(t)$, la aceleración $\vec{a}(t)$ y la rapidez $v(t)$.
 - b) Descomponer la aceleración en sus componentes tangencial y normal:

$$a_T = \frac{\vec{r}'(t) \cdot \vec{r}''(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}, \quad a_N = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}$$
 - c) Verificar que $\|\vec{a}\|^2 = a_T^2 + a_N^2$.

- d) Calcular la curvatura κ de la trayectoria. ¿Cuál es su radio de curvatura $\rho = 1/\kappa$?
12. Un robot industrial mueve su efector final siguiendo la trayectoria $\vec{r}(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t, t)$ para $t \in [0, 2\pi]$ (la curva sobre un cilindro llamada *cicloide cilíndrica*).
- a) Calcular $\vec{r}'(t)$ y $\|\vec{r}'(t)\|$. Identificar para qué valores de $t \in [0, 2\pi]$ la velocidad se anula.
- b) Calcular la longitud total de la trayectoria $L = \int_0^{2\pi} \|\vec{r}'(t)\| dt$.
Sugerencia: Usar la identidad $1 - \cos t = 2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$.
- c) Calcular la curvatura $\kappa(t) = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$ en $t = \pi$.
- d) Determinar si la función de longitud de arco $s(t) = \int_0^t \|\vec{r}'(u)\| du$ es invertible en $(0, 2\pi)$. ¿Qué condición debe cumplirse y por qué?
13. Demostrar, partiendo únicamente de la definición de derivada como límite, que el producto punto satisface la regla del producto:

$$\frac{d}{dt} [\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)] = \vec{u}'(t) \cdot \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \cdot \vec{v}'(t)$$

14. En el análisis cinemático de mecanismos y robots, la aceleración de un punto que sigue una trayectoria curvilínea se descompone en dos componentes físicamente distintas. Demostrar rigurosamente que, para cualquier partícula que sigue una curva suave $\vec{r}(t)$, el vector aceleración admite la descomposición:

$$\vec{a}(t) = a_T \hat{T} + a_N \hat{N}$$

y derivar las expresiones explícitas:

$$a_T = \frac{\vec{r}'(t) \cdot \vec{r}''(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}, \quad a_N = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^2}$$

Concluir verificando el resultado sobre el movimiento circular $\vec{r}(t) = (R \cos \omega t, R \sin \omega t, 0)$ e interpretar físicamente ambas componentes.

Sugerencia: Partir de $\vec{v} = v\hat{T}$ (con $v = \|\vec{r}'\|$), diferenciar con la regla del producto, y expandir $\hat{T}'$ usando la regla de la cadena junto con la primera fórmula de Frenet-Serret, $\frac{d\hat{T}}{ds} = \kappa\hat{N}$. Para las fórmulas computacionales, derivar $v^2 = \vec{r}' \cdot \vec{r}'$ y aplicar la identidad de Lagrange.

9. Funciones escalares

La mayoría de los fenómenos físicos e ingenieriles dependen de múltiples variables simultáneamente: la temperatura en un sólido depende de las coordenadas (x, y, z) , la presión de un gas depende de la temperatura y el volumen, la resistencia de una viga depende de su geometría y del material. Para modelar estos fenómenos se introducen las funciones escalares de varias variables, que extienden el concepto de función real $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a dominios de dimensión superior.

9.1. Definición

Definición: Función escalar de n variables

Una función escalar de n variables es una regla f que asigna a cada punto $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ en un subconjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ un único número real:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \longmapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Al conjunto D se le llama dominio de f , y al conjunto de todos los valores posibles de salida se le llama imagen o rango:

$$\text{Im}(f) = \{f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R} : (x_1, \dots, x_n) \in D\}$$

9.2. Dominio y Rango


El dominio natural de f es el conjunto de todos los puntos para los que la expresión de f está matemáticamente definida. Las restricciones más frecuentes son:

- **Denominadores:** $g(x, y) \neq 0$
- **Raíces de índice par:** $g(x, y) \geq 0$
- **Logaritmos:** $g(x, y) > 0$
- **Funciones inversas:** respetar el dominio de arcsin, arc cos, etc.

Ejemplo 1. Sea $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$. La condición $9 - x^2 - y^2 \geq 0$ define el dominio:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$$

Este es el círculo de radio 3 centrado en el origen. La imagen es $\text{Im}(f) = [0, 3]$: el mínimo 0 se alcanza en la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ y el máximo 3 en el origen.



Ejemplo 2. Sea $g(x, y, z) = \frac{\ln(1 - x^2 - y^2)}{z}$. Se necesitan dos condiciones simultáneas:

$$1 - x^2 - y^2 > 0 \Rightarrow x^2 + y^2 < 1 \quad \text{y} \quad z \neq 0$$

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1 \text{ y } z \neq 0\}$$

Para determinar la imagen de f , es útil: identificar los valores extremos en la frontera del dominio, determinar si f es continua, y verificar si hay máximos o mínimos globales.

9.3. Gráfica de funciones con dominio en $\mathbb{R}^2$


Para una función de dos variables $z = f(x, y)$, la gráfica es la superficie en $\mathbb{R}^3$ formada por todos los puntos de la forma $(x, y, f(x, y))$:

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D\}$$

Cada punto del plano xy se eleva o hunde según el valor que f le asigna.


Ejemplo 1. Paraboloide elíptico: $f(x, y) = x^2 + y^2$

Esta superficie tiene un mínimo global en el origen $(0, 0, 0)$ y crece sin límite al alejarse. En cualquier plano vertical que pase por el eje z , la sección es una parábola.



Ejemplo 2. Silla de montar (paraboloide hiperbólico): $f(x, y) = x^2 - y^2$

Esta superficie sube como una parábola en la dirección x y baja como una parábola en la dirección y . El punto $(0, 0, 0)$ es un punto de silla: no es ni máximo ni mínimo local.



Punto de silla

9.4. Curvas de nivel de funciones con dominio en $\mathbb{R}^2$

Visualizar una superficie en papel es limitado. Una alternativa es proyectar sobre el plano xy las intersecciones de la superficie con planos horizontales $z = c$.

Definición: Curvas de nivel

La curva de nivel de $f(x, y)$ para el valor $c \in \mathbb{R}$ es el conjunto:


$$C_c = \{(x, y) \in D : f(x, y) = c\}$$

La colección de curvas de nivel para distintos valores de c se llama mapa de contorno de f . Es la representación que usan los mapas topográficos: cada curva une puntos con la misma altitud.

La curva de nivel C_c es la proyección sobre el plano xy de la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano horizontal $z = c$. Curvas de nivel muy juntas indican que la función cambia rápidamente; curvas muy separadas indican cambio lento.

Ejemplo 1. Curvas de nivel del paraboloide: $f(x, y) = x^2 + y^2$


La ecuación $x^2 + y^2 = c$ define círculos de radio $\sqrt{c}$ (solo para $c > 0$). Para $c = 0$ el único punto es el origen.



Nótese que las curvas están más separadas en el origen (la función sube lentamente) y más juntas hacia afuera (la función sube más rápido). Esto refleja que la pendiente de la parábola es mayor lejos del vértice.

Ejemplo 2. Curvas de nivel de la silla de montar: $f(x, y) = x^2 - y^2$

La ecuación $x^2 - y^2 = c$ define hipérbolas (para $c \neq 0$) o dos rectas cruzadas (para $c = 0$).



Las hipérbolas azules ($c > 0$) abren en la dirección x y las rojas ($c < 0$) abren en la dirección y , reflejando que la función sube en x y baja en y .

9.5. Superficies de nivel de funciones con dominio en $\mathbb{R}^3$

Para una función de tres variables $w = f(x, y, z)$, la gráfica sería un objeto en $\mathbb{R}^4$, imposible de visualizar directamente. El análogo de las curvas de nivel son las superficies de nivel.

Definición: Superficie de nivel


La superficie de nivel de $f(x, y, z)$ para el valor $c \in \mathbb{R}$ es el conjunto:

$$S_c = \{(x, y, z) \in D : f(x, y, z) = c\}$$

Cada superficie de nivel es un subconjunto del espacio $\mathbb{R}^3$ y representa todos los puntos donde f toma el mismo valor c .

Ejemplo 1. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

Las superficies de nivel son $x^2 + y^2 + z^2 = c$, que son esferas concéntricas de radio $\sqrt{c}$ centradas en el origen (para $c > 0$).



Ejemplo 2. $g(x, y, z) = x^2 + y^2$

Las superficies de nivel de g son $x^2 + y^2 = c$, que son cilindros circulares de radio $\sqrt{c}$ con eje en la dirección z . La función no depende de z , de modo que para cada nivel c hay una familia de circunferencias apiladas verticalmente.

9.6. Ejercicios

1. Determinar el dominio natural de cada función escalar e indicar a qué conjunto geométrico corresponde en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$:

a) $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - 4y^2}$

b) $g(x, y) = \ln(y - x^2)$

c) $h(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$

2. Determinar el dominio natural de cada función de tres variables y describir geométricamente la región en $\mathbb{R}^3$:

a) $f(x, y, z) = \sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}$

b) $g(x, y, z) = \frac{\arcsin(z)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

3. Para la función $f(x, y) = \sqrt{x + y} + \sqrt{4 - x^2}$:

a) Encontrar el dominio natural D e identificarlo geométricamente (trazar o describir la región).

b) Determinar la imagen de f .

c) Verificar que el punto $(1, 0)$ pertenece a D y calcular $f(1, 0)$.

4. Identificar y nombrar la superficie definida por cada función $z = f(x, y)$, describiendo su forma geométrica (paraboloide, silla de montar, plano, cono, cilindro, etc.) y señalando características clave como vértice, eje de simetría o punto de silla:

a) $f(x, y) = 3x - 2y + 5$

- b) $f(x, y) = x^2 + 4y^2$
c) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
d) $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$
5. Para $f(x, y) = x^2 + 4y^2$, trazar las curvas de nivel correspondientes a $c = 0, 1, 4, 9$ en el plano xy .
- a) Determinar la forma geométrica de cada curva de nivel e indicar sus semiejes.
b) ¿Qué ocurre con el espaciado entre curvas de nivel conforme c aumenta? ¿Qué dice esto sobre la “pendiente” de la superficie?
c) ¿Para qué valores de c existen curvas de nivel? ¿Cuál es la imagen de f ?
6. Trazar las curvas de nivel de $f(x, y) = xy$ para $c = -2, -1, 0, 1, 2$ e identificar su forma.
- a) Mostrar que para $c \neq 0$ cada curva de nivel es una hipérbola y determinar sus asíntotas.
b) ¿Qué ocurre con la curva de nivel $c = 0$? Describir el conjunto $\{(x, y) : xy = 0\}$.
c) Usando el mapa de contorno, describir el comportamiento de f cerca del origen: ¿tiene máximo, mínimo o punto de silla?
7. Se dan las ecuaciones de las curvas de nivel de una función $f(x, y)$. En cada caso, identificar una posible expresión para $f(x, y)$ justificando la elección:
- a) Las curvas de nivel son rectas paralelas de la forma $2x - y = c$.
b) Las curvas de nivel son circunferencias centradas en $(1, 2)$.
c) Las curvas de nivel son parábolas de la forma $y = x^2 + c$.
d) Las curvas de nivel para $c > 0$ son elipses, y no existen para $c < 0$.
8. Para cada función de tres variables, identificar y describir geoméricamente sus superficies de nivel para $c = 1, 4, 9$:
- a) $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ (¿depende de z ?)
b) $g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$
c) $h(x, y, z) = 2x + 3y - z$

Para el inciso (b), distinguir los casos $c > 0$, $c = 0$ y $c < 0$.

9. Un mapa topográfico de una montaña muestra curvas de nivel equiespaciadas en altura ($\Delta z = 100$ m) a distancias horizontales que varían de un punto a otro. En la zona A las curvas están muy juntas; en la zona B están muy separadas.
- a) ¿En cuál zona es más pronunciada la pendiente del terreno? Justificar usando la interpretación de las curvas de nivel.
b) Si $z = f(x, y)$ modela la altitud, y en la zona A una curva de nivel $c = 500$ m y la siguiente $c = 600$ m están separadas apenas 50 m horizontalmente, mientras que en la zona B están separadas 500 m, estimar la “pendiente media” en cada zona como $\Delta z / \Delta d$.

- c)* Proponer una función $f(x, y)$ sencilla cuyas curvas de nivel tengan la forma general de un volcán (alto en el centro, nivel descendente hacia afuera).
10. La distribución de temperatura en una placa metálica cuadrada $[-2, 2] \times [-2, 2]$ está modelada por:

$$T(x, y) = 100 - 10x^2 - 20y^2 \quad (^\circ\text{C})$$

- a)* Encontrar el dominio y la imagen de T sobre la placa.
- b)* Calcular la temperatura en los puntos $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(2, 0)$.
- c)* Trazar las curvas de nivel (isotermas) para $T = 100, 80, 60, 40, 20$ $^\circ\text{C}$. ¿Qué forma tienen? ¿Cuáles de ellas intersectan la placa?
- d)* Determinar el conjunto de puntos de la placa donde la temperatura es de exactamente 70 $^\circ\text{C}$ e identificarlo geoméricamente.
- e)* Una partícula se mueve sobre la placa siguiendo la trayectoria $\vec{r}(t) = (t, t^2 - 1)$ para $t \in [-1, 1]$. Calcular $T(x(t), y(t))$ a lo largo de esta trayectoria y encontrar el punto de temperatura máxima.

10. Límites y Continuidad de Funciones Escalares

En el cálculo de una variable, al calcular $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, el punto x solo puede acercarse a a por dos caminos: por la izquierda o por la derecha. En el cálculo multivariable, la situación es radicalmente más compleja: el punto (x, y) puede acercarse a (x_0, y_0) por infinitos caminos distintos: rectas, parábolas, espirales, etc. Esto hace que demostrar la existencia de un límite sea más complicado.

10.1. Definición formal del límite

Definición: Límite de una función de dos variables

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea (x_0, y_0) un punto de acumulación del dominio D . Se dice que el límite de f cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) es el número real L , y se escribe:


$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que:

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon$$

En otras palabras: todos los puntos del dominio dentro del disco de radio δ centrado en (x_0, y_0) — excepto el propio centro — tienen imágenes dentro del intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

10.1.1. Interpretación geométrica de la definición ε - δ



La definición exige que sin importar el camino por el que (x, y) se acerque a (x_0, y_0) , el valor $f(x, y)$ siempre deba converger al mismo L . Este es el requisito clave que distingue el límite multivariable del univariable.

La definición se extiende a funciones de n variables reemplazando el disco por una bola en $\mathbb{R}^n$: $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon$, donde $\|\cdot\|$ es la norma euclídea en $\mathbb{R}^n$.

10.2. Propiedades algebraicas del límite

Al igual que en una variable, los límites multivariables satisfacen las reglas aritméticas estándar.

Teorema: Álgebra de límites

Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$ y $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = M$, entonces:

1. $\lim(f \pm g) = L \pm M$
2. $\lim(f \cdot g) = L \cdot M$
3. $\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M}$, siempre que $M \neq 0$
4. $\lim[f(x,y)]^n = L^n$, para n entero positivo

10.3. Cálculo de límites

Existen tres estrategias principales para evaluar un límite multivariable.

10.3.1. Estrategia 1: Sustitución directa

Si f es un polinomio o una función racional bien definida en (x_0, y_0) , el límite se calcula simplemente evaluando:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$$

Ejemplo.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x^2 + 3y}{x + y} = \frac{1 + 6}{1 + 2} = \frac{7}{3}$$

Cuando la sustitución produce una indeterminación ($\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, etc.), es necesario usar técnicas algebraicas: factorización, racionalización o cambio de variable.

Ejemplo con indeterminación.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x - y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x - y)(x + y)}{x - y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) = 0$$

10.3.2. Estrategia 2: Método de trayectorias


Este método se usa para demostrar que un límite no existe. Si se puede encontrar al menos dos trayectorias que se acercan al mismo punto pero producen valores límite distintos, entonces el límite no existe.

Nota: Principio de trayectorias

Si existen dos caminos C_1 y C_2 que convergen a (x_0, y_0) tales que:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C_1}} f(x,y) = L_1 \neq L_2 = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C_2}} f(x,y)$$

entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ **no existe**.



Ejemplo. Demostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ no existe.

Trayectoria C_1 : $y = 0$ (eje x). Al sustituir $y = 0$:

$$\frac{x \cdot 0}{x^2 + 0} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Trayectoria C_2 : $y = x$. Al sustituir $y = x$:

$$\frac{x \cdot x}{x^2 + x^2} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

Como $0 \neq \frac{1}{2}$, el límite no existe.

Para funciones homogéneas o cocientes de polinomios en el origen, es útil probar la familia de rectas $y = mx$. Si el límite a lo largo de $y = mx$ depende de m , el límite general no existe.

Ejemplo con familia $y = mx$. Sea $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$. A lo largo de $y = mx$:

$$f(x, mx) = \frac{x^2 \cdot mx}{x^4 + m^2 x^2} = \frac{mx^3}{x^2(x^2 + m^2)} = \frac{mx}{x^2 + m^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Todas las rectas dan 0. Pero a lo largo de la parábola $y = x^2$:

$$f(x, x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + x^4} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

El límite no existe, aunque todas las rectas hubieran dado el mismo resultado. Esto ilustra que pasar la prueba de rectas **no es suficiente** para garantizar la existencia del límite.

10.3.3. Estrategia 3: Coordenadas polares

Para límites en el origen $(0, 0)$, el cambio a coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ transforma el problema:

$$(x, y) \rightarrow (0, 0) \iff r \rightarrow 0^+ \quad (\text{para cualquier } \theta)$$

Nota: Criterio polar

Si al sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ la expresión de f se puede acotar como $|f| \leq g(r)$ donde $g(r) \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow 0^+$ independientemente de θ , entonces:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$$

Si la expresión resultante depende de θ de forma irreductible, el límite probablemente no existe.

Ejemplo 1: límite que existe. Sea $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2}$.

En polares: $x^2 + y^2 = r^2$, $x^3 = r^3 \cos^3 \theta$:

$$\frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = r \cos^3 \theta$$

Dado que $|\cos \theta| \leq 1$, se tiene $|r \cos^3 \theta| \leq r \rightarrow 0$. Por lo tanto, el límite es **0**.

Ejemplo 2: límite que no existe. Sea $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

En polares:

$$\frac{r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos(2\theta)$$

El resultado depende de θ : no converge a un valor único. El límite no existe.

10.3.4. Teorema del emparedado**Teorema: Teorema del emparedado**

Si existen funciones g y h tales que $g(x,y) \leq f(x,y) \leq h(x,y)$ en un entorno de (x_0, y_0) , y además:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} h(x,y) = L$$

entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y) = L$.

Este teorema es la herramienta formal que justifica el criterio polar: si se acota $|f| \leq r \cdot M$ donde M es una constante (o función acotada en θ), entonces $-rM \leq f \leq rM$ y ambas cotas tienden a 0.

Ejemplo. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$.

Usando $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = r$ y $x^2 \leq x^2 + y^2 = r^2$:

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{r^2 \cdot r}{r^2} = r \rightarrow 0$$

Por el Teorema del Emparedado, el límite es **0**.

10.4. Continuidad

Definición: Continuidad en un punto

Una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en el punto $(x_0, y_0) \in D$ si se satisfacen simultáneamente las tres condiciones:

1. $f(x_0, y_0)$ está definida.
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ existe.
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

Si f es continua en todos los puntos de D , se dice que f es continua en D .

10.4.1. Funciones continuas elementales

Teorema: Continuidad de funciones elementales

Las siguientes funciones son continuas en todo su dominio natural:

- Todo polinomio $p(x, y) = \sum a_{ij}x^i y^j$.
- Toda función racional $p(x, y)/q(x, y)$ donde $q(x, y) \neq 0$.
- Las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y raíces aplicadas a expresiones continuas.
- La composición de funciones continuas: si $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces $\phi \circ g$ es continua.

10.4.2. Extensión continua de una función

Cuando una función presenta una indeterminación en un punto, puede ser posible extenderla de manera continua redefiniendo su valor en ese punto.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ para $(x, y) \neq (0, 0)$. En polares:

$$\frac{r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)}{r^2} = r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

Como $|\cos^3 \theta + \sin^3 \theta| \leq 2$, se tiene que $|f| \leq 2r \rightarrow 0$. Por tanto:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$$

Definiendo $f(0, 0) = 0$, la función extendida es continua en el origen.

10.4.3. Discontinuidades y su clasificación

Una función puede ser discontinua en un punto (x_0, y_0) por tres razones:

- **No está definida:** $(x_0, y_0) \notin D$.

- **El límite no existe:** la función oscila o toma valores distintos según el camino.
- **El límite existe pero no coincide con $f(x_0, y_0)$:** discontinuidad evitable.

10.5. Ejercicios

1. Calcule los siguientes límites usando sustitución directa. Identifique por qué la sustitución es válida en cada caso.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (3x^2 - 2xy + y)$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,3)} (x^3 + 2xy - y^2)$

2. Calcule los siguientes límites de funciones racionales. Verifique previamente que el denominador no se anula en el punto límite.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \frac{x^2 + y}{x - y + 1}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{3xy - y^2}{x + y}$

3. Calcule los siguientes límites aplicando el teorema de continuidad de funciones elementales (trigonómicas, exponenciales y su composición).

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0, \pi/2)} e^x \sin(y)$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi, 0)} [x \cos(y) + e^y]$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (4, 1)} \sqrt{x + y^2} \cdot \ln(xy)$

4. La sustitución directa produce una indeterminación en los siguientes límites. Utilice factorización algebraica para resolverlos.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 - y^2}{x - y}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{2x^2 - xy - y^2}{2x + y}$

Sugerencia: intente factorizar el numerador como producto de dos binomios.

5. Calcule el siguiente límite.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + 4} - 2}{x^2 + y^2}$$

6. Sea la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Determine si f es continua en $(0, 0)$ verificando las tres condiciones de la definición. En caso de que no lo sea, clasifique el tipo de discontinuidad.

7. Demuestre que el siguiente límite no existe:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

8. Utilice el método de trayectorias para determinar si existen los siguientes límites. Justifique su conclusión.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 2y^2}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^4}$

9. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

10. Determina si los límites existen y, en caso afirmativo, calcule su valor. Justifique su conclusión.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$

11. Calcule el siguiente límite aplicando el Teorema del Emparejado.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin(y)}{x^2 + y^2}$$

12. Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}.$$

a) Use coordenadas polares para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

b) Defina la extensión continua

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ c & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Determine el valor de c que hace a $\tilde{f}$ continua en el origen y justifique su respuesta verificando las tres condiciones de continuidad.

13. Considere el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

- a) Evalúe el límite a lo largo de la familia de rectas $y = mx$ (con $m \in \mathbb{R}$) y determine el valor que se obtiene para cada m .
- b) Evalúe el límite a lo largo de la parábola $y = x^2$ y compare el resultado con el del apartado anterior.
- c) Concluya sobre la existencia del límite.

14. Sea la función

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$ usando el Teorema del Emparejado.
- b) Clasifique el tipo de discontinuidad de g en $(0, 0)$.
- c) Determine, si es posible, un valor c^* tal que la función redefinida con $g(0, 0) = c^*$ sea continua en el origen.

15. Demuestra mediante la definición ε - δ , que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

11. Derivadas Parciales

El análisis de funciones de varias variables requiere una noción de tasa de cambio que respete la estructura multidimensional del dominio. En una variable, la derivada mide cómo cambia $f(x)$ cuando x varía. En varias variables, la pregunta más natural es: ¿cómo cambia $f(x, y)$ cuando solo una de las variables varía, mientras la otra permanece fija? La respuesta a esta pregunta es la derivada parcial.

11.1. Definición

Definición: Derivada parcial

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea (x_0, y_0) un punto interior del dominio D . La derivada parcial de f con respecto a x en (x_0, y_0) se define como:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

siempre que el límite exista. De forma análoga, la derivada parcial con respecto a y en (x_0, y_0) es:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

La estructura de la definición es idéntica a la de la derivada ordinaria: se perturba una sola variable, se mide el cociente de diferencias y se toma el límite. La única diferencia es que la otra variable permanece constante durante el proceso.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = x^2 + xy$. Por definición:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 + (1+h) \cdot 2 - (1+2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$

11.2. Notaciones

Para una función $z = f(x, y)$, la derivada parcial con respecto a x admite varias escrituras equivalentes:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} = f_x = \partial_x f = D_x f$$

y de forma análoga para y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y} = f_y = \partial_y f = D_y f$$

Para indicar que la derivada se evalúa en un punto específico (x_0, y_0) se escribe $f_x(x_0, y_0)$ o $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$.

La notación f_x es compacta y útil en cálculos. La notación de Leibniz $\frac{\partial f}{\partial x}$ es más explícita y facilita la identificación de la variable de derivación, lo que la hace conveniente en contextos donde intervienen muchas variables.

11.3. Cálculo de derivadas parciales

Nota: Regla práctica

Para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$, se trata y como una constante y se deriva con respecto a x usando las reglas ordinarias de derivación. Para calcular $\frac{\partial f}{\partial y}$, se trata x como una constante y se deriva con respecto a y .

Todas las reglas de derivación de una variable se aplican sin modificación: la regla del producto, la del cociente y la de la cadena funcionan igual, porque en cada derivada parcial solo hay una variable activa.

Ejemplo 1. Sea $f(x, y) = x^3y^2 + 2xy - y^4$.

$$f_x = 3x^2y^2 + 2y \quad f_y = 2x^3y + 2x - 4y^3$$

Ejemplo 2. Sea $g(x, y) = \sin(x^2 + y)$. Aplicando la regla de la cadena:

$$g_x = \cos(x^2 + y) \cdot 2x \quad g_y = \cos(x^2 + y)$$


Ejemplo 3. Sea $h(x, y) = e^{xy} \ln y$. Al derivar con respecto a x se trata $\ln y$ como constante, y al derivar con respecto a y se aplica la regla del producto:

$$h_x = ye^{xy} \ln y \quad h_y = xe^{xy} \ln y + \frac{e^{xy}}{y}$$

11.4. Interpretación geométrica y conceptual

Considérese la superficie $z = f(x, y)$ y un punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ sobre ella. Si se intersecta la superficie con el plano vertical $y = y_0$, se obtiene una curva plana que puede verse como la gráfica de la función de una variable $z = f(x, y_0)$. La derivada parcial $f_x(x_0, y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto considerado.

De forma análoga, la intersección con el plano $x = x_0$ da la curva $z = f(x_0, y)$, y $f_y(x_0, y_0)$ es la pendiente de su recta tangente.



Conceptualmente, $f_x(x_0, y_0)$ mide la tasa de cambio instantánea de f en la dirección del eje x al pasar por (x_0, y_0) . Si $f_x > 0$, la función crece al moverse en esa dirección; si $f_x < 0$, decrece. La misma idea se aplica a f_y en la dirección y . Cada derivada parcial da información sobre el comportamiento de f en una dirección coordenada, sin decir nada sobre las demás.

11.5. Generalización para n variables

La definición se extiende sin dificultad a funciones de n variables.

Definición: Derivada parcial en $\mathbb{R}^n$

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $\mathbf{x}_0 = (x_1, \dots, x_n) \in D$ un punto interior. La derivada parcial de f con respecto a la i -ésima variable en $\mathbf{x}_0$ es:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(\mathbf{x}_0)}{h}$$

Para calcularla, se fijan todas las variables excepto x_i y se aplican las reglas ordinarias de derivación. El resultado es una función que, en general, depende de todas las variables.

Ejemplo. Sea $f(x, y, z) = x^2yz + e^{xz}$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xyz + ze^{xz} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2z \quad \frac{\partial f}{\partial z} = x^2y + xe^{xz}$$

11.6. Derivadas parciales de orden superior

Si f_x y f_y son a su vez diferenciables, se pueden calcular sus derivadas parciales, obteniendo derivadas de segundo orden. Para $f(x, y)$ existen cuatro:

$$\begin{aligned} f_{xx} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) & f_{yy} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ f_{xy} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) & f_{yx} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

Las derivadas f_{xx} y f_{yy} se denominan derivadas puras, y f_{xy} , f_{yx} se denominan derivadas mixtas. En la notación de Leibniz, el orden de derivación se lee de derecha a izquierda:

$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ indica que se deriva primero con respecto a x y luego con respecto a y .

El proceso se puede iterar para obtener derivadas de cualquier orden. Una derivada de orden k se obtiene aplicando k veces la operación de derivación parcial, posiblemente con respecto a variables distintas.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = x^3y + \sin(xy)$.

$$\begin{aligned} f_x &= 3x^2y + y \cos(xy) & f_y &= x^3 + x \cos(xy) \\ f_{xx} &= 6xy - y^2 \sin(xy) & f_{yy} &= -x^2 \sin(xy) \\ f_{xy} &= 3x^2 + \cos(xy) - xy \sin(xy) & f_{yx} &= 3x^2 + \cos(xy) - xy \sin(xy) \end{aligned}$$

Se observa que $f_{xy} = f_{yx}$. Esta igualdad no es casual: es consecuencia del teorema de Clairaut.

11.7. Teorema de Clairaut

Teorema: Teorema de Clairaut

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Si las derivadas mixtas f_{xy} y f_{yx} están definidas en un entorno abierto del punto (x_0, y_0) y son continuas en (x_0, y_0) , entonces:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

La hipótesis de continuidad es necesaria: existen funciones para las que f_{xy} y f_{yx} existen en un punto pero son distintas, precisamente porque alguna de las dos no es continua allí.

Ejemplo de aplicación. Sea $f(x, y) = e^{x^2y}$. Se tiene:

$$f_x = 2xy e^{x^2y} \quad f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy e^{x^2y}) = 2x e^{x^2y} + 2x \cdot x^2y e^{x^2y} = 2x(1 + x^2y) e^{x^2y}$$

$$f_y = x^2 e^{x^2y} \quad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 e^{x^2y}) = 2x e^{x^2y} + x^2 \cdot 2xy e^{x^2y} = 2x(1 + x^2y) e^{x^2y}$$

Como ambas derivadas son continuas, el teorema garantiza $f_{xy} = f_{yx}$, lo que se verifica directamente.

El teorema se extiende a funciones de n variables y a derivadas mixtas de cualquier orden: si todas las derivadas parciales de orden k son continuas, el resultado no depende del orden en que se apliquen las k derivaciones.

11.8. Ejercicios

1. Calcule f_x y f_y usando la definición de límite para cada función en el punto indicado.

a) $f(x, y) = 3x^2 - 2xy$ en $(1, 1)$

b) $f(x, y) = xy^2 + x$ en $(2, 1)$

2. Calcule todas las derivadas parciales de primer orden.

a) $f(x, y) = x^4 - 3x^2y^3 + y^5$

b) $g(x, y) = \frac{x^2 - y}{x + 2y}$

c) $h(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$

3. Calcule las derivadas parciales de primer orden de las siguientes funciones.

a) $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$

b) $g(x, y) = \ln(x^2 + \sin y)$

c) $h(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

4. Calcule las derivadas parciales de primer orden de las siguientes funciones de tres variables.

a) $f(x, y, z) = x^2y - yz^3 + xz$

b) $g(x, y, z) = e^{xyz}$

$$c) \ h(x, y, z) = \frac{x + y}{y + z}$$

5. Calcule las cuatro derivadas parciales de segundo orden f_{xx} , f_{yy} , f_{xy} y f_{yx} .

$$a) \ f(x, y) = x^3y^2 - 5xy^4$$

$$b) \ f(x, y) = \cos(x + 2y)$$

$$c) \ f(x, y) = x \ln(xy)$$

6. Verifique el teorema de Clairaut calculando f_{xy} y f_{yx} y comprobando que son iguales.

$$a) \ f(x, y) = x^2e^y + y^2 \sin x$$

$$b) \ f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) \quad ((x, y) \neq (0, 0))$$

7. Para $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$, encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a las curvas de corte con los planos $y = 1$ y $x = 2$ en el punto $(2, 1, 11)$.

8. Calcule las derivadas parciales indicadas.

$$a) \ f_{xxy} \text{ para } f(x, y) = x^4y^3 - 2x^2y$$

$$b) \ f_{xyz} \text{ para } f(x, y, z) = x^2yz + xy^2z + xyz^2$$

$$c) \ \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} \text{ para } f(x, y) = e^{xy}$$

9. Demuestre que $u(x, t) = e^{-t} \sin x$ satisface la ecuación del calor $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

10. Demuestre que $u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ satisface la ecuación de Laplace $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ para $(x, y) \neq (0, 0)$.

11. Se define $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

a) Calcule $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ usando la definición de límite.

b) Calcule $f_{xy}(0, 0)$ y $f_{yx}(0, 0)$. ¿Se cumple el teorema de Clairaut? Justifique.

12. Sea $f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ con $a, b, c \in \mathbb{N}$. Demuestre que:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = (a + b + c) f(x, y, z)$$

Este resultado es un caso particular del teorema de Euler para funciones homogéneas.

12. Planos Tangentes

En el cálculo de una variable, la recta tangente a $y = f(x)$ en x_0 es la mejor aproximación lineal de la función en ese punto. En dos variables, el análogo es el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en un punto dado: el plano que mejor aproxima a la superficie en un entorno de ese punto.

12.1. Derivación de la ecuación

Un plano que pasa por el punto (x_0, y_0, z_0) con $z_0 = f(x_0, y_0)$ tiene la forma:

$$z - z_0 = a(x - x_0) + b(y - y_0)$$

para ciertos coeficientes a y b por determinar. El criterio de tangencia exige que este plano contenga las rectas tangentes a las curvas de corte de la superficie con cada plano coordenado vertical.

La intersección del plano con $y = y_0$ produce la recta $z - z_0 = a(x - x_0)$. Esa recta debe ser tangente a la curva $z = f(x, y_0)$ en x_0 , por lo que su pendiente es $f_x(x_0, y_0)$, de donde $a = f_x(x_0, y_0)$.


La intersección con $x = x_0$ produce la recta $z - z_0 = b(y - y_0)$. Por el mismo argumento, $b = f_y(x_0, y_0)$.

Sustituyendo ambos coeficientes se obtiene la ecuación del plano tangente.

Definición: Plano tangente

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en (x_0, y_0) . El plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es:

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$



12.2. Aproximación lineal

La ecuación del plano tangente proporciona una forma de aproximar $f(x, y)$ cuando (x, y) es cercano a (x_0, y_0) . Dado que el plano se acerca a la superficie en ese entorno, se

tiene:

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

La función del lado derecho se denomina linealización de f en (x_0, y_0) .

Definición: Linealización

La linealización de f en (x_0, y_0) es la función afín:

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

La expresión $f(x, y) \approx L(x, y)$ se denomina aproximación lineal de f en (x_0, y_0) .

La aproximación es válida cuando (x, y) está suficientemente cerca de (x_0, y_0) y f es diferenciable en ese punto.

Ejemplo. Aproximar $\sqrt{(1,01)^2 + (0,98)^2}$ usando la linealización de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $(1, 1)$.

$f(1, 1) = \sqrt{2}$. Las derivadas parciales son:

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \Rightarrow f_x(1, 1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \Rightarrow f_y(1, 1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

La linealización es:

$$L(x, y) = \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}(x - 1) + \frac{1}{\sqrt{2}}(y - 1)$$

Evalando en $(1,01, 0,98)$, con $x - 1 = 0,01$ e $y - 1 = -0,02$:

$$L(1,01, 0,98) = \sqrt{2} + \frac{0,01}{\sqrt{2}} - \frac{0,02}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} - \frac{0,01}{\sqrt{2}} \approx 1,4071$$

El valor exacto es $\sqrt{1,0201 + 0,9604} = \sqrt{1,9805} \approx 1,4073$, con un error del orden de 10^{-4} .

12.3. Diferencial total


Antes de definir el diferencial en dos variables conviene recordar la idea en el cálculo de una variable, donde el concepto es más sencillo de visualizar. Sea $y = f(x)$ derivable en x_0 . Cuando x se incrementa una cantidad Δx , el cambio real de la función es:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

Este cambio real recorre la curva y en general no es fácil de calcular. La recta tangente ofrece una alternativa: en lugar de subir por la curva, se sube por la recta tangente, cuya pendiente es $f'(x_0)$. El ascenso a lo largo de la tangente correspondiente al mismo desplazamiento horizontal se llama diferencial de y :

$$dy = f'(x_0) dx,$$

donde $dx = \Delta x$ es un incremento independiente. Así, Δy es el cambio verdadero medido sobre la curva y dy es el cambio aproximado medido sobre la recta tangente. La diferencia entre ambos, $\Delta y - dy$, es el error de la aproximación lineal y tiende a cero más rápido que dx cuando $dx \rightarrow 0$, de modo que $\Delta y \approx dy$ para incrementos pequeños.



En la figura, dx es el desplazamiento horizontal, Δy es el ascenso real sobre la curva y dy es el ascenso sobre la recta tangente. Cuanto menor sea dx , más pequeña es la brecha $\Delta y - dy$ entre la curva y su tangente.

La misma idea se traslada a dos variables sin más que reemplazar la recta tangente por el plano tangente. Sea $z = f(x, y)$ diferenciable. Cuando (x, y) pasa de (x_0, y_0) a $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, el cambio real en z es:

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

Igual que Δy se aproximaba subiendo por la recta tangente, ahora Δz se aproxima subiendo por el plano tangente. El ascenso sobre ese plano, correspondiente a los desplazamientos dx y dy , es el diferencial total.

Definición: Diferencial total

El diferencial total de $z = f(x, y)$ en el punto (x_0, y_0) es:

$$dz = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

donde dx y dy son variables independientes que representan los incrementos en x e y .

La estructura es la misma que en una variable. Allí un solo término, $f'(x_0) dx$, recogía la contribución de la única dirección disponible; aquí hay una contribución por cada variable, $f_x dx$ en la dirección x y $f_y dy$ en la dirección y , y el diferencial total es su suma. El diferencial dz mide el cambio en altura sobre el plano tangente cuando (x, y) se desplaza dx en la dirección x y dy en la dirección y . La relación entre el cambio real y el diferencial es:

$$\Delta z \approx dz \quad \text{cuando } dx \text{ y } dy \text{ son pequeños}$$

En la notación general para $w = f(x_1, \dots, x_n)$, el diferencial total es:

$$dw = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

Una aplicación directa del diferencial es la estimación de errores: si cada variable x_i tiene un error de medición dx_i , el error propagado en f se estima como $|df|$.

Ejemplo 1. Sea $z = x^2y^3$. El diferencial es:

$$dz = 2xy^3 dx + 3x^2y^2 dy$$

Si $(x, y) = (2, 1)$, $dx = 0,1$ y $dy = -0,05$:

$$dz = 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (0,1) + 3 \cdot 4 \cdot 1 \cdot (-0,05) = 0,4 - 0,6 = -0,2$$

El cambio real es $\Delta z = (2,1)^2(0,95)^3 - 4 \approx -0,1986$, consistente con la estimación.

Ejemplo 2. Las dimensiones de una caja rectangular se miden con errores de hasta 0,1 cm en cada dimensión. Si las medidas nominales son $l = 10$ cm, $w = 8$ cm y $h = 5$ cm, estimar el error en el volumen $V = lwh$.

$$dV = wh dl + lh dw + lw dh = 40 dl + 50 dw + 80 dh$$

Con $|dl|, |dw|, |dh| \leq 0,1$:

$$|dV| \leq 40(0,1) + 50(0,1) + 80(0,1) = 4 + 5 + 8 = 17 \text{ cm}^3$$

El volumen nominal es $V = 400 \text{ cm}^3$, con un error relativo estimado de $17/400 = 4,25 \%$.

12.4. Ejercicios

1. Halle la ecuación del plano tangente a cada superficie en el punto indicado.

a) $f(x, y) = 4x^2 + y^2$ en $(1, 2)$

b) $f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ en $(4, 1)$

c) $f(x, y) = x \sin(y)$ en $(2, \pi/6)$

2. Halle la ecuación del plano tangente a cada superficie en el punto indicado.

a) $f(x, y) = e^{x-y}$ en $(1, 1)$

b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$ en $(0, 0)$

c) $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2 + 1}$ en $(1, -1)$

3. Determine los puntos de la superficie $z = x^2 - xy + y^2 - 2x + 4y$ donde el plano tangente es paralelo al plano $z = 2x - 4y + 1$.

4. Halle la linealización $L(x, y)$ de cada función en el punto indicado y úsela para aproximar el valor señalado.

a) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $(3, 4)$, aproximar $f(2,97, 4,02)$.

b) $f(x, y) = e^x \cos y$ en $(0, 0)$, aproximar $f(0,1, 0,05)$.

5. Use la aproximación lineal de $f(x, y) = x^y$ en $(1, 3)$ para estimar $(1,03)^{2,95}$. Compare con el valor obtenido por calculadora.

6. Calcule el diferencial total de cada función.

a) $z = x^3 \sin(2y)$

b) $w = \frac{u^2 - v^2}{u^2 + v^2}$

c) $T = e^{-r} \cos \theta$

7. El radio y la altura de un cilindro recto se miden como $r = 5$ cm y $h = 12$ cm, con errores de medición de hasta 0,05 cm en r y 0,1 cm en h . Use diferenciales para estimar el error máximo en el cálculo del volumen $V = \pi r^2 h$.
8. La resistencia R de dos resistores en paralelo es $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$. Si $R_1 = 80 \Omega$ y $R_2 = 100 \Omega$, cada uno con un error relativo de 2 %, estime el error relativo máximo en R usando diferenciales.


13. Regla de la Cadena

En una variable, si $z = f(x)$ y $x = g(t)$, entonces $\frac{dz}{dt} = \frac{dz}{dx} \frac{dx}{dt}$. En varias variables, la misma idea se generaliza: cuando z depende de varias variables intermedias, la derivada total respecto al parámetro final es la suma de las contribuciones de cada camino en el árbol de dependencias.

13.1. Diagrama de árbol

El diagrama de árbol es una representación de las relaciones de dependencia entre las variables de una composición. Cada nodo representa una variable, y cada arista lleva la derivada (parcial u ordinaria) de la variable superior respecto a la inferior. La regla de la cadena opera sobre este diagrama de la siguiente manera: para obtener la derivada de la variable raíz respecto a una variable hoja, se identifican todos los caminos que las unen, se multiplican las derivadas a lo largo de cada camino y se suman los resultados.


El diagrama correspondiente a $z = f(x, y)$ con $x = x(t)$, $y = y(t)$ es:



Hay dos caminos de z a t : uno a través de x y otro a través de y . La regla de la cadena suma ambas contribuciones:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Cuando las variables intermedias dependen a su vez de varias variables, el diagrama se expande. Para $z = f(x, y)$ con $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$:



Para $\partial z / \partial s$ se recorren los caminos $z \rightarrow x \rightarrow s$ y $z \rightarrow y \rightarrow s$; para $\partial z / \partial t$ los caminos $z \rightarrow x \rightarrow t$ y $z \rightarrow y \rightarrow t$.

13.2. La regla de la cadena

13.2.1. Caso 1: una variable paramétrica

Teorema: Regla de la cadena: caso 1

Sea $z = f(x, y)$ diferenciable y sean $x = x(t)$, $y = y(t)$ diferenciables en t . Entonces z es diferenciable como función de t y:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Ejemplo. Sea $z = x^2 + y^2$ con $x = \cos t$, $y = \sin t$. Por la regla de la cadena:

$$\frac{dz}{dt} = 2x(-\sin t) + 2y(\cos t) = -2\cos t \sin t + 2\sin t \cos t = 0$$

El resultado es coherente: $z = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ es constante, por lo que su derivada es cero.

13.2.2. Caso 2: dos variables paramétricas

Teorema: Regla de la cadena: caso 2

Sea $z = f(x, y)$ diferenciable y sean $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$ con derivadas parciales continuas. Entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$

Ejemplo. Sea $z = e^x \sin y$ con $x = st^2$, $y = s^2t$. Entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = e^x \sin y \cdot t^2 + e^x \cos y \cdot 2st = e^{st^2} (t^2 \sin(s^2t) + 2st \cos(s^2t))$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = e^x \sin y \cdot 2st + e^x \cos y \cdot s^2 = e^{st^2} (2st \sin(s^2t) + s^2 \cos(s^2t))$$

13.2.3. Caso general

Teorema: Regla de la cadena general

Sea $w = f(x_1, \dots, x_m)$ diferenciable y sean $x_i = x_i(t_1, \dots, t_n)$ funciones con derivadas parciales continuas. Para cada $k = 1, \dots, n$:

$$\frac{\partial w}{\partial t_k} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial w}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial t_k} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_k} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_k} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_m} \frac{\partial x_m}{\partial t_k}$$

La suma recorre todas las variables intermedias x_i , y cada término corresponde a uno de los caminos del árbol de dependencias que conecta w con t_k .

Ejemplo. Sea $w = xy + yz + xz$ con $x = t \cos t$, $y = t \sin t$, $z = t$. Las derivadas ordinarias de las variables intermedias son $\dot{x} = \cos t - t \sin t$, $\dot{y} = \sin t + t \cos t$, $\dot{z} = 1$. Por

la regla de la cadena:

$$\frac{dw}{dt} = (y+z)\dot{x} + (x+z)\dot{y} + (y+x)\dot{z}$$

que se evalúa sustituyendo las expresiones en función de t .

13.3. Derivación implícita

Cuando una ecuación $F(x, y) = 0$ define y como función diferenciable de x , la regla de la cadena permite calcular dy/dx sin necesidad de despejar y explícitamente.

Caso $F(x, y) = 0$

Suponga que la ecuación $F(x, y) = 0$ define implícitamente $y = y(x)$. Al sustituir esa dependencia, el lado izquierdo se convierte en una función de una sola variable:

$$F(x, y(x)) = 0 \quad \text{para todo } x \text{ en un intervalo.}$$

Como esta identidad se cumple para todo x , se puede derivar ambos lados respecto de x . El miembro derecho es la constante 0, cuya derivada es nula. El miembro izquierdo es una composición: F depende de x de dos maneras, directamente a través de su primer argumento e indirectamente a través de $y(x)$. La regla de la cadena para $w = F(x, y)$ con $x = x$ e $y = y(x)$ da:

$$\frac{d}{dx}F(x, y(x)) = \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = F_x + F_y \frac{dy}{dx}.$$

Igualando a cero, puesto que la identidad deriva a 0:

$$F_x + F_y \frac{dy}{dx} = 0.$$

Despejando el término con dy/dx y dividiendo entre F_y , válido siempre que $F_y \neq 0$:

$$F_y \frac{dy}{dx} = -F_x \quad \implies \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

Caso $F(x, y, z) = 0$

Ahora suponga que la ecuación $F(x, y, z) = 0$ define implícitamente $z = z(x, y)$. Sustituyendo, se obtiene la identidad:

$$F(x, y, z(x, y)) = 0 \quad \text{para todo } (x, y) \text{ en una región.}$$

Para hallar $\partial z / \partial x$ se deriva la identidad respecto de x manteniendo y constante. En esta derivada parcial, x interviene directamente en el primer argumento y también a través de $z(x, y)$, mientras que y se trata como constante, de modo que $\partial y / \partial x = 0$. La regla de la cadena da:

$$\frac{\partial}{\partial x}F(x, y, z(x, y)) = F_x \frac{\partial x}{\partial x} + F_y \frac{\partial y}{\partial x} + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

Despejando, con $F_z \neq 0$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}.$$

De forma simétrica, derivando la identidad respecto de y con x constante, ahora $\partial x/\partial y = 0$:

$$F_x \frac{\partial x}{\partial y} + F_y \frac{\partial y}{\partial y} + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad \implies \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

En ambos casos el patrón es el mismo: la derivada de la variable dependiente respecto de una independiente es el cociente, con signo negativo, entre la parcial de F respecto de esa variable independiente y la parcial de F respecto de la variable dependiente.

Teorema: Derivación implícita

Si $F(x, y) = 0$ define $y = y(x)$ diferenciable y $F_y \neq 0$, entonces:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

Si $F(x, y, z) = 0$ define $z = z(x, y)$ diferenciable y $F_z \neq 0$, entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

Ejemplo 1. Sea $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy = 0$. Con $F_x = 3x^2 - 3y$ y $F_y = 3y^2 - 3x$:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 - 3y}{3y^2 - 3x} = \frac{y - x^2}{y^2 - x}$$

Ejemplo 2. Sea $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$. Con $F_x = 2x$, $F_y = 2y$, $F_z = 2z$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z}$$

resultado que coincide con el obtenido al despejar $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y derivar directamente.

13.4. Ejercicios

1. Sea $z = x^2y - y^3$, con $x = \sin t$ e $y = \cos t$.

a) Calcule $\frac{dz}{dt}$ usando la regla de la cadena.

b) Verifique el resultado sustituyendo directamente y derivando.

2. Sea $w = x^2 + y^2 + z^2$, con $x = e^t$, $y = e^t \sin t$, $z = e^t \cos t$. Calcule $\frac{dw}{dt}$ y evalúe en $t = 0$.

3. Sea $z = \ln(x^2 + y^2)$, con $x = e^s \cos t$ e $y = e^s \sin t$. Calcule $\frac{\partial z}{\partial s}$ y $\frac{\partial z}{\partial t}$ y simplifique los resultados.

4. Sea $z = x^3 - 3xy^2$, con $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$.

a) Calcule $\frac{\partial z}{\partial r}$ y $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ usando la regla de la cadena.

- b) Exprese los resultados en términos de r y θ .
5. Sea $z = f(x, y)$ con $x = t^2$ e $y = t^3$. Exprese $\frac{d^2z}{dt^2}$ en términos de las derivadas parciales de f y las derivadas de x e y con respecto a t .
6. Use derivación implícita para calcular $\frac{dy}{dx}$ en cada caso.
- a) $x^4 + y^4 = 16$
 b) $e^y = x^2 + y^2$
 c) $\sin(x + y) = y^2 \cos x$
7. Para cada ecuación $F(x, y, z) = 0$, calcule $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- a) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$
 b) $xe^z + ze^y = 2$
 c) $xyz + \ln(xyz) = 1$
8. Sea $F(x, y) = 0$ con F diferenciable y $F_y \neq 0$. Use derivación implícita dos veces para demostrar que:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3}$$

Aplice la fórmula para hallar y'' en $x^2 + y^2 = r^2$.

9. Sea $z = f(u, v)$ con $u = x + y$ y $v = x - y$, donde f tiene derivadas parciales de segundo orden continuas. Demuestre que:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$$

10. Demuestre que la función $u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct)$, donde f y g son funciones dos veces diferenciables y $c > 0$ es una constante, satisface la ecuación de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

11. Sea $u(x, y)$ una función con derivadas parciales de segundo orden continuas que satisface la ecuación de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$. Usando el cambio de variables $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y la regla de la cadena, demuestre que u satisface la ecuación de Laplace en coordenadas polares:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

Sugerencia: calcule primero $\frac{\partial r}{\partial x}$, $\frac{\partial r}{\partial y}$, $\frac{\partial \theta}{\partial x}$, $\frac{\partial \theta}{\partial y}$, y use la regla de la cadena para expresar u_x , u_y , u_{xx} , u_{yy} en términos de u_r , u_θ , u_{rr} , $u_{r\theta}$, $u_{\theta\theta}$.

12. Se dice que $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es homogénea de grado n si $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ para todo $t > 0$.
- a) Demuestre el teorema de Euler para funciones homogéneas: si f es diferenciable y homogénea de grado n , entonces $xf_x + yf_y = nf(x, y)$. Sugerencia: diferencie la identidad $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ con respecto a t y evalúe en $t = 1$.
 - b) Verifique el teorema para $f(x, y) = x^3 + 2x^2y - xy^2$.
 - c) Demuestre que si f es homogénea de grado n y tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces $x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy} = n(n-1)f$.
13. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas cartesianas son $u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$. Usando el cambio de variables $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y la regla de la cadena, demuestre que en coordenadas polares toman la forma:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

14. Sea $u(x, y)$ diferenciable con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.

a) Demuestre que $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2$.

15. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ homogénea de grado n y diferenciable.

- a) Generalice el teorema de Euler a n variables: demuestre que $\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = nf(x_1, \dots, x_n)$.
- b) Use el resultado del inciso anterior para mostrar que f_x, f_y son a su vez homogéneas de grado $n-1$ cuando f es homogénea de grado n .
- c) Aplique los incisos anteriores a $f(x, y, z) = \frac{x^2y + y^2z + z^2x}{x^2 + y^2 + z^2}$ para determinar su grado de homogeneidad y verificar el teorema de Euler directamente.

14. Derivada Direccional y Vector Gradiente

Las derivadas parciales f_x y f_y miden la tasa de cambio de f en las direcciones de los ejes coordenados. La derivada direccional generaliza esta idea a una dirección arbitraria en el plano.

14.1. Derivada direccional

Sea $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ un vector unitario en $\mathbb{R}^2$ y sea (x_0, y_0) un punto en el dominio de f . La tasa de cambio de f en la dirección de $\mathbf{u}$ se obtiene restringiendo f a la recta que pasa por (x_0, y_0) con dirección $\mathbf{u}$:

$$\mathbf{r}(h) = (x_0 + hu_1, y_0 + hu_2), \quad h \in \mathbb{R}.$$

Definición: Derivada direccional

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ un vector unitario. La derivada direccional de f en (x_0, y_0) en la dirección de $\mathbf{u}$ es:

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hu_1, y_0 + hu_2) - f(x_0, y_0)}{h}$$

siempre que el límite exista.

Geométricamente, el plano vertical que pasa por $(x_0, y_0, 0)$ en la dirección de $\mathbf{u}$ corta a la superficie $z = f(x, y)$ en una curva C . La derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a C en P_0 .

Si $\mathbf{u} = \mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$, la definición reproduce $f_x(x_0, y_0)$; si $\mathbf{u} = \mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$, reproduce $f_y(x_0, y_0)$. Las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional.

Calcular derivadas direccionales mediante la definición límite es trabajoso. Cuando f es diferenciable, la regla de la cadena proporciona una fórmula algebraica directa.

Teorema: Fórmula de la derivada direccional

Si f es diferenciable en (x_0, y_0) y $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ es unitario, entonces:

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)u_1 + f_y(x_0, y_0)u_2$$

Demostración. La idea es reconocer que el cociente de la definición es, en realidad, la derivada de una función de una sola variable, a la cual se le puede aplicar la regla de la cadena ya estudiada.

Se restringe f a la recta que pasa por (x_0, y_0) con dirección $\mathbf{u}$, definiendo:

$$g(h) = f(x(h), y(h)), \quad x(h) = x_0 + hu_1, \quad y(h) = y_0 + hu_2.$$

Con esta notación, el cociente incremental de la definición es precisamente el cociente incremental de g en $h = 0$:

$$\frac{f(x_0 + hu_1, y_0 + hu_2) - f(x_0, y_0)}{h} = \frac{g(h) - g(0)}{h}.$$

Tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$, el lado derecho es por definición la derivada $g'(0)$, de modo que:

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = g'(0).$$

Ahora bien, g es la composición de f con las funciones $x(h)$ e $y(h)$, así que su derivada se obtiene con la regla de la cadena para $z = f(x, y)$ donde x e y dependen de una variable h :

$$g'(h) = \frac{dz}{dh} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dh} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dh}.$$

Las derivadas de las componentes son constantes, pues $x(h)$ e $y(h)$ son lineales en h :

$$\frac{dx}{dh} = u_1, \quad \frac{dy}{dh} = u_2.$$

Sustituyendo:

$$g'(h) = f_x(x(h), y(h)) u_1 + f_y(x(h), y(h)) u_2.$$

Al evaluar en $h = 0$ se tiene $x(0) = x_0$ e $y(0) = y_0$, con lo que las parciales se calculan en el punto original:

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = g'(0) = f_x(x_0, y_0) u_1 + f_y(x_0, y_0) u_2.$$

Esto explica por qué la definición límite, que en principio no menciona las derivadas parciales, produce un resultado expresado en términos de ellas: al restringir f a la recta de dirección $\mathbf{u}$, la regla de la cadena descompone la tasa de cambio en las contribuciones de cada variable, f_x y f_y , ponderadas por las componentes u_1 y u_2 de la dirección. $\square$

Ejemplo. Sea $f(x, y) = x^2y + \sin(xy)$ y $\mathbf{u}$ la dirección del ángulo $\theta = \pi/3$, es decir $\mathbf{u} = \langle 1/2, \sqrt{3}/2 \rangle$. En el punto $(1, 0)$:

$$f_x = 2xy + y \cos(xy) \Big|_{(1,0)} = 0, \quad f_y = x^2 + x \cos(xy) \Big|_{(1,0)} = 2.$$

$$\text{Luego } D_{\mathbf{u}}f(1, 0) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

14.2. Vector gradiente

La fórmula $D_{\mathbf{u}}f = f_x u_1 + f_y u_2$ es el producto punto de $\langle f_x, f_y \rangle$ con $\mathbf{u}$. El vector $\langle f_x, f_y \rangle$ reúne toda la información de primer orden de f y recibe el nombre de gradiente.

Definición: Vector gradiente

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. El gradiente de f en (x, y) es el vector:

$$\nabla f(x, y) = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle = f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j}$$

La derivada direccional se expresa entonces como:

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{u}$$

El gradiente es un campo vectorial: asigna a cada punto del dominio un vector en $\mathbb{R}^2$. Su valor en un punto resume la pendiente de f en todas las direcciones simultáneamente.

Ejemplo. Para $f(x, y) = x^2 - xy + y^3$, el gradiente es $\nabla f = \langle 2x - y, -x + 3y^2 \rangle$. En el punto $(2, 1)$: $\nabla f(2, 1) = \langle 3, 1 \rangle$.

La derivada direccional en la dirección de $\mathbf{v} = \langle 3, 4 \rangle$ (que se normaliza a $\mathbf{u} = \langle 3/5, 4/5 \rangle$) es:

$$D_{\mathbf{u}}f(2, 1) = \langle 3, 1 \rangle \cdot \langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle = \frac{9}{5} + \frac{4}{5} = \frac{13}{5}.$$

14.3. Generalización para n variables

La extensión al caso de n variables es inmediata: se reemplaza $\mathbb{R}^2$ por $\mathbb{R}^n$ y el vector unitario se toma en $\mathbb{R}^n$.

Definición: Derivada direccional en $\mathbb{R}^n$

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ con $\|\mathbf{u}\| = 1$. La derivada direccional de f en $\mathbf{x}_0$ en la dirección $\mathbf{u}$ es:

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0)}{h}$$

Si f es diferenciable, $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}$, donde el gradiente es:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right\rangle$$

Ejemplo. Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. El gradiente es $\nabla f = \langle 2x, 2y, 2z \rangle = 2\mathbf{r}$, proporcional al vector posición. En el punto $(1, 1, 1)$ y con $\mathbf{u} = \langle 1, 1, 1 \rangle / \sqrt{3}$:

$$D_{\mathbf{u}}f(1, 1, 1) = \langle 2, 2, 2 \rangle \cdot \frac{\langle 1, 1, 1 \rangle}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$$

14.4. Maximización de la derivada direccional


La expresión $D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \|\nabla f\| \|\mathbf{u}\| \cos \phi = \|\nabla f\| \cos \phi$, donde ϕ es el ángulo entre ∇f y $\mathbf{u}$, permite determinar las direcciones extremas.

Teorema: Dirección de máximo y mínimo crecimiento

Sea f diferenciable en $\mathbf{x}_0$ con $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$. Entonces:

- $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}_0)$ es máxima cuando $\mathbf{u} = \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}$, y el valor máximo es $\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$.
- $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}_0)$ es mínima cuando $\mathbf{u} = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}$, y el valor mínimo es $-\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$.
- $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}_0) = 0$ cuando $\mathbf{u} \perp \nabla f(\mathbf{x}_0)$.

El tercer punto tiene una consecuencia geométrica importante: el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel de f . En efecto, si $f(x, y) = c$ define una curva y $\mathbf{r}(t)$ la parametriza, entonces $\frac{d}{dt}f(\mathbf{r}(t)) = \nabla f \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$, con lo que ∇f es normal a $\mathbf{r}'(t)$, que es el vector tangente a la curva de nivel.



El gradiente en (x_0, y_0) apunta en la dirección de máximo crecimiento de f y es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = 4x^2 + y^2$. En el punto $(1, 2)$: $\nabla f(1, 2) = \langle 8, 4 \rangle$. El máximo crecimiento es $\|\nabla f\| = \sqrt{64 + 16} = 4\sqrt{5}$, y ocurre en la dirección $\mathbf{u} = \langle 8, 4 \rangle / (4\sqrt{5}) = \langle 2, 1 \rangle / \sqrt{5}$.

14.5. Ejercicios

1. Calcule la derivada direccional de las siguientes funciones en el punto y dirección indicados usando la definición límite, y verifique el resultado con la fórmula del gradiente.
 - a) $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2$ en $(1, 2)$, dirección $\mathbf{u} = \langle 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2} \rangle$.
 - b) $f(x, y) = x^2 + xy$ en $(0, 1)$, dirección $\mathbf{u} = \langle 3/5, 4/5 \rangle$.
2. Calcule el gradiente de cada función y evalúelo en el punto dado.
 - a) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ en $(1, 2)$.
 - b) $f(x, y) = e^x \sin(y)$ en $(0, \pi/6)$.
 - c) $f(x, y) = \arctan(y/x)$ en $(1, 1)$.
3. Sea $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 2y^2}$.
 - a) Calcule $\nabla f(1, 1)$.
 - b) Encuentre la derivada direccional en $(1, 1)$ en la dirección del punto $(1, 1)$ al punto $(3, 2)$.
 - c) Determine la dirección en que f decrece con mayor rapidez en $(1, 1)$ y calcule esa tasa de decrecimiento.
4. La temperatura en una placa metálica está dada por $T(x, y) = 100 - 3x^2 - 5y^2$ (en $^{\circ}\text{C}$), con x e y en metros.
 - a) Encuentre el gradiente de T en el punto $(1, 2)$.
 - b) En ese punto, ¿en qué dirección debe moverse un punto de la placa para que la temperatura suba con mayor rapidez? ¿Cuál es esa tasa máxima de cambio?
 - c) Calcule la derivada direccional en la dirección que forma $\pi/4$ con el eje x .
5. Calcule la derivada direccional de $f(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$ en el punto $(1, 1, 1)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = \langle 2, -1, 2 \rangle$. Encuentre además la tasa máxima de cambio de f en ese punto.
6. Encuentre todos los puntos del dominio en los que el gradiente de $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$ es el vector cero. Clasifique esos puntos como posibles máximos, mínimos o puntos de silla a partir de la información que proporciona el gradiente (sin usar el criterio de la segunda derivada).
7. Demuestre que el gradiente de $f(x, y)$ es perpendicular a la curva de nivel $f(x, y) = c$ en cualquier punto de la curva. Use este resultado para encontrar la ecuación de la recta tangente a la elipse $4x^2 + 9y^2 = 25$ en el punto $(2, 1)$ sin parametrizar la curva.


8. Sea $f(x, y) = \sin(xy) + e^{x-y}$.
- Calcule $\nabla f(0, 0)$.
 - Encuentre todas las direcciones unitarias $\mathbf{u}$ en las que $D_{\mathbf{u}}f(0, 0) = 0$.
 - Calcule la derivada direccional en la dirección que forma un ángulo θ con el eje x y determine para qué valores de $\theta \in [0, 2\pi)$ la derivada es positiva.
9. Sea $f(x, y) = xe^{y^2}$ y sea $\mathbf{u}(\theta) = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$. Defina $g(\theta) = D_{\mathbf{u}(\theta)}f(1, 0)$.
- Expresa $g(\theta)$ en forma cerrada.
 - Encuentre los valores de $\theta \in [0, 2\pi)$ que maximizan y minimizan $g(\theta)$ y verifique que coinciden con la dirección del gradiente y su opuesto.
 - Calcule $g'(\theta)$ y determine los ángulos en que la tasa de cambio de $D_{\mathbf{u}}f$ respecto a la dirección es cero.
10. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Demuestre las siguientes propiedades del gradiente.
- $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$ para cualquier g diferenciable.
 - $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$ (regla del producto para gradientes).
 - Si $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, entonces $\nabla(h \circ f) = h'(f) \nabla f$ (regla de la cadena para gradientes).
 - Use el inciso (c) para calcular $\nabla(\ln(x^2 + y^2))$ sin derivar componente a componente.
11. Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ y sea $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ con $r = \|\mathbf{r}\|$.
- Muestre que $\nabla(r^n) = nr^{n-2}\mathbf{r}$ para cualquier entero $n \geq 1$.
 - Deduzca que $\nabla(1/r) = -\mathbf{r}/r^3$ (campo gravitacional de una masa puntual, salvo constante).
 - Una función $f(\mathbf{r})$ cuyo gradiente apunta en la dirección radial $\mathbf{r}/r$ se llama función central. Demuestre que toda función de la forma $f = \phi(r)$, con ϕ diferenciable, es una función central.
12. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ homogénea de grado n , es decir, $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$.
- Demuestre que $\nabla f(tx, ty) = t^{n-1} \nabla f(x, y)$, es decir, el gradiente de una función homogénea de grado n es un campo vectorial homogéneo de grado $n - 1$.
 - Deduzca el teorema de Euler directamente de la definición de derivada direccional: interprete $nf(x, y)$ como la derivada de $f(tx, ty)$ con respecto a t , evaluada en $t = 1$, y aplique la regla de la cadena.
 - Verifique ambos resultados para $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$.

15. Máximos y Mínimos de Funciones de Varias Variables

Las derivadas parciales y el gradiente permiten localizar los puntos donde una función alcanza valores extremos. El análisis en varias variables sigue el mismo esquema que en una variable, con la diferencia de que los puntos críticos admiten más tipos de comportamiento local.

Conviene distinguir desde el principio dos nociones. Un extremo *local* compara el valor de la función solo con los puntos cercanos: es el más alto o el más bajo dentro de un entorno pequeño. Un extremo *absoluto* compara con todos los puntos del dominio: es el más alto o el más bajo de toda la región. La siguiente figura muestra la gráfica de una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con dos cimas y dos hondonadas de distinta altura, y permite ver ambas ideas sobre la superficie. Un mismo punto puede ser máximo local sin ser el máximo absoluto, pues basta con que exista otra cima más alta en otra parte del dominio.

$z = f(x, y)$ con extremos locales y absolutos



El máximo absoluto es a la vez un máximo local, pero la cima de la izquierda es solo un máximo local porque existe otra cima más alta. Lo mismo ocurre con las hondonadas: la más profunda da el mínimo absoluto y la otra es solo un mínimo local. En este ejemplo los cuatro extremos son puntos interiores del dominio; cuando la región es cerrada y acotada, los valores extremos también pueden alcanzarse sobre la frontera, situación que se estudia más adelante.

15.1. Máximos y mínimos locales

Definición: Máximo y mínimo local

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se dice que f tiene un máximo local en (a, b) si existe $\delta > 0$ tal que $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todo $(x, y) \in D$ con $\|(x, y) - (a, b)\| < \delta$. Análogamente, f tiene un mínimo local en (a, b) si $f(x, y) \geq f(a, b)$ en ese disco. Si la desigualdad vale en todo el dominio D , el extremo es absoluto (o global).

Teorema: Condición necesaria de Fermat

Si f tiene un extremo local en (a, b) y las derivadas parciales $f_x(a, b)$ y $f_y(a, b)$ existen, entonces:

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Los puntos donde $\nabla f = \mathbf{0}$ o donde alguna derivada parcial no existe se llaman puntos críticos de f . Todo extremo local es un punto crítico, pero no todo punto crítico es un extremo: puede ser un punto de silla, en el que f crece en unas direcciones y decrece en otras desde ese punto.

15.2. Criterio de la segunda derivada

Para clasificar un punto crítico sin necesidad de analizar el signo de $f(x, y) - f(a, b)$ directamente, se utiliza el discriminante formado por las segundas derivadas parciales.

Teorema: Criterio de la segunda derivada

Sea f con segundas derivadas parciales continuas en una vecindad de (a, b) , y suponga que $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$. Define el discriminante:

$$D(a, b) = f_{xx}(a, b) f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

- Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces (a, b) es un mínimo local.
- Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces (a, b) es un máximo local.
- Si $D < 0$, entonces (a, b) es un punto de silla.
- Si $D = 0$, el criterio no concluye y se requiere un análisis adicional.


Ejemplo 1. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 2y + 8$.

Las derivadas parciales son $f_x = 2x - 4$ y $f_y = 2y - 2$. El sistema $f_x = 0$, $f_y = 0$ tiene la solución única $(a, b) = (2, 1)$. Como $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 2$ y $f_{xy} = 0$:

$$D(2, 1) = 2 \cdot 2 - 0^2 = 4 > 0, \quad f_{xx}(2, 1) = 2 > 0.$$

Por el criterio, $(2, 1)$ es un mínimo local con $f(2, 1) = 3$. Completando el cuadrado, $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 1)^2 + 3 \geq 3$, lo que confirma que es el mínimo global.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 2y + 8$$



Ejemplo 2. Sea $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.


De $f_x = 3x^2 - 3y = 0$ se obtiene $y = x^2$; sustituyendo en $f_y = 3y^2 - 3x = 0$ resulta $3x^4 - 3x = 3x(x^3 - 1) = 0$, con soluciones $x = 0$ y $x = 1$.

Los puntos críticos son $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Las segundas derivadas son $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 6y$ y $f_{xy} = -3$.

En $(0, 0)$: $D = (0)(0) - (-3)^2 = -9 < 0$, de modo que $(0, 0)$ es un punto de silla, con $f(0, 0) = 0$.

En $(1, 1)$: $D = (6)(6) - (-3)^2 = 27 > 0$ y $f_{xx}(1, 1) = 6 > 0$, de modo que $(1, 1)$ es un mínimo local, con $f(1, 1) = 1 + 1 - 3 = -1$.

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$



15.3. Máximos y mínimos absolutos en una región D

Teorema: Teorema de valores extremos

Si f es continua en un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ cerrado y acotado, entonces f alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en D .

Para hallar los extremos absolutos de f en D se aplica el siguiente procedimiento:

1. Calcular los valores de f en todos los puntos críticos del interior de D .

2. Encontrar los valores extremos de f restringida a la frontera ∂D .

El mayor de todos los valores obtenidos es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

Ejemplo 3. Encuentre los extremos absolutos de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$ en el disco cerrado $D : x^2 + y^2 \leq 4$.

Puntos críticos interiores. De $f_x = 2x - 2 = 0$ y $f_y = 2y = 0$ se obtiene $(1, 0)$. Como $1^2 + 0^2 = 1 < 4$, el punto es interior a D , con $f(1, 0) = 1 - 2 = -1$.


Frontera. Parametrizando la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ con $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$:

$$g(t) = 4 \cos^2 t + 4 \sin^2 t - 4 \cos t = 4 - 4 \cos t.$$

De $g'(t) = 4 \sin t = 0$ se obtienen $t = 0$ y $t = \pi$, con puntos $(2, 0)$ y $(-2, 0)$:

$$f(2, 0) = 4 - 4 = 0, \quad f(-2, 0) = 4 + 4 = 8.$$

Comparando todos los candidatos: el mínimo absoluto es -1 , alcanzado en $(1, 0)$; el máximo absoluto es 8 , alcanzado en $(-2, 0)$.



15.4. Ejercicios

1. Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2 - 2y + 5$.
2. Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$.
3. Sea $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 4$.
 - a) Encuentre todos los puntos críticos de f .
 - b) Clasifique cada uno usando el criterio de la segunda derivada.
 - c) Calcule el valor de f en cada extremo local y determine si alguno de ellos es absoluto.
4. Sea $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$.
 - a) Determine todos los puntos críticos de f .
 - b) Clasifíquelos con el criterio de la segunda derivada y calcule el valor de f en cada mínimo local.

- c) Justifique que f no tiene máximo absoluto en $\mathbb{R}^2$.
5. Encuentre los extremos absolutos de $f(x, y) = 2x + 3y$ en el disco cerrado $D : x^2 + y^2 \leq 4$.
6. Encuentre los extremos absolutos de $f(x, y) = xy$ en la región triangular D con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(0, 4)$.
7. Sea $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ con $a > 0$ y $4ac - b^2 > 0$.
- a) Muestre que $(0, 0)$ es el único punto crítico de f .
- b) Use el criterio de la segunda derivada para clasificarlo.
- c) Deduzca que $f(x, y) > 0$ para todo $(x, y) \neq (0, 0)$ y que el mínimo absoluto de f en $\mathbb{R}^2$ es $f(0, 0) = 0$.
8. Encuentre los extremos absolutos de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ en el disco cerrado $D : x^2 + y^2 \leq 1$.
- a) Analice los puntos críticos en el interior de D .
- b) Parametrice la frontera $x^2 + y^2 = 1$ y determine los extremos de f sobre ella.
- c) Concluya cuáles son el mínimo y el máximo absolutos y en qué puntos se alcanzan.

16. Multiplicadores de Lagrange


El criterio de la segunda derivada localiza los extremos de una función en el interior de su dominio. En muchos problemas, sin embargo, se busca optimizar una función cuando las variables están sujetas a una o varias condiciones. El método de los multiplicadores de Lagrange resuelve esta clase de problemas sin necesidad de despejar las restricciones.

16.1. Qué es y para qué sirve

Un problema de optimización con restricciones consiste en hallar los valores extremos de una función objetivo $f(x, y, z)$ sobre el conjunto de puntos que satisfacen una condición $g(x, y, z) = k$. La condición $g = k$ define una curva o superficie de nivel, y el problema equivale a recorrer ese conjunto buscando los puntos donde f es máxima o mínima.

Situaciones de este tipo aparecen con frecuencia: maximizar el volumen de una caja con área superficial fija, minimizar el costo de un material sujeto a un volumen dado, o encontrar el punto de una superficie más cercano al origen. En todos los casos la variable no puede moverse libremente por el espacio, sino solo sobre el conjunto restringido.

La idea geométrica del método es la siguiente. Al recorrer la curva de restricción $g = k$, la función f crece o decrece según se crucen sus curvas de nivel. En un punto extremo, la curva de restricción es tangente a una curva de nivel de f . Como el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel, en ese punto de tangencia los gradientes ∇f y ∇g son paralelos.



En el punto óptimo P_0 , la restricción es tangente a una curva de nivel de f y los gradientes ∇f y ∇g apuntan en la misma dirección (salvo un factor escalar).

16.2. Método para una restricción

Teorema: Multiplicadores de Lagrange (una restricción)

Sean f y g funciones con derivadas parciales continuas. Si f alcanza un extremo local sobre la restricción $g(x, y, z) = k$ en un punto P_0 donde $\nabla g(P_0) \neq \mathbf{0}$, entonces existe un escalar λ , llamado *multiplicador de Lagrange*, tal que:

$$\nabla f(P_0) = \lambda \nabla g(P_0).$$

En la práctica, los puntos candidatos se obtienen resolviendo el sistema formado por la condición vectorial y la restricción:

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g, \\ g(x, y, z) = k. \end{cases}$$

Para dos variables esto son tres ecuaciones ($f_x = \lambda g_x$, $f_y = \lambda g_y$, $g = k$) con tres incógnitas (x , y , λ). El método entrega los puntos candidatos; para decidir cuáles son máximos y cuáles mínimos se comparan los valores de f en ellos, o se recurre a argumentos geométricos.

Ejemplo 1. Encuentre los valores extremos de $f(x, y) = xy$ sobre la elipse $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$.

Aquí $g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2}$ y $k = 1$. Los gradientes son:

$$\nabla f = \langle y, x \rangle, \quad \nabla g = \left\langle \frac{x}{4}, y \right\rangle.$$

La condición $\nabla f = \lambda \nabla g$ da el sistema:


$$y = \lambda \frac{x}{4}, \quad x = \lambda y.$$

Sustituyendo la segunda en la primera: $y = \lambda \cdot \frac{\lambda y}{4} = \frac{\lambda^2}{4}y$. Si $y \neq 0$, entonces $\lambda^2 = 4$, es decir $\lambda = \pm 2$.

Con $\lambda = 2$: $x = 2y$. En la restricción, $\frac{(2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = \frac{y^2}{2} + \frac{y^2}{2} = y^2 = 1$, luego $y = \pm 1$ y $x = \pm 2$. Se obtienen $(2, 1)$ y $(-2, -1)$, con $f = 2$.

Con $\lambda = -2$: $x = -2y$, lo que da $(2, -1)$ y $(-2, 1)$, con $f = -2$.

El máximo es 2, alcanzado en $(2, 1)$ y $(-2, -1)$; el mínimo es -2, alcanzado en $(2, -1)$ y $(-2, 1)$.



En los puntos óptimos, las hipérbolas $xy = \pm 2$ son tangentes a la elipse. Esa tangencia es la traducción geométrica de la condición $\nabla f = \lambda \nabla g$.

Ejemplo 2. Encuentre el punto de la superficie $z = xy + 1$ más cercano al origen.

Minimizar la distancia equivale a minimizar su cuadrado $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeto a la restricción $g(x, y, z) = z - xy = 1$. Los gradientes son:

$$\nabla f = \langle 2x, 2y, 2z \rangle, \quad \nabla g = \langle -y, -x, 1 \rangle.$$

El sistema $\nabla f = \lambda \nabla g$ es:


$$2x = -\lambda y, \quad 2y = -\lambda x, \quad 2z = \lambda.$$

De las dos primeras, $2x = -\lambda y$ y $2y = -\lambda x$. Multiplicando y sumando se obtiene $2(x^2 - y^2) = 0$ tras eliminar λ , de donde $x = \pm y$. Restando las ecuaciones, $2(x - y) = -\lambda(y - x) = \lambda(x - y)$, así que $x = y$ o $\lambda = 2$.

Si $x = y$, entonces $2x = -\lambda x$. Con $x \neq 0$ se tendría $\lambda = -2$ y de $2y = -\lambda x = 2x = 2y$, consistente; pero $z = \lambda/2 = -1$ obligaría a $z = xy + 1 = x^2 + 1 > 0$, contradicción. Luego $x = 0$, y con $x = y = 0$ la restricción da $z = 1$.

El punto más cercano es $(0, 0, 1)$, a distancia 1 del origen. Corresponde al vértice de la superficie, donde el plano tangente es horizontal.

Punto de $z = xy + 1$ más cercano al origen



16.3. Método para dos restricciones

Cuando las variables deben satisfacer simultáneamente dos condiciones, $g(x, y, z) = k$ y $h(x, y, z) = m$, cada una define una superficie y su intersección es, en general, una curva C en el espacio. El problema consiste en optimizar f recorriendo esa curva.

Teorema: Multiplicadores de Lagrange (dos restricciones)

Sean f , g y h con derivadas parciales continuas. Si f alcanza un extremo local sobre la curva $C = \{g = k\} \cap \{h = m\}$ en un punto P_0 donde $\nabla g(P_0)$ y $\nabla h(P_0)$ son linealmente independientes, entonces existen escalares λ y μ tales que:

$$\nabla f(P_0) = \lambda \nabla g(P_0) + \mu \nabla h(P_0).$$

Geométricamente, el vector tangente a la curva C es perpendicular tanto a ∇g como a ∇h . En un extremo, ∇f también debe ser perpendicular a esa tangente, y por lo tanto debe pertenecer al plano generado por ∇g y ∇h . Esa condición de pertenencia se expresa como la combinación lineal $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$.

El sistema resultante tiene cinco ecuaciones (tres de la condición vectorial y las dos restricciones) con cinco incógnitas: x , y , z , λ y μ .

Ejemplo 3. Encuentre los valores extremos de $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ sobre la curva intersección del plano $g(x, y, z) = x - y + z = 1$ y el cilindro $h(x, y, z) = x^2 + y^2 = 1$.

Los gradientes son:

$$\nabla f = \langle 1, 2, 3 \rangle, \quad \nabla g = \langle 1, -1, 1 \rangle, \quad \nabla h = \langle 2x, 2y, 0 \rangle.$$

La condición $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$ da:

$$1 = \lambda + 2\mu x, \quad 2 = -\lambda + 2\mu y, \quad 3 = \lambda.$$

De la tercera, $\lambda = 3$. Sustituyendo en las dos primeras:

$$1 = 3 + 2\mu x \Rightarrow \mu x = -1, \quad 2 = -3 + 2\mu y \Rightarrow \mu y = \frac{5}{2}.$$

Con $\mu \neq 0$: $x = -\frac{1}{\mu}$ y $y = \frac{5}{2\mu}$. La restricción del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ da:

$$\frac{1}{\mu^2} + \frac{25}{4\mu^2} = 1 \Rightarrow \frac{29}{4\mu^2} = 1 \Rightarrow \mu^2 = \frac{29}{4}, \quad \mu = \pm \frac{\sqrt{29}}{2}.$$


Para $\mu = \frac{\sqrt{29}}{2}$: $x = -\frac{2}{\sqrt{29}}$, $y = \frac{5}{\sqrt{29}}$. El plano da $z = 1 - x + y = 1 + \frac{7}{\sqrt{29}}$. Entonces:

$$f = x + 2y + 3z = -\frac{2}{\sqrt{29}} + \frac{10}{\sqrt{29}} + 3 + \frac{21}{\sqrt{29}} = 3 + \frac{29}{\sqrt{29}} = 3 + \sqrt{29}.$$

Para $\mu = -\frac{\sqrt{29}}{2}$, un cálculo análogo da $f = 3 - \sqrt{29}$.

El máximo es $3 + \sqrt{29}$ y el mínimo es $3 - \sqrt{29}$, alcanzados en los dos puntos de la elipse intersección.

$$C = \{x - y + z = 1\} \cap \{x^2 + y^2 = 1\}$$



La curva roja es la intersección del plano con el cilindro, una elipse en el espacio. Los puntos marcados son donde la función lineal f alcanza sus valores extremos al recorrerla.

16.4. Ejercicios

1. Use el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores extremos de $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeto a la restricción $x^4 + y^4 = 1$.
2. Encuentre los valores máximo y mínimo de $f(x, y) = 3x + 4y$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. Interprete geométicamente el resultado en términos de la tangencia entre las rectas de nivel de f y la circunferencia.
3. Una caja rectangular sin tapa debe tener un volumen de 32 cm^3 . Use multiplicadores de Lagrange para determinar las dimensiones que minimizan el área de material empleado.
 - a) Plantee la función objetivo (área) y la restricción (volumen).
 - b) Resuelva el sistema $\nabla A = \lambda \nabla V$ junto con la restricción.
 - c) Determine las dimensiones óptimas y el área mínima.
4. Encuentre los puntos de la superficie $z^2 = xy + 4$ más cercanos al origen. Minimice el cuadrado de la distancia $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeto a la restricción $g(x, y, z) = z^2 - xy = 4$.
5. Encuentre los valores extremos de $f(x, y, z) = x + y + z$ sobre la curva intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 2$ y el plano $y + z = 1$, usando el método de dos restricciones.
6. Sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ constantes positivas. Use multiplicadores de Lagrange para demostrar que el máximo de $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ sujeto a $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ es $\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}$, y que se alcanza cuando $\mathbf{x}$ es paralelo al vector $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$. Este resultado equivale a la desigualdad de Cauchy-Schwarz.