

NEMABIT

NEMABIT es un nematicida orgánico que actúa directamente en los parásitos de nematodos que causan daño a la planta al alimentarse de sus raíces, la sofisticada formulación de NEMABIT, le permite una mayor actividad en el perfil del suelo maximizando el efecto nematicida, al mismo tiempo que protege al ingrediente activo para garantizar la selectividad al cultivo. NEMABIT posee un perfil toxicológico amigable para el medio ambiente además de contener sustratos orgánicos que favorecen el intercambio catiónico promoviendo el desarrollo las plantas. Se recomienda seguir las recomendaciones y dosis expuestas en esta ficha técnica:

- Agite el producto perfectamente antes de usarlo. Aplique por adición directa en el agua en aspersión o a través del sistema de riego por goteo. Agregue agua limpia hasta la mitad de la capacidad del tanque de la mezcla del sistema de riego por goteo.
- Su activo es altamente soluble bajo condiciones de temperatura ambiente.
- Evite la exposición directa al sol para evitar la degradación de algunos ingredientes.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE AGROINSUMO	Nematicida
FORMULACIÓN	Líquido
COLOR	Café oscuro
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble
PRINCIPALES COMPUESTOS	Compuestos orgánicos y Microelementos

DOSIS Y APLICACIÓN

PARÁSITO	TIPO DE SUELO	DOSIS L/Ha	APLICACIÓN
<i>Pratylenchus</i> <i>Aphelenchoides</i> <i>Helicotylenchus</i> <i>Hoplolaimus</i> <i>Tylenchorhynchus</i>	Neutros y alcalinos	6 - 10	Aplique a la siembra.
		3 - 5	30 días después de la siembra.
		3	30 días después de la 2da aplicación.
	Ácidos	4 - 6	A la siembra.
		2 - 3	30 a 40 días después de la 1ra aplicación.
		2 - 3	30 a 40 días después de la 2da aplicación.
<i>Meloidogyne</i> <i>Nacobbus</i> <i>Rotylenchulus</i>	Neutros y alcalinos	10 - 15	A la siembra.
		5 - 8	30 a 40 días después.
		3 - 5	30 a 40 días después de la 2da aplicación.
	Ácidos	8 - 10	A la siembra.
		3 - 5	30 a 40 días después.
		3 - 5	30 a 40 días después de la 2da aplicación.
<i>Ditylenchus radopholus</i> <i>Xiphinemma</i>	Neutros y alcalinos	8 - 12	A la siembra.
		5 - 6	30 a 40 días después.
		3	30 a 40 días después de la 2da aplicación.
	Ácidos	6 - 8	A la siembra.
		3 - 5	30 a 40 días después.
		3	30 a 40 días después de la 2da aplicación.

- Nemabit es una formula orgánica balanceada la cual ejerce su efecto mortífero en nematodos que afectan directa o indirectamente a la planta;
 - Nemabit brinda un perfil innovador, orgánico, seguro y poderoso, convirtiendolo en un elemento esencial para lograr cultivos sanos y cosechas de calidad que respondan a las demandas actuales de la cadena alimenticia;
 - Actúa por contacto de amplio espectro de control y efecto inmediato sobre las poblaciones de plagas de suelo y nematodos que atacan a diferentes cultivos al controlar rápidamente los nematodos y plagas del suelo permite que se desarrollen raíces sanas y abundantes permitiendo un mejor desarrollo y anclaje de las plantas;
 - Nemabit resulta efectivo debido a la inhibición de la presencia de huevecillos en la superficie donde tuvo contacto el producto; así también inhibiendo el desarrollo del nematodo en la segunda etapa larvaria y por último provocándole la intoxicación al alimentarse de los tejidos de la epidermis;
- Por su formulación libre de piretroides de amplio espectro resulta una alternativa totalmente amigable con el medio ambiente permitiendo utilizarlo de maneras.



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Extractos naturales	40%
Ácidos Húmicos	10%
Ácidos Fulvicos	10%
Promotores hormonales	5%
Conservadores y diluyentes	35%

PRESENTACIONES: 1L - 5L - 10L - 20L - 100L - 200L

