

关系的运算

School of Computer
Wuhan University

1

- 关系的合成
- 关系的幂
- 关系的闭包
- 传递闭包的求解算法

Remark

关系上的运算


Remark

由于关系就是集合，因此集合上的运算也是关系的运算。


- “ \leq ” - “ 1_A ” = “ $<$ ”;
- \mathbb{R} 上有: “ \leq ” \cap “ \geq ” = “ $=$ ”;
- “ \leq ” \cup “ \geq ” = \mathbb{R} 上的全域关系;
- $\mathcal{P}(A)$ 上有: “ \subseteq ” \cap “ \supseteq ” = “ $=$ ”;
- “ \subseteq ” \cup “ \supseteq ” \neq 全域关系.

由于关系的对象是 n 重组, 因此还有些一般集合不具有的运算.


关系合成的图示




关系合成的图示



关系合成的图示



关系合成的图示



合成的定义

Definition (合成关系, Composite Relation)

设 $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$, $\mathcal{R}_2 \subseteq B \times C$, \mathcal{R}_1 和 \mathcal{R}_2 的合成记为 $\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2$ ($\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2$) 定义为:

$$\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \triangleq \{ \langle a, c \rangle \mid a \in A, c \in C \wedge \exists b \in B \wedge a \mathcal{R}_1 b \wedge b \mathcal{R}_2 c \}$$

是A到C上的关系.

Remark

合成的条件：第一个关系的陪域(codomain)和第二个关系的域(domain)是相同的集合。

Example

Example

- \mathcal{R}_1 是兄弟关系; \mathcal{R}_2 父子关系; $\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle \mid a \text{和} b \text{间有直航航线} \}$, $\mathcal{R} \mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线(记为 \mathcal{R}^2);
- $(=_4)^2 = =_4$;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$; 则, $1_A \mathcal{R} = \mathcal{R} 1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset \mathcal{R} = \mathcal{R} \emptyset = \emptyset$;
- 合成对应的SQL语句: `SELECT \mathcal{R}_1 .first, \mathcal{R}_2 .second FROM \mathcal{R}_1 JOIN \mathcal{R}_2 ON \mathcal{R}_1 .second = \mathcal{R}_2 .first.`

Example

- \mathcal{R}_1 是兄弟关系; \mathcal{R}_2 父子关系; $\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle \mid a \text{和} b \text{间有直航航线} \}$, $\mathcal{R} \mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线(记为 \mathcal{R}^2);
- $(=_4)^2 = =_4$;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$; 则, $1_A \mathcal{R} = \mathcal{R} 1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset \mathcal{R} = \mathcal{R} \emptyset = \emptyset$;
- 合成对应的SQL语句: `SELECT \mathcal{R}_1 .first, \mathcal{R}_2 .second FROM \mathcal{R}_1 JOIN \mathcal{R}_2 ON \mathcal{R}_1 .second = \mathcal{R}_2 .first`

Example

- \mathcal{R}_1 是兄弟关系; \mathcal{R}_2 父子关系; $\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle \mid a \text{和} b \text{间有直航航线} \}$, $\mathcal{R} \mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线(记为 \mathcal{R}^2);
- $(=_4)^2 = =_4$;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$; 则, $1_A \mathcal{R} = \mathcal{R} 1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset \mathcal{R} = \mathcal{R} \emptyset = \emptyset$;
- 合成对应的SQL语句: `SELECT \mathcal{R}_1 .first, \mathcal{R}_2 .second FROM \mathcal{R}_1 JOIN \mathcal{R}_2 ON \mathcal{R}_1 .second = \mathcal{R}_2 .first`

Example

- \mathcal{R}_1 是兄弟关系; \mathcal{R}_2 父子关系; $\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle \mid a \text{和} b \text{间有直航航线} \}$, $\mathcal{R} \mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线(记为 \mathcal{R}^2);
- $(=_4)^2 = =_4$;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$; 则, $1_A \mathcal{R} = \mathcal{R} 1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset \mathcal{R} = \mathcal{R} \emptyset = \emptyset$;
- 合成对应的SQL语句: `SELECT \mathcal{R}_1 .first, \mathcal{R}_2 .second FROM \mathcal{R}_1 JOIN \mathcal{R}_2 ON \mathcal{R}_1 .second = \mathcal{R}_2 .first.`

Example

- \mathcal{R}_1 是兄弟关系; \mathcal{R}_2 父子关系; $\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle \mid a \text{和} b \text{间有直航航线} \}$, $\mathcal{R} \mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线(记为 \mathcal{R}^2);
- $(=_4)^2 = =_4$;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$; 则, $1_A \mathcal{R} = \mathcal{R} 1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset \mathcal{R} = \mathcal{R} \emptyset = \emptyset$;
- 合成对应的SQL语句: *SELECT \mathcal{R}_1 .first, \mathcal{R}_2 .second FROM \mathcal{R}_1 JOIN \mathcal{R}_2 ON \mathcal{R}_1 .second = \mathcal{R}_2 .first.*

Example

- \mathcal{R}_1 是兄弟关系; \mathcal{R}_2 父子关系; $\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle \mid a \text{和} b \text{间有直航航线} \}$, $\mathcal{R} \mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线(记为 \mathcal{R}^2);
- $(=_4)^2 = =_4$;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$; 则, $1_A \mathcal{R} = \mathcal{R} 1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset \mathcal{R} = \mathcal{R} \emptyset = \emptyset$;
- 合成对应的SQL语句: *SELECT $\mathcal{R}_1.first, \mathcal{R}_2.second$ FROM \mathcal{R}_1 JOIN \mathcal{R}_2 ON $\mathcal{R}_1.second = \mathcal{R}_2.first$.*

合成的运算性质(1/2)

Theorem

设 $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$, $\mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3 \subseteq B \times C$, $\mathcal{R}_4 \subseteq C \times D$:

- ① $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) = \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$ (\circ 对 \cup 的分配律);
- ② $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \subseteq \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$;
- ③ $(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) \mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4 \cup \mathcal{R}_3 \mathcal{R}_4$ (\circ 对 \cup 的分配律);
- ④ $(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \mathcal{R}_4 \subseteq \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4 \cap \mathcal{R}_3 \mathcal{R}_4$;
- ⑤ $(\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2) \mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4)$ (结合率).

合成的运算性质(1/2)

Theorem

设 $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$, $\mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3 \subseteq B \times C$, $\mathcal{R}_4 \subseteq C \times D$:

- ① $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) = \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$ (\circ 对 \cup 的分配律);
- ② $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \subseteq \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$;
- ③ $(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) \mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4 \cup \mathcal{R}_3 \mathcal{R}_4$ (\circ 对 \cup 的分配律);
- ④ $(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \mathcal{R}_4 \subseteq \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4 \cap \mathcal{R}_3 \mathcal{R}_4$;
- ⑤ $(\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2) \mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4)$ (结合率).

合成的运算性质(1/2)

Theorem

设 $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B, \mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3 \subseteq B \times C, \mathcal{R}_4 \subseteq C \times D$:

- ① $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) = \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$ (\circ 对 \cup 的分配律);
- ② $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \subseteq \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$;
- ③ $(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) \mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4 \cup \mathcal{R}_3 \mathcal{R}_4$ (\circ 对 \cup 的分配律);
- ④ $(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \mathcal{R}_4 \subseteq \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4 \cap \mathcal{R}_3 \mathcal{R}_4$;
- ⑤ $(\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2) \mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4)$ (结合率).

合成的运算性质(2/2)

Proof.

②的证明:

$$① \quad \forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$② \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$③ \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$④ \quad \iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$$

$$⑤ \quad \implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$⑥ \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$

$$⑦ \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$



合成的运算性质(2/2)

Proof.

②的证明:

$$\textcircled{1} \quad \forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{2} \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{3} \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{4} \quad \iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$$

$$\textcircled{5} \quad \implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{6} \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$

$$\textcircled{7} \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$



合成的运算性质(2/2)

Proof.

②的证明:

$$\textcircled{1} \quad \forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{2} \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{3} \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{4} \quad \iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$$

$$\textcircled{5} \quad \implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{6} \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$

$$\textcircled{7} \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$



合成的运算性质(2/2)

Proof.

②的证明:

$$\textcircled{1} \quad \forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{2} \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{3} \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{4} \quad \iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$$

$$\textcircled{5} \quad \implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{6} \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$

$$\textcircled{7} \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$



合成的运算性质(2/2)

Proof.

②的证明:

$$① \quad \forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$② \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$③ \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$④ \quad \iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$$

$$⑤ \quad \implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$⑥ \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$

$$⑦ \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$



合成的运算性质(2/2)

Proof.

②的证明:

$$① \quad \forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$② \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$③ \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$④ \quad \iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$$

$$⑤ \quad \implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$⑥ \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$

$$⑦ \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$



合成的运算性质(2/2)

Proof.

②的证明:

$$① \quad \forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$② \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$③ \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$④ \quad \iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$$

$$⑤ \quad \implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$⑥ \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$

$$⑦ \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$



合成的运算性质(2/2)

Proof.

②的证明:

$$① \quad \forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$② \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$③ \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$④ \quad \iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$$


$$⑤ \quad \implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$⑥ \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$

$$⑦ \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3$$



②的反例




$$\begin{aligned}\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) &= \emptyset \\ \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3 &= \{\langle a, c \rangle\}\end{aligned}$$

Example 1

Example

- 求所有可以间接通航的城市：



a 和 b 可间接通航, iff:

$$\exists a_1, a_2, \dots, a_{n-1} (a \mathcal{R} a_1 \wedge a_1 \mathcal{R} a_2 \wedge \dots \wedge a_{n-1} \mathcal{R} b)$$

则: $\langle a, a_1 \rangle \in \mathcal{R};$

$$\langle a, a_2 \rangle \in \mathcal{R}^2;$$

.....

$$\langle a, a_{n-1} \rangle \in (\mathcal{R}^{n-2}) \mathcal{R} \triangleq \mathcal{R}^{n-1};$$

$$\langle a, b \rangle \in (\mathcal{R}^{n-1}) \mathcal{R} \triangleq \mathcal{R}^n;$$

$\therefore a$ 和 b 可间接通航, iff, $\exists n \langle a, b \rangle \in \mathcal{R}^n$.

Example 2: Six Degrees of Separation (六度分隔)



见http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation.

Definition (关系的幂, Power of relation)

Definition (关系的幂, Power of relation)

- ① $\mathcal{R}^0 = \mathbb{1}_A$;
- ② $\mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R}^n \mathcal{R}$.


关系的幂

Definition (关系的幂, Power of relation)

设 \mathcal{R} 是 A 上的关系, $n \in \mathbb{N}$, \mathcal{R} 的乘幂递归定义如下:

- ① $\mathcal{R}^0 = \mathbb{1}_A$;
- ② $\mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R}^n \mathcal{R}$.

Example



$$\therefore \mathcal{R}^n = \begin{cases} \mathcal{R} & \text{if } n \text{ 是奇数} \\ \mathbb{1}_A & \text{if } n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

相关性质

Theorem

- ① $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n};$
- ② $(\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn};$

①的证明.

对 n 用归纳法:



相关性质

Theorem

① $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n};$

② $(\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn};$

①的证明.

对 n 用归纳法:



相关性质

Theorem

- ① $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n};$
- ② $(\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn};$

①的证明.

对 n 用归纳法:

$$\text{① } n=0 \text{ 时, } \mathcal{R}^m \mathcal{R}^0 = \mathcal{R}^m 1_A = \mathcal{R}^m = \mathcal{R}^{m+0};$$



相关性质

Theorem

- ① $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n};$
- ② $(\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn};$

①的证明.

对 n 用归纳法:

- ① $n = 0$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^0 = \mathcal{R}^m \mathbb{1}_A = \mathcal{R}^m = \mathcal{R}^{m+0};$
- ② 设 $n = k$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k = \mathcal{R}^{m+k};$
- ③ $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{R}^m \mathcal{R}^{k+1} \\
 &= \mathcal{R}^m (\mathcal{R}^k \mathcal{R}) \quad (\text{def}) \\
 &= (\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k) \mathcal{R} \quad (\text{结合律}) \\
 &= \mathcal{R}^{m+k} \mathcal{R} \quad (\text{归纳假设}) \\
 &= \mathcal{R}^{m+k+1} \quad (\text{def})
 \end{aligned}$$



相关性质

Theorem

- ① $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}$;
- ② $(\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$;

①的证明.

对 n 用归纳法:

- ① $n = 0$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^0 = \mathcal{R}^m \mathbb{1}_A = \mathcal{R}^m = \mathcal{R}^{m+0}$;
- ② 设 $n = k$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k = \mathcal{R}^{m+k}$;
- ③ $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{R}^m \mathcal{R}^{k+1} \\
 &= \mathcal{R}^m (\mathcal{R}^k \mathcal{R}) \quad (\text{def}) \\
 &= (\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k) \mathcal{R} \quad (\text{结合律}) \\
 &= \mathcal{R}^{m+k} \mathcal{R} \quad (\text{归纳假设}) \\
 &= \mathcal{R}^{m+k+1} \quad (\text{def})
 \end{aligned}$$



相关性质

Theorem

- ① $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}$;
- ② $(\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$;

①的证明.

对 n 用归纳法:

- ① $n = 0$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^0 = \mathcal{R}^m \mathbb{1}_A = \mathcal{R}^m = \mathcal{R}^{m+0}$;
- ② 设 $n = k$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k = \mathcal{R}^{m+k}$;
- ③ $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{R}^m \mathcal{R}^{k+1} \\
 &= \mathcal{R}^m (\mathcal{R}^k \mathcal{R}) \quad (\text{def}) \\
 &= (\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k) \mathcal{R} \quad (\text{结合律}) \\
 &= \mathcal{R}^{m+k} \mathcal{R} \quad (\text{归纳假设}) \\
 &= \mathcal{R}^{m+k+1} \quad (\text{def})
 \end{aligned}$$



相关性质

Theorem

- ① $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}$;
- ② $(\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$;

①的证明.

对 n 用归纳法:

- ① $n = 0$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^0 = \mathcal{R}^m \mathbb{1}_A = \mathcal{R}^m = \mathcal{R}^{m+0}$;
- ② 设 $n = k$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k = \mathcal{R}^{m+k}$;
- ③ $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{R}^m \mathcal{R}^{k+1} \\
 &= \mathcal{R}^m (\mathcal{R}^k \mathcal{R}) \quad (\text{def}) \\
 &= (\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k) \mathcal{R} \quad (\text{结合律}) \\
 &= \mathcal{R}^{m+k} \mathcal{R} \quad (\text{归纳假设}) \\
 &= \mathcal{R}^{m+k+1} \quad (\text{def})
 \end{aligned}$$



相关性质

Theorem

① 设 $|A| = n$, 则存在 i, j $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

① 由鸽巢原理, 因为 $|A| = n$, 所以 $|A \times A| = n^2$.
 所以 \mathcal{R} 共有 2^{n^2} 个不同的子集.
 ② 若 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 两两不同, 则共有 $2^{n^2} + 1$ 个不同的关系.
 ③ 根据鸽巢原理, 必有 $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$ 成立. \square

Corollary

$\forall m \in \mathbb{N} \quad \mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}.$

相关性质

Theorem

① 设 $|A| = n$, 则存在 i, j $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

① $|A| = n, \therefore |A \times A| = n^2$;

② $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 个;

③ 由抽屉原理, 必有 $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$ 成立.

④ 由 $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$ 可得 $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j = \mathcal{R}^{2^{n^2} - j + i}$.

⑤ 因此 $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j = \mathcal{R}^{2^{n^2} - j + i}$.



Corollary

$\forall m \in \mathbb{N} \mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}.$

相关性质

Theorem

① 设 $|A| = n$, 则存在 i, j $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $|A| = n, \therefore |A \times A| = n^2$;
- ② $\therefore |\mathcal{P}(A \times A)| = 2^{n^2}$;
- ③ 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项;
- ④ 根据抽屉原则, $\exists i, j$ $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

$\forall m \in \mathbb{N} \ \mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}.$

相关性质

Theorem

① 设 $|A| = n$, 则存在 i, j $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $|A| = n, \therefore |A \times A| = n^2$;
- ② $\therefore |\mathcal{P}(A \times A)| = 2^{n^2}$;
- ③ 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项;
- ④ 根据抽屉原则, $\exists i, j$ $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

$\forall m \in \mathbb{N} \mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}.$

相关性质

Theorem

- ① 设 $|A| = n$, 则存在 i, j $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $|A| = n, \therefore |A \times A| = n^2$;
 ② $\therefore |\mathcal{P}(A \times A)| = 2^{n^2}$;
 ③ 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项;
 ④ 根据抽屉原则, $\exists i, j$ $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}.$$

相关性质

Theorem

- ① 设 $|A| = n$, 则存在 i, j $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $|A| = n, \therefore |A \times A| = n^2$;
 ② $\therefore |\mathcal{P}(A \times A)| = 2^{n^2}$;
 ③ 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项;
 ④ 根据抽屉原则, $\exists i, j$ $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}.$$

相关性质

Theorem

- ① 设 $|A| = n$, 则存在 i, j $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $|A| = n, \therefore |A \times A| = n^2$;
- ② $\therefore |\mathcal{P}(A \times A)| = 2^{n^2}$;
- ③ 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项;
- ④ 根据抽屉原则, $\exists i, j$ $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}.$$

相关性质

Theorem

- ① 设 $|A| = n$, 则存在 i, j $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $|A| = n, \therefore |A \times A| = n^2$;
- ② $\therefore |\mathcal{P}(A \times A)| = 2^{n^2}$;
- ③ 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项;
- ④ 根据抽屉原则, $\exists i, j$ $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \mathcal{R}^m \in \{ \mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1} \}.$$

闭包

Description (闭包, Closure)

数学上把包含某个给定的集合, 并且具有某个性质的**最小**集合称为**闭包**.

Example

所有的可以间接通航的城市之间的关系是直接通航城市的传递闭包;

闭包

Description (闭包, Closure)

数学上把包含某个给定的集合, 并且具有某个性质的**最小**集合称为**闭包**.

Example

- ① 所有的可以间接通航的城市之间的关系是直接通航城市的传递闭包;
- ② 极限的闭包: 包含某个集合并且所有该集合上的极限都在该集合中的最小集合, 如: $\overline{[0, 1[} = [0, 1]$.

闭包

Description (闭包, Closure)

数学上把包含某个给定的集合，并且具有某个性质的**最小**集合称为**闭包**。

Example

- ① 所有的可以间接通航的城市之间的关系是直接通航城市的传递闭包；
- ② 极限的闭包：包含某个集合并且所有该集合上的极限都在该集合中的最小集合，如： $\overline{]0, 1[} = [0, 1]$ 。

关系的逆

Definition (关系的逆)

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 关系 \mathcal{R} 的逆关系, 记为 $\tilde{\mathcal{R}}$ (读作tilde), 定义如下:

$$\tilde{\mathcal{R}} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \} \subseteq B \times A$$

Example

关系的逆

Definition (关系的逆)

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 关系 \mathcal{R} 的逆关系, 记为 $\tilde{\mathcal{R}}$ (读作tilde), 定义如下:

$$\tilde{\mathcal{R}} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \} \subseteq B \times A$$

Example

- $\lesssim = \geq$; $\tilde{1}_A = 1_A$; $\tilde{\subseteq} = \supseteq$;
- 关系的逆是关系的对偶概念; 如果 \mathcal{R} 具有五性, 则 $\tilde{\mathcal{R}}$ 也相应的具有;
- 关系的逆与关系的补是不同的概念:

$$\overline{\mathcal{R}} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \} \subseteq A \times B$$

关系的逆

Definition (关系的逆)

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 关系 \mathcal{R} 的逆关系, 记为 $\tilde{\mathcal{R}}$ (读作tilde), 定义如下:

$$\tilde{\mathcal{R}} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \} \subseteq B \times A$$

Example

- $\lesseqgtr = \geq$; $\widetilde{1_A} = 1_A$; $\widetilde{\subseteq} = \supseteq$;
- 关系的逆是关系的对偶概念; 如果 \mathcal{R} 具有五性, 则 $\tilde{\mathcal{R}}$ 也相应的具有;
- 关系的逆与关系的补是不同的概念:

$$\overline{\mathcal{R}} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \} \subseteq A \times B$$

关系的逆

Definition (关系的逆)

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 关系 \mathcal{R} 的逆关系, 记为 $\tilde{\mathcal{R}}$ (读作tilde), 定义如下:

$$\tilde{\mathcal{R}} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \} \subseteq B \times A$$

Example

- $\lesseqgtr = \geq$; $\widetilde{1_A} = 1_A$; $\widetilde{\subseteq} = \supseteq$;
- 关系的逆是关系的对偶概念; 如果 \mathcal{R} 具有五性, 则 $\tilde{\mathcal{R}}$ 也相应的具有;
- 关系的逆与关系的补是不同的概念:

$$\overline{\mathcal{R}} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \} \subseteq A \times B$$

关系的逆

Definition (关系的逆)

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 关系 \mathcal{R} 的逆关系, 记为 $\tilde{\mathcal{R}}$ (读作tilde), 定义如下:

$$\tilde{\mathcal{R}} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \} \subseteq B \times A$$

Example

- $\lesssim = \geq$; $\tilde{1}_A = 1_A$; $\tilde{\subseteq} = \supseteq$;
- 关系的逆是关系的对偶概念; 如果 \mathcal{R} 具有五性, 则 $\tilde{\mathcal{R}}$ 也相应的具有;
- 关系的逆与关系的补是不同的概念:

$$\overline{\mathcal{R}} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \} \subseteq A \times B$$

相关性质

Theorem

\mathcal{R} 是对称关系, iff, $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$.

Proof.

1. \Rightarrow $\forall (x, y) \in \mathcal{R}, (y, x) \in \mathcal{R}$; So $(x, y) \in \tilde{\mathcal{R}}$

$\Rightarrow \mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}}$, but $\tilde{\mathcal{R}} \subseteq \mathcal{R}$;

So, $\mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}} = \mathcal{R}$ ($\tilde{\mathcal{R}}$ 也是对称关系), $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$;

2. \Leftarrow $\forall (x, y) \in \mathcal{R}, (y, x) \in \mathcal{R}$;

\mathcal{R} 是对称关系.



相关性质

Theorem

\mathcal{R} 是对称关系, iff, $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$.

Proof.

$\Rightarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}; \text{ So } \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}$

$\therefore \mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}}, \text{ but } \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R};$

So, $\tilde{\mathcal{R}} \subseteq \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R} (\because \tilde{\mathcal{R}} \text{ 也是对称关系}), \therefore \mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}};$

$\Leftarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \therefore \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}; \text{ So } \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$

所以 \mathcal{R} 是对称关系.



相关性质

Theorem

\mathcal{R} 是对称关系, iff, $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$.

Proof.

$\Rightarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}; \text{ So } \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}$

$\therefore \mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}}, \text{ but } \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R};$

$\text{So, } \tilde{\mathcal{R}} \subseteq \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R} (\because \tilde{\mathcal{R}} \text{ 也是对称关系}), \therefore \mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}};$

$\Leftarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \therefore \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}; \text{ So } \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$

所以 \mathcal{R} 是对称关系.



相关性质

Theorem

\mathcal{R} 是对称关系, iff, $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$.

Proof.

$\Rightarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}; \text{ So } \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}$

$\therefore \mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}}, \text{ but } \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R};$

$\text{So, } \tilde{\mathcal{R}} \subseteq \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R} (\because \tilde{\mathcal{R}} \text{ 也是对称关系}), \therefore \mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}};$

$\Leftarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \therefore \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}; \text{ So } \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$

所以 \mathcal{R} 是对称关系.



10

特性关系的闭包

Definition

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, \mathcal{R} 的自反(对称、传递)闭包 \mathcal{R}' 是满足下述三条件的关系:

- ① $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$;
- ② \mathcal{R}' 是自反的(对称的、传递的);
- ③ 设 \mathcal{R}'' 是满足上述两条件的关系, 则 $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}''$.

分别记 \mathcal{R} 的自反、对称和传递闭包为: $r(\mathcal{R})$, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$.

Proposition

\mathcal{R} 是自反的(对称的、传递的), iff, $\mathcal{R} = r(\mathcal{R})$ ($s(\mathcal{R})$, $t(\mathcal{R})$).

特性关系的闭包

Definition

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, \mathcal{R} 的自反(对称、传递)闭包 \mathcal{R}' 是满足下述三条件的关系:

- ① $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$;
- ② \mathcal{R}' 是自反的(对称的、传递的);
- ③ 设 \mathcal{R}'' 是满足上述两条件的关系, 则 $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}''$.

分别记 \mathcal{R} 的自反、对称和传递闭包为: $r(\mathcal{R})$, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$.

Propostion

\mathcal{R} 是自反的(对称的、传递的), iff, $\mathcal{R} = r(\mathcal{R})$ ($s(\mathcal{R})$, $t(\mathcal{R})$).

闭包的构造(1/2)

Theorem

$$\textcircled{1} \ r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbb{1}_A; \quad \textcircled{2} \ s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} \ t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明.

$$\bullet \ \mathcal{R} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

$$\bullet \ \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq t(\mathcal{R});$$

$$\bullet \ t(\mathcal{R}) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$



闭包的构造(1/2)

Theorem

$$\textcircled{1} r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbf{1}_A; \quad \textcircled{2} s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明.

$$\textcircled{1} \mathcal{R} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

$$\textcircled{2} \forall \langle x, y \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i, \langle y, z \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

$$\exists m, n \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^m, \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}^n; \therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$ 是传递的.



闭包的构造(1/2)

Theorem

$$\textcircled{1} r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbb{1}_A; \quad \textcircled{2} s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明.

$$\textcircled{1} \mathcal{R} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

$$\textcircled{2} \forall \langle x, y \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i, \langle y, z \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

$$\exists m, n \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^m, \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}^n; \therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$ 是传递的.



闭包的构造(1/2)

Theorem

$$\textcircled{1} r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbb{1}_A; \quad \textcircled{2} s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明.

$$\textcircled{1} \mathcal{R} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

$$\textcircled{2} \forall \langle x, y \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i, \langle y, z \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

$$\exists m, n \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^m, \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}^n; \therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$ 是传递的.



闭包的构造(2/2)

③的证明.

③ 设传递关系 $\mathcal{R}' \supseteq \mathcal{R}$, 则要证明: $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \mathcal{R}'$;

用归纳法证明: $\forall n \mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$.

① $n=1$ 时, $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$;

② 假设 $n-1$ 时命题成立, 即 $n-1 \leq 1$ 时

$\mathcal{R}^i \subseteq \mathcal{R}'$ 成立, 则 n 时

$\mathcal{R}^n = \mathcal{R} \circ \mathcal{R}^{n-1} \subseteq \mathcal{R}' \circ \mathcal{R}'$

$\subseteq \mathcal{R}'$ (因为 \mathcal{R}' 是传递的)



③的证明.

用归纳法证明: $\forall n \mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$.



闭包的构造(2/2)

③的证明.

③ 设传递关系 $\mathcal{R}' \supseteq \mathcal{R}$, 则要证明: $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \mathcal{R}'$;

用归纳法证明: $\forall n \mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$.

① $n = 1$ 时, $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$;

② 设 $n = k$ 时结论成立, $n = k + 1$ 时:

设 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^{k+1} = \mathcal{R}^k \mathcal{R}$;

$\therefore \exists y \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^k \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$;

So $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}' \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}'$;

$\therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}'$ (\mathcal{R}' 是传递的).



闭包的构造(2/2)

③的证明.

③ 设传递关系 $\mathcal{R}' \supseteq \mathcal{R}$, 则要证明: $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \mathcal{R}'$;

用归纳法证明: $\forall n \mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$.

- ① $n = 1$ 时, $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$;
- ② 设 $n = k$ 时结论成立, $n = k + 1$ 时:
 设 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^{k+1} = \mathcal{R}^k \mathcal{R}$;
 $\therefore \exists y \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^k \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$;
 So $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}' \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}'$;
 $\therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}'$ (\mathcal{R}' 是传递的).



Examples

Example

- $r(<) = \leq$; $s(<) = \neq$;
- $s(\leq) = \text{全域关系}$; $r(\neq) = \text{全域关系}$;
- 设 \mathcal{R} 是城市之间有直接航线的关系, 则城市之间有间接航线的关系等于 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$.

Examples

Example

- $r(<) = \leq$; $s(<) = \neq$;
- $s(\leq) = \text{全域关系}$; $r(\neq) = \text{全域关系}$;
- 设 \mathcal{R} 是城市之间有直接航线的关系, 则城市之间有间接航线的关系等于 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$.

Examples

Example

- $r(<) = \leq$; $s(<) = \neq$;
- $s(\leq) = \text{全域关系}$; $r(\neq) = \text{全域关系}$;
- 设 \mathcal{R} 是城市之间有直接航线的关系, 则城市之间有间接航线的关系等于 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$.

Examples

Example

- $r(<) = \leq$; $s(<) = \neq$;
- $s(\leq) = \text{全域关系}$; $r(\neq) = \text{全域关系}$;
- 设 \mathcal{R} 是城市之间有直接航线的关系, 则城市之间有间接航线的关系等于 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$.

有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$;

Proof.

① 设 $(x_0, x_{n-1}) \in \mathcal{R}^{n-1}$;

② 设 $(x_0, x_{n-2}) \in \mathcal{R}^{n-2}$;

③ 设 $(x_0, x_{n-3}) \in \mathcal{R}^{n-3}$;

④ 设 $(x_0, x_{n-4}) \in \mathcal{R}^{n-4}$;

⑤ 设 $(x_0, x_{n-5}) \in \mathcal{R}^{n-5}$;

⑥ 设 $(x_0, x_{n-6}) \in \mathcal{R}^{n-6}$;

⑦ 设 $(x_0, x_{n-7}) \in \mathcal{R}^{n-7}$;

⑧ 设 $(x_0, x_{n-8}) \in \mathcal{R}^{n-8}$;

⑨ 设 $(x_0, x_{n-9}) \in \mathcal{R}^{n-9}$;

⑩ 设 $(x_0, x_{n-10}) \in \mathcal{R}^{n-10}$;

⑪ 设 $(x_0, x_{n-11}) \in \mathcal{R}^{n-11}$;

⑫ 设 $(x_0, x_{n-12}) \in \mathcal{R}^{n-12}$;



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$;

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$;
- ② $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \ x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
- ③ 即 \mathcal{R} 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 长度为 n 的有向路径;
- ④ 而 x_1, x_2, \dots, x_n $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个元素中选取;
- ⑤ 所以根据抽屉原则, $\exists 1 \leq i < j \leq n+1 \ x_i = x_j$;
- ⑥ $\therefore x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
 $\underbrace{\hspace{15em}}_{n+1-(j-i) \text{ 个}}$
- ⑦ $\therefore \langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$;

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$;
- ② $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \ x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
- ③ 即 \mathcal{R} 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 长度为 n 的有向路径;
- ④ 而 x_1, x_2, \dots, x_n $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个元素中选取;
- ⑤ 所以根据抽屉原则, $\exists 1 \leq i < j \leq n+1 \ x_i = x_j$;
- ⑥ $\therefore \underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \text{ 个}}$;
- ⑦ $\therefore \langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$;

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$;
- ② $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \ x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
- ③ 即 \mathcal{R} 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 长度为 n 的有向路径;
- ④ 而 x_1, x_2, \dots, x_n $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个元素中选取;
- ⑤ 所以根据抽屉原则, $\exists 1 \leq i < j \leq n+1 \ x_i = x_j$;
- ⑥ $\therefore x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{n+1-(j-i) \text{ 个}}$
- ⑦ $\therefore \langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$;

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$;
- ② $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \ x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
- ③ 即 \mathcal{R} 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 长度为 n 的有向路径;
- ④ 而 x_1, x_2, \dots, x_n $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个元素中选取;
- ⑤ 所以根据抽屉原则, $\exists 1 \leq i < j \leq n+1 \ x_i = x_j$;
- ⑥ $\therefore x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{n+1-(j-i) \text{ 个}}$
- ⑦ $\therefore \langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$;

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$;
- ② $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \ x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
- ③ 即 \mathcal{R} 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 长度为 n 的有向路径;
- ④ 而 x_1, x_2, \dots, x_{n+1} $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个元素中选取;
- ⑤ 所以根据抽屉原则, $\exists 1 \leq i < j \leq n+1 \ x_i = x_j$;
- ⑥ $\therefore x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{n+1-(j-i) \uparrow}$
- ⑦ $\therefore \langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$;

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$;
- ② $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \ x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
- ③ 即 \mathcal{R} 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 长度为 n 的有向路径;
- ④ 而 x_1, x_2, \dots, x_{n+1} $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个元素中选取;
- ⑤ 所以根据抽屉原则, $\exists 1 \leq i < j \leq n+1 \ x_i = x_j$;

$$\textcircled{6} \quad \underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \uparrow};$$

$$\textcircled{7} \quad \therefore \langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i.$$



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$;

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$;
- ② $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \ x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
- ③ 即 \mathcal{R} 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 长度为 n 的有向路径;
- ④ 而 x_1, x_2, \dots, x_{n+1} $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个元素中选取;
- ⑤ 所以根据抽屉原则, $\exists 1 \leq i < j \leq n+1 \ x_i = x_j$;
- ⑥ $\therefore \underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \uparrow}$;

$$\textcircled{7} \therefore \langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i.$$



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$;




Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$;
- ② $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \ x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}$;
- ③ 即 \mathcal{R} 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 长度为 n 的有向路径;
- ④ 而 x_1, x_2, \dots, x_{n+1} $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个元素中选取;
- ⑤ 所以根据抽屉原则, $\exists 1 \leq i < j \leq n+1 \ x_i = x_j$;
- ⑥ $\therefore \underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \uparrow}$;
- ⑦ $\therefore \langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.




Examples

$\mathcal{R} = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$ 的传递闭包



$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3$$



闭包之间的关系(1/3)

Propostion

设 \mathcal{R} 是自反关系, 则, $t(\mathcal{R})$ 和 $s(\mathcal{R})$ 也是自反关系;

$t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

● 凡是自反的, 谓, $a, a \in \mathcal{R}$

● 于是, $a, a \in t(\mathcal{R})$

● 所以, $t(\mathcal{R})$ 也是自反的



闭包之间的关系(1/3)

Proposition

设 \mathcal{R} 是自反关系, 则, $t(\mathcal{R})$ 和 $s(\mathcal{R})$ 也是自反关系;

$t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

- ① \mathcal{R} 是自反的, iff, $\mathbb{1}_A \subseteq \mathcal{R}$
- ② 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq \mathbb{1}_A$;
- ③ 所以, \mathcal{R} 是自反的.



闭包之间的关系(1/3)

Proposition

设 \mathcal{R} 是自反关系, 则, $t(\mathcal{R})$ 和 $s(\mathcal{R})$ 也是自反关系;

$t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

① \mathcal{R} 是自反的, iff, $\mathbb{1}_A \subseteq \mathcal{R}$

② 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq \mathbb{1}_A$;

③ 所以, \mathcal{R} 是自反的.



闭包之间的关系(1/3)

Proposition

设 \mathcal{R} 是自反关系, 则, $t(\mathcal{R})$ 和 $s(\mathcal{R})$ 也是自反关系;

$t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

① \mathcal{R} 是自反的, iff, $\mathbb{1}_A \subseteq \mathcal{R}$

② 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq \mathbb{1}_A$;

③ 所以, \mathcal{R} 是自反的.



闭包之间的关系(1/3)

Proposition

设 \mathcal{R} 是自反关系, 则, $t(\mathcal{R})$ 和 $s(\mathcal{R})$ 也是自反关系;

$t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

- ① \mathcal{R} 是自反的, iff, $\mathbb{1}_A \subseteq \mathcal{R}$
- ② 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq \mathbb{1}_A$;
- ③ 所以, \mathcal{R} 是自反的.



闭包之间的关系(2/3)

Proposition

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R});$$

Proof.

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

由此:

$$\forall n \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n \subseteq \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R}).$$



闭包之间的关系(2/3)

Proposition

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R});$$

Proof.

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

由此:

$$\forall n \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n \subseteq \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R}).$$



闭包之间的关系(2/3)

Proposition

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R});$$

Proof.

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

由此:

$$\forall n \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n \subseteq \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R}).$$



闭包之间的关系(2/3)

Proposition

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R});$$

Proof.

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

由此:

$$\forall n \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n \subseteq \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R}).$$



闭包之间的关系(2/3)

Proposition

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R});$$

Proof.

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

由此:

$$\forall n \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n \subseteq \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R}).$$



闭包之间的关系(2/3)

Proposition

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R});$$

Proof.

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

由此:

$$\forall n \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n \subseteq \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R}).$$



闭包之间的关系(3/3)

Proof(continued).

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbf{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

闭包之间的关系(3/3)

Proof(continued).

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$(\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^{k+1}$$

闭包之间的关系(3/3)

Proof(continued).

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^{k+1} \\
 = & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^k (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 乘幂的定义)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 归纳假设)} \\
 = & \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathcal{R} \right) \cup \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathbb{1}_A \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=1}^{k+1} \mathcal{R}^i \right) \cup \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \bigcup_{i=0}^{k+1} \mathcal{R}^i
 \end{aligned}$$

闭包之间的关系(3/3)

Proof(continued).

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^{k+1} \\
 = & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^k (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 乘幂的定义)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 归纳假设)} \\
 = & \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathcal{R} \right) \cup \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathbb{1}_A \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=1}^{k+1} \mathcal{R}^i \right) \cup \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \bigcup_{i=0}^{k+1} \mathcal{R}^i
 \end{aligned}$$

闭包之间的关系(3/3)

Proof(continued).

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^{k+1} \\
 = & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^k (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 乘幂的定义)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 归纳假设)} \\
 = & \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathcal{R} \right) \cup \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathbb{1}_A \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=1}^{k+1} \mathcal{R}^i \right) \cup \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \bigcup_{i=0}^{k+1} \mathcal{R}^i
 \end{aligned}$$

闭包之间的关系(3/3)

Proof(continued).

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^{k+1} \\
 = & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^k (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 乘幂的定义)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 归纳假设)} \\
 = & \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathcal{R} \right) \cup \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathbb{1}_A \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=1}^{k+1} \mathcal{R}^i \right) \cup \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \bigcup_{i=0}^{k+1} \mathcal{R}^i
 \end{aligned}$$

闭包之间的关系(3/3)

Proof(continued).

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^{k+1} \\
 = & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^k (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 乘幂的定义)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 归纳假设)} \\
 = & \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathcal{R} \right) \cup \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathbb{1}_A \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=1}^{k+1} \mathcal{R}^i \right) \cup \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \bigcup_{i=0}^{k+1} \mathcal{R}^i
 \end{aligned}$$

闭包之间的关系(3/3)

Proof(continued).

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^{k+1} \\
 = & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^k (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 乘幂的定义)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 归纳假设)} \\
 = & \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathcal{R} \right) \cup \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathbb{1}_A \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=1}^{k+1} \mathcal{R}^i \right) \cup \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \bigcup_{i=0}^{k+1} \mathcal{R}^i
 \end{aligned}$$

闭包之间的关系(3/3)

Proof(continued).

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i;$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^{k+1} \\
 = & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^k (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 乘幂的定义)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 归纳假设)} \\
 = & \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathcal{R} \right) \cup \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathbb{1}_A \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \left(\bigcup_{i=1}^{k+1} \mathcal{R}^i \right) \cup \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) && \text{(by 合成对并的分配率)} \\
 = & \bigcup_{i=0}^{k+1} \mathcal{R}^i
 \end{aligned}$$

关系的合成与关系矩阵乘积

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$; $|A| = m$, $|B| = n$ 和 $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}};$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj};$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$

$$\bullet \quad c_{ij} = 1$$

$$\iff \exists k \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\text{使得 } a_{ik} \wedge b_{kj} = 1$$

$$\iff a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$$

$$\iff (x_i, y_k) \in \mathcal{R} \wedge (y_k, z_j) \in \mathcal{S}$$

$$\iff (x_i, z_j) \in \mathcal{R} \circ \mathcal{S}$$



关系的合成与关系矩阵乘积

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$; $|A| = m$, $|B| = n$ 和 $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}};$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj};$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$

- ① $c_{ij} = 1$
- ② $\iff \exists k \ a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$
- ③ $\iff \exists k \ x_i \mathcal{R} y_k \wedge y_k \mathcal{S} z_j$
- ④ $\iff x_i \mathcal{R} \mathcal{S} z_j$



关系的合成与关系矩阵乘积

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$; $|A| = m$, $|B| = n$ 和 $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}};$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj};$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$

$$\textcircled{1} \quad c_{ij} = 1$$

$$\textcircled{2} \quad \iff \exists k \ a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$$

$$\textcircled{3} \quad \iff \exists k \ x_i \mathcal{R} y_k \wedge y_k \mathcal{S} z_j$$

$$\textcircled{4} \quad \iff x_i \mathcal{R} \mathcal{S} z_j$$



关系的合成与关系矩阵乘积

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$; $|A| = m$, $|B| = n$ 和 $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}};$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj};$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$

- ① $c_{ij} = 1$
- ② $\iff \exists k \ a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$
- ③ $\iff \exists k \ x_i \mathcal{R} y_k \wedge y_k \mathcal{S} z_j$
- ④ $\iff x_i \mathcal{R} \mathcal{S} z_j$



关系的合成与关系矩阵乘积

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$; $|A| = m$, $|B| = n$ 和 $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}};$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj};$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$

- ① $c_{ij} = 1$
- ② $\iff \exists k \ a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$
- ③ $\iff \exists k \ x_i \mathcal{R} y_k \wedge y_k \mathcal{S} z_j$
- ④ $\iff x_i \mathcal{R} \mathcal{S} z_j$



关系的合成与关系矩阵乘积

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$; $|A| = m$, $|B| = n$ 和 $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}};$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj};$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$

- ① $c_{ij} = 1$
- ② $\iff \exists k \ a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$
- ③ $\iff \exists k \ x_i \mathcal{R} y_k \wedge y_k \mathcal{S} z_j$
- ④ $\iff x_i \mathcal{R} \mathcal{S} z_j$



Example

Example

设: $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$

则:

$$M_{RS} = M_R \cdot M_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

传递闭包的求解算法

Description

$$M_{t(\mathcal{R})} = \sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$$

其中: $M_{\mathcal{R}}$ 是 n 阶方阵;

- 计算 $M \cdot M$ 的每个元素 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj} \dots\dots\dots O(n)$;
- 计算 $M \cdot M \dots\dots\dots O(n^3)$;
- 计算 $\sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i \dots\dots\dots O(n^4)$.

Warshall算法可降算法的复杂度为: $O(n^3)$.

传递闭包的求解算法

Description

$$M_{t(\mathcal{R})} = \sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$$

其中: $M_{\mathcal{R}}$ 是 n 阶方阵;

- 计算 $M \cdot M$ 的每个元素 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj} \dots\dots\dots O(n)$;
- 计算 $M \cdot M \dots\dots\dots O(n^3)$;
- 计算 $\sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i \dots\dots\dots O(n^4)$.

Warshall算法可降算法的复杂度为: $O(n^3)$.

传递闭包的求解算法

Description

$$M_{t(\mathcal{R})} = \sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$$

其中: $M_{\mathcal{R}}$ 是 n 阶方阵;

- 计算 $M \cdot M$ 的每个元素 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj} \dots\dots\dots O(n)$;
- 计算 $M \cdot M \dots\dots\dots O(n^3)$;
- 计算 $\sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i \dots\dots\dots O(n^4)$.

Warshall算法可降算法的复杂度为: $O(n^3)$.

传递闭包的求解算法

Description

$$M_{t(\mathcal{R})} = \sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$$

其中: $M_{\mathcal{R}}$ 是 n 阶方阵;

- 计算 $M \cdot M$ 的每个元素 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj} \dots\dots\dots O(n)$;
- 计算 $M \cdot M \dots\dots\dots O(n^3)$;
- 计算 $\sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i \dots\dots\dots O(n^4)$.

Warshall算法可降算法的复杂度为: $O(n^3)$.

Warshall 算法

Definition

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, M 是 \mathcal{R} 的关系矩阵; n 阶方阵 W_k 递归定义如下:

- ① $W_0 = M$;
- ② $W_k = (w_{ij}^k)_{n \times n}$, 其中: $w_{ij}^k = 1$, iff, 从 a_i 到 a_j 有一条仅经过 a_1, a_2, \dots, a_k 的有向路径.

Proposition

$$W_n = M_{t(\mathcal{R})}$$

Warshall 算法

Definition

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, M 是 \mathcal{R} 的关系矩阵; n 阶方阵 W_k 递归定义如下:

- ① $W_0 = M$;
- ② $W_k = (w_{ij}^k)_{n \times n}$, 其中: $w_{ij}^k = 1$, iff, 从 a_i 到 a_j 有一条仅经过 a_1, a_2, \dots, a_k 的有向路径.

Proposition

$$W_n = M_{t(\mathcal{R})}$$

Warshall 算法

Definition

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, M 是 \mathcal{R} 的关系矩阵; n 阶方阵 W_k 递归定义如下:

- ① $W_0 = M$;
- ② $W_k = (w_{ij}^k)_{n \times n}$, 其中: $w_{ij}^k = 1$, iff, 从 a_i 到 a_j 有一条仅经过 a_1, a_2, \dots, a_k 的有向路径.

Proposition

$$W_n = M_{t(\mathcal{R})}$$

Warshall 算法

Definition

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, M 是 \mathcal{R} 的关系矩阵; n 阶方阵 W_k 递归定义如下:


- ① $W_0 = M$;
- ② $W_k = (w_{ij}^k)_{n \times n}$, 其中: $w_{ij}^k = 1$, iff, 从 a_i 到 a_j 有一条仅经过 a_1, a_2, \dots, a_k 的有向路径.

Proposition

$$W_n = M_{t(\mathcal{R})}$$


Example

Example




$$W_0 = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix}$$


Example


$$W_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$


Example


$$W_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Example


$$W_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Example



$$W_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Description (W_k 和 W_{k+1} 的关系)

$w_{ij}^{k+1} = 1$, iff, 下述两条件之一成立:

故：

$$w_{ij}^{k+1} = w_{ij}^k \vee (w_{i(k+1)}^k \wedge w_{(k+1)j}^k)$$

W_k 的计算

Description (W_k 和 W_{k+1} 的关系)

$w_{ij}^{k+1} = 1$, iff, 下述两条件之一成立:

- ① $w_{ij}^k = 1$, 即从 a_i 到 a_j 有一条仅经过 a_1, a_2, \dots, a_k 的有向路径;
- ② 有一条仅经过 a_1, a_2, \dots, a_{k+1} , 并且仅经过 a_{k+1} 一次的路径:
如:

$$a_i, x_1, x_2, \dots, x_p, a_{k+1}, y_1, y_2, \dots, y_q, a_j$$

其中: x_1, x_2, \dots, x_p 和 y_1, y_2, \dots, y_q 都在 $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 中;

$$\therefore w_{i(k+1)}^k = 1 \wedge w_{(k+1)j}^k = 1;$$

故:

$$w_{ij}^{k+1} = w_{ij}^k \vee (w_{i(k+1)}^k \wedge w_{(k+1)j}^k)$$

Description (W_k 和 W_{k+1} 的关系)

$w_{ij}^{k+1} = 1$, iff, 下述两条件之一成立:

- ① $w_{ij}^k = 1$, 即从 a_i 到 a_j 有一条仅经过 a_1, a_2, \dots, a_k 的有向路径;
- ② 有一条仅经过 a_1, a_2, \dots, a_{k+1} , 并且仅经过 a_{k+1} 一次的路径:
如:

$$a_i, x_1, x_2, \dots, x_p, a_{k+1}, y_1, y_2, \dots, y_q, a_j$$

其中: x_1, x_2, \dots, x_p 和 y_1, y_2, \dots, y_q 都在 $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 中;

$$\therefore w_{i(k+1)}^k = 1 \wedge w_{(k+1)j}^k = 1;$$

故：

$$w_{ij}^{k+1} = w_{ij}^k \vee (w_{i(k+1)}^k \wedge w_{(k+1)j}^k)$$

Warshall 算法

Warshall 算法.

```
procedure warshall(Matrix  $M_{\mathcal{R}}$ )
{
   $W := M_{\mathcal{R}}$ ;
  for  $k := 1$  to  $n$  do {
    for  $i := 1$  to  $n$  do {
      for  $j := 1$  to  $n$  do {
         $w_{ij} := w_{ij} \vee (w_{ik} \wedge w_{kj})$ ;
      }
    }
  }
}
```



本章小节

1 关系的合成

- 关系的合成
- 关系的幂
- 关系的闭包
- 传递闭包的求解算法