

Simulación del movimiento Browniano y examinación de los efectos de las dimensiones en los tiempos de regreso al origen de una partícula

Isaac Estrada García

22 de septiembre de 2020

1. Introducción

El movimiento Browniano es un modelo matemático de una partícula que describe la "danza" aleatoria de las partículas que se debe [1] a la agitación molecular en la que se hayan inmersas.

En este trabajo los objetivos principales son modelar sistemáticamente el movimiento Browniano de una partícula, de una a ocho dimensiones del espacio, así como también examinar el tiempo de regreso al origen de la partícula analizando su caminata pseudoaleatoria.

2. Hipótesis

Es posible que la probabilidad sea nula conforme las dimensiones vayan aumentando, y de la misma manera los regresos al origen.

3. Objetivos

Simular el movimiento Browniano [2] de una partícula examinando los efectos de la dimensión en el tiempo de regreso al origen para dimensiones de 1 a 8 en incrementos lineales de uno, variando el número de pasos de la caminata como potencias de dos, con exponentes de 5 a 10 en incrementos lineales de uno, con 50 repeticiones del experimento para cada combinación y graficar los resultados en una sola figura con diagramas de caja-bigote.

4. Simulación y Resultados

La simulación del movimiento Browniano se realiza con lenguaje de programación Python. La codificación que se encuentra en el repositorio de "simulacion" da como resultado una grafica caja-bijote que describe los pasos que toma




Figura 1: Regresos al origen de una partícula simulado sistemáticamente por el modelo movimiento Browniano.

la partícula al llegar al origen partiendo de el, se realizan 50 experimentos para en 6 distintas caminatas y en 8 dimensiones, posterior se calcula el tiempo medido en pasos de regreso al origen.

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos donde se puede observar una tendencia decreciente de regresos al origen conforme aumentan las dimensiones.

5. Conclusiones

Mientras más dimensiones existan en el movimiento de pseudoalatorio de una partícula menor es las veces que pasa por su origen.

Referencias

- [1] Enrique Puga Cital. Difusión efectiva en sistemas de materia activa diluida, June 2017.
- [2] Elisa Schaeffer. Práctica 1: Movimiento Browniano, September 2020. URL <https://elisa.dyndns-web.com/teaching/comp/par/p1.html>.