
a Motif prevalence, −150 to +50 nt (PWM, P < 10−4)
Sequences with site (%)
0
10
20
30
40
33.3% (9/27)
13.3% (8/60)
10.6% (66/625)
4.2% (468/11095)
1.6% (21/1335)
High-TE (discovery)
1.0–1.5 (indep.)
0.5–1.5 (indep.)
Low/mid
Low-TE
b Translationally primed genes, −150 to −1 nt
sites in 5′UTR
sites upstream of TSS
Sequences with site (%)
19.5% (137/701)
33.3% (9/27)
10.4% (65/625)
4.2% (464/11095)
1.5% (20/1335)
Primed (701) 5′UTR 60 nt
High-TE 5′UTR 228 nt
0.5–1.5 5′UTR 178 nt
Low/mid 5′UTR 193 nt
Low-TE 5′UTR 238 nt
c Position of sites (bar, median)
AUG
High-TE
1.0–1.5
0.5–1.5
Low/mid
Low-TE
−150 −125 −100 −75 −50 −25 0 25 50
Site centre relative to AUG (nt)
d Site location (annotated 5′UTR)
High-TE
1.0–1.5
0.5–1.5
Low/mid
Low-TE
0 20 40 60 80 100
Sites (%)
5′UTR
upstream of TSS
CDS