
a Motif prevalence, −150 to +50 nt (PWM, P < 10−4)
Shuffled control
Sequences with site (%)
0
10
20
30
40
33.3%
(9/27)
13.3%
(8/60)
10.6%
(66/625)
4.2%
(468/11095)
1.6%
(21/1335)
High-TE
(discovery)
1.0–1.5
(indep.)
0.5–1.5
(indep.)
Low/mid
Low-TE
b Translationally primed genes, −150 to −1 nt
sites in 5′UTR
sites upstream of TSS
Sequences with site (%)
0
10
20
30
40
18.4%
(129/701)
33.3%
(9/27)
10.4%
(65/625)
4.2%
(464/11095)
1.5%
(20/1335)
Primed (701)
5′UTR 60 nt
High-TE
5′UTR 228 nt
0.5–1.5
5′UTR 178 nt
Low/mid
5′UTR 193 nt
Low-TE
5′UTR 238 nt
c Position of sites (bar, median)
AUG
High-TE
1.0–1.5
0.5–1.5
Low/mid
Low-TE
−150
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
Site centre relative to AUG (nt)
d Site location (annotated 5′UTR)
High-TE
1.0–1.5
0.5–1.5
Low/mid
Low-TE
0
20
40
60
80
100
Sites (%)
5′UTR
upstream of TSS
CDS