

Práctica 6

Subgrupo AA_5

- Alonso Pérez, Isabel
- Aznar Zapata, Alejandra
- Collantes serrano, Jimena

Índice

Ejercicio 1	2
1. Hipótesis:	2
2. Supuestos:	2
3. Estadístico de contraste:	2
4. Distribución muestral:	2
5. Nivel crítico	2
6. Decisión	2

Ejercicio 1

1. Hipótesis:

$$H_0: \mu = 1,65$$

$$H_1: \mu \neq 1,65$$

2. Supuestos:

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Altura (metros)	,135	12	,200 [*]	,956	12	,723

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se mantiene la normalidad de la población de la variable altura, ya que:

$$Sig > \alpha$$

$$0,723 > 0,05$$

3. Estadístico de contraste:

Prueba para una muestra

			Valor de prueba = 1.65			95% de intervalo de confianza de la diferencia	
	t	gl	Significación		Diferencia de medias	Inferior	Superior
			P de un factor	P de dos factores			
Altura (metros)	,451	11	,331	,661	,01083	-,0421	,0637

$$T = 0,451$$

4. Distribución muestral:

T se distribuye según t_{11}

5. Nivel crítico

$$p = 0,661$$

6. Decisión

Como $p > \alpha$, se mantiene la hipótesis nula. Por lo tanto, la media de altura en la población será 1,65m.

