



id	Hugtök	Skilgreining	Skýring	Athugasemdir
0	MISSING	...		
6	n -und, n -d, röðuð n -und, röðuð n -d	n -und, þar sem n er náttúruleg tala, samanstendur af n hlutum í tiltekinni röð. n -undin sem inniheldur hlutina $a_1, \dots, a_n$ í þessari röð er táknuð með $(a_1, \dots, a_n)$	Ef $\{A_i\}_{i=1}^n$ er fjölskylda af mengjum og $a_i \in A_i$ fyrir $i = 1, \dots, n$ þá er n -undin $(a_1, \dots, a_n)$ stak í faldmenginu $\prod_{i=1}^n A_i$	
17	Abel-grúpa, víxlgrúpa, abelsk grúpa, víxlin grúpa			
41	aðferð			
46	aðgerð, reikniaðgerð	Vörpun af gerðinni $X \times \dots \times X \rightarrow X$ þar sem X er mengi kallast <i>reikniaðgerð</i> á X		Koma með dæmi?
65	aðlæg hlið	Hlið marghyrnings kallast <i>aðlæg</i> tilteknu horni hans ef hún liggur á armi þess. Jafnframt er sagt að tvær hliðar marghyrnings séu aðlægar hvor annarri ef þær deila endapunkti	Almennt kallast tvær hliðar marghyrnings aðlægar ef þær skerast í nákvæmlega einum punkti. Tvær hliðar margflötungs (í þrem víddum) kallast sömuleiðis aðlægar ef þær skerast í einum eða fleiri punktum sem liggja allir á sömu línu	Koma með mynddæmi?
74	aðmengi, ítak, bakmengi	Sjá vörpun		

Hlutfall tveggja heiltalna a og $b \neq 0$, ritað á forminu $\frac{a}{b}$. Talan a kallast *teljari* og talan b *nefnari*


Gerum ráð fyrir að einhver tiltekin heild sé gefin. Þessi heild getur til dæmis verið svæði eins og rétthyrningur eða hringur>, hún getur verið hópur af hlutum eins og eplum, appelsínum eða mönnum, o.s.frv. Í bili skulum við gera ráð fyrir að heildin sé rétthyrningurinn á myndinni að neðan:





Við skilgreindum stofnbrotið $\frac{1}{b}$ til að svara eftirfarandi spurningu: “Ef tiltekinni heild er skipt í b jafna hluta, hver er þá stærð hvers hluta miðað við heildina?” Með öðrum orðum hefur sérhver hluti á myndinni að neðan stærðina $\frac{1}{b}$ miðað við heildina:



Hér höfum við áhuga á að svara aðeins almennari spurningu: “Ef heildinni er skipt í b jafna hluta, hver er þá stærð a slíkra hluta miðað við heildina?” Til að svara spurningunni innleiðum við táknið $\frac{a}{b}$, sem við lesum „ a á móti b “ eða „ a b -tu“. Við látum sem sagt $\frac{a}{b}$ tákna stærð dökka svæðisins á myndinni að neðan miðað við heildina:




273	andhverfa (vörpunar), andhverf vörpun	<i>Andhverfa</i> vörpunar $f : X \rightarrow Y$ er vörpun $g : Y \rightarrow X$ þannig að samskeyting varpananna f og g annars vegar og g og f hins vegar sé viðeigandi samsemdarvörpun, þ.e. $g \circ f = \text{id}_X \quad \text{og} \quad f \circ g = \text{id}_Y.$ Andhverfa f er táknuð með f^{-1}	Ef slík vörpun g er til ákvarðast hún ótvírátt af þessum skilyrðum. Vörpun $f : X \rightarrow Y$ er andhverfanleg ef og aðeins ef hún er gagntæk. Skilyrðin tvö í skilgreiningunni segja með öðrum orðum að fyrir sérhver $x \in X$ og $y \in Y$ gildi að $f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{og} \quad f(f^{-1}(y)) = y.$ Þetta sýnir að andhverfan f^{-1} hefur einmitt öfuga verkun við f, því f varpar stakinu $x \in X$ í stakið $f(x) \in Y$ og f^{-1} varpar stakinu $f(x)$ aftur í upphaflega stakið x skv. fyrri jöfnunni. Sömuleiðis hefur f öfuga verkun við f^{-1}, því f^{-1} varpar stakinu $y \in Y$ í stakið $f^{-1}(y) \in X$ og f varpar stakinu $f^{-1}(y)$ aftur í upphaflega stakið y skv. seinni jöfnunni. Áhrifin af því að beita f og f^{-1} hvorri á eftir annarri eru því engin, sem endurspeglast í Venn-myndinni að neðan: 	
274	andhverfanlegur	Vörpun kallast <i>andhverfanleg</i> ef hún á sér andhverfu		Ætti iðorðið að vera andhverfanleg vörpun (upp á andhverfanlegt fylki)? Ath. að andhverfanlegt fylki er ekki í Orðaskránni.
290	andsælis, rangsælis			
316	annars stigs margliða, ferningsmargliða	Margliða með stig 2	Til þess að reikna rætur annars stigs margliðu á forminu $ax^2 + bx + c$ má nota lausnarformúluna $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$ Þessi formúla er oft kölluð <i>D</i>-reglan vegna þess að iðulega er ritað $D = b^2 - 4ac$ en fjöldi rauntölulausna á jöfnunni $ax^2 + bx + c = 0$ ákvarðast algjörlega af gildinu D sem kallast <i>aðgreinir</i> eða <i>greinir</i>	

334	armur	Sjá horn		
351	átæk vörpun	Vörpun sem hefur allt bakmengið sem myndmengi, þ.e. vörpun $f : X \rightarrow Y$ sem uppfyllir $f(X) = Y$	Fyrir sérhverja vörpun $f : X \rightarrow Y$ gildir að $f(X)$ er hlutmengi í Y, svo til að sýna að f sé átæk nægir að sýna að Y sé líka hlutmengi í $f(X)$. Það er gert með því að sýna að sérhvert stak $y \in Y$ sé gildi vörpunarinnar f, þ.e. að fyrir sérhvert $y \in Y$ sé til $x \in X$ þannig að $f(x) = y$. Venn-myndirnar að neðan sýna tvær varpanir $f : X \rightarrow Y$ og $g : Z \rightarrow W$. Vörpunin f er átæk því sérhvert stak í Y er gildi vörpunarinnar f. Hins vegar er g ekki átæk því til dæmis er stakið lengst til hægri í W ekki gildi vörpunarinnar g: 	Laga stærð á mynd, kannski skipta upp í tvær myndir
419	baugur			
425	bein sönnun	Sönnun á leiðingu $p \implies q$ þar sem gert er ráð fyrir að yrðingin p sé sönn og sýnt er með rökleiðslu að þá sé q líka sönn, ólíkt óbein sönnun		
436	beint horn	Horn kallast <i>beint horn</i> ef armar þess eru gagnstæðir. Slíkt horn mælist 180 gráður eða π radíana		Finna mynd



Rauntalnamengi I kallast *bil* ef fyrir sér hver $x, y \in I$ og $z \in \mathbb{R}$ þannig að $x < z < y$ gildi að $z \in I$. Ef I á sér neðra mark L kallast L *vinstri endapunktur* bilsins. Sömuleiðis ef I á sér efra mark U þá kallast U *hægri endapunktur* bilsins


Bil geta verið af ýmsum toga eftir því hvort þau séu með endapunkta (sjá hálf lína) og hvort þau innihaldi síðan þá endapunkta (sjá opið bil, lokað bil og hálfopið bil). Eftirfarandi tvær myndir sýna allar gerðir bila:




478	radíani, bogaeining, bogamálseining	Mælieining á lengd hringboga og stærð horna, skilgreind þannig að lengd boga einingarhrings mælist 2π <i>radíana</i>	Önnur leið til þess að skilgreina radíana er sem stærð hornsins með oddpunkt í miðju hringssins sem fæst þegar að bogalengd hringssins er jöfn geisla hans. Eftirfarandi mynd sýnir ýmis horn einingarhrings auk stærð þeirra í bæði gráðum og radíónum:  Til er einfalt samband milli radíana og gráða. Til að breyta horni α sem mælt er í gráðum yfir í radíana er notuð formúlan $\theta = \frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi = \frac{\alpha}{180}\pi$	Laga bakgrunnslit
479	bogalengd	Lengd hringboga		
483	bogamál			Skilgreina
488	boginn, sveigður			Skilgreina
520	breiðger rúmfræði	Rúmfræði sem byggir á fyrstu fjórum frumsendum evklíðskar rúmfræði en í staðinn fyrir fimmtu frumsenduna er gert ráð fyrir eftirfarandi frumsendu: <i>Fyrir gefna línu og gefinn punkt, sem ekki er á línunni, er til fleiri en ein lína sem fer í gegnum punktinn og sker ekki línuna</i>	Í þessari rúmfræði er hornasumma þríhyrnings minni en 180 gráður	
538	breyta, breytistærð, breytileg stærð	Stærð sem getur haft mörg mismunandi gildi		
578	brún	Línustrik þar sem tvær hliðar þrívíðs margflötungs skerast		Ræða almenna margflötunga í skýringu?
648	deilanlegur			Skilgreina



685	deiling án afgang	Deiling náttúrulegrar tölur með annarri náttúrulegri tölur þar sem afgangurinn er 0		Er hægt að gera deilingu með afgangi, deilingu án afgang og gengur upp í einfaldara fyrir yngsta hópinn?
686	deiling með afgangi	Ef n og d eru náttúrulegar tölur þannig að $d \neq 0$ þá er til náttúrulegar tölur q og r sem uppfylla $n = q \cdot d + r \quad \text{og} \quad 0 \leq r < d.$ Að rita n á þessu formi nefnist þá að <i>deila tölunni d upp í n</i>	Skilgreiningin er setning sem er kennd við forngríska stærðfræðinginn Evklíð. Hún er samtímis formleg skilgreining á deilingu heillra talna auk þess að hún gefur af sér eftirfarandi reiknirit til þess að framkvæma slíka deilingu: Ef $n > d$ þá getum við dregið d frá n og endað með tölur m sem er minni en n. Ef $m > d$ þá getum við endurtekið leikinn og dregið d frá m og endað þannig með tölur $o < m$. Eftir ákveðið mörg skref, segjum q skref, endum við með tölur r sem er minni en d. Þá er q kvóti deilingarinnar og talan r afgangur hennar	
722	dreifinn	Reikniaðgerð $\odot$ er sögð vera <i>dreifin</i> yfir $\oplus$ ef $\odot$ og $\oplus$ fullnægja dreifireglunni		
723	dreifiregla	Ef $\odot$ og $\oplus$ eru tvístæðar reikniaðgerðir á mengi X er sagt að $\odot$ og $\oplus$ fullnægi <i>dreifireglunni</i> ef fyrir sérhver stök $x, y, z \in X$ gildir að $x \odot (y \oplus z) = (x \odot y) \oplus (x \odot z)$ og $(y \oplus z) \odot x = (y \odot x) \oplus (z \odot x)$	Sagt er að $\odot$ og $\oplus$ fullnægi <i>dreifireglunni frá vinstri</i> ef fyrir sérhver stök $x, y, z \in X$ gildir að $x \odot (y \oplus z) = (x \odot y) \oplus (x \odot z).$ Á sama hátt er sagt að $\odot$ og $\oplus$ fullnægi <i>dreifireglunni frá hægri</i> ef fyrir sérhver stök $x, y, z \in X$ gildir að $(y \oplus z) \odot x = (y \odot x) \oplus (z \odot x).$ Því er sagt að $\odot$ og $\oplus$ fullnægi <i>dreifireglunni</i> ef $\odot$ og $\oplus$ fullnægi <i>dreifireglunni</i> bæði frá vinstri og hægri. Ef $\odot$ er víxlin þá er hún sjálfkrafa <i>dreifin</i> yfir $\oplus$ ef hún er <i>dreifin</i> annaðhvort frá hægri eða vinstri	
737	eðun	Fyrir sérhverjar yrðingar p og q er $p \vee q$ (lesið: „ p eða q “) sú yrðing sem segir að að minnsta kosti önnur yrðinganna p og q sé sönn	Þessari staðreynd má lýsa með tölunni að neðan, sem sýnir sanngildi $p \vee q$ eftir ólíkum sanngildum p annars vegar og q hins vegar	Búa til mynd
743	efra mark, hámark			Skilgreina
759	eftirfari			Skilgreina
803	eiginleiki			Skilgreina

832	einfaldur marghyrningur	Marghyrningur sem er þannig að engar tvær hliðar hans skerast		
866	ein halla fall	Fall sem er vaxandi eða minnkandi		Koma með dæmi um ein halla fall?
884	einingarferningur	Feringur með hliðarlengd 1		
887	einingarhringur	Hringur með geisla 1	Hægt er að skilgreina hornaföllin með tilliti til einingarhringsins en í karteskri sléttu hefur punktur (x, y) á einingarhringnum hnitin $(\cos(\theta), \sin(\theta))$ þar sem θ er hornið sem línustrikið frá $(0, 0)$ til (x, y) myndar við jákvæða x -ásinn	
897	einliða	Margliða sem hefur aðeins einn lið		Koma með dæmi?
922	einshyrndur	Tveir þríhyrningar ABC og EFG kallast <i>einshyrndir</i> ef hægt er að para horn annars þríhyrningsins við horn hins þríhyrningsins þannig að hornin í sama pari eru jafn stór. Táknað $ABC \sim EFG$	Á eftirfarandi mynd eru ABC og FEG einshyrndir vegna þess að: $\angle A$ og $\angle E$ eru jafn stór (grænu hornin á myndinni), $\angle B$ og $\angle F$ eru jafn stór (gulu hornin á myndinni) og $\angle C$ og $\angle G$ eru jafn stór (rauðu hornin á myndinni). 	
927	einskorðun	Fyrir vörpun $f : X \rightarrow Y$ og hlutmengi A í X kallast vörpunin $f _A : A \rightarrow Y; \quad f _A(x) = f(x)$ <i>einskorðun</i> vörpunarinnar f við mengið A		
932	einslaga, einslagaður	Tvær rúmmyndir A og B í evklíðsku rúmi $\mathbb{E}$ kallast <i>einslaga</i> ef til er færsla ϕ á $\mathbb{E}$ þannig að $\phi(A)$ og B séu eins rúmmyndir	Á eftirfarandi mynd eru A, B og C einslaga: 	Laga bakgrunnslit


943	einslögunarfærsla	Færsla ϕ á tiltekinni sléttu kallast <i>einslögunarfærsla</i> ef hlutfallið milli lengda strikanna $\phi(AB)$ og AB er það sama fyrir öll strik AB , sem kallast þá <i>kvarði</i> einslögunarfærslunnar		Finna mynd
951	einstæð aðgerð	Aðgerð á mengi X af gerðinni $X \rightarrow X$ kallast <i>einstæð aðgerð</i>		Koma með dæmi?
963	einstökungur, einsstaksmengi	Mengi með nákvæmlega eitt stak		
965	eintæk vörpun	Vörpun sem varpar ólíkum stökum úr formenginu í ólík stök úr bakmenginu	Látum $f : X \rightarrow Y$ vera vörpun. Í táknmáli segir þessi skilgreining þá að f sé eintæk ef fyrir sérhver $x_1, x_2 \in X$ með $x_1 \neq x_2$ gildir að $f(x_1) \neq f(x_2)$. Að f varpi ólíkum stökum úr X í ólík stök úr Y má einnig orða svo að ef f varpar tveimur stökum x_1 og x_2 úr X í sama stakið úr Y, þá verði x_1 og x_2 að vera sama stakið. Með öðrum orðum er f eintæk ef og aðeins ef fyrir sérhver $x_1, x_2 \in X$ með $f(x_1) = f(x_2)$ gildir að $x_1 = x_2$. Þegar sýna á að tiltekin vörpun sé eintæk er oft einfaldara að nota þetta skilyrði en það fyrra. Venn-myndirnar að neðan sýna tvær varpanir $f : X \rightarrow Y$ og $g : Z \rightarrow W$. Vörpunin f er eintæk því hún varpar ólíkum stökum úr X í ólík stök úr Y. Hins vegar er g ekki eintæk því hún varpar tveimur efstu stökunum úr Z í sama stakið í W: 	Laga stærð á mynd eða skipta upp í tvær
980	ekki jákvæður, frekar neikvæður, óviðlægur	Rauntala kallast <i>ekki jákvæð</i> ef hún er minni en eða jöfn 0		
981	ekki neikvæður, frekar jákvæður, ófrádrægur	Rauntala kallast <i>ekki neikvæð</i> ef hún er stærri en eða jöfn 0		
1009	endanlegur	Mengi kallast <i>endanlegt</i> ef fjöldatala þess er náttúruleg tala		


1030	evklíðsk rúmfræði	Rúmfræði sem uppfyllir frumsendur forngríska stærðfræðingsins Evklíðs	Undirstöður rúmfræðinnar má rekja aftur til Evklíðs en í <i>Frumatríðunum</i>, sem spanna 13 bækur, tók hann saman alla rúmfræði og talnafræði sem þekkt var á þeim tíma. Í fyrstu bókinni setti Evklíð fram fimm frumsendur fyrir rúmfræði í sléttu og notaði þær til að leiða út setningar um sléttuna. Frumsendur Evklíðs voru fimm talsins: 1. Hægt er að teikna beint strik milli sérhverra tveggja punkta. 2. Hægt er að framlengja sérhvert beint strik í óendanlega langa beina línu. 3. Fyrir strik í sléttu er hægt að draga um það hring þannig að strikið sé geisli hringsins, og miðja hans er í öðrum endapunkti striksins. 4. Öll rétt horn eru eins. 5. Fyrir gefna línu og gefinn punkt, sem ekki er á línunni, er til ein og aðeins ein lína sem fer í gegnum punktinn og sker ekki línuna. Síðasta frumsendan varð eftirmönnum Evklíðs sérstaklega hugleikin og er alltaf vísað í hana sem “fimmtu frumsendu Evklíðs”. Með því að gera ekki ráð fyrir þessari frumsemdu fæst óevklíðsk rúmfræði.	
1031	evklíðsk slétta	Tvívítt rúm sem uppfyllir frumsendur Evklíðskar rúmfræði		
1040	eyðingaraðferð	Aðferð til þess að leysa jöfnuhneppi með því að <i>eyða</i> breytum. Þá er tekið tvær jöfnur í jöfnuhneppinu og skalað eina þeirra þannig að stuðlarnir fyrir framan breytuna sem eyða skal eru þeir sömu. Síðan er ein jafnan dregin frá hinni og þannig fengin ný jafna sem inniheldur ekki eyddu breytuna. Með því að eyða öllum breytunum til skiptis og endurtaka allt ferlið eins oft og þarf fæst lausn á jöfnuhneppinu		Koma með dæmi


1078	fall	Vörpun sem hefur $\mathbb{R}$ eða $\mathbb{C}$ sem bakmengi		Koma með dæmi um föll?
1090	fallgildi	Fyrir fall $f : X \rightarrow Y$ og stak x úr X kallast stakið úr Y sem f úthlutar x <i>gildi fallsins</i> f í x og táknað með $f(x)$		Skóða orðalag. Þarf mynd?
1125	ferflötungur, fjórflötungur, þrístrend strýta, þrístrendur píramíti	Pýramídi með þríhyrning sem grunnflöt		
1127	ferhyrningur	Marghyrningur með fjórar hliðar	Eftirfarandi er mynd af ferhyrningi: 	
1130	ferilhorn	Horn með oddpunkt á hring sem hefur strengi fyrir arma	Ef hornið er eiginlegt þá skera strengirnir tveir hringinn í tveim punktum og sagt er þá að ferilhornið <i>spanni</i> hringbogann milli punktanna. Ferilhorn er jafnt hálfum boganum sem það spannar	
1131	ferill, boglína, sveiglína	Myndmengi samfelldrar vörpunar $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Punktarnir $f(a)$ og $f(b)$ kallast <i>endapunktur ferilsins</i> . Óformlega má segja að ferill í tveim víddum sé það sem verður til þegar þú dregur blýant um sléttu án þess að lyfta honum		Nota evklíðska skilgreiningu frekar en grannfræðilega? - Finna mynd?
1157	ferningsrót, önnur rót	Sú rauntala $x \geq 0$ sem uppfyllir $x^2 = a$ kallast <i>kvaðratrótin</i> af a og táknuð með $\sqrt{a}$	Kvaðratrót er sértílvik af almenna hugtakinu um n -tu rót	


1163	ferningur	Rétthyrningur með allar hliðar jafn langar	Eftirfarandi er mynd af ferningi:	
				
1194	firð	Firð á mengi M er fall $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}_+$, sem uppfyllir • $d(x, x) = 0$ fyrir öll $x \in M$ • $d(x, y) > 0$ fyrir öll $x \neq y \in M$ • $d(x, y) = d(y, x)$ fyrir öll $x, y \in M$ • $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ fyrir öll $x, y, z \in M$ Stærðin $d(x, y)$ er gjarnan kölluð fjarlægðin milli x og y		Segir ekki skilgreiningin allt sem segja þarf? Er þörf á skýringu?
1200	firðrúm	Tvennd (M, d) þar sem M er mengi og $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}_+$ er firð		Koma með dæmi um firðrúm?
1204	fjarlægð			
1205	fjarlægt innra horn	Þau innri horn marghyrnings sem ekki eru grannhorn tiltekins ytra horns	Á eftirfarandi mynd eru $\angle BAC$ og $\angle ACB$ fjarlæg innri horn við ytra hornið $\angle DBC$: 	Laga bakgrunnslit
1211	fjöldatala	Jafngildisflokkur mengja þar sem milli sérhverra tveggja mengja er til gagntæk vörpun		Skóða þessa skilgreiningu betur
1229	fjölskylda			




1244	fjórðungur	Sjá skýringu við kartesk hnit		
1265	flatarmál			Skilgreina
1325	flötur, hliðarflötur, hlið	Sjá margflötungur		
1328	flutningur, hreyfing	Færsla á tiltekinni sléttu sem varðveitir fjarlægðir	Sérhvern flutning má framkvæma með því að nota hliðrun, snúning og línuspeglun. Eins og aðrar færslur, þá varðveita flutningar samsíða línur. Flutningar varðveita líka stærðir horna	Finna mynd
1343	formengi, frámengi, skilgreiningarmengi, óðal	Sjá vörpun		
1363	formúla, formkorn, formáli			


1366	formynd, frummynd, öfug mynd	Fyrir vörpun $f : X \rightarrow Y$ og hlutmengi B í Y kallast mengi þeirra staka úr X sem f varpar í stak úr B <i>frummynd</i> vörpunarinnar f af menginu B. Hana má rita á forminu $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$	Fyrir sérhvert $y \in B$ eru þau stök úr X sem f varpar í y lausnir jöfnunnar $f(x) = y$. Frummyndina $f^{-1}(B)$ má því einnig skilgreina sem mengi allra lausna jöfnunnar $f(x) = y$ fyrir sérhvert $y \in B$ og þannig má rita hana á forminu $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid \text{til er } y \in B \text{ þ.a. } f(x) = y\}.$ Venn-myndin að neðan sýnir vörpunina $f : X \rightarrow Y$, hlutmengið B í Y og frummynd þess $f^{-1}(B)$:  Frummyndir af sammengjum, sniðmengjum og fyllimengjum fullnægja eftirfarandi reiknireglum, sem segja að fyrir sérhver hlutmengi B_1 og B_2 í Y gildi: $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2).$ $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2).$ $f^{-1}(B_1^c) = (f^{-1}(B_1))^c.$ Ef A er hlutmengi í X og B er hlutmengi í Y fást jafnframt eftirfarandi reiknireglur um samspil mynda og frummynda: $A \subseteq f^{-1}(f(A)).$ $f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$
1384	forystustuðull	Sjá margliða	
1389	fótpunktur	Skurðpunktur línu og þverils síns	



1403	frændhorn	Tvö horn sem samanlagt mælast 180 gráður	Á eftirfarandi mynd eru $\angle BOA$ og $\angle DPC$ frændhorn: 	Laga bakgrunnslit
1416	framsetning			
1452	frumsenda, frumsetning	Yrðing sem lögð er til grundvallar en ekki er ætlast til að sé sönnuð	Í fyrstu gæti virst vafasamt að gefa sér að eitthvað sé satt í staðinn fyrir að sanna það enda eru sannanir aðalverkfæri stærðfræðinga til þess að sannfæra sjálfa sig og aðra um að staðhæfingar séu réttar. Því miður er ekki hægt að komast hjá því en það væri eins og að keyra bíl án eldsneytis. Svokölluðu <i>afleiðslukerfin</i> sem stærðfræðingar nota er einungis hægt að nota til þess að álykta nýjar staðreyndir út frá staðreyndum sem er nú þegar búið að sanna. Þess vegna þurfa fyrst að vera til staðreyndir sem er ákveðið að séu sannar. Það er ákveðin hættu að frumsendurnar séu innbyrðis mótsagnakenndar eða að þær endurspegli ekki innsæi okkar varðandi það sem ætti að vera satt	Ég held að það þurfi að koma með eitt-hvað dæmi um seinustu setninguna út af hún er ef til vill mjög villandi eins og er
1468	frumtala, prímtala	Náttúruleg tala $p > 1$ kallast <i>frumtala</i> ef einu náttúrulegu tölurnar sem ganga upp í henni eru talan 1 og talan p	Þessi skilgreining jafngildir því að segja að talan p sé frumtala ef fyrir sérhverjar náttúrulegar tölur a og b þannig að p gengur upp í $a \cdot b$ þá gengur p líka upp í a.m.k. annarri þeirra. Ljóst er að fyrsta frumtalan er 2 og almennt er hægt að ákvarða hvort gefin náttúruleg tala n sé frumtala með því að prófa að deila öllum frumtölum frá 2 til $\sqrt{n}$ upp í n. Ef alltaf fæst afgangur þá er talan frumtala. Allar frumtölur minni en 100 eru eftirfarandi: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97	
1475	frumþáttur	Sjá undirstöðusetningu reikningslistarinnar		


1515	fullyrðing, yrðing	Staðhæfing sem er annaðhvort sönn eða ósönn	Yrðingar eru yfirleitt táknaðar með litlum bókstöfum eins og p , q , r og svo framvegis	
1553	fyllimengi	Mengjamunur á forminu $G \setminus A$ þar sem $A \subseteq G$ kallast <i>fyllimengi</i> A í G . Ef enginn vafi leikur á hvert mengið G sé og við höfum ekki áhuga á því sem er utan G (sem kallast þá <i>grunnmengi</i>) köllum við þennan mengjamun einfaldlega fyllimengi A og taknum hann með A^c	Ýmis önnur tákni þekkjast fyrir fyllimengi A; til dæmis $\overline{A}$, A' og $\mathbf{C}A$. Við höfum sem sagt: $A^c = G \setminus A.$ Óformlega má segja að fyllimengið A^c sé sá hluti grunnmengisins sem liggur utan mengisins A. Á Venn-myndum er venja að tákna grunnmengið með rétt-hyrningiog á myndinni að neðan er fyllimengið A^c litað rautt:  Um fyllimengi sam- og sniðmengja gilda reglur De Morgans, sem segja að fyrir sérhver tvö mengi A og B gildi: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad \text{og} \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$ Jafnframt gilda eftirfarandi reglur fyrir mengin A og B: 1. $A \cap A^c = \emptyset$. 2. $A \cup A^c = G$. 3. $(A^c)^c = A$. 4. $A \subset B$ ef og aðeins ef $B^c \subset A^c$.	Skóða hvernig fjallað er um grunnmengi.
1586	gagntæk vörpun	Vörpun sem er bæði eintæk og átæk	Eftirfarandi mynd sýnir gagntæka vörpun:	





1599	ganga upp í	Sagt er að náttúruleg tala n gangi upp í náttúrulegri tölu m ef hægt er að deila m með n án afgang		Koma með dæmi
1616	geiri, hringgeiri	Flatarmynd sem afmarkast af ferilhorni og boganum sem það spannar		Vantar færslu fyrir að spanna í þessum skilningi?
1619	geisli, hringgeisli	<i>Geisli</i> getur bæði átt við línustrik frá miðju hrings í einhvern punkt hans eða lengd línustriksins		
1620	geisli, kúlegeisli	<i>Geisli</i> getur bæði átt við línustrik frá miðju kúluhvels í einhvern punkt á kúluhvelinu eða lengd línustriksins		
1646	gleiðhyrndur, sljóhyrndur	Þríhyrningur kallast <i>gleiðhyrndur</i> ef hann hefur eitt gleitt horn	Eftirfarandi mynd sýnir gleiðhyrndan þríhyrning: 	Laga bakgrunnslit
1647	gleiður, sljór	Horn kallast <i>gleitt</i> ef það mælist stærra en rétt horn	Á eftirfarandi mynd er hornið $\angle BOC$ gleitt: 	
1667	gráða, horngráða, bogagráða	Mælieining sem oft er notuð til að mæla stærð hringboga og horna sem er fengin með því að skipta hring í 360 eins boga sem kallast <i>gráður</i> og eru táknaðar með 1°	Eftirfarandi mynd sýnir ýmis horn eining-arhrings auk stærð þeirra í bæði gráðum og radíönum: 	


1677	grannhorn, aðlæg frændhorn	Ef tvö horn hafa einn sameiginlegan arm og hinir armarnir eru gagnstæðar hálfínur, þá er sagt að hornin séu <i>grannhorn</i>	Á eftirfarandi mynd eru $\angle COB$ og $\angle BOA$ grannhorn: 	Laga bakgrunnslit
1716	grunnflötur			Hvað á að vísa í hér?
1742	grúpa			
1744	grúpuaðgerð			
1756	gullinn rétthyrningur	Rétthyrningur með hliðar a, b þar sem $b > a$ sem uppfylla $\frac{b-a}{a} = \frac{a}{b}$		Sýna mynd
1757	gullinsnið	Hlutfall hliða í gullnum rétthyrningi sem hefur gildið $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, oft táknað φ		
1780	hægri dreifiregla	Sjá dreifiregla		
1838	hálfhringur			Skilgreina



1840	hálf lína	Bil sem hefur nákvæmlega einn endapunkt	Eftirfarandi myndir sýna mismunandi gerðir hálf lína:  Á fyrstu myndinni má sjá hálf línuna $[a, \infty)$, á annarri myndinni hálf línuna (a, ∞), á þriðju myndinni hálf línuna $(-\infty, a]$ og á seinustu myndinni hálf línuna $(-\infty, a)$	Skilgreina líka hálf línu í flatarmyndaræði.
1843	hálflokað bil	Samheiti fyrir hálfopið bil		
1844	hálfopið bil	Bil með tvo endapunkta sem inniheldur nákvæmlega einn þeirra	Eftirfarandi myndir sýna hálfopin bil:  Á fyrri myndinni inniheldur bilið einungis hægri endapunkt sinn og á síðari myndinni inniheldur bilið einungis vinstri endapunkt sinn	




1863	halli, hallatala			Skilgreina
1896	heil tala, heiltala	Mengið $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N})$ kallast mengi <i>heillra talna</i>		Þessari skilgreiningu er mjög ábótavant en salta hana í bili
1899	heild			
1948	heilt rætt fall, margliða	Stæða af gerðinni $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$ þar sem $a_0, \dots, a_n$ eru rauntölur og $a_n \neq 0$, kallast <i>margliða</i>. Tölurnar $a_0, \dots, a_n$ kallast <i>stuðlar</i> margliðunnar og kallast þá a_n <i>forystustuðull</i> hennar og a_0 <i>fastastuðull</i> hennar. Stærðirnar $a_i x^i$ kallast <i>liðir</i> margliðunnar og kallast þá $a_n x^n$ <i>forystuliður</i> hennar og a_0 <i>fastaliður</i> hennar. Talan n kallast <i>stig</i> margliðunnar og er það táknað með $\deg(P)$	Stuðlar margliðu þurfa ekki endilega að vera rauntölur. Almennt þarf stuðla-mengið bara að vera baugur. Þegar all-ir stuðlar gefinnar margliðu koma úr einhverju gefnu talnakerfi $\mathbb{K}$ sem hefur svipaða eiginleika og $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ eða $\mathbb{C}$, þá er sagt að hún sé <i>margliða yfir</i> $\mathbb{K}$. Oft má líta á gefna margliðu sem margliðu yfir mörg mismunandi talnamengi	Vantar færslu fyrir fastamargliðu: “Margliða sem hefur enga liði aðra en fastaliðinn kallast <i>fastamargliða</i>” - Hægt að gera skilgreininguna ennþá kjarnyrtari?
1962	helmingalína horns	Lína sem fer í gegnum oddpunkt horns og skiptir horninu í tvö eins horn kallast <i>helmingalína hornsins</i>	Stundum á orðið helmingalína einungis við hálfínuna með endapunkt í oddpunkti hornsins sem liggur innaní horninu. Eftirfarandi mynd sýnir helmingalínu hornsins A:  Helmingalínur horna þríhyrnings skerast allar í einum punkti en skurðpunkturinn er miðja innritaðs hrings þríhyrningsins	



1974	Héronsregla	Ef þríhyrningur hefur hliðarlengdir a, b og c og $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$ er hálf t ummálið, þá segir <i>regla Herons</i> að flatarmál þríhyrningsins sé $F = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}.$	 Ef þríhyrningurinn hér að ofan hefur hliðarlengdir $a = 13$, $b = 16$ og $c = 21$ þá er $s = 25$ og við getum reiknað flatarmálið með $F = \sqrt{25 \cdot (25 - 13) \cdot (25 - 16) \cdot (25 - 21)} = 30 \cdot \sqrt{15}$	Vantar færslu fyrir hliðarlengd
2048	hlið, hliðarlína, hliðarstrik	Sjá marghyrningur		
2056	hliðrun	Færsla τ á tiltekinni sléttu kallast <i>hliðrun</i> ef hún hefur eftirfarandi tvo eiginleika: 1. fjarlægðin milli A og $\tau(A)$ er sú sama fyrir alla punkta A, 2. hálfmurnar frá A í gegnum $\tau(A)$ tilgreina sömu stefnuna fyrir alla punkta $A \neq \tau(A)$	Hlutlaus færslan telst líka til hliðrana; hún hefur hinsvegar enga tiltekna stefnu. Hliðranir hafa eftirfarandi eiginleika: 1. Hliðranir varðveita lengdir allra strika og eru því flutningar. 2. Ef τ er hliðrun, þá eru línurnar l og $\tau(l)$ samsíða. Einu flutningarnir sem hafa þennan eiginleika eru hliðranir og punktspeglarnir. 3. Flutningur sem heldur engum punkti kyrrum er hliðrun. 4. Samskeyting tveggja hliðrana er hliðrun.	Finna mynd
2072	hlutfall	<i>Hlutfallið</i> milli tveggja talna a og $b \neq 0$ er fyrri talan deild með þeirri síðari		
2089	hluti, partur			



2098	hlutmengi	Mengi A er sagt vera <i>hlutmengi</i> í mengi B ef sérhvert stak í A er líka stak í B . Þetta er táknað með $A \subset B$	Á Venn-myndinni að neðan er A hlutmengi í B því svæðið innan minni hringsins (sem táknar stökin í A) er líka innan stærri hringsins (sem táknar stökin í B): 	Nota $\subseteq$ í staðinn?
2123	hlutur, gripur			
2143	hnit	Sjá hnitakerfi		
2145	hnitakerfi	Samsvörun milli punkta í n -víðu rúmi og n -undar af tölum sem kallast <i>hnit</i> . Hnitin eru notuð til að staðsetja punkta í rúminu	Fjalla um almennari hnitakerfi.	Hægt að skilgreina þetta á formlegri hátt án þess að kafa of djúpt? Endurhugsa aðeins skilgreininguna, hún er ekki mjög skýr - Koma með dæmi um hnitakerfi
2196	hópur			



2198	horn	Tvær hálfínur með sama upphafspunkt eru sagðar mynda <i>horn</i>. Upphafspunktur hálfínanna kallast þá <i>oddpunktur</i> hornsins og hálfínurnar kallast <i>armar</i> þess. Horn með oddpunkt O er táknað $\angle O$. Ef A og B eru tveir punktar sem liggja á sitt-hvorum armi hornsins þá er einnig hægt að tákna hornið $\angle AOB$	Á eftirfarandi mynd sést horn með oddpunkt O og arma h og k:  Þegar armar horns liggja ekki á sömu línu, þá er sagt að hornið sé <i>eiginlegt</i>. Punktur sem ekki liggur á örmum eiginlegs horns er <i>innaní</i> horninu ef hann liggur á línustriki með endapunkta á örmum þess, en <i>utanvið</i> hornið annars. Athugið að sérhver tvö línustrik með sameiginlegan endapunkt sem eru innihaldin í horninu mynda jafnframt sama horn	
2202	hornafall			Skilgreina
2223	hornamál	Til þess að bera saman tvö eiginleg horn, þá flytjum við annað hornið þannig að annar armur hornanna sé sameiginlegur og þannig að sérhver punktur innaní öðru horninu liggi líka innaní hinu horninu. Þá getur þrennt gerst: 1. Hinn armur flutta hornsins fellur saman við hinn arm óhreyfða hornsins. Þá eru hornin <i>jafn stór</i>, eða einfaldlega <i>eins</i> 2. Hinn armur flutta hornsins lendir á milli arma óhreyfða hornsins. Þá er flutta hornið minna en óhreyfða hornið, sem er þá jafnframt <i>stærri</i> en flutta hornið 3. Hinn armur flutta hornsins lendir utanvið óhreyfða hornið. Þá er flutta hornið stærri en óhreyfða hornið, sem er þá jafnframt <i>minna</i> en flutta hornið	Stærð horns er oft mælt í gráðum eða radíönum	Sér færsla fyrir eiginlegur með skilgreiningu og vísa i hana. Spurning líka hvort hér eigi að skilgreinar stærð horns, þ.e. hvernig eigi að mæla horn, ekki samanburð á stærð tveggja horna. Og spurning hvert textinn um samanburð ætti að fara.




2225	hornasumma	Summa allra horna í marghyrningi	Auðvelt er að finna hornasummu marghyrnings með því að skipta honum upp í þríhyrninga. Hægt er að skipta n-hyrningi upp í $n - 2$ þríhyrninga, svo að hornasumma n-hyrnings er $(n - 2) \cdot 180$. Sem dæmi er hægt að skipta fimmhyrningnum $ABCDE$ að neðan í þrjá þríhyrninga, svo að hornasumma hans er $(5 - 2) \cdot 180^\circ = 540^\circ$: 	
2235	hornpunktur, oddpunktur	Punktur þar sem tvær hliðar marghyrnings skerast (í tveimur víddum) eða punktur þar sem þrjár eða fleiri hliðar margflötungs skerast (í þrem víddum)		Ræða almenna margflötunga í skýringu - Þessi skilgreining virkar ekki ef margflötungurinn sker sjálfan sig
2270	hreyfing			
2276	hringbogi, bogi, ör	Sá hluti hrings sem liggur milli tveggja punkta hans kallast <i>hringbogi</i>	Á eftirfarandi mynd má sjá hringbogana á milli A og B. Sá þessara hringboga sem er innaní horninu $\angle AMB$ er dekkri:  Þegar talað er um bogann AB er jafnan átt við þann minni	Laga bakgrunnslit



2295	hringur, hringferill, hringlína	Mengi þeirra punkta í tiltekinni sléttu sem eru í sömu fjarlægð frá punkti sem liggur á sléttunni sem kallast þá <i>miðja</i> hringins	Hring með geisla r má einnig skilgreina sem mengi punkta (x, y) sem uppfylla jöfnuna $x^2 + y^2 = r^2.$ Eftirfarandi mynd sýnir hring með miðju M og geisla r: 	
2317	hvas	Horn kallast <i>hvasst</i> ef það mælist minna en rétt horn	Á eftirfarandi mynd er $\angle AOB$ hvasst horn: 	Laga bakgrunnslit
2318	hvasshyrndur	Þríhyrningur kallast <i>hvasshyrndur</i> ef öll horn hans eru hvöss	Eftirfarandi mynd sýnir hvasshyrndan þríhyrning: 	


2319	hvel, kúluhvel, kúluflötur, kúluyfirborð	Mengi þeirra punkta sem eru í sömu fjarlægð frá tilteknum punkti sem kallast <i>miðja</i> kúluhvelsins	Eftirfarandi er mynd af kúluhveli:	Finna betri mynd
				
2337	hversdagsleg mengjafræði			
2391	innhýrndur marghyrningur	Einfaldur marghyrningur sem er ekki kúptur		
2418	innritaður hringur, innanverður snerti-hringur	Hringur er <i>innritaður</i> í marghyrning ef allar hliðar marghyrningsins eru snertlar við hringinn	Eftirfarandi mynd sýnir þríhyrning með innrituðum hring:	Laga bakgrunnslit
				
2422	innsæisrökfræði			
2426	innsetningaraðferð	Aðferð til þess að leysa jöfnuhneppi þar sem breytur eru einangraðar og síðan settar inn í aðrar jöfnur		Koma með dæmi
2453	jaðar			
2474	jafn, jafnstór			
2478	jafna, líking	Yrðing sem lýsir því að tvær stærðir séu jafnar	Dæmi um jöfnu er staðhæfingin $q(x)$: „ $x^2 = 1$ “ sem er jafna með óþekkту stærðina x . Þegar talan -1 er sett í stað óþekkту stærðarinnar fæst staðhæfingin $p(-1)$: „ $(-1)^2 = 1$ “, sem er sönn yrðing. Þegar talan -2 er sett í stað óþekkту stærðarinnar fæst hins vegar staðhæfingin $p(-2)$: „ $(-2)^2 = 1$ “, sem er ósönn yrðing	

2480	jafnarma	Þríhyrningur kallast <i>jafnarma</i> ef hann hefur tvær jafn langar hliðar	Eftirfarandi er mynd af jafnarma þríhyrningi:	Finna betri mynd
				
2489	jafngildisflokkur	Hlutmengi A í mengi X sem uppfyllir fyrir öll $x, y \in A$ að x og y séu vensluð saman með tilliti til tiltekinna jafngildisvensla og að $x \in A$ sé ekki venslað saman við neitt stak í $X \setminus A$		Koma með dæmi (sama og í færslunni um jafngildisvensl?
2496	jafnhliða þríhyrningur	Þríhyrningur með allar hliðar jafn langar	Öll horn jafnhliða þríhyrnings eru jafn stór, reyndar mælast þau öll $\frac{2}{3}\pi$ radíana eða 60 gráður. Eftirfarandi er mynd af jafnhliða þríhyrningi:	Finna betri mynd
				


2518	jafnstæður	Fall $f : X \rightarrow Y$ þar sem X og Y eru hlutmengi í mengi rauntalna kallast <i>jafnstætt</i> ef fyrir öll $x \in X$ gildi að $f(-x) = f(x)$	Graf jafnstæðs falls fellur í sjálft sig við speglun um y-ásinn. Eftirfarandi mynd sýnir jafnstætt fall: 	
2535	jákvæður, viðlægur	Rauntala kallast <i>jákvæð</i> ef hún er stærri en 0		Vantar færslu fyrir samanburð á rauntölum (samanburður er til en e.t.v. of vítt hugtak)
2546	jöfn tala, slétt tala	Heil tala sem er deilanleg með 2, þ.e. heil tala n sem rita má á forminu $n = 2 \cdot k$ þar sem k er heil tala		
2548	jöfnuhneppi	Mengi jafna sem innihalda sameiginlegar breytur		
2554	kartesk hnit, Kartesarhnit	Hnit í karteskri sléttu		
2559	kassi, kubbur, rétthyrndur samhliðungur	Sexflötungur þar sem allar hliðar eru rétt-hyrningar	Eftirfarandi er mynd af kassa með hliðarlengdir l, b og h: 	
2576	keila	Rúmmynd sem afmarkast af fleti með sveigðum jaðri og fletinum sem fæst með því að draga línustrik milli punkta jaðarins og eins tiltekins punkts		Má punkturinn liggja í grunnfletinum? - Óþarfi að vitna í færsluna fyrir keiluf্লöt út af því það er skilgreint hvernig hann er smíðaður hér?
2579	keiluf্লötur			

2657	kósínus	Fyrir rétthyrndan þríhyrning ABC þar sem C er rétt horn er hornafallið <i>kósínus</i> af horninu A, táknað $\cos(A)$, skilgreint sem hlutfallið milli lengd aðlægrar skammhliðar og lengd langhliðar. Sjá eftirfarandi mynd: 	Eftirfarandi mynd sýnir hluta grafs kósínusarfallsins: 	Önnur skilgreining undir einingarhring. Laga nöfn? Laga bakgrunnslit
2658	kósínusregla	Um þríhyrning $\triangle ABC$ með hliðarlengdir a, b og c gildir <i>kósínusreglan</i> $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(C).$	Þegar hornið C er rétt, þá er síðasti liðurinn 0 og jafnan gefur reglu Pýþagórasar	Koma með dæmi? Útskýra hvernig setningunni er beitt? Finna mynd?
2661	kótangens	Hornafall sem er skilgreint sem $\frac{1}{\tan(A)}$ fyrir $A \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$, táknað $\cot(A)$. Fyrir rétthyrndan þríhyrning ABC þar sem C er rétt horn er <i>kótangens</i> af horninu A hlutfallið milli lengd aðlægrar skammhliðar og lengd mótlægrar skammhliðar	Eftirfarandi mynd sýnir hluta grafs kótangensfallsins: 	Betra að láta táknmál fylgja með? Laga bakgrunnslit - Finna mynd sem skýrir tenginguna við þríhyrning
2680	kúla, hnöttur, knöttur	Rúmmynd sem afmarkast af kúluhveli		
2717	kúptur marghyrningur, úthyrndur marghyrningur	Marghyrningur kallast <i>kúptur</i> ef öll línustrik með endapunkta inni í honum liggja innan marghyrningsins		

2776	lagshorn	Tvö horn sem samanlagt mælast 90 gráður	Á eftirfarandi mynd eru $\angle BOA$ og $\angle COB$ lagshorn: 	Laga bakgrunnslit
2781	láhnit	Sjá skýringu við kartesk slétta		
2789	langhlið	Sú hlið rétthyrnds þríhyrnings sem er mótlæg rétta horninu	Á eftirfarandi mynd er CA langhlið þríhyrningsins:  Þessi hlið er nefnd langhliðin vegna þess að hún er lengri en báðar hinar hliðarnar. Þríhyrningsójafnan segir okkur að $AB + BC \leq CA$ en af því leiðir að ef þríhyrningurinn er ekki úrkynjaður þá er $AB > 0$ og $BC > 0$ og því gildir $AB < CA$ og $BC < CA$	Mótlæg hlið - setja inn færslu. Þá bæði hlið sem er mótlæg horni í þríhyrningi og mótlægar hliðar í marghyrningi?
2811	lausnarformúla			
2820	leggja saman			
2836	leiðing	Fyrir sérhverjar yrðingar p og q er $p \implies q$ (lesið: „ p leiðir að q “) sú yrðing sem segir að q sé sönn ef p er það. Yrðingin p kallast þá <i>skilyrði</i> og q <i>ályktun</i>	Leiðing $p \implies q$ jafngildir $\neg p \vee q$	Koma með dæmi um leiðingar? Vantar sanntöflu í skýringu
2840	leiðrétting			
2860	lengd			
2870	leysa			

2911	lína, bein lína			
2955	graf, línurit, fallrit, varprit, ferill (falls)	Fyrir fall $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ þar sem $I \subseteq \mathbb{R}$ kallast mengi allra tvennda af gerðinni $(x, f(x))$, þar sem $x \in I$ <i>graf</i> fallsins f og er táknað með $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in I\}$ Graf falls má teikna í tvívítt hnitakerfi með því að merkja inn alla punkta sem hafa hnit $(x, f(x))$	Venja er að merkja grafið með jöfnunni $y = f(x)$, því hún lýsir hvernig y-hnit punktanna á grafinu fást út frá x-hnitum þeirra. Skoðum sem dæmi fallið $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x) = x^2$. Graf þess er mengið sem samanstendur af öllum tvenndum af gerðinni $(x, f(x)) = (x, x^2)$ þar sem $x \in \mathbb{R}$, þ.e. $G_f = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}.$ Eins og lýst er að ofan má teikna grafið í hnitakerfi með því að merkja inn alla punkta sem hafa hnit (x, x^2). Nokkur dæmi um punkta af þessari gerð eru $(-3, 9)$, $(-2, 4)$, $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 4)$ og $(3, 9)$. Á myndinni að neðan hefur graf f verið teiknað í hnitakerfi með rauðum lit og eru punktarnir sjö að framan blálitaðir. Grafið er síðan merkt með jöfnunni $y = x^2$:  Almennt fyrir vörpun $f : X \rightarrow Y$ kallast mengi allra tvennda af gerðinni $(x, f(x))$, þar sem $x \in X$ graf vörpunarinnar f og er táknað með $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$. Graf vörpunnar er hlutmengi í faldmenginu $X \times Y$	Laga bakgrunnslit

2958	línustrik, strik	Sá hluti línu sem liggur milli tveggja punkta sem kallast <i>endapunktur</i> línustriksins		Finna mynd
2973	lóðhnit	Sjá skýringu við kartesk slétta		
2975	lóðlína, þverlína, þverill	<i>Þverill</i> á línu l er lína m sem myndar rétt horn við l		
2987	lögmál um annað tveggja	Frumsenda í sígildri rökfræði sem segir að um allar yrðingar p gildi annaðhvort að p sé sönn eða að $\neg p$ sé sönn		
3010	lokað bil	Bil með tvo endapunkta sem inniheldur þá báða	Eftirfarandi er mynd af lokuðu bili: 	
3016	lokaður ferill, lokaður vegur, lykkja	Ferill þar sem báðir endapunktar ferilsins eru sami punkturinn		
3036	lokuð segð, lokuð fullyrðing, lokuð yrðing	Yrðing sem inniheldur engar óþekktar stærðir		
3049	lotufall, lotubundið fall	Fall $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ er sagt vera <i>lotubundið</i> ef til er rauntala $p > 0$ þannig að fyrir öll $x \in \mathbb{R}$ gildi: $f(x + p) = f(x).$ Talan p kallast þá <i>lota</i> fallsins	Tvinngild föll geta verið lotubundin meðfram raunásnum annars vegar eða þverásnum hins vegar. Ef fall er lotubundið meðfram báðum ásum kallast það <i>tvílotubundið</i>	Þarf skilgreiningarmengið að vera allt $\mathbb{R}$?
3072	mælieining	<i>Mælieining</i> er ákveðið magn tiltekinnar stærðar sem er notað sem viðmið við mælingu slíkra stærða	Mælieiningar eru oft staðlaðar en til að mynda heldur <i>Bureau international des poids et mesures</i> (BIPM) utan um SI-einingakerfið sem er mikið notað í vísindum.	Þarf að bæta við að allar mælingar eru þá margfeldi einingarinnar eða setja það í skýringu eða segir það sig kannski sjálft? - Koma með dæmi um mælieiningar
3081	magn			
3118	margfeldi			Skilgreina
3133	margflötungur, flötungur			“<ref idTerm=6532>Rúmmynd</ref> sem samanstendur af <ref idTerm=1009>endanlega</ref> mörgum <ref idTerm=3161>marghyrningum</ref> sem kallast <i>hliðar</i> margflötungsins” Þarf aðeins að endurhugsa skilgreininguna
3141	margföldun			Skilgreina

3161	marghyrningur, hyrningur	Flatarmynd sem samanstendur af endanlega mörgum línustrikum (sem kallast <i>hliðar</i> marghyrningsins) þannig að sérhvert línustrik deili endapunkti með nákvæmlega einu öðru línustriki	Hugtakið marghyrningur er oft notað til að vísa í einfalda marghyrninga en almennt mega hliðar marghyrnings skera hvor aðra	
3270	mengi	Safn hluta	Þessi skilgreining á mengi skilgreinir svokallaða hversdagslega mengjafræði sem ekki er unnt að nota í stærðfræði vegna þess að hún leiðir til mótsagnar (samanber þversögn Russell). Sú mengjafræði sem er mest notuð nú til dags er mengjafræðin sem byggir á frumsendum Ernst Zermelo og Abraham Fraenkel og kölluð Zermelo-Fraenkel-mengjafræði eða ZF. Oft er einnig gert ráð fyrir valfrumsendunni og þá talað um Zermelo-Fraenkel-mengjafræði með valfrumsendu eða ZFC	
3275	mengjafræði			
3279	mengjamargfeldi, faldmengi, Kartesarmargfeldi, karteskt margfeldi	<i>Faldmengi</i> tveggja mengja X og Y , táknad $X \times Y$, er mengi para (x, y) þannig að $x \in X$ og $y \in Y$	Almennt ef $I \subseteq \mathbb{N}$ er bil og $(X_i)_{i \in I}$ er runa af mengjum þá er faldmengi þeirra skilgreint sem mengi runa $(x_i)_{i \in I}$ þannig að $x_i \in X_i$ fyrir öll $i \in I$	
3280	mengjamunur, mengjamismunur	<i>Mengjamunur</i> tveggja mengja A og B er mengi þeirra staka sem eru í A en ekki í B. Þetta mengi er táknad með $A \setminus B$ (lesið: A án B) og það má rita á forminu $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$	Óformlega má segja að mengjamunurinn $A \setminus B$ sé sá hluti mengisins A sem er utan mengisins B og á Venn-myndinni hér að neðan er hann litaður rauður:  Fyrir öll mengi A og B má rita mengjamuninn $A \setminus B$ sem sniðmengi A og fyllimengis B, þ.e. $A \setminus B = A \cap B^c.$ Jafnframt gildir fyrir öll mengi A að $A \setminus \emptyset = A$ og $A \setminus A = \emptyset$	

3282	vörpun	<i>Vörpun</i> $f : X \rightarrow Y$ frá mengi X yfir í mengið Y er forskrift eða regla sem úthlutar sérhverju staki úr X nákvæmlega einu staki úr Y . Mengið X kallast <i>skilgreiningarmengi</i> vörpunarinnar og mengið Y kallast <i>bakmengi</i> hennar	Í mengjafræði er vörpun $f : X \rightarrow Y$ skilgreind sem vensl sem uppfylla eftirfarandi tvö skilyrði: 1. Sérhver stak $x \in X$ er venslað við eitthvert stak $y \in Y$ 2. Ef $x \in X$ er venslað við $y \in Y$ og x er einnig venslað við $z \in Y$, þá gildir $y = z$ Fyrri skilyrðið tryggir að vörpunin sé skilgreind á öllu formengi sínu og seinna skilyrðið tryggir það að vörpunin taki ekki mörg gildi í einum punkti	
3317	miðlína	Lína sem fer í gegnum oddpunkt þríhyrnings og miðpunkt mótlægrar hliðar		
3319	miðpunktur	Punktur á línustriki sem er í sömu fjarlægð frá endapunktum þess		
3325	miðstrengur	Sjá strengur		
3328	miðþverill, miðþverlína	Lína sem liggur í gegnum miðpunkt annarrar línu og er hornrétt á hana		
3332	milli, á milli			
3347	minni, smærri			
3353	minnsta samfeldi, minnsta sameiginlega margfeldi	Minnsta <i>samfeldi</i> tveggja heiltalna n og m , táknað $\text{lcm}(n, m)$	Til þess að finna minnsta samfeldi talna n og m er byrjað á að frumpáttu þær. Ef $p_1, \dots, p_k$ eru allir þeir frumpættir sem tilheyra að minnsta kosti annarri tölunni n eða m , og $a_1, \dots, a_k$ og $b_1, \dots, b_k$ eru margfeldni þeirra í n og m , þá er minnsta samfeldi þeirra: $\text{lcm}(n, m) = p_1^{c_1} \cdot p_2^{c_2} \cdot \dots \cdot p_{k-1}^{c_{k-1}} \cdot p_k^{c_k}$ þar sem $c_i = \max\{a_i, b_i\}$	
3396	mótlæg hlið, öndverð hlið, gagnstæð hlið			Skilgreina
3398	mótlægt horn	Sjá gagnstæð horn		
3400	mótlægur, móttæður, gagnstæður, öndverður, andstæður, öfugur			
3401	mótsagnakenndur, í mótsögn			

3402	mótskilyrðing	Fyrir leiðingu $p \implies q$ kallast leiðingin $\neg q \implies \neg p$ <i>mótskilyrðing</i> hennar	Mótskilyrðing leiðingar hefur sama sanngildi og leiðingin sjálf	
3403	mótsögn	Það að yrðing r og neitun hennar $\neg r$ séu báðar sannar samtímis kallast <i>mótsögn</i>		


Fyrir vörpun $f : X \rightarrow Y$ kallast mengi allra gilda sem vörpunin tekur *mynd* vörpunarinnar f . Hana má rita á forminu

$$f(X) = \{f(x) \in Y \mid x \in X\}.$$

Myndina $f(X)$ má einnig skilgreina sem mengi allra $y \in Y$ þannig að jafnan $y = f(x)$ hafi lausn úr X og þannig má rita hana á forminu

$$f(X) = \{y \in Y \mid \text{til er } x \in X \text{ þ.a. } y = f(x)\}.$$


Venn-myndin að neðan sýnir vörpunina $f : X \rightarrow Y$ og mynd hennar $f(X)$:



Myndin $f(X)$ er alltaf hlutmengi í bakmenginu Y , en eins og Venn-myndin sýnir þurfa þau ekki að vera jöfn, þ.e. til geta verið stök í bakmenginu sem eru ekki í myndinni. Með sama móti má tala um mynd vörpunar af hlutmengi í skilgreiningarmenginu. Ef $A \subseteq X$ þá kallast mengi allra gilda sem f tekur á menginu A (táknað með $f(A)$) mynd vörpunarinnar f af menginu A . Hana má rita á forminu

$$f(A) = \{f(x) \in Y \mid x \in A\}.$$

Venn-myndin að neðan sýnir vörpunina $f : X \rightarrow Y$, hlutmengið A í X og mynd þess $f(A)$:




Myndir af sammengjum og sniðmengjum fullnægja eftirfarandi reiknireglum, sem segja að fyrir sérhver hlutmengi A_1 og A_2 í X gildi:


$$1. f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$$

$$2. f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$$



3475	náttúrleg tala	Stak í menginu $\{0, 1, 2, \dots\}$ (stundum er talan 0 ekki tekin með), táknad með $\mathbb{N}$	Fyrsta tilraun til að skilgreina náttúrulegar tölur formlega var gerð af ítalska stærðfræðingnum Giuseppe Peano árið 1889. Hann setti fram eftirfarandi fimm frumsendur: 1. <i>Núll</i> er náttúruleg tala, táknud með 0 2. Sérhver náttúruleg tala n á sér eftirfara sem er náttúruleg tala, táknad með $S(n)$ 3. Núll er ekki eftirfari neinnar náttúrulegrar tölu, það er að segja $0 \neq S(n)$ fyrir neina náttúrulega tölu n 4. Ef eftirfarar tveggja náttúrulegra talna n og m eru jafnir, þá eru n og m jafnar, í táknmáli $S(n) = S(m) \implies n = m$ 5. Ef mengi inniheldur núll og það að náttúruleg tala n sé innihaldin í menginu hafi í för með sér að $S(n)$ sé einnig innihaldið í menginu, þá inniheldur mengið náttúrulegu tölurnar Seinasta frumsendan er kölluð <i>prepunarfrumsendan</i> en hún gerir okkur kleift að tala um eiginleika allra náttúrulegra talna (sem eru óendanlega margar) í endanlega mörgum skrefum. Ef $P : \mathbb{N} \rightarrow \{\perp, \top\}$ er opin yrðing og við skoðum mengið $X = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n)\}$ þá segir frumsendan að ef $P(0)$ sé sönn og $P(S(n))$ sé sönn að því gefnu að $P(n)$ sé sönn fyrir einhverja náttúrulega tölu n, þá er $X = \mathbb{N}$ og þar með gildir P fyrir allar náttúrulegar tölur	
3490	neðra mark, lágmark			Skilgreina
3497	nefnari	Sjá almennt brot		


3507	neitun	Fyrir sérhverja yrðingu p er $\neg p$ (lesið: „ekki p “) sú yrðing sem fæst með því að <i>neita</i> yrðingunni p	Þessari staðreynd má lýsa með eftirfarandi töflu, sem sýnir sanngildi $\neg p$ eftir ólíkum sanngildum p :	Búa til mynd
3517	niðurstaða, ályktun, lokaályktun	Sjá leiðing		
3563	núllmargliða	Fastamargliðan 0 kallast <i>núllmargliðan</i> .		
3640	óbein sönnun	Sönnun á yrðingingu p með því að gera ráð fyrir $\neg p$ og sýna að það leiði til mótsagnar, það er að einhver yrðing r og $\neg r$ séu báðar sannar samtímis	Til þess að geta gert ráð fyrir því að p sé ósönn þarf að nota frumsendu sem kallast lögmál um annað tveggja sem segir að fyrir allar yrðingar p gildi annaðhvort p eða $\neg p$. Í sígildri rökfræði, sem er sú rökfræði sem stærðfræðingar nota allra mest, er gert ráð fyrir þessari frumsendu og því eru óbeinar sannanir notaðar óspart þegar það einfaldar hlutina. Í svokallaðri innsæisrökfræði hins vegar er ekki gert ráð fyrir þessari frumsendu og því einungis hægt að styðjast við beinar sannanir. Vert er að nefna að yrðing af taginu $p \implies \neg q$ er hægt að sanna í innsæisrökfræði með því að gera ráð fyrir p og q og sýna að það leiði til mótsagnar. Það krefst ekki lögmáls um annað tveggja vegna þess að neitun $\neg q$ er skilgreind sem $q \implies \perp$ þar sem $\perp$ merkir mótsögn. Því jafngildir $p \implies \neg q$ yrðingunni $p \implies q \implies \perp$	
3659	oddatala, ójöfn tala, hvöss tala	Heil tala sem er ekki deilanleg með 2, þ.e. heil tala n sem rita má á forminu $n = 2 \cdot k + 1$ þar sem k er heil tala		
3661	oddpunktur, topppunktur, broddur	Sjá horn		

3663	oddstæður	Fall $f : X \rightarrow Y$ þar sem X og Y eru hlutmengi í mengi rauntalna kallast <i>oddstætt</i> ef fyrir öll $x \in X$ gildir að $f(-x) = -f(x).$	Graf oddstæðs falls fellur í sjálft sig þegar því er speglað um y-ásinn og spegilmyndinni síðan speglað um x-ásinn. Þetta má einnig orða svo að graf oddstæðs falls falli í sjálft sig ef því er snúið um hálfhring. Eftirfarandi mynd sýnir oddstætt fall: 	
3666	ódeilanlegur			Skilgreina
3684	óendanleg runa, runa			Skilgreina
3698	óendanlegur	Mengi kallast <i>óendanlegt</i> ef það er ekki endanlegt		Tala um teljanleika
3705	óevklíðsk rúmfræði	Rúmfræði sem byggir á fyrstu fjórum frumsendum Evklíðs en hafnar þeirri fimmtu. Það eru tvær gerðir óevklíðskar rúmfræðar en þær eru breiðger rúmfræði og sporger rúmfræði		
3710	ofanvarp	<i>Ofanvarp punkts</i> P á línu l er skurðpunktur línunnar l og þverilsins á l gegnum P. <i>Ofanvarp striks</i> á línu er mengið af ofanvörpum allra punkta striksins á línuna		Ræða almennari ofanvörp í skýringu

3744	ogun	Fyrir sérhverjar yrðingar p og q er $p \wedge q$ (lesið: „ p og q “) sú yrðing sem segir að p og q séu báðar sannar. Yrðingin $p \wedge q$ er þess vegna sönn þegar yrðingarnar p og q eru báðar sannar, en annars er hún ósönn	Þessu má lýsa með eftirfarandi töflu, sem sýnir sanngildi yrðingarinnar $p \wedge q$ eftir ólíkum sanngildum p annars vegar og q hins vegar: <table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \wedge q$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	p	q	$p \wedge q$	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	Búa til mynd í betri gæðum
p	q	$p \wedge q$																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
3793	opið bil	Bil sem inniheldur ekki endapunkta sína	Eftirfarandi er myndir af opnum bilum: 																

3800	opin segð, opin fullyrðing, opin yrðing	Yrðing sem inniheldur eina eða fleiri breytur	Staðhæfingin $p(x)$: “x er slétt tala” er opin yrðing með óþekktu stærðina x. Þegar talan 1 er sett í stað óþekkту stærðarinnar fæst staðhæfingin $p(1)$: “1 er slétt tala”, sem er ósönn yrðing. Þegar talan 2 er sett í stað óþekkту stærðarinnar fæst hins vegar staðhæfingin $p(2)$: “2 er slétt tala”, sem er sönn yrðing. Látum $p(x)$ vera opna yrðingu og X vera mengi. Þau stök úr X sem gera $p(x)$ að sannri yrðingu þegar þau eru sett í stað óþekkту stærðarinnar kallast <i>lausnir</i> opnu yrðingarinnar $p(x)$ í menginu X. Ennfremur kallast mengi allra lausna $p(x)$ í X <i>lausnamengi</i> $p(x)$ í X og það er táknad með $P = \{x \in X \mid p(x)\}$	
3810	ör, píla			
3814	óræður	Rauntala kallast <i>óræð</i> ef hún er ekki ræð		Koma með dæmi, til dæmis $\sqrt{2}$?
3932	ótvírætt ákvarðaður	Stærð A kallast <i>ótvírætt ákvörðuð</i> af tilteknum skilyrðum ef hún 1. uppfyllir þau skilyrði (A er <i>ákvörðuð</i> af skilyrðunum), 2. ef önnur stærð B uppfyllir sömu skilyrði þá gildir $A = B$		
3976	pí (π)	Hlutfallið milli hálfis ummáls hrings og geisla hans		Strangt til tekið ætti að standa hérna hlutfall milli ummál hringskífu og geisla hringsins sem hún afmarkast af
3991	prósenta	Tala a er p <i>prósent</i> af tölunni b ef hlutfall á milli a og b er $\frac{p}{100}$		
4001	punktur, depill			
4002	Pýþagórasarregla, setning Pýþagórasar	<i>Setning Pýþagórasar</i> segir að fyrir rétt-hyrndan þríhyrning með skammhliðar a og b og langhlið c gildi $c^2 = a^2 + b^2$		

4009	raðað mengi, raðmengi, hlutraðað mengi, hlaðmengi			
4039	ræð tala	Rauntala sem er hægt að rita sem almennt brot		
4093	rauntala			
4150	reikniregla			Skilgreina
4167	rétt horn	Horn kallast <i>rétt horn</i> ef armar þess eru þverstæðir. Slíkt horn mælist $\frac{\pi}{2}$ radíana eða 90 gráður	Á eftirfarandi mynd er $\angle AOB$ rétt horn (og þar með líka $\angle BOC$): 	Laga bakgrunnslit á mynd
4171	rétthyrndur			
4173	rétthyrndur þríhyrningur	Þríhyrningur með eitt rétt horn	Eftirfarandi er mynd af rétthyrndnum þríhyrningi: 	
4175	rétthyrningur	Ferhyrningur með öll horn rétt	Eftirfarandi er mynd af rétthyrningi: 	

4184	sívalningur, réttstæður sívalningur	Rúmmynd sem afmarkast af tveimur jafnstórum hringskífum, sem liggja í samsíða sléttum og hafa miðjur sem liggja á línu sem er hornrétt á skífunar, og sveigðum rétthyrndum hliðarfleti sem fæst með því að tengja saman punkta hringjanna sem skífunar afmarkast af með línustriki	Einnig er hægt að smíða sívalning með því að snúa rétthyrningi heilan hring um eina af hliðum sínum. Lengd hliðarinnar sem rétthyrningnum var snúið um kallast þá <i>hæð</i> sívalningsins og lengd hliðanna sem eru þverstæðar á hana kallast <i>geisli</i> sívalningsins. Sveigði flöturinn sem myndast við að rétthyrningnum er snúið kallast textitmöttull sívalningsins. Hæð sívalnings er oft táknud með bókstafnum <i>h</i> og geisli hans með bókstafnum <i>r</i> . Eftirfarandi er mynd af sívalningi:	Dálítið óþjál skilgreining
				
4253	rót, lausn	Sú rauntala $x \geq 0$ sem uppfyllir $x^n = a$ þar sem $n \geq 1$ er náttúruleg tala kallast <i>n-ta rótin</i> af <i>a</i> og táknud með $\sqrt[n]{a}$. Talan <i>a</i> kallast <i>rótarstofn</i> og <i>n</i> kallast <i>rótarvísir</i>	Rætur fullnægja tveimur reiknireglum sem oft eru kallaðar <i>rótarreglurnar</i> . Þær segja: 1. $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ 2. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	Pússa orðalag - Þarf að koma með dæmi? Minnst líka á tvinntölur?
4254	rót, núllstöð	Fyrir margliðu <i>P</i> kallast rauntala <i>r</i> þannig að $P(r) = 0$ <i>rót</i> eða <i>núllstöð</i> margliðunnar	Skilgreiningin á einnig við um margliður sem eru ekki raungildar. Sjá margliða	


Fall sem varpar sérhverju staki x úr skilgreiningarmenginu í n -tu rót þess $\sqrt[n]{x}$, þar sem $n \geq 2$ er náttúruleg tala

Ef n er slétt tala sýnir myndin að neðan hvernig graf rótarfallsins

$$g_s : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[; \quad g_s(x) = \sqrt[n]{x}$$

lítur út. Eins og grafið endurspeglar er g_s stranglega vaxandi og gagntækt og þar með andhverfanlegt. Andhverfa þess er einskorðun n -ta veldisfallsins við bilið $[0, \infty[$, þ.e.

$$f_s|_{[0, \infty[} : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[; \quad f_s|_{[0, \infty[}(x) = x^n$$





Ef n er oddatala sýnir myndin að neðan hvernig graf rótarfallsins



$$g_o : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad g_o(x) = \sqrt[n]{x}$$




lítur út. Eins og grafið endurspeglar er g_o stranglega vaxandi og gagntækt og því andhverfanlegt. Andhverfa þess er n -ta veldisfallið

$$f_o : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad f_o(x) = x^n$$



4266	rúm			
4271	rúmfræði			
4294	Russell-þversögn			
4343	samfeldi, sameiginlegt margfeldi	Náttúruleg tala n kallast <i>samfeldi</i> tveggja heiltalna ef þær ganga báðar upp í n		Finna dæmi
4359	samfelld fall			
4423	samlagningarumhverfa, samlagningarandhverfa	Fyrir gefna rauntölu x kallast rauntala y þannig að $x + y = 0$ <i>samlagningarandhverfa</i> x , táknuð $-x$	Almennt ef X er víxlin grúpa með hlutleysu e þar sem grúpuaðgerðin er táknuð $+$ kallast stak y þannig að $x + y = e$ samlagningarandhverfa x	
4425	samleggjandi, liður			
4458	samliggjandi, í röð			
4464	sammengi	<i>Sammengi</i> tveggja mengja A og B er mengi þeirra staka sem eru að minnsta kosti í öðru þeirra. Þetta mengi er táknað með $A \cup B$ (lesið: A sam B) og það má rita á forminu $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ eða } x \in B\}.$	Á Venn-myndinni hér að neðan er $A \cup B$ litað rautt:  Til að einfalda rithátt er sammengi n mengja $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ oft ritað á forminu $\bigcup_{i=1}^n A_i$. Sammengi eru tengin og víxlin, þ.e. fyrir öll mengi A, B og C gildir að $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad \text{og} \quad A \cup B = B \cup A.$ Jafnframt eru sammengi dreifin yfir sniðmengi, þ.e. fyrir öll mengi A, B og C gildir að $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{og} \quad (B \cap C) \cup A = (B \cup A) \cap (C \cup A).$ Loks gildir fyrir öll mengi A að $A \cup \emptyset = A$ og $A \cup A = A$	
4498	samsemdarvörpun	Vörpun f sem varpar sérhverju staki úr mengi X í sjálft sig, það er $f(x) = x$ fyrir öll $x \in X$. Táknuð id_X		


4509	samsíða, samhliða			
4514	samsíðungur	Ferhyrningur þar sem sérhver hlið er samsíða mótlægri hlið sinni	Eftirfarandi er mynd af samsíðungi:	
				
4518	samskeyting	Fyrir varpanir $f : X \rightarrow Y$ og $g : Y \rightarrow Z$ kallast vörpunin $g \circ f : X \rightarrow Z$ sem skilgreind er með forskriftinni $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ samskeyting varpananna f og g	Venn-myndin að neðan sýnir varpanir $f : X \rightarrow Y$ og $g : Y \rightarrow Z$ og samskeytingu þeirra $g \circ f : X \rightarrow Z$:	
				
4541	samsvörun	Tvistæð vensl milli tveggja mengja þar sem sérhvert stak í öðru hvoru menginu er venslað við nákvæmlega eitt stak í hinu menginu	Ef við lítum á vörpun milli mengja X og Y sem vensl þá jafngildir samsvörun milli X og Y gagnstækri vörpun	Finna mynd?
4554	sanna			
4560	sanngildi	Í sígildri rökfræði er sérhver yrðing annaðhvort <i>sönn</i> eða <i>ósönn</i> en kallast það <i>sanngildi</i> yrðingarinnar	Sanngildi eru ýmist táknuð með $1, T$ eða $\top$ þegar um sannar yrðingar er að ræða en annars $0, F$ eða $\perp$	
4621	setning, meginsetning, höfuðsetning			
4624	setningin um ytra horn	Setning í Evklíðskri rúmfræði sem segir að ytra horn þríhyrnings sé jafn stórt og summa fjarlægari innri horna	Látum ABC vera þríhyrning þar sem $\angle BAC$ er 35° og $\angle ACB$ er 30° . Bæði grannhorn $\angle CBA$ eru þá $35^\circ + 30^\circ = 65^\circ$ samkvæmt setningunni um ytra horn	Smíða mynd af þessu dæmi
4625	sexflötungur	Margflötungur með sex hliðar		
4628	sexhyrningur			Skilgreina

4630	sextándakerfi	Talnaritunarkerfi með grunntölu 16. Oft notað tölustafina 0-9 og síðan A, B, C, D, E og F fyrir tölurnar 10, 11, 12, 13, 14 og 15		Ræða not í skýringu?
4642	sígild rökfræði			
4647	sínus	Fyrir rétthyrndan þríhyrning ABC þar sem C er rétt horn er hornafallið <i>sínus</i> af horninu A, táknað $\sin(A)$, skilgreint sem hlutfallið milli lengd mótlægrar skammhliðar og lengd langhliðar. Sjá eftirfarandi mynd: 	Eftirfarandi mynd sýnir hluta grafs sínusarfallsins: 	Laga nöfn? Laga bakgrunnslit
4649	sínusregla	Um þríhyrning $\triangle ABC$ gildir <i>sínusreglan</i> $\frac{\sin(A)}{a} = \frac{\sin(B)}{b} = \frac{\sin(C)}{c},$ þ.e. hlutfallið milli sínusar af horni þríhyrnings og mótlægrar hliðar hornsins það sama fyrir öll hornin.	Þetta hlutfall er einnig jafnt $\frac{1}{2R}$ þar sem R er geisli umritaðs hring þríhyrningsins.	Finna mynd til þess að taka dæmi?
4660	sívalningsflötur	Faldmengi $\mathcal{C} \times I$ þar sem $\mathcal{C} \in \mathbb{R}^2$ er ferill og $I \subseteq \mathbb{R}$		Þarf eitthvað að útskýra þetta nánar? Ég held að mynd sé ábyggilega ekki svo gagnleg
4725	skammhlið	Hlið rétthyrnds þríhyrnings sem er aðlæg rétta horninu	Á eftirfarandi mynd eru AB og BC skammhliðar þríhyrningsins: 	Vísa í skilgreiningu á aðlægri hlið.

4743	skauthnit, pólhnit	Hnit í pólhnitakerfi		
------	--------------------	----------------------	--	--

Hnitakerfi á evklíðska sléttu þar sem punktar eru staðsettir með því að tilgreina fjarlægð þeirra og stefnu séð frá gefnum punkti O sem er kallaður *skaut* eða *póll*

Eftirfarandi mynd sýnir hvernig hægt er að tilgreina staðsetningu punkts í karteskum hnitum annars vegar og pólhnitum annars vegar:





Látum $O = (0,0)$ vera upphafspunkt karteska hnitakerfisins og $E = (1,0)$ vera einingarpunktinn á x -ásnum. Ef $P = (x,y)$ er punktur í sléttunni, þá mælir $r = |OP| = \sqrt{x^2 + y^2}$ fjarlægð P frá O . Stefnu P séð frá O má tilgreina með bogamáli hornsins $\angle EOP$, sem við köllum *stefnuhorn* punktsins P . Ef P liggur ekki á neikvæða x -ásnum, þá liggur stefnuhornið á bilinu $]-\pi, \pi[$ og það er gefið með $\arccos\left(x/\sqrt{x^2 + y^2}\right)$ ef $y \geq 0$ en annars með $\arccos\left(x/\sqrt{x^2 + y^2}\right)$.



Skauthnit punktsins $P = (x,y)$ eru því gefin með tvenndinni (r, θ) .


Ekki er hægt að útvíkka skilgreininguna á stefnuhorni með skynsamlegum hætti fyrir punkta á neikvæða x -ásnum eða skautpunktinn O . Hinsvegar má snúa hnitakerfinu, og undanskilja í staðinn einhverja aðra hálflínu út frá O . Þannig mætti til dæmis láta stefnuhornið vera á bilinu $]-\pi/2, 3\pi/2[$ og undanskilja í staðinn neikvæða hluta y -ássins.

Ef punktur hefur skauthnit (r, θ) , þá eru kartesk hnit hans gefin með


$$x = r \cos \theta \quad \text{og} \quad y = r \sin \theta$$



4771	skerast, sníðast, skarast	Ef sniðmengi tveggja punktamengja er ekki tómt er sagt að mengin <i>skerist</i>		
4797	skilyrði	Sjá leiðingu		
4814	skipta í þríhyrninga			
4845	skurðpunktur, sniðpunktur	Punktur þar sem tvö mengi skerast	Á eftirfarandi mynd skerast línurnar l og m í punktinum A: 	Laga bakgrunnslit á myndinni
4884	slétta, sléttur flötur, plan			
4891	sléttumynd, flatarmynd			
4912	snertill, snertilína	Lína sem liggur gegnum nákvæmlega einn punkt á hring	Á eftirfarandi mynd má sjá hring með miðju M og snertil sem liggur í gegnum punktinn C: 	Minnast á að snertillinn sé hornréttur á geislann? - Laga bakgrunnslit á myndinni

4928	snið, sniðmengi, skurðmengi, skarmengi	<i>Sniðmengi</i> tveggja mengja A og B er mengi þeirra staka sem eru í báðum þeirra. Þetta mengi er táknað með $A \cap B$ (lesið: A snið B) og það má rita á forminu $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ og } x \in B\}.$	Á Venn-myndinni hér að neðan er $A \cap B$ litað rautt. Til að einfalda rithátt er sniðmengi n mengja $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ oft ritað á forminu $\bigcap_{i=1}^n A_i$.  Sniðmengi eru tengin og víxlin, þ.e. fyrir öll mengi A, B og C gildir að $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \quad \text{og} \quad A \cap B = B \cap A.$ Jafnframt eru sniðmengi dreifin yfir sam-mengi, þ.e. fyrir öll mengi A, B og C gildir að $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{og} \quad (B \cup C) \cap A = (B \cap A) \cup (C \cap A).$ Loks gildir fyrir öll mengi A að $A \cap \emptyset = \emptyset$ og $A \cap A = A$	
4929	sniðill	Lína sem sker hring í tveimur ólíkum punktum	Á eftirfarandi mynd má sjá hring með miðju M og sniðil sem liggur í gegnum punktana A og B:  Ekki skal rugla saman sniðli og streng en munurinn er sá að sniðill er lína og strengur er línustrik. Sérhver strengur hrings er innihaldinn í sniðli	Laga bakgrunnslit á myndinni


4939	keila, snúðkeila, hringkeila	Rúmmynd sem afmarkast af hringskífu og fletinum sem fæst með því að draga línustrik milli punkta hringsins sem skífan afmarkast af og eins punkts sem liggur á línu sem er hornrétt á skífuna og fer í gegnum miðju hennar	Einnig er hægt að smíða keila með því að snúa rétthyrndum þríhyrningi heilan hring um aðra af skammhliðum sínum. Lengd skammhliðarinnar sem þríhyrningnum var snúið um kallast þá <i>hæð</i> keilunnar og lengd hinnar skammhliðarinnar kallast <i>geisli</i> hennar. Sveigði flöturinn sem langhliðin myndar kallast <i>möttull</i> keilunnar. Hæð keilu er oft táknud með bókstafnum <i>h</i> og geisli hennar með bókstafnum <i>r</i> . Eftirfarandi er mynd af keilu:	Þarf punkturinn að liggja fyrir utan grunnflötinn? - Rosalega óþjál skilgreining
			 A diagram of a cone. A vertical line segment from the apex to the center of the base is labeled h. A horizontal line segment from the center of the base to the edge is labeled r. A right-angle symbol is shown at the center of the base where these two segments meet.	
4954	snúningur	Ef ρ er færsla á tiltekinni sléttu og M er punktur í sléttunni þá kallast ρ <i>snúningur með miðju í punktinum M</i> ef hnhefureftirfarandieiginleika : <i>punktarnir A og $\rho(A)$ eru í sömu fjarlægð frá M fyrir alla punkta A í sléttunni,</i> <i>hornin $\angle AM\rho(A)$ eru jafn stór fyrir alla punkta $A \neq M$.</i>		Finna mynd
4964	sönnun			
4986	speglun			


5002	sporbaugur	Mengi allra punkta (x, y) í sléttu sem uppfylla jöfnu af taginu $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ fyrir að $a, b > 0$. Punktarnir $(a, 0)$, $(0, b)$, $(-a, 0)$ og $(0, -b)$ uppfylla jöfnuna að ofan og ef $b > a$ kallast línustrikið frá $(0, -b)$ til $(0, b)$ <i>langás</i> og línustrikið frá $(-a, 0)$ til $(a, 0)$ <i>skammás</i>	Önnur leið til þess að skilgreina sporbaug er sem mengi punkta í sléttu þannig að summa fjarlægða þeirra frá tveim föstum punktum sé fasti. Punktarnir tveir kallast <i>brennipunktar</i>	Finna mynd
5072	staðhæfing			
5097	stæða, stærðtákn			
5102	stærð			
5107	stærðfræði			
5114	stærðfræðilegur hlutur			
5117	stærðfræðingur	Einstaklingur sem iðkar stærðfræði		
5128	stak, íbúi			
5135	stefna, átt			
5145	stefnuhorn			
5161	stig	Sjá margliða	Stig núllmargliðunnar er ekki unnt að skilgreina með skynsamlegum hætti sem heila tölu og er því stig hennar sagt vera óskilgreint	
5215	stöðluð margliða	Margliða þar sem gildi forystustuðulsins er 1	Margliðan $x^2 + 2x + 3$ er stöðluð margliða af stigi 2	
5227	stofnbrot	Almennt brot á forminu $\frac{1}{n}$ þar sem n er jákvæð heiltala		
5250	strangvaxandi, stranglegi vaxandi, strangstígandi, stranglegi stígandi, stranghækkandi, stranglegi hækkandi, sívaxandi, sístígandi, síhækkandi			


5261	strengur	Línustrik sem hefur báða endapunkta sína á hring kallast <i>strengur</i> í hringnum	Ef miðja hringins liggur á streng kallast sá strengur <i>miðstrengur</i>. Á eftirfarandi mynd má sjá hring með miðju M:  Strikið AB er strengur í hringnum og strikið CD er miðstrengur	Laga bakgrunnslit á myndinni
5265	stríkkun	Færsla λ kallast <i>stríkkun</i> með <i>miðju</i> í punktinum M ef fyrir alla punkta P gildir að hlutfallið milli lengda strikanna MP og $M\lambda(P)$ er fasti k , sem kallast þá <i>kvarði</i> stríkkunarinnar		Finna mynd
5286	strýta, píramíti	Rúmmynd sem afmarkast af marghyrningsfleti fletinum sem fæst með því að draga línustrik milli punkta marghyrningsins og eins tiltekins punkts		
5290	stuðull	Sjá margliða		
5320	summa, samtala			Skilgreina
5325	sundurlæg skipting			Skilgreina
5329	sundurlægur, óskaraður	Tvö mengi X og Y eru sögð vera <i>sundurlæg</i> ef þau hafa ekkert sameiginlegt stak, þ.e. ef $X \cap Y = \emptyset$		Finna mynd? Er það nauðsynlegt?
5335	svæði			
5380	takmarkað fall, skorðað fall	Fall $f : X \rightarrow Y$ kallast <i>takmarkað</i> ef til er rauntala C þannig að $ f(x) \leq C$ fyrir öll $x \in X$	Það að fall sé takmarkað jafngildir því að myndmengi þess sé takmarkað mengi. Til dæmis er sínusfallið $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takmarkað vegna þess að $\sin(\mathbb{R}) = [-1, 1]$ sem er takmarkað mengi	
5381	takmarkað mengi, skorðað mengi	Rauntalnamengi A kallast <i>takmarkað</i> ef til er rauntala C þannig að $ x \leq C$ fyrir öll x úr A	Skilgreiningin á líka við tvinntalnamengi. Almennt er sagt að firðrúm (X, d) sé takmarkað ef til er rauntala C þannig að $d(x, y) \leq C$ fyrir öll $x, y \in X$	

5386	takmarkaður að neðan, skorðaður að neðan	Rauntalnamengi kallast <i>takmarkað að neðan</i> ef það hefur undirtölu	Almennt er sagt að hluttraðað mengi sé takmarkað að neðan ef það hefur undirstak. Til dæmis er hálflínan $[0, \infty)$ takmörkuð að neðan en talan 0 er sjálf undirtala	
5387	takmarkaður að ofan, skorðaður að ofan	Rauntalnamengi kallast <i>takmarkað að ofan</i> ef það hefur yfirtölu	Almennt er sagt að hluttraðað mengi sé takmarkað að ofan ef það hefur yfirstak. Til dæmis er hálflínan $(-\infty, 0]$ takmörkuð að ofan en talan 0 er sjálf yfirtala	
5397	tala			
5408	talnafræði, talnalist			
5415	talnakerfi			
5416	talnalína, talnaás, rauntalnalína, rauntalnaás, raunás	Lína með tvo aðgreinda punkta O (<i>núllpunktur</i>) og E (<i>einingarpunktur</i>) sem svara til náttúrulegu talnanna 0 og 1. Fjarlægðin milli þessa punkta er notuð sem lengdareining og heiltölunum er raðað á línuna þannig að samliggjandi tölur eru í þessari fjarlægð frá hvor annarri		Skóða.
5431	tangens	Hornafall sem er skilgreint sem $\frac{\sin(A)}{\cos(A)}$ fyrir $A \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, táknað $\tan(A)$. Fyrir rétthyrndan þríhyrning ABC þar sem C er rétt horn er <i>tangens</i> af horninu A hlutfallið milli lengd mótlægrar skammhliðar og lengd aðlægrar skammhliðar. Sjá eftirfarandi mynd: 	Eftirfarandi mynd sýnir hluta grafs tangensfallsins: 	Laga nöfn?
5462	teljari	Sjá almennt brot		
5472	tenginn	Reikniaðgerð $\odot$ sem uppfyllir tengiregluna		


5473	tengiregla	Tvístæð reikniaðgerð $\odot : X \times X \rightarrow X$ á mengi X er sögð fullnægja <i>tengireglunni</i> ef fyrir sérhver stök $x, y, z \in X$ gildi að $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	Margar aðgerðir í algengri notkun uppfylla tengiregluna en þó eru til ótengnar aðgerðir. Sem dæmi má nefna veldishafningu en til að mynda er $(2^3)^2 \neq 2^{(3^2)}$. Athugum að $(2^3)^2 = 8^2 = 64$ en $2^{(3^2)} = 2^9 = 512$	
5480	teningur, verpill, reglulegur sexflötungur	Kassi þar sem allar hliðar eru ferningar	Eftirfarandi er mynd af teningi:	
5486	tígull, tigull	Ferhyrningur með allar hliðar jafn langar	Eftirfarandi er mynd af tígli:	
5538	tölfræðilegt eftirlit			
5558	tölustafur	Tákn sem stendur fyrir ákveðna náttúrulega tölu	Algengustu tölustafirnir sem notaðir eru í stærðfræði eru svokallaðir arabískir tölustafir: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 sem eru notaðir í talnakerfum með grunntölu minni en eða jöfn 10. Fyrir talnakerfi með stærri grunntölum er síðan yfirleitt sótt tákn úr rómverska stafrófinu: A, B, C og svo framvegis til þess að tákna tölur stærri en 9	
5564	tómt mengi, tómamengi	Mengið með engin stök, ýmist táknað með $\emptyset, \varnothing$ eða $\{\}$		
5567	topphorn	<i>Topphorn</i> getur ýmist átt við hornið sem jöfnu hliðar jafnhliða þríhyrnings mynda eða tvöfalt áshorn keilu eða píramída		Vantar færslu fyrir áshorn



5568	topphorn, gagnstæð horn	Hornið sem gagnstæðar hálfínur við arma horns mynda kallast <i>mótlægt horn</i> upphaflega hornsins og sagt er að þessi tvö horn séu <i>gagnstæð horn</i>	Eftirfarandi er mynd sem sýnir gagnstæð horn:  Rauðu hálfínurnar eru mótlægar við bláu hálfínurnar og rauða hornið er því mótlægt við bláa hornið. Gagnstæð horn eru alltaf jafn stór	Reyna að gera skýrar.
5577	trapisa, hálsamsíðungur	Ferhyrningur þar sem einhver hlið er sam- síða mótlægri hlið sinni	Eftirfarandi er mynd af trapisu: 	
5579	trefja	Frummynd vörpunar $f : X \rightarrow Y$ af einstökungnum $\{y\}$ þar sem $y \in Y$, oft táknuð $f^{-1}(\{y\})$ eða $f^{-1}(y)$ ef engin hætta er á misskilningi		
5627	tvennd, raðtvennd, röðuð tvennd	Par hluta í tiltekinni röð	Fyrir tvo hluti $x \in X$ og $y \in Y$ þar sem X og Y eru mengi er tvenndin (x, y) stak í faldmenginu $X \times Y$	
5669	tvílotubundinn, tvílotulegur	Sjá skýringu við lotubundið fall		Finna mynd?
5673	tvinnfall, tvinngilt fall, tvinntölugilt fall			Skilgreina
5682	tvinntala			Skilgreina
5702	tvístæð aðgerð	Aðgerð á mengi X af gerðinni $X \times X \rightarrow X$ kallast <i>tvístæð aðgerð</i>	Dæmi um tvístæðar aðgerðir eru samlagning og margföldun á mengi rauntalna $\mathbb{R}$	
5705	tvístæð vensl			Skilgreina
5719	tvíundakerfi	Talnaritunarkerfi með grunntölu 2. Yfirleitt notað tölustafina 0 og 1		Ræða not í skýringu?
5729	tvívíður			


5756	umhverf tala, umhverfa, margföldun- arumhverfa, andhverf tala, andhverfa, margföldunarandhverfa, gagnkvæm tala	Fyrir gefna rauntölu $x \neq 0$ kallast raun- tala y þannig að $xy = 1$ <i>margföldunarand- hverfa</i> x , táknuð með $\frac{1}{x}$ eða x^{-1}	Almennt ef X er grúpa með hlutleysu e þar sem grúpuaðgerðin er táknuð $\cdot$ kallast stak y þannig að $x \cdot y = e$ margföldunar- andhverfa x , táknuð x^{-1}	
5757	umhverfa, andhverfa	<i>Andhverfa</i> staks x í mengi X með tilliti til reikniaðgerðarinnar $\odot$ með hlutleysu e er stak $y \in X$ sem uppfyllir $x \odot y = y \odot x = e$	Ef $\odot$ er tengin ákvarðast umhverfan ótví- rætt af þessum skilyrðum og sérhvert stak tenginnar reikniaðgerðar hefur því í mesta lagi eina andhverfu. Athugið að and- hverfa staks þarf ekki endilega að vera til. Ef reikniaðgerðin sem um ræðir er sam- lagning, þá er andhverfa staksins x yfir- leitt táknuð með $-x$. Ef reikniaðgerðin er hins vegar margföldun, þá er andhverfa staksins x yfirleitt táknuð með x^{-1} eða $\frac{1}{x}$.	Vantar færslu fyrir samlagningu
5774	ummál	Lengd jaðars flatarmyndar (ef lengdin er endanleg)	Ummál hringskífu er fengið með formúl- unni $2\pi r$ þar sem r er geisli skífunnar. Ummál marghyrnings fæst með því að leggja saman allar hliðarlengdir hans	Koma með fleiri þekktar formúlur? Er skilgreiningin of torskilin?
5779	ummyndun, myndun, færsla	Vörpun $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sem uppfyllir 1. punktar í tiltekinni röð á sömu línu varpast í punkta í sömu röð á ein- hverri línu, 2. strik sem eru jafn löng varpast í strik sem eru líka jafn löng		Sömu röð?
5784	umritaður hringur	Ef hornpunktar marghyrnings liggja all- ir á gefnum hring, þá kallast hringurinn <i>umritaður hringur</i> marghyrningsins	Eftirfarandi mynd sýnir umritaðan hring sexhyrnings: 	Laga bakgrunnslit á myndinni
5818	undirstak, undirskorða, undirtala	Fyrir rauntalnamengi A kallast rauntalan L <i>undirtala</i> mengisins A ef fyrir öll $x \in A$ gildir að $x \geq L$	Almennt getur hluttraðað mengi hugsan- lega átt sér <i>undirstak</i> . Slíkt stak þarf hins vegar ekki endilega að vera til, sem dæmi á mengi rauntalna $\mathbb{R}$ sér ekkert undirstak	

5822	undirstöðusetning algebrunnar, grunnsetning algebrunnar	<i>Undirstöðusetning algebrunnar</i> segir að sérhver margliða yfir tvinntölurnar $\mathbb{C}$ með stig ≥ 1 eigi sér núllstöð í $\mathbb{C}$ $P = (x - r_1)^{a_1}(x - r_2)^{a_2} \dots (x - r_k)^{a_k}$ Þar sem $r_1, \dots, r_k$ eru allar núllstöðvar P í $\mathbb{C}$ og $a_1, \dots, a_k$ kallast <i>margfeldni</i> þeirra. Að rita margliðuna á þessu formi kallast að <i>frumbátta</i> hana yfir $\mathbb{C}$. Yfir rauntölurnar tekur undirstöðusetningin eftirfarandi form: <i>Ef P er stöðluð margliða yfir $\mathbb{R}$, þá má skrifa P sem margfeldi af fyrsta stigs margliðum $(x - r_i)$ og annars stigs margliðum $x^2 + ax + b$ sem hafa enga núllstöð yfir $\mathbb{R}$. Tölurnar r_i eru allar núllstöðvar margliðunnar</i>	Þar sem tvinntala r er núllstöð í margliðu P yfir $\mathbb{C}$ þá og því aðeins að margliðan $(x - r)$ gangi upp í P , þá gefur undirstöðusetningin að sérhverja margliðu P yfir $\mathbb{C}$ megi skrifa á eftirfarandi formi:	Vantar færslu fyrir fyrsta stigs margliðu?
5824	undirstöðusetning reikningslistarinnar, grunnsetning reikningslistarinnar, frumbáttunarsetning	<i>Undirstöðusetning reikningslistarinnar</i> segir að sérhverja náttúrulega tölu n megi skrifa á nákvæmlega einn hátt sem margfeldi af frumtölum. Nánar tiltekið gildir fyrir sérhverja náttúrulega tölu n að til eru ótvírætt ákvarðaðar frumtölur $p_1, \dots, p_k$ og náttúrulegar tölur $a_1, \dots, a_k$ þannig að: $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_{k-1}^{a_{k-1}} \cdot p_k^{a_k}$ þar sem $p_i < p_j$ þegar $i < j$. Að skrifa töluna n á þessu formi kallast að <i>frumbátta</i> hana. Tölurnar $p_1, \dots, p_k$ kallast þá <i>frumþættir</i> tölunnar n og a_i kallast <i>margfeldni</i> frumþáttarins p_i	Eftirfarandi er frumbáttun á tölunni 252:  Af myndinni sést að 252 frumbáttast sem $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$	Laga bakgrunnslit á myndinni
5839	upphaf, upphafspunktur, hnitmiðja, hnitamiðja			
5850	upphafspunktur			
5871	úrkyndur			
5901	úthlutunarverkefni	Rúmfræði í þrem víddum		


5902	úthorn, fyllihorn	Tvö horn sem samanlagt mælast 360 gráður		Finna mynd
5954	valfrumsenda, valfrumsetning, frumsenda um val, frumsetning um val			
5963	varðveita, rækja			
5968	varpgildi			
6007	veldi			Skilgreina
6009	veldisfall	Fall sem varpar sérhverju staki x í n -ta veldi þess x^n , þar sem $n \geq 2$ er náttúruleg tala		
6013	veldismengi	Mengið sem samanstendur af öllum hlutmengjum í tilteknu mengi X , táknað með $\mathcal{P}(X)$	Almennt gildir að ef fjöldi staka í mengi X er n, þar sem n er náttúruleg tala, er fjöldi staka í veldismengi þess 2^n. Dæmi um veldismengi fæst með því að setja $X = \{1, 2, 3\}$. Hlutmengjunum í X má þá skipta í fjóra hópa eftir fjölda staka: $\emptyset$ er það hlutmengi í X sem hefur ekkert stak. $\{1\}$, $\{2\}$ og $\{3\}$ eru þau hlutmengi í X sem hafa eitt stak. $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ og $\{2, 3\}$ eru þau hlutmengi í x sem hafa tvö stök. $\{1, 2, 3\}$ er það hlutmengi í X sem hefur þrjú stök. Veldismengið $\mathcal{P}(X)$ er þá mengið sem samanstendur af öllum framantöldum mengjum, þ.e. $\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$	

6050	Venn-mynd	Myndræn framsetning í sléttu á innbyrðis afstöðu ólíkra mengja þar sem lokaðir ferlar (eins og hringir, sporbaugar, ferhyrn-ingar o.s.frv.) eru notaðir til að tákna mengi og svæðið sem er innan ferlanna táknar stökin í menginu	Eftirfarandi mynd er dæmi um Venn-mynd:  Hringurinn táknar mengið A og svæðið innan hans táknar stökin í A , rétthyrningurinn táknar mengið B og svæðið innan hans táknar stökin í B . Bláa svæðið samanstendur af þeim stökum sem eru í A en ekki í B (þau eru innan hringsins en utan rétthyrningsins), gula svæðið samanstendur af þeim stökum sem eru í B en ekki í A (þau eru innan rétthyrningsins en utan hringsins) og græna svæðið samanstendur af þeim stökum sem eru bæði í A og í B (þau eru innan bæði hringsins og rétthyrningsins)	
6051	vensl			Skilgreina
6087	vídd, víddartala, rúmvídd			
6167	vinstri dreifiregla	Sjá dreifiregla		
6228	víxlinn			
6233	víxlregla	Tvístæð reikniðgerð $\odot : X \times X \rightarrow X$ á mengi X kallast <i>víxlin</i> eða að hún fullnægi <i>víxlreglunni</i> ef fyrir sérhver stök $x, y \in X$ gildir að $x \odot y = y \odot x$	Dæmi um víxlna reikniðgerð er margföldun rauntalna en um öll $x, y \in \mathbb{R}$ gildir $xy = yx$	Færa í víxlin
6252	x-ás			Skilgreina
6253	y-ás			Skilgreina
6280	yfirstak, yfirkorða, yfirtala	Fyrir rauntalnamengi A kallast rauntalan U <i>yfirtala</i> mengisins A ef fyrir öll $x \in A$ gildir að $x \leq U$	Almennt getur hlutráðað mengi hugsanlega átt sér <i>yfirstak</i> . Slíkt stak þarf hins vegar ekki endilega að vera til, sem dæmi á mengi rauntalna $\mathbb{R}$ sér ekkert yfirstak	

6295	ytra horn, utanvert horn	Grannhorn tiltekins horns í marghyrningi. Horn marghyrningsins kallast þá <i>innri horn</i>	Á eftirfarandi mynd er $\angle DBC$ ytra horn við þríhyrninginn ABC því það er grannhorn $\angle CBA$:  Hornin $\angle BAC$ og $\angle ACB$ kallast jafnframt <i>fjarlæg innri horn</i> við ytra hornið $\angle DBC$	Laga bakgrunnslit á myndinni
6314	Zermelo-Fraenkel-mengjafræði			
6315	Zermelo-Fraenkel-mengjafræði með valfrumsendu			
6402	þrepasönnun, þrepunarsönnun, rakin sönnun	Aðferð til þess að sanna eiginleika náttúrulegu talnanna. Hún snýst út á það að sýna fyrst að talan 0 (eða 1) hafi umræddan eiginleika (sem kallast <i>grunnþrepið</i>) og síðan sýna að ef einhver tala k uppfylli skilyrðin þá uppfylli $k + 1$ þau líka. Sú forsenda að talan k hafi þann eiginleika sem um ræðir kallast <i>þrepunarforsenda</i> og það að sýna að $k + 1$ hafi einnig eiginleikann kallast <i>þrepunarskref</i> . Þegar þrepunarforsendan gerir ráð fyrir að allar tölur minni en eða jöfn k uppfylli skilyrðin kallast sönnunin <i>sterk þrepunarsönnun</i>		
6436	þríhyrningsójafna			Skilgreina
6438	þríhyrningur	Marghyrningur með þrjár hliðar	Eftirfarandi er mynd af þríhyrningi: 	
6454	þrívíður			

6469	þver, þverstæður, hornréttur, þverlægur			
6473	þverás			Skilgreina
6483	þverill, þverlína			Skilgreina
6489	þvermál	Lengd miðstrengs í hring		
6531	þykkvafræði, þrívíð rúmfræði	...		
6532	þykkvi, rúmskiki, líkami, hlutur, rúm-mynd, gripur			
6586	hlutleysa, hlutlaust stak			
6589	hringskífa, hringflötur	Sléttumynd sem afmarkast af hring	Eftirfarandi er mynd af hringskífu með miðju M og geisla r. Skyggða svæðið tilheyrir allt hringskífunni: 	

6592	jafngildisvensl	Tvístæð vensl $\sim$ á mengi X sem uppfylla eftirfarandi þrjú skilyrði: 1. $x \sim x$ fyrir öll $x \in X$ (<i>spegilvirkni</i>) 2. Fyrir sérhver stök $x, y \in X$ gildir að ef $x \sim y$ þá gildir einnig $y \sim x$ (<i>samhverfni</i>) 3. Fyrir sérhver stök $x, y, z \in X$ gildir að ef $x \sim y$ og $y \sim z$, þá gildir einnig $x \sim z$ (<i>gegnvirkni</i>)	Jafngildisvensl á mengi X eru ákveðin útvíkkun á hugtakinu að tvö stök úr X séu jöfn, enda uppfylla venslin = skilyrði þess að vera jafngildisvensl. Sérhver jafngildisvensl á X mynda skiptingu á X í sundurlæga jafngildisflokka. Venslin = eru sértílfelli þar sem jafngildisflokkarnir eru allir einstökungar, með öðrum orðum eru tvö stök $x, y \in X$ jöfn þá og því aðeins að þau séu sama stakið. Almenn jafngildisvensl gera manni hins vegar kleift að einblína á ákveðna eiginleika stakanna og líta á tvö stök sem eru vensluð saman sem jafngild þó að þau séu ekki jöfn stök. Dæmi um jafngildisvensl eru venslin “eru sam síða” á mengi lína í evklíðskri sléttu en þá ákveðum við að einblína einungis á halla línanna og hunsum alveg hvaða punktar liggja á þeim	
------	-----------------	---	---	--

6595	kartesk slétta, Kartesarslétta	Evklíðsk slétta með hnitakerfi sem fæst með því að setja upp þverstæðar talnalínur sem kallast <i>hnitaásar</i> og skerast í núllpunktum sínum. Þessi skurðpunktur kallast þá <i>upphafspunktur</i> hnitakerfisins sem er yfirleitt táknaður með O og venja er að kalla aðra talnalínuna x-ás og hina y-ás	Eftirfarandi er mynd af kartesku hnitakerfi:  Upphafspunkturinn skiptir x-ás í tvær hálfslínur; þá sem hefur punkta með frekar jákvæð hnit og kallast <i>jákvæði x-ás</i>, og aðra sem hefur punkta með frekar neikvæð hnit og kallast <i>neikvæði x-ás</i>. Sama á við um y-ás. Jákvæðu ásarnir tilgreina stefnu á hnitásunum. Á mynd er venja að gefa jákvæðu stefnu hnitáasanna til kynna með ör og merkja ásana við örina með x eða y. Hnitáasarnir skipta sléttunni í fjóra <i>fjórðunga</i>: 1. Fyrsti fjórðungur samanstendur af þeim punktum sléttunnar sem eru innaní rétta horninu sem hefur jákvæða x-ás og jákvæða y-ás fyrir arma sína, 2. Annar fjórðungur samanstendur af þeim punktum sléttunnar sem eru innaní rétta horninu sem hefur neikvæða x-ás og jákvæða y-ás fyrir arma sína, 3. Þriðji fjórðungur samanstendur af þeim punktum sléttunnar sem eru innaní rétta horninu sem hefur neikvæða x-ás og neikvæða y-ás fyrir arma sína, 4. Fjórði fjórðungur samanstendur af þeim punktum sléttunnar sem eru innaní rétta horninu sem hefur jákvæða x-ás og neikvæða y-ás fyrir arma sína,	Er þetta nógu nákvæm skilgreining? - Vantar færslu fyrir áttaða sléttu (áttað rúm er hins vegar til)
------	--------------------------------	--	--	---

6596	keilusnið			
6624	ósannur	Sjá sanngildi		
6651	rökleiðsla, röksemdafærsla			
6659	sannur	Sjá sanngildi		
6668	talnaritunarkerfi	Aðferð til þess að rita tölur með því að nota endanlega marga tölustafi. Fjöldi tölustafanna n kallast <i>grunntala</i> talnakerfisins og sérhverja tölu má þá skrifa sem summu liða á forminu an^k þar sem $ a < n$ og $k \in \mathbb{Z}$		Orðalag er óskýrt, mengið sem þú dregur tölustafina úr er endanlegt en ekki fjöldi tölustafanna sem þú þarft til að rita tiltekna tölu

id	Hugtök	Skilgreining	Skýring	Athugasemdir
0	MISSING	...		
1	-und, -d			
2	ϕ -fall Eulers			
3	A -stöðugleiki			
4	B -splæsifall			
5	K -fræði			
6	n -und, n -d, röðuð n -und, röðuð n -d	n -und, þar sem n er <ref idTerm=3475>náttúruleg tala</ref> , samanstendur af n <ref idTerm=2123>hlutum</ref> í tiltekinni röð. n -undin sem inniheldur hlutina $a_1, \dots, a_n$ í þessari röð er táknuð með $(a_1, \dots, a_n)$	Ef $\{A_i\}_{i=1}^n$ er <ref idTerm=1229>fjölskylda</ref> af <ref idTerm=3270>mengjum</ref> og $a_i \in A_i$ fyrir $i = 1, \dots, n$ þá er n -undin $(a_1, \dots, a_n)$ <ref idTerm=5128>stak</ref> í <ref idTerm=3279>faldmenginu</ref> $\prod_{i=1}^n A_i$	
7	p -leg heiltala, heil p -leg tala			
8	p -leg tala			
9	p -leg virðing			
10	p -legur			
11	t -dreifing			
12	t -próf			
13	á köflum			
14	Abel-, abelskur			
15	Abel-deildi af fyrstu gerð, fágað deildi, Abel-diffur af fyrstu gerð, fágað diffur			
16	Abel-deildi, Abel-diffur			
17	Abel-grúpa, víxlgrúpa, abelsk grúpa, víxl-in grúpa			
18	Abel-útvíkkun, Abel-víkkun, abelsk út-víkkun			
19	Abel-víðátta, Abel-víðerni			
20	aðalhornalína, meginhornalína			
21	aðdráttarmengi			
22	aðdráttarpunktur			
23	aðfaldaður, hrópmerktur			
24	aðfeldaröð			
25	aðfella			
26	aðfelld hálf lína			
27	aðfelld samsíða lína			
28	aðfelldur þríhyrningur			
29	aðfelldur, aðfelli-			
30	aðfelli-			
31	aðfellihringur			
32	aðfelliujafn			
33	aðfelliuliðun, aðfelld liðun			

34	aðfellunormlegur			
35	aðfelluréttur			
36	aðfelluröð			
37	aðfelluskilvirkni			
38	aðfelluskilvirkur			
39	aðfellustefna, aðelluátt			
40	aðfellustöðugur			
41	aðferð			
42	aðferð breytilegra stuðla			
43	aðferð minnstu ferninga, aðferð minnstu fervika			
44	aðgengilegur jaðarpunktur			
45	aðgerð			
46	aðgerð, reikniaðgerð	<ref idTerm=3282>Vörpun</ref> af gerðinni $X \times \cdots \times X \rightarrow X$ þar sem X er <ref idTerm=3270>mengi</ref> kallast <i>reikniaðgerð</i> á X		Koma með dæmi?
47	aðgerðagreining			
48	aðgerðartákn			
49	aðgerðartákn			
50	aðgreina			
52	aðgreiningareiginleiki Hausdorffs, frumsenda Hausdorffs, frumsetning Hausdorffs			
53	aðhæf heildun, aðhæf tegrun			
54	aðhæft ítrekunarreiknirit			
55	aðhæfur			
56	aðhlutur, bakhlutur			
57	aðhvarf			
58	aðhvarfsfall			
59	aðhvarfsferill			
60	aðhvarfsfrávik, leif			
61	aðhvarfsgreining			
62	aðhvarfsjafna			
63	aðhvarfslína			
64	aðhvarfsstuðull			

65	aðlæg hlið	<ref idTerm=2048>Hlið</ref> <ref idTerm=3161>marghyrnings</ref> kallast <i>aðlæg</i> tilteknu <ref idTerm=2198>horni</ref> hans ef hún liggur á <ref idTerm=334>armi</ref> þess. Jafnframt er sagt að tvær hliðar marghyrnings séu aðlægar hvor annarri ef þær deila endapunkti	Almennt kallast tvær hliðar marghyrnings aðlægar ef þær <ref idTerm=4771>skerast</ref> í nákvæmlega einum <ref idTerm=4001>punkti</ref>. Tvær <ref idTerm=1325>hliðar</ref> <ref idTerm=3133>margflötungs</ref> (í þrem víddum) kallast sömuleiðis aðlægar ef þær skerast í einum eða fleiri punktum sem liggja allir á sömu <ref idTerm=2911>línu</ref>	Koma með mynddæmi?
66	aðlæg horn, samlæg horn, samliggjandi horn			
67	aðlægur			
68	aðlægur punktur			
69	aðlægur, samlægur, samliggjandi, grannstæður			
70	aðlaga			
71	aðlögun			
72	aðlögunarpróf, mátunarpróf			
74	aðmengi, ítak, bakmengi	Sjá <ref idTerm=3282>vörpun</ref>		
75	aðoka			
76	aðoka, aðoka frá vinstri			
77	aðskilja, skilja að, greina á milli, aðgreina			
78	aðskiljanleg jafna			
79	aðskiljanleg lokun, aðskiljanlegur hjúpur			
80	aðskiljanleg margliða			
81	aðskiljanleg útvíkkun, aðskiljanleg víkkun			
82	aðskiljanlega lokaður			
83	aðskiljanlegt net			
84	aðskiljanlegur			
85	aðskiljanleikastig			
86	aðskiljanleiki			
87	aðskilnaðarfrumsenda			
88	aðskilnaðargreining			
89	aðskilnaðarregla, aðskilnaðarháttur			
90	aðskilnaðarstærð			
91	aðskilnaðarstyrkur			
92	aðskilnaður			
93	aðskilnaður breytistærða			
94	aðstoðar-, hjálpar-, viðbótar-			
95	aðstreymi			
96	æðri stærðfræði			
97	æstæður, sístæður, í jafnvægi, jafnvægis-			

98	ætt			
99	af handahófi			
100	afgangsferð			
101	afgangslíður, leif			
102	afgangsrof			
103	afgangssetning			
104	afgangsskekkja			
105	afgangur, minnsti leif			
106	afkóta, dulráða, aflykka			
107	afkótun, dulráðning, aflyklun			
108	afleiða, afleitt fall			
109	afleiðanlegur			
110	afleiðanleiki			
111	afleiddur			
112	afleiddur varpi			
113	afleiðing			
114	afleiðingur, afleiðuvirki			
115	afleiðsla			
116	afleiðsla, ályktun			
117	afleiðslu-			
118	afleiðsluáferð			
119	afleiðslusönnun			
120	afleitt mengi			
121	afleitt ríki			
122	affræði			
123	affræðigreining			
124	afmáanleg ósamfelldni			
125	afmáanlegur sérstöðupunktur			
126	afsanna, hrekja			
127	afsannanlegur, hrekjanlegur			
128	afsannanleiki			
129	afsannanleiki, hrekjanleiki			
130	afsönnun, hrakning			
131	afstæð samkvæmni			
132	afstæð svipgrúpa			
133	afstæði			
134	aftasti tölustafur			
135	aftasti tölustafur			
136	afturfærsla			
137	afturinnsetning, endurinnsetning			
138	afturmunur			
139	afturvirk skekkjugreining			
140	afvinding			
141	Agnesarhaddur			
142	áhætta			


143	áhætta neytandans		
144	áhættufall		
145	áhættufræði		
146	áhættuleikur		
147	ákvarðaður		
148	ákvarðanafræði		
149	ákvarðanlegur, úrskurðanlegur		
150	ákveða		
151	ákveðið heildi, ákveðið tegur		
152	ákveðnipunktur		
153	ákveðu-		
154	ákveðujafna		
155	ákvörðun		
156	ákvörðunaraðferð		
157	ákvörðunarfall		
158	ákvörðunarferli		
159	ákvörðunarverkefni		
160	álægur		
161	alef		
162	Aleksandrov-þjöppun, einspunktsþjöppun		
163	alflokkur, alheimsflokkur		
164	algebra með einingarstaki		
165	algebra, algefra		
166	algebruferill, algebrulegur ferill		
167	algebruflötur, algebrulegur flötur		
168	algebrugrannfræði, algebruleg grannfræði		
169	algebrujafna, algebruleg jafna, margliðujafna		
170	algebruleg heiltala, heil algebruleg tala		
171	algebruleg lokun		
172	algebruleg margfeldni		
173	algebruleg stæða, stæða		
174	algebruleg tala, algebrutala		
175	algebruleg útvíkkun, algebruleg víkkun		
176	algebruleg víðátta		
177	algebrulega háður		
178	algebrulega lokaður		
179	algebrulega óháður		
180	algebrulega samoka stak, samoka stak		
181	algebrulegt fall		
182	algebrulegt mengi		
183	algebrulegt rúm		
184	algebrulegt talnasvið, talnakroppur		

185	algebrulegt varpvíðerni			
186	algebrulegt víðerni			
187	algebrulegur sléttuferill			
188	algebrulegur, algebru-			
189	algebrumótun			
190	algebrumynstur, algebrulegt mynstur			
191	algebrurúmfræði, algebruleg rúmfræði			
192	algebrutalnafræði, algebruleg talnafræði			
193	algengasta gildi, líklegasta gildi			
194	algildi, lengd, tölugildi			
195	algildisflötur			
196	algildismerki, tölugildismerki			
197	algildisminnsta leif			
198	algildisvægi, alvægi			
199	algjörlega ósamanhangandi, algjörlega ósamanhangandi			
200	algjörlega ósamfelldur			
201	algjörlega takmarkaður, algjörlega skorðaður			
202	alhæfa			
209	alheildanlegur, altegranlegur			
210	alheimur			
211	aljafna			
212	alls staðar samleitinn, alstaðar samleitinn			
213	alls staðar þéttur, alstaðar þéttur			
214	allsherjar-			
215	allsherjaralgebra			
216	allsherjareiginleiki			
217	allsherjarflokkur			
218	allsherjarhlutur			
219	allsherjarlokun			
220	allsherjarmagnari, allsherjarvirki			
221	allsherjarsvið			
222	allsherjartákn			
223	allsherjarþekjuflötur			
224	allsherjarþekjurúm			
225	allt eða ekkert			
226	almengi			
227	almenn algebrujafna, almenn margliðujafna			
228	almenn grannfræði, mengjagrannfræði			
229	almenn línuleg grúpa			
230	almenn línuleg varpgrúpa			
231	almenn samfellutilgáta, alhæfð samfellutilgáta			


232	almenn staða			
233	almenna afstæðiskenningin			

<ref idTerm=2072>Hlutfall</ref> tveggja <ref idTerm=1896>heiltalna</ref> a og $b \neq 0$, ritað á forminu $\frac{a}{b}$. Talan a kallast *teljari* og talan b *nefnari*

Gerum ráð fyrir að einhver tiltekin <ref idTerm=1899>heild</ref> sé gefin. Þessi heild getur til dæmis verið <ref idTerm=5335>svæði</ref> eins og <ref idTerm=4175>rétthyrningur</ref> eða <ref idTerm=2295>hringur</ref>, hún getur verið <ref idTerm=2196>hópur</ref> af hlutum eins og eplum, appelsínum eða mönnum, o.s.frv. Í bili skulum við gera ráð fyrir að heildin sé rétthyrningurinn á myndinni að neðan:




Við skilgreindum <ref idTerm=5227>stofnbrotið</ref> $\frac{1}{b}$ til að svara eftirfarandi spurningu: “Ef tiltekinni heild er skipt í b jafna hluta, hver er þá stærð hvers hluta miðað við heildina?” Með öðrum orðum hefur sérhver hluti á myndinni að neðan stærðina $\frac{1}{b}$ miðað við heildina:



Hér höfum við áhuga á að svara aðeins almenntari spurningu: “Ef heildinni er skipt í b jafna hluta, hver er þá stærð a slíkra hluta miðað við heildina?” Til að svara spurningunni innleiðum við táknið $\frac{a}{b}$, sem við lesum „ a á móti b “ eða „ a b -tu“. Við látum sem sagt $\frac{a}{b}$ tákna stærð dökka svæðisins á myndinni að neðan miðað við heildina:



235	almennt tilfelli, almennt tilvik			
236	almennt, að jafnaði			
237	almennur			
239	almennur ferill			
240	almennur liður			
241	almennur punktur			
242	alsamfelldni			
243	alsamfelldur			
244	alsamleggjanlegur			
245	alsamleitinn			
246	alsamleitinn í jöfnum mæli			
247	alsamleitni			
248	alsamleitni í jöfnum mæli			
249	alsamleitnihálflétta			
250	alsamleitnimark, alsamleitniláhnit			
251	altæk fullyrðing, alhæf fullyrðing			
252	ályktunartölfræði			
253	ámóta			
254	ámóta			
255	ámóta fylki			
256	ámótun			
257	ámyndun			
258	án formerkis			
259	án skerðingar á víðgildi			
260	andbrigður þinur, mótbrigður þinur			
261	andbrigður, mótbrigður			
262	andeinsmóta			
263	andeinsmótun			
264	andfætispunktar, gagnstæðir punktar			
265	andfætisvörpun			
266	andfágaður			
267	andhermískt form			
268	andhermískur			
269	andhverf vensl			
270	andhverfa			
271	andhverfa (falls), andhverft fall			
272	andhverfa (fylkis), umhverfa (fylkis), and- hverft fylki, umhverft fylki			

273	andhverfa (vörpunar), andhverf vörpun	<i>Andhverfa</i> <ref idTerm=3282>vörpunar</ref> $f : X \rightarrow Y$ er vörpun $g : Y \rightarrow X$ þannig að <ref idTerm=4518>samskeyting</ref> varpananna f og g annars vegar og g og f hins vegar sé viðeigandi <ref idTerm=4498>samsemdarvörpun</ref>, þ.e. $g \circ f = \text{id}_X \quad \text{og} \quad f \circ g = \text{id}_Y.$ Andhverfa f er táknuð með f^{-1}	Ef slík vörpun g er til <ref idTerm=3932>ákvarðast hún ótvírætt</ref> af þessum <ref idTerm=4797>skilyrðum</ref>. Vörpun $f : X \rightarrow Y$ er andhverfanleg ef og aðeins ef hún er <ref idTerm=1586>gagntæk</ref>. Skilyrðin tvö í skilgreiningunni segja með öðrum orðum að fyrir sérhver $x \in X$ og $y \in Y$ gildi að $f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{og} \quad f(f^{-1}(y)) = y.$ Þetta sýnir að andhverfan f^{-1} hefur einmitt öfuga verkun við f, því f varpar <ref idTerm=5128>stakinu</ref> $x \in X$ í stakið $f(x) \in Y$ og f^{-1} varpar stakinu $f(x)$ aftur í upphaflega stakið x skv. fyrri jöfnunni. Sömuleiðis hefur f öfuga verkun við f^{-1}, því f^{-1} varpar stakinu $y \in Y$ í stakið $f^{-1}(y) \in X$ og f varpar stakinu $f^{-1}(y)$ aftur í upphaflega stakið y skv. seinni <ref idTerm=2478>jöfnunni</ref>. Áhrifin af því að beita f og f^{-1} hvorri á eftir annarri eru því engin, sem endurspeglast í <ref idTerm=6050>Vennmyndinni</ref> að neðan: 	
274	andhverfanlegur	<ref idTerm=3282>Vörpun</ref> kallast <i>andhverfanleg</i> ef hún á sér <ref idTerm=273>andhverfu</ref>		Ætti iðorðið að vera andhverfanleg vörpun (upp á andhverfanlegt fylki)? Ath. að andhverfanlegt fylki er ekki í Orðaskránni.
275	andhverfður, umhverfður			
276	andhverfing			
277	andhverft breiðbogafall			
278	andhverfuformúla, andhverfuformkorn			
279	andhverfur			
280	andhverfur breiðbogakósínus			
281	andhverfur breiðbogakótangens			

282	andhverfur breiðbogasínus			
283	andhverfur breiðbogatangens			
284	andhverfuregla Fouriers			
285	andhverfusetning			
286	andinnanmótun			
287	andlínulegur			
288	andlogri			
289	andrárástand			
290	andsælis, rangsælis			
293	andsamhverft fall, oddhverft fall			
294	andsamhverft fylki			
295	andsamhverft tvílínulegt form, oddhverft tvílínulegt form			
296	andsamhverfur			
297	andsamhverfur, oddhverfur			
298	andsammótun, andmótun			
299	andsamsíða			
300	andsamsíðungur, ferhyrningur með engar hliðar samsíða			
301	andsjálfhverfur			
302	andsjálfmótun			
303	andvíxill			
304	andvíxlanlegur			
305	andvíxlast			
306	andvíxlinn			
307	andvíxlunarjafna			
308	annað meginform, annað undirstöðuform			
309	annarrar raðar			
310	annarrar stéttar			
311	annars stigs			
312	annars stigs algebruflötur			
313	annars stigs ferill			
314	annars stigs ferill, ferningsferill			
315	annars stigs háflötur, ferningsháflötur			

316	annars stigs margliða, ferningsmargliða	<ref idTerm=1948>Margliða</ref> með <ref idTerm=5161>stig</ref> 2	Til þess að reikna <ref idTerm=4254>rætur</ref> annars stigs margliðu á forminu $ax^2 + bx + c$ má nota <ref idTerm=2811>lausnarformúluna</ref> $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$ Þessi formúla er oft kölluð <i>D</i>-reglan vegna þess að iðulega er ritað $D = b^2 - 4ac$ en fjöldi <ref idTerm=4093>rauntölulausna</ref> á <ref idTerm=2478>jöfnunni</ref> $ax^2 + bx + c = 0$ ákvarðast algjörlega af gildinu <i>D</i> sem kallast <i>aðgreinir</i> eða <i>greinir</i>	
317	annars stigs nálgun			
318	annars stigs sviðsútvíkkun, fernings-sviðsútvíkkun, annars stigs sviðsvíkkun, ferningssviðsvíkkun			
319	annars stigs, fernings-			
320	áreiðanleiki			
321	áreiðanleiki			
322	arfgengur eiginleiki			
323	arftekið grannmynstur			
324	arftekið hlutnet, einskorðað hlutnet			
325	artekinn, einskorðaður			
326	arkarfall, bogafall			
327	arkarkósínus			
328	arkarkótangens			
329	arkarsínus			
330	arkartangens			
331	arkimedískt algildi, arkimedísk virðing			
332	arkimedískt raðsvið, arkimedískt raðað svið			
333	armur			
334	armur	Sjá <ref idTerm=2198>horn</ref>		
335	ás			
336	ás, möndull			
337	asnabré			
338	ássamhverf, ássamhverfni			
339	ássamhverfing, ássamhverfa			
340	ássamhverfur			
341	ássamlínunótun			
342	ássnið			

343	ástand			
344	ástand			
345	ástand, stand			
346	ástandsrum			
347	ástandstala			
348	ástandsvigur			
349	ásvigur, snúningsvigur			
350	átæk mótun, átæk sammótun			
351	átæk vörpun	<ref idTerm=3282>Vörpun</ref> sem hefur allt <ref idTerm=74>bakmengið</ref> sem <ref idTerm=3417>myndmengi</ref>, þ.e. vörpun $f : X \rightarrow Y$ sem uppfyllir $f(X) = Y$	Fyrir sérhverja vörpun $f : X \rightarrow Y$ gildir að $f(X)$ er <ref idTerm=2098>hlutmengi</ref> í Y, svo til að sýna að f sé átæk nægir að sýna að Y sé líka hlutmengi í $f(X)$. Það er gert með því að sýna að sérhvert <ref idTerm=5128>stak</ref> $y \in Y$ sé gildi vörpunarinnar f, þ.e. að fyrir sérhvert $y \in Y$ sé til $x \in X$ þannig að $f(x) = y$.</div><div><ref idTerm=6050>Venn-myndirnar</ref> að neðan sýna tvær varpanir $f : X \rightarrow Y$ og $g : Z \rightarrow W$. Vörpunin f er átæk því sérhvert stak í Y er gildi vörpunarinnar f. Hins vegar er g ekki átæk því til dæmis er stakið lengst til hægri í W ekki gildi vörpunarinnar g:</div><div></div>	Laga stærð á mynd, kannski skipta upp í tvær myndir
352	átækur			
353	atburðaalgebra			
354	atburður (í líkindafræði), tilviljanakenndur atburður			
355	atburður, atvik, tilvik			
356	átekt, átaka			
357	athugun			
358	atlas, kortasafn			
359	atóm			
360	atómlaust mál			
361	áttað horn, stefnt horn, snúningshorn			
362	áttað rúm			
363	áttaður			
364	áttaður hringur			
365	áttaður, stefndur, stefnubundinn			
366	áttanlegur			
367	áttanleiki			


368	áttflötungur			
369	átthyrningstala, átthyrnd tala			
370	átthyrningur			
371	áttækin einsfirðun			
372	áttækinn			
373	áttskiptin einsfirðun			
374	áttskiptinn			
375	áttuð slétta			
376	áttuð víðátta			
377	áttun			
378	áttunda-			
379	áttundakerfi			
380	áttundareikningur			
381	áttungur			
382	auðkenning, greinimark			
383	auðugt vigurbundin			
384	auðugur			
385	augljós			
386	augljós lausn			
387	augljósleiki			
388	augljóst bundin			
389	augljóst grannmynstur, fábrotið grann- mynstur			
390	aukahending			
391	aukahornalína			
392	aukahringur, aukahvirfilhringur			
393	aukahvirfilpunktur			
394	aukaskilyrði, hliðarskilyrði			
395	aukið fylki			
396	aukinn			
397	autt sæti			
398	ávöntun			
399	bæti, tölvustafur			
400	bagall			
401	Baire-fall			
402	Baire-setning, setning Baires			
403	bakliður			
404	bakpokaverkefni			
405	Banach-algebra			
406	Banach-rúm			
407	bandalag			
408	bandbreidd			
409	bandfylki			
410	bann			
411	bann-			

412	bannjafnvægi			
413	bannlíkindi			
414	Bartlett-próf			
415	baugað rúm			
416	baugamótun			
417	baugmynstur			
418	baugsútvíkkun, baugsvíkkun			
419	baugur			
420	Bayes-ályktunaraðferð			
421	Bayes-setning, setning Bayes			
422	Bayes-tölfræði			
423	bein mynd			
424	bein skekkja			
425	bein sönnun	<ref idTerm=4964>Sönnun</ref> á <ref idTerm=2836>leiðingu</ref> $p \implies q$ þar sem gert er ráð fyrir að <ref idTerm=1515>yrðingin</ref> p sé <ref idTerm=6659>sönn</ref> og sýnt er með <ref idTerm=6651>rökleiðslu</ref> að þá sé q líka sönn, ólíkt <ref idTerm=3640>óbein sönnun</ref>		
426	bein summa			
427	bein þríliða			
428	beinlínu-			
429	beinlínumynd			
430	beinn			
431	beinn eftirkomandi, næsti eftirkomandi			
432	beinn liður			
433	beinn stöðugleiki			
434	beinn undanfari, næsti undanfari			
435	beinn þáttur			
436	beint horn	<ref idTerm=2198>Horn</ref> kallast <i>beint horn</i> ef <ref idTerm=334>armar</ref> þess eru <ref idTerm=3400>gagnstæðir</ref>. Slíkt horn <ref idTerm=2223>mælist</ref> 180 <ref idTerm=1667>gráður</ref> eða π <ref idTerm=478>radíana</ref>		Finna mynd
437	beint kerfi			
438	beint margfeldi			
439	beint markgildi			
440	belti			
441	Bernoulli-dreifing, tvíliðudreifing, tví- kostadreifing			

442	Bernoulli-hending			
443	Bernoulli-tala			
444	Bernoulli-tilraun			
445	Bessel-fall, sívalningsfall			
446	besta leikáætlun, besta áætlun			
447	besta nálgun			
448	bestunarverkefni			
449	bestur			
450	betadreifing			
451	betafall			
452	beyging, sveiging			
453	beygjuskilakrosspunktur			
454	biðraðfræði			

457	bil	<ref idTerm=4093>Rauntalna</ref> <ref idTerm=3270>mengi</ref> I kallast <i>bil</i> ef fyrir sérhver $x, y \in I$ og $z \in \mathbb{R}$ þannig að $x < z < y$ gildi að $z \in I$. Ef I á sér <ref idTerm=3490>neðra mark</ref> L kallast L <i>vinstri endapunktur</i> bilsins. Sömuleiðis ef I á sér <ref idTerm=743>efra mark</ref> U þá kallast U <i>hægri endapunktur</i> bilsins	Bil geta verið af ýmsum toga eftir því hvort þau séu með endapunkta (sjá <ref idTerm=1840>hálfína</ref>) og hvort þau innihaldi síðan þá endapunkta (sjá <ref idTerm=3793>opið bil</ref>, <ref idTerm=3010>lokað bil</ref> og <ref idTerm=1844>hálfopið bil</ref>). Eftirfarandi tvær myndir sýna allar gerðir bila:
-----	-----	---	---

462	bjagaður, vilhallur, skakkur, hlutdrægur			
463	bjögun			
464	bjögun, togun			
465	blað			
466	blað, þynni			
467	blandað hliðarskilyrði, blönduð þvingun			
468	blandað jaðargildisverkefni			
469	blandað úrtak			
470	blandið lotutugabrot, blandið umferðar- tugabrot			
471	blandin hlutafleiða, blönduð hlutafleiða			
472	blandin tala			
473	blandinn liður, blandaður liður			
474	blandinn þinur			
475	blendið slembiferli			
476	blöndun			
477	boðleið, rás			

478	radíani, bogaeining, bogamálseining	<ref idTerm=3072>Mælieining</ref> á <ref idTerm=2860>lengd</ref> <ref idTerm=2270>hringboga</ref> og <ref idTerm=5102>stærð</ref> <ref idTerm=2198>horna</ref>, skilgreind þannig að lengd boga <ref idTerm=887>einingarhrings</ref> mælist 2π <i>radíana</i>	Önnur leið til þess að skilgreina radíana er sem stærð hornsins með <ref idTerm=3661>oddpunkt</ref> í miðju <ref idTerm=2295>hrings</ref> sem fæst þegar að <ref idTerm=479>bogalengd</ref> hringsins er jöfn geisla hans. Eftirfarandi mynd sýnir ýmis horn <ref idTerm=887>einingarhrings</ref> auk stærð þeirra í bæði gráðum og <ref idTerm=478>radíönum</ref>:  Til er einfalt samband milli radíana og gráða. Til að breyta horni α sem mælt er í gráðum yfir í radíana er notuð formúlan $\theta = \frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi = \frac{\alpha}{180}\pi$	Laga bakgrunnslit
479	bogalengd	<ref idTerm=2860>Lengd</ref> <ref idTerm=2276>hringboga</ref>		
480	bogalengdarfall			
481	bogalengdarfrymi			
482	bogalengdarfrymi			
483	bogamál			Skilgreina
484	bogamínúta			
485	bogasekúnda			
486	bogi, ferilbogi			
487	bogin lína, boglína, sveigð lína, sveiglína			
488	boginn, sveigður			Skilgreina
489	Boole-aðgerð			
490	Boole-algebra			

491	Boole-baugur			
492	Boole-breyta			
493	Boole-fall			
494	Boole-grind			
495	Boole-virki			
496	Borel-algebra			
497	Borel-atburðaalgebra			
498	Borel-fall			
499	Borel-mengi			
500	braut			
501	braut, ferill			
502	brautarúm			
503	breiðboga kótangens			
504	breiðbogafall, gleiðbogafall			
505	breiðbogafllötur			
506	breiðbogakósekans			
507	breiðbogakósínus			
508	breiðbogariti			
509	breiðbogasekans			
510	breiðbogasínus			
511	breiðbogasnúðflötur			
512	breiðbogatangens			
513	breiðbogi, gleiðbogi			
514	breidd			
515	breiðger			
516	breiðger fleygbogafllötur, söðulflötur			
517	breiðger hlutafleiðujafna			
518	breiðger punktur			
519	breiðger Riemann-flötur			
520	breiðger rúmfræði	<ref idTerm=4271>Rúmfræði</ref> sem byggir á fyrstu fjórum <ref idTerm=1452>frumsendum</ref> <ref idTerm=1030>evklíðskar rúmfræði</ref> en í staðinn fyrir fimmtu frumsenduna er gert ráð fyrir eftirfarandi frumsendu: <i>Fyrir gefna <ref idTerm=2911>línu</ref> og gefinn <ref idTerm=4001>punkt</ref>, sem ekki er á línunni, er til fleiri en ein lína sem fer í gegnum punktinn og <ref idTerm=4771>sker</ref> ekki línuna</i>	Í þessari rúmfræði er <ref idTerm=2225>hornasumma</ref> <ref idTerm=6438>þríhyrnings</ref> minni en 180 <ref idTerm=1667>gráður</ref>	
521	breiðger samsíðufrumsenda			
522	breiðger sjálfmótun, breiðger færsla			
523	breiðger slétta			

524	breiðger vefja			
525	breiðgerð			
526	breiðgerð			
527	breiðgert rúm			
528	brenniás			
529	brennidepill, brennipunktur			
530	brenniflötur			
531	brennigeisli			
532	brennilengd			
533	brennilfna			
534	brennilfna			
535	brennimengi			
536	brennimiðstrengur			
537	brennistrengur			
538	breyta, breytistærð, breytileg stærð	<ref idTerm=5102>Stærð</ref> sem getur haft mörg mismunandi gildi		
539	breytast			
540	breytast með samfelldum hætti			
541	breytilegur			
542	breytingarhraði			
543	breytistuðull, fráviksstuðull			
544	breytulaus			
545	breytuskipti, innsetning			
546	brigðgengur			
547	brjóstvitsregla, þumalfingursregla			
548	broddur			
549	brot			
550	brotabaugur			
551	brotabrot			
552	brotaregla, hlutfallsregla			
553	brotareikningur			
554	brotareikningur			
555	brotastrik, lárétt brotastrik			
556	brotastrik, skástrik, brotaskástrik			
557	brotasvið			
558	brothluti			
559	broti			
560	brotið íðal			
561	brotið línustrik			
562	brotin línuleg færsla, Möbúusarfærsla			
563	brotin línuleg grúpa			
564	brotin tala, brot			
565	brotinn línulegur			
566	brotinn veldisvísir			
567	brotinn, brota-			

568	brotmark, hlutfallsmark			
569	brotpunktur			
570	brottskurður			
571	Brown-hreyfing, brownsk hreyfing			
572	brú			
573	brúa, inngiska, innreikna			
574	brugðningafræði			
575	brugðningagrúpa			
576	brugðningur			
577	brún			
578	brún	<ref idTerm=2958>Línustrik</ref> þar sem tvær <ref idTerm=1325>hliðar</ref> <ref idTerm=6454>þrívíðs</ref> <ref idTerm=3133>margflötungs</ref> <ref idTerm=4771>skerast</ref>		Ræða almenna margflötunga í skýringu?
579	brúnahorn			
580	brúnahorn			
581	brúnalengd			
582	brúun, innreiknun, inngiskun			
583	brúunaraðferð			
584	brúunarfall			
585	brúunarskekkja			
586	bryddað fylki			
587	brydding			
588	bryddingarðferð			
589	bryggja, útgizka, útreikna			
590	bryggjun, útgiskun, útreiknun			
591	bryggjunarfall			
592	bryggjunarskekkja			
593	bundin			
594	bundin			
595	bundin af hvelum, hvelabundin			
596	bundin af línnum, línubundin			
597	bundin af samsíða línnum, samsíðubundin			
598	bundin af sléttum, sléttubundin			
599	bundin breyta, bundin breytistærð, lepp-breyta			
600	bundinn Riemann-flötur			
601	bundinn vigur			
602	burðarmengi			
603	burður, flutningur			
604	burtséð frá			
605	bútaaðferð, bútunaraðferð			
606	bútur			

607	bútur, bogi		
608	byggja, byggja upp, búa til, smíða		
609	bylgja, alda		
610	bylgjujafna, öldujafna		
611	bylta		
612	bylta (fylkis), bylt fylki		
613	bylting		
614	byrjunarlausn		
615	Cantor-mengi, Cantorsmengi, talnamengi Cantors, þrífundamengi Cantors		
616	Cauchy-dreifing		
617	Cauchy-formúla		
618	Cauchy-margfeldi		
619	Cauchy-margföldun		
620	Cauchy-próf, samleitniþróf Cauchys		
621	Cauchy-runa		
622	Cauchy-setningin		
623	Cayley-tala, áttundatala		
624	Ceva-strik		
625	Ceva-þríhyrningur		
626	Cholesky-þáttun		
627	Cramer-regla, regla Cramers		
628	d'Alembert-virki		
629	dæmi, sýnidæmi		
630	dæmi, þraut, reikningsdæmi, æfingar- dæmi		
631	dæmigerður		
632	dæmigert stak		
633	dæmigert úrtak		
634	dálkaðgerð		
635	dálkauppstökkun, dálkaumröðun		
636	dálkfylki, eindálkafylki, súlufylki		
637	dálkmeðaltal		
638	dálkstétt		
639	dálksumma, dálksamtala		
640	dálkur, súla		
641	dálkvigur, súluvigur		
642	dálkvísir		
643	dánartíðni		
644	Dedekind-baugur		
645	Dedekind-snið		
646	deila		
647	deilaflokkur		
648	deilanlegur		Skilgreina
649	deilanleiki		

650	deilasumma			
651	deilda- og heildareikningur, diffur- og tegurreikningur, örsmæðareikningur, reiknivísi			
652	deilda, diffra			
653	deildaalgebra			
654	deildabaugur			
655	deildaform, diffurform			
656	deildagrannmynstur			
657	deildagrúpa			
658	deildajafna, afleiðujafna, diffurjafna			
659	deildamengi			
660	deildamóta, diffurmóta			
661	deildamótull			
662	deildamótun, diffurmótun			
663	deildamyndun			
664	deildamynstur			
665	deildanleg víðátta, diffranleg víðátta			
666	deildanlegur á köflum, diffranlegur á köflum			
667	deildanlegur frá hægri, diffranlegur frá hægri			
668	deildanlegur frá vinstri, diffranlegur frá vinstri			
669	deildanlegur í punkti, diffranlegur í punkti			
670	deildanlegur, diffranlegur			
671	deildanleiki, diffranleiki			
672	deildareikningur, diffurreikningur			
673	deildarúm			
675	deildarúmfræði Riemanns, Riemann-deildarúmfræði			
676	deildarúmfræði, diffurrúmfræði			
677	deildastuðull, deildahlutfall, diffurkvóti, afleiða í punkti			
678	deildavensl			
679	deildavirki, diffurvirki, afleiðuvirki			
680	deildi, diffur			
681	deildun, diffrun			
682	deildunarvirki, diffrunarvirki			
683	deilibaugur			
684	deiling			

685	deiling án afgang	<ref idTerm=686>Deiling</ref> <ref idTerm=3475>náttúrulegrar tölu</ref> með annarri náttúrulegri tölu þar sem afgangurinn er 0		Er hægt að gera deilingu með afgangi, deilingu án afgang og gengur upp í einfaldara fyrir yngsta hópinn?
686	deiling með afgangi	Ef n og d eru <ref idTerm=3475>náttúrulegar tölur</ref> þannig að $d \neq 0$ þá er til náttúrulegar tölur q og r sem uppfylla $n = q \cdot d + r \quad \text{og} \quad 0 \leq r < d.$ Að rita n á þessu formi nefnist þá að <i>deila</i> <ref idTerm=5397>tölunni</ref> d upp í n	Skilgreiningin er setning sem er kennd við forngríska <ref idTerm=5117>stærðfræðinginn</ref> Evklíð. Hún er samtímis formleg skilgreining á deilingu heilla talna auk þess að hún gefur af sér eftirfarandi reiknirit til þess að framkvæma slíka deilingu: Ef $n > d$ þá getum við dregið d frá n og endað með tölu m sem er minni en n. Ef $m > d$ þá getum við endurtekið leikinn og dregið d frá m og endað þannig með tölu $o < m$. Eftir ákveðið mörg skref, segjum q skref, endum við með tölu r sem er minni en d. Þá er q kvóti deilingarinnar og talan r afgangur hennar	
687	deilingaraðferð, deilingarreiknirit			
688	deilingarmerki			
689	deilir			
690	deilistofn			
691	deltafelli, deltafall, deltafelli Diracs, deltafall Diracs			
692	deltaferill			
693	depilfeldi, innfeldi, innra margfeldi			
694	Desargues-, argeskur			
695	Desargues-setningin meiri, stóra Desargues-setningin			
696	Desargues-setningin minni, litla Desargues-setningin			
697	Desargues-slétta, argesk slétta			
698	deyfð sveifla			
699	Díofantosargreining			
700	Díofantosarjafna			
701	Dirichlet-dreifing			
702	Dirichlet-röð			
703	draga			
704	draga (rót)			
705	draga frá			
706	draga saman			
707	dráttarferill			
708	dráttur án skila			
709	dráttur með skilum			

710	draugalest			
711	dreif, dreififelli, dreififall			
712	dreifafræði, dreififellafræði			
713	dreifarlausn, dreififellislausn			
714	dreifður			
715	dreifing			
716	dreifing, líkindadreifing			
717	dreifingafjölskylda			
718	dreifingarfall, dreififall, líkindadreifingarfall			
719	dreifingarferill			
720	dreifingargerð			
721	dreifingaróháður			
722	dreifinn	<ref idTerm=46>Reikniaðgerð</ref> $\odot$ er sögð vera <i>dreifin</i> yfir $\oplus$ ef $\odot$ og $\oplus$ fullnægja <ref idTerm=723>dreifireglunni</ref>		
723	dreifiregla	Ef $\odot$ og $\oplus$ eru <ref idTerm=5702>tvístæðar reikniaðgerðir</ref> á <ref idTerm=>mengi</ref> X er sagt að $\odot$ og $\oplus$ fullnægi <i>dreifireglunni</i> ef fyrir sérhver <ref idTerm=5128>stök</ref> $x, y, z \in X$ gildir að $x \odot (y \oplus z) = (x \odot y) \oplus (x \odot z)$ og $(y \oplus z) \odot x = (y \odot x) \oplus (z \odot x)$	Sagt er að $\odot$ og $\oplus$ fullnægi <i>dreifireglunni frá vinstri</i> ef fyrir sérhver stök $x, y, z \in X$ gildir að $x \odot (y \oplus z) = (x \odot y) \oplus (x \odot z).$ Á sama hátt er sagt að $\odot$ og $\oplus$ fullnægi <i>dreifireglunni frá hægri</i> ef fyrir sérhver stök $x, y, z \in X$ gildir að $(y \oplus z) \odot x = (y \odot x) \oplus (z \odot x).$ Því er sagt að $\odot$ og $\oplus$ fullnægi dreifireglunni ef $\odot$ og $\oplus$ fullnægi dreifireglunni bæði frá vinstri og hægri. Ef $\odot$ er <ref idTerm=6228>víxlin</ref> þá er hún sjálfkrafa dreifin yfir $\oplus$ ef hún er dreifin annaðhvort frá hægri eða vinstri	
724	dreifrit, punktaský, punktarit			
725	dreifni			
726	dreifnihlutfall			
727	dreift hlutmengi			
728	dreifvirðing			
729	dreifvirðingarbaugur			
730	drómasetning			
731	drómi			
732	Dynkin-rit			
733	Dynkin-safn			
734	dýpt			


735	eða			
736	eða-tákn			
737	eðun	Fyrir sérhverjar p og q er $p \vee q$ (lesið: „ p eða q “) sú yrðing sem segir að að minnsta kosti önnur yrðinganna p og q sé	Þessari staðreynd má lýsa með töflunni að neðan, sem sýnir sanngildi $p \vee q$ eftir ólíkum sanngildum p annars vegar og q hins vegar	Búa til mynd
738	eðunarhluti, eðunarliður			
739	ef og aðeins ef, þá og því aðeins að			
740	efra flokksmark			
741	efra flokksmark			
742	efra heildi, efra tegur			
743	efra mark, hámark			Skilgreina
744	efra markgildi, stærsti þéttipunktur, efsti þéttipunktur			
745	efra öryggisbil			
746	efra stýrimark			
747	efra stýrimark			
748	efra þríhyrningsfylki			
749	efri miðjuruna, efri miðjurnar			
750	efri stallagerð, efri þrepagerð, efri þrepa-skipan			
751	efri stéttar rökfræði			
752	efri þríhyrningsgrúpa			
753	efsta gildi, hæsta gildi, stærsta gildi, stærsta hágildi, víðfeðmt hágildi			
754	eftir á			
755	eftirádreifing			
756	eftirálíkindi			
757	eftirámat			
758	eftirfararaðtala			
759	eftirfari			Skilgreina
760	eftirlit			
761	eftirlitsrit			
762	eftirtáknun			
763	egg-, eggлага			
764	eggferill, eggbaugur			
765	eggflötur			
766	eggin á fleygnum			
767	eiði, slitmengi			
768	eiginaðhvarf, sjálfsaðhvarf			
769	eiginaðhverfur, sjálfsaðhverfur			
770	eigindlegur			
771	eigindlegur eiginleiki			
772	eiginfall			


773	eiginfylgni, sjálffylgni			
774	eiginfylgnifall, sjálffylgnifall			
775	eiginfylgnirit, sjálffylgnirit			
776	eiginfylgnistuðull, sjálffylgnistuðull			
777	eigingildi			
778	eigingildisverkefni			
779	eiginlausn			
780	eiginleg frumsenda			
781	eiginleg hlutgrúpa			
782	eiginleg hlutvera			
783	eiginleg ósamleitni			
784	eiginleg tvinntala, þverkynja tala, þverkyns tala			
785	eiginleg útvíkkun, eiginleg víkkun			
786	eiginleg vörpun			
787	eiginleg þverstaðalgrúpa, snúningagrúpa, snúningsgrúpa			
788	eiginleg þverstaðalvörpun, snúningur			
789	eiginlega ósamleitinn			
790	eiginlega samsniða			
791	eiginlegt brot			
792	eiginlegt hlutmengi			
793	eiginlegt hlutrúm			
794	eiginlegt hlutsvið			
795	eiginlegt rætt fall			
796	eiginlegt þverstaðlað fylki, snúningsfylki			
797	eiginlegur			
798	eiginlegur deilir			
799	eiginlegur flokkur			
800	eiginlegur flutningur, eiginleg hreyfing			
801	eiginlegur óendanleiki			
802	eiginlegur punktur			
803	eiginleiki			Skilgreina
804	eiginleikinn um endanleg snið			
805	eiginrófspéttleiki			
806	eiginrúm			
807	eiginsléttu			
808	eiginvidd, rúmfræðileg margfeldni			
809	eiginvigrafylki			
810	eiginvigur, eiginvektor			
811	eileif			
812	einangraður			
813	einangraður hluti			
814	einangraður punktur			
815	einangraður sérstöðupunktur			


816	einblaða breiðbogafloitur, einskála breið-bogafloitur			
817	eind			
818	eindagrúpa, margföldunargrúpa			
819	eindregið frumsendukerfi, eindregið frum-setningakerfi			
820	eindreginn			
821	einfalda			
822	einfalda			
823	einfaldlega gegnvirkur			
824	einfaldlega lotubundinn			
825	einfaldlega samanhangandi, einfaldlega samhangandi			
826	einfaldur			
827	einfaldur atburður, frumatburður			
828	einfaldur baugur			
829	einfaldur bogi, einfaldur ferill			
830	einfaldur hnútur, smárahnútur			
831	einfaldur leggur			
832	einfaldur marghyrningur	<ref idTerm=3161>Marghyrningur</ref> sem er þannig að engar tvær <ref idTerm=2048>hliðar</ref> hans <ref idTerm=4771>skerast</ref>		
833	einfaldur punktur			
834	einfaldur vegur, braut			
835	einfaldur, grunnstæður			
836	einfalt eigingildi			
837	einfalt fall			
838	einfalt fylki, frumfylki			
839	einfalt heildi, einvítt heildi, einfalt tegur, einvítt tegur			
840	einfalt net			
841	einfalt róf			
842	einfalt samhverft fall			
843	einfalt skaut, einfaldur póll			
844	einfalt úrtak, hreint úrtak			
845	einfari			
846	einföld aðgerð			
847	einföld hending			
848	einföld núllstöð			
849	einföld örvarás			
850	einföld rás			
851	einföld rót			
852	einföld rúmfræði, grunnstæð rúmfræði			
853	einföld talnafræði, grunnstæð talnafræði			

854	einföld úrtaka, hrein úrtaka			
855	einföld útvíkkun, einföld víkkun			
856	einföld þríliða			
857	einföldun			
858	einföldun			
859	einföldunarregla			
860	einföldunarregla (fyrir hornaföll)			
861	eingild vörpun			
862	eingildur			
863	eingilt fall			
864	einhalla			
865	einhalla á köflum			
866	einhalla fall	<ref idTerm=1078>Fall</ref> sem er <ref idTerm=0>vaxandi</ref> eða <ref idTerm=0>minnkandi</ref>		Koma með dæmi um einhalla fall?
867	einhalla runa			
868	einhalla samleitni			
869	einhalli			
870	einhliða			
871	einhliða afleiða			
872	einhliða deildanleiki, einhliða diffranleiki			
873	einhliða flötur			
874	einhliða íðal			
875	einhliða markgildi			
876	einhliða markgildi			
877	einhliða öryggisbil			
878	einhliða próf			
879	einhliða samfelldni, samfelldni frá annarri hlið			
880	einhluta			
881	einhluta keilusnið			
882	einingarbil			
883	einingarfall			
884	einingarferningur	<ref idTerm=1163>Feringur</ref> með <ref idTerm=0>hliðarlengd</ref> 1		
885	einingarfylki			
886	einingarhringskífa, einingarskífa			

887	einingarhringur	Hringur með geisla 1	Hægt er að skilgreina hornaföllin með tilliti til einingarhringsins en í kateskri sléttu hefur punktur (x, y) á einingarhringnum hnitin $(\cos(\theta), \sin(\theta))$ þar sem θ er hornið sem línustrikið frá $(0, 0)$ til (x, y) myndar við jákvæða x-ásinn	
888	einingarhvel			
889	einingarkúla			
890	einingarrót			
891	einingarskipting, einingarhlutun, hlutun á einum			
892	einingarvigur, einingarvektor			
893	einkenna			
895	einkenni, eigind			
896	einkryppudreifing			
897	einliða	Margliða sem hefur aðeins einn lið		Koma með dæmi?
898	einliða jafna			
899	einmargur			
900	einmáta fylki			
901	einmáta grúpa			
902	einmenningsspil, einmenningur			
903	einmörg samsvörun			
904	einmótull			
905	einmótun, ímótun			
906	einn			
907	einn og aðeins einn, nákvæmlega einn			
908	einoka fylki			
909	einoka grúpa			
910	einoka grúpa yfir rauntölurnar, raunþverstaðalgrúpa, þverstaðalgrúpa yfir rauntölurnar			
911	einoka grúpa yfir tvinntölurnar			
912	einoka jafngildur			
913	einoka virki			
914	einpunktungur, einspunktsrúm			
915	einrás, 1-rás			

916	einsátta			
917	einsátta rúm			
918	einsetupunktur			
919	einsfirða			
920	einsfirðanagrúpa			
921	einsfirðun, firðrækin vörpun			
922	einshyrndur	Tveir <ref idTerm=6438>þríhyrningar</ref> ABC og EFG kallast <i>einshyrndir</i> ef hægt er að para <ref idTerm=2198>horn</ref> annars þríhyrningsins við horn hins þríhyrningsins þannig að hornin í sama pari eru <ref idTerm=2223>jafn stór</ref>. Táknað $ABC \sim EFG$	Á eftirfarandi mynd eru ABC og FEG einshyrndir vegna þess að: $\angle A$ og $\angle E$ eru jafn stór (grænu hornin á myndinni), $\angle B$ og $\angle F$ eru jafn stór (gulu hornin á myndinni) og $\angle C$ og $\angle G$ eru jafn stór (rauðu hornin á myndinni).	
923	einskorða			
924	einskorðað grannmynstur, hlutrúms-grannmynstur			
925	einskorðarður			
926	einskorðuð lokun			
927	einskorðun	Fyrir <ref idTerm=3282>vörpun</ref> $f : X \rightarrow Y$ og <ref idTerm=2098>hlutmengi</ref> A í X kallast vörpunin $f _A : A \rightarrow Y; \quad f _A(x) = f(x)$ <i>einskorðun</i> vörpunarinnar f við mengið A		
928	einskorðunarmótun			
929	einskrefa ítrekun			
930	einslæg horn			
931	einslaga þríhyrningur, einshyrndur þríhyrningur			

932	einslaga, einslagaður	Tvær <ref idTerm=6532>rúmmyndir</ref> A og B í <ref idTerm=1034>evklíðsku rúmi</ref> $\mathbb{E}$ kallast <i>einslaga</i> ef til er <ref idTerm=5779>færsla</ref> ϕ á $\mathbb{E}$ þannig að $\phi(A)$ og B séu <ref idTerm=0>eins</ref> rúmmyndir	Á eftirfarandi mynd eru A, B og C einslaga: 	Laga bakgrunnslit
933	einsleit deildajafna			
934	einsleitt fall			
935	einsleitt íðal			
936	einsleitt Markov-ferli			
937	einsleitt rúm			
938	einsleitt stak			
939	einsleitur			
940	einsleitur			
941	einsleitur þáttur			
942	einslögun			
943	einslögunarfærsla	<ref idTerm=5779>Færsla</ref> ϕ á tiltekinni <ref idTerm=4884>sléttu</ref> kallast <i>einslögunarfærsla</i> ef <ref idTerm=2072>hlutfallið</ref> milli <ref idTerm=2860>lengda</ref> <ref idTerm=2958>strikanna</ref> $\phi(AB)$ og AB er það sama fyrir öll strik AB, sem kallast þá <i>kvarði</i> einslögunarfærslunnar		Finna mynd
944	einslögunarmiðja, stríkkunarmiðja			
945	einsmóta			
946	einsmótun			
947	einsmótun			
948	einsmótun			
949	einsmótunarflokkur			
950	einsmótunarsetning			
951	einstæð aðgerð	<ref idTerm=46>Aðgerð</ref> á <ref idTerm=3270>mengi</ref> X af gerð-inni $X \rightarrow X$ kallast <i>einstæð aðgerð</i>		Koma með dæmi?
952	einstæð umsögn			
953	einstæð vensl			
954	einstæður			
955	einstafa tala			
956	einstaklingur			
957	einstika fjölskylda			
958	einstika grúpa			
959	einstikun			
960	einstikunarsetning			

961	einstoga			
962	einstogun			
963	einstökungur, einsstaksmengi	<ref idTerm=3270>Mengi</ref> með nákvæmlega eitt <ref idTerm=5128>stak</ref>		
964	einsþrepsaðferð			
965	eintæk vörpun	<ref idTerm=3282>Vörpun</ref> sem varpar ólíkum <ref idTerm=5128>stökum</ref> úr <ref idTerm=1343>formenginu</ref> í ólík stök úr <ref idTerm=74>bakmenginu</ref>	Látum $f : X \rightarrow Y$ vera vörpun. Í táknmáli segir þessi skilgreining þá að f sé eintæk ef fyrir sérhver $x_1, x_2 \in X$ með $x_1 \neq x_2$ gildir að $f(x_1) \neq f(x_2)$. Að f varpi ólíkum stökum úr X í ólík stök úr Y má einnig orða svo að ef f varpar tveimur stökum x_1 og x_2 úr X í sama stakið úr Y, þá verði x_1 og x_2 að vera sama stakið. Með öðrum orðum er f eintæk ef og aðeins ef fyrir sérhver $x_1, x_2 \in X$ með $f(x_1) = f(x_2)$ gildir að $x_1 = x_2$. Þegar sýna á að tiltekin vörpun sé eintæk er oft einfaldara að nota þetta skilyrði en það fyrra. <ref idTerm=6050>Vennmyndirnar</ref> að neðan sýna tvær varpanir $f : X \rightarrow Y$ og $g : Z \rightarrow W$. Vörpunin f er eintæk því hún varpar ólíkum stökum úr X í ólík stök úr Y. Hins vegar er g ekki eintæk því hún varpar tveimur efstu stökunum úr Z í sama stakið í W: 	Laga stærð á mynd eða skipta upp í tvær
966	eintækt fall			
967	eintækur			
968	eintekt, eintaka			
969	einungamótun			
970	einungur, hálfgrúpa með hlutleysu			
971	einvalda			
972	einvíð dreifing			
973	einvíð stærð, tölustærð, stigastærð			
974	einvíður			
975	einvítt hvel, einhvel			
976	einþríhyrningsfyllki			
977	ekki augljós			
978	ekki fastur			
979	ekki í jöfnum mæli			

980	ekki jákvæður, frekar neikvæður, óviðlægur	<ref idTerm=4093>Rauntala</ref> kallast <i>ekki jákvæð</i> ef hún er minni en eða jöfn 0		
981	ekki neikvæður, frekar jákvæður, ófrádrægur	<ref idTerm=4093>Rauntala</ref> kallast <i>ekki neikvæð</i> ef hún er stærri en eða jöfn 0		
982	ekki núll			
983	ekki núlldeilir, reglulegt stak			
984	ekki ótvíræður, ekki einræður			
985	ekki tómur			
986	eltingarverkefni			
987	endahnútur			
988	endahnútur, endapunktur			
989	endanleg aðferð			
990	endanleg fjöldatala			
991	endanleg framsetning			
992	endanleg röð			
993	endanleg runa			
994	endanleg slétta			
995	endanleg tala			
996	endanleg útvíkkun, endanleg víkkun			
997	endanleg þrepun			
998	endanlega framsettur			
999	endanlega frumsendanlegur			
1000	endanlega margir			
1001	endanlega samanhangandi, endanlega samhangandi			
1002	endanlega spannaður, endanlega framleiddur			
1003	endanlega viðbættinn, endanlega samleggjandi			
1004	endanlega víður			
1005	endanlega víður			
1006	endanlegt mengi			
1007	endanlegt svið, Galois-svið			
1008	endanlegt tugabrot			
1009	endanlegur	<ref idTerm=3270>Mengi</ref> kallast <i>endanlegt</i> ef <ref idTerm=1211>fjöldatala</ref> þess er <ref idTerm=3475>náttúruleg tala</ref>		
1010	endanlegur fjöldi			
1011	endanlegur munur			
1012	endanleikahyggi			
1013	endanleiki			


1014	endapunktur			
1015	endi			
1016	endi			
1017	endurkoma, afturkoma			
1018	endurkomutími, endurkomustund			
1019	endurkvæmt ástand, afturkvæmt ástand			
1020	endurkvæmt ferli, afturkvæmt ferli			
1021	endurkvæmur, afturkvæmur			
1022	endurnýjunarferli			
1023	endurnýjunarpunktferli			
1024	endurtölusetning, tölusetning á nýjan leik			
1025	endurúrtaka			
1026	Euler-			
1027	Euler-aðferð			
1028	Euler-net			
1029	evklíðsk firð			


1030	evklíðsk rúmfræði	<ref idTerm=4271>Rúmfræði</ref> sem uppfyllir <ref idTerm=1452>frumsendur</ref> forngríska <ref idTerm=5117>stærðfræðingsins</ref> Evklíðs	Undirstöður rúmfræðinnar má rekja aftur til Evklíðs en í <i>Frumatrið-unum</i>, sem spanna 13 bækur, tók hann saman alla rúmfræði og <ref idTerm=5408>talnafræði</ref> sem þekkt var á þeim tíma. Í fyrstu bókinni setti Evklíð fram fimm frumsendur fyrir rúmfræði í <ref idTerm=4884>sléttu</ref> og notaði þær til að leiða út <ref idTerm=4621>setningar</ref> um sléttuna. Frumsendur Evklíðs voru fimm talsins: 1. Hægt er að teikna beint <ref idTerm=2958>strik</ref> milli sérhverra tveggja <ref idTerm=4001>punkta</ref>. 2. Hægt er að framlengja sérhvert beint strik í óendanlega langa beina <ref idTerm=2911>línu</ref>. 3. Fyrir strik í sléttu er hægt að draga um það <ref idTerm=2295>hring</ref> þannig að strikið sé geisli hringsins, og miðja hans er í öðrum endapunkti striksins. 4. Öll <ref idTerm=4167>rétt horn</ref> eru <ref idTerm=0>eins</ref>. 5. Fyrir gefna línu og gefinn punkt, sem ekki er á línunni, er til ein og aðeins ein lína sem fer í gegnum punktinn og <ref idTerm=4771>sker</ref> ekki línuna. Síðasta frumsendan varð eftirmönnum Evklíðs sérstaklega hugleikin og er alltaf vísað í hana sem “fimmtu frumsendu Evklíðs”. Með því að gera ekki ráð fyrir þessari frumsendu fæst <ref idTerm=3705>óevklíðsk rúmfræði</ref>.
------	-------------------	---	--

1031	evklíðsk slétta	<ref idTerm=5729>Tvívítt</ref> <ref idTerm=4266>rúm</ref> sem uppfyllir frumsendur <ref idTerm=1030>Evklíðskar rúm-fræði</ref>		
1032	evklíðskt innfeldi, innfeldi			
1033	evklíðskt innfeldisrúm, evklíðskt rúm, innfeldisrúm			
1034	evklíðskt rúm	evklíðsk slétta	<ref idTerm=4266>Rúm</ref> sem uppfyllir frumsendur <ref idTerm=1030>Evklíðskar rúm-fræði</ref>	
1035	evklíðskur baugur			
1036	evklíðskur flutningur			
1037	evklíðskur staðall			
1038	evklíðskur, Evklíðs-			
1039	eyða			
1040	eyðingaradferð	<ref idTerm=41>Aðferð</ref> til þess að <ref idTerm=2840>leysa</ref> <ref idTerm=2548>jöfnuhneppi</ref> með því að <i>eyða</i> <ref idTerm=538>breytum</ref>. Þá er tekið tvær <ref idTerm=2478>jöfnur</ref> í jöfnuhneppinu og skalað eina þeirra þannig að <ref idTerm=5290>stuðlarnir</ref> fyrir framan breytuna sem eyða skal eru þeir sömu. Síðan er ein jafnan dregin frá hinni og þannig fengin ný jafna sem inniheldur ekki eyddu breytuna. Með því að eyða öllum breytunum til skiptis og endurtaka allt ferlið eins oft og þarf fæst lausn á jöfnuhneppinu		Koma með dæmi
1041	eyðingarrúm			
1043	fábrotinn			
1044	fábrotinn hnútur			
1045	fábrotleiki			
1046	fæðingaferli			
1047	fæðingar- og dánarferli			
1048	fæðingatíðni			
1049	færsla			
1050	færslufylki			
1051	færslugrúpa			
1052	fágað fall, tvinnfágað fall			


1053	fágað línubundin			
1054	fágað mengi			
1055	fágað mynstur, tvinnfágað mynstur			
1056	fágað rúm, tvinnfágað rúm			
1057	fágað víðerni			
1058	fágaður ferill			
1059	fágaður, tvinnfágaður			
1060	fáguð framlenging			
1061	fáguð rúmfræði			
1062	fáguð talnafræði, talnafræðigreining			
1063	fáguð víðátta, tvinnfáguð víðátta, tvinnvíðátta			
1064	fáguð vörpun			
1065	fágun			
1066	fágunaraðgreinanlegur			
1067	fágunarfullkominn			
1068	fágunarhjúpur			
1069	fágunarkúptur			
1070	fágunarsvæði			
1071	fágunarsvæði			
1072	faldfirð, firðamargfeldi			
1073	faldheildi, faldtegur			
1074	faldmál, margfeldismál			
1075	faldmengi, mengjamargfeldi, margfeldismengi			
1076	faldnet, netamargfeldi			
1077	faldrúm, margfeldisrúm			
1078	fall	<ref idTerm=3282>Vörpun</ref> sem hefur <ref idTerm=4093> $\mathbb{R}$ </ref> eða <ref idTerm=5682> $\mathbb{C}$ </ref> sem <ref idTerm=74>bakmengi</ref>		Koma með dæmi um föll?
1079	falla saman			
1080	fallaalgebra			
1081	fallajafna			
1082	fallandi keðja, minnkandi keðja			
1083	fallandi, minnkandi			
1084	fallaröð			
1085	fallarúm			
1086	fallaruna			
1087	fallasvið			
1088	fallfasti			
1089	fallfrymi			

1090	fallgildi	Fyrir $\langle \text{ref idTerm=1078} \rangle \text{fall} \langle / \text{ref} \rangle$ $f : X \rightarrow Y$ og $\langle \text{ref idTerm=5128} \rangle \text{stak} \langle / \text{ref} \rangle$ x úr X kallast stakið úr Y sem f úthlutar x <i>gildi fallsins</i> f í x og táknað með $f(x)$		Skóða orðalag. Þarf mynd?
1091	fallgildi			
1092	falljafna Eulers			
1093	fallörvanet			
1094	falltákn			
1095	fallvensl			
1096	fánaviðátta, flaggvíðátta			
1097	fáni, flagg			
1098	fánýti			
1099	farandsalaverkefni			
1100	fasaferill			
1101	fasameðaltal			
1102	fasamynd			
1103	fasarúm			
1104	fasi			
1105	fastafall, fasti, fast fall			
1106	fastakommureikningur			
1107	fastaliður			
1108	fastasvið			
1109	fastheldnihætta			
1110	fastheldnimistösk			
1111	fasti Eulers			
1112	fasti, fastastærð			
1113	fastur			
1114	fátækleg tala			
1115	fella-, falla-			
1116	fellagreining			
1117	felli			
1118	felliafleiða			
1119	fellideildun, fellidiffrun			
1120	felliheildi, fellitegur			
1121	felliheildun, fellitegrun			
1122	felujafna			
1123	ferð			
1124	ferfaldur, fjórfaldur			
1125	ferflötungur, fjórflötungur, þristrend strýta, þristrendur píramíti	$\langle \text{ref idTerm=5286} \rangle \text{Pýramídi} \langle / \text{ref} \rangle$ með $\langle \text{ref idTerm=6438} \rangle \text{þríhyrning} \langle / \text{ref} \rangle$ sem $\langle \text{ref idTerm=1716} \rangle \text{grunnflöt} \langle / \text{ref} \rangle$		
1126	ferhliðungur, fjórhliðungur			

1127	ferhyrningur	<ref idTerm=3161>Marghyrningur</ref> með fjórar <ref idTerm=2048>hliðar</ref>	Eftirfarandi er mynd af ferhyrningi: 	
1128	ferilaðlögun			
1129	ferilheildi, feriltegur			
1130	ferilhorn	<ref idTerm=2198>Horn</ref> með <ref idTerm=3661>oddpunktur</ref> á <ref idTerm=2295>hring</ref> sem hefur <ref idTerm=5261>strengi</ref> fyrir <ref idTerm=334>arma</ref>	Ef hornið er <ref idTerm=0>eiginlegt</ref> þá skera strengirnir tveir hringinn í tveim <ref idTerm=4001>punktum</ref> og sagt er þá að ferilhornið <i>spanni</i> <ref idTerm=2276>hringbogann</ref> milli punktanna. Ferilhorn er jafnt hálfum boganum sem það spannar	
1131	ferill, boglína, sveiglína	<ref idTerm=3417>Myndmengi</ref> <ref idTerm=4359>samfelldrar vörpunar</ref> $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. <ref idTerm=4001>Punktarnir</ref> $f(a)$ og $f(b)$ kallast <i>endapunktur ferilsins</i> . Óformlega má segja að ferill í tveim <ref idTerm=6087>víddum</ref> sé það sem verður til þegar þú dregur blýant um <ref idTerm=4884>sléttu</ref> án þess að lyfta honum		Nota evklíðska skilgreiningu frekar en grannfræðilega? - Finna mynd?
1132	ferill, vegur, leið			
1133	ferillyfting			
1134	ferilris, reism			
1135	ferilsamanhangandi, vegsamanhangandi, ferilsamhangandi, vegsamhangandi			
1136	ferilsamhengisþáttur, vegsamhengisþáttur			
1137	ferlarúm, vegarúm, leiðarúm			
1138	ferli			
1139	ferlínulegur, fjórlínulegur			
1140	Fermat-frumtala			
1141	Fermat-vefja, fleygger vefja			
1142	fernd			
1143	ferninga			

1144	ferningsbestun			
1145	ferningsseileif			
1146	ferningsflötur			
1147	ferningsform			
1148	ferningsfylki, ferningslaga fylki			
1149	ferningsgagnkvæmni			
1150	ferningsgagnkvæmnissetning, setning um ferningsgagnkvæmni			
1151	ferningsheildanlegur, ferningstegranlegur			
1152	ferningslaga			
1153	ferningslaus			
1154	ferningsleif			
1155	ferningsmeðaltal			
1156	ferningsmeðaltalsrót			
1157	ferningsrót, önnur rót	Sú <ref idTerm=4093>rauntala</ref> $x \geq 0$ sem uppfyllir $x^2 = a$ kallast <i>kvaðratrótin</i> af a og táknud með $\sqrt{a}$	Kvaðratrót er sértilvik af almenna hugtakinu um <ref idTerm=4253>n-tu rót</ref>	
1158	ferningssumma frávika, ferningsfrávik			
1159	ferningssvið			
1160	ferningstala, ferhyrnd tala			
1161	ferningun			
1162	ferningun hrings			
1163	ferningur	<ref idTerm=4175>Rétthyrningur</ref> með allar <ref idTerm=2048>hliðar</ref> jafn <ref idTerm=2860>langar</ref>	Eftirfarandi er mynd af ferningi: 	
1164	ferstrendingur			
1165	fertala			
1166	ferverpill, fjórvíður teningur			
1167	fervik			
1168	fervikagreining			
1169	Fibonacci-runna			
1170	Fibonacci-tala			
1171	fimmfaldur			
1172	fimmflötungur			
1173	fimmhyrndur			

1174	fimmhyrningstala, fimmhyrnd tala		
1175	fimmhyrningur		
1176	fimmsetning		
1177	fimmstirningur, reglulegur fimmstirningur		
1178	fimmta stigs		
1179	fimmta stigs ferill		
1180	fimmta stigs flötur		
1181	fimmta stigs jafna		
1182	fimmtánhyrningur		
1183	fimmtungsmark		
1184	fimmund		
1185	fín upplausn		
1186	fíngerving		
1187	fíngrareikningur		
1188	fínleiki		
1189	fínn		
1190	finna gildi (einhvers), reikna út		
1191	fínna grannmynstur, sterkara grannmynstur		
1192	fínni þakning		
1193	fínt knippi		
1194	firð	Firð á mengi M er fall $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}_+$, sem uppfyllir $d(x, x) = 0$ fyrir öll $x \in M$ $d(x, y) > 0$ fyrir öll $x \neq y \in M$ $d(x, y) = d(y, x)$ fyrir öll $x, y \in M$ $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ fyrir öll $x, y, z \in M$ Stærðin $d(x, y)$ er gjarnan kölluð fjarlægðin milli x og y	Segir ekki skilgreiningin allt sem segja þarf? Er þörf á skýringu?
1195	firð-		
1196	firðanlegur		
1197	firðanleiki		
1198	firðargrannmynstur, firðgrannmynstur		
1199	firðrækinn		


1200	firðrúm	<ref idTerm=5627>Tvennd</ref> (M, d) par sem M er <ref idTerm=3270>mengi</ref> og $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}_+$ er <ref idTerm=1194>firð</ref>		Koma með dæmi um firðrúm?
1201	firðun			
1202	firðunarsetning			
1203	firðþinur			
1204	fjarlægð			
1205	fjarlægt innra horn	Þau <ref idTerm=6295>innri horn</ref> <ref idTerm=3161>marghyrnings</ref> sem ekki eru <ref idTerm=1677>grannhorn</ref> tiltek- ins <ref idTerm=6295>ytra horns</ref>	Á eftirfarandi mynd eru $\angle BAC$ og $\angle ACB$ fjarlæg innri horn við ytra hornið $\angle DBC$: 	Laga bakgrunnslit
1206	fjarstæða			
1207	fjögraferningasetning, fjögurraferninga- setning			
1208	fjögralítasetning, fjögurralítasetning			
1209	fjölbreytugreining			
1210	fjöldatala			
1211	fjöldatala	<ref idTerm=2489>Jafngildisflokkur</ref> <ref idTerm=3270>mengja</ref> par sem <ref idTerm=3332>milli</ref> sérhverra tveggja <ref idTerm=3270>mengja</ref> er til <ref idTerm=1586>gagntæk vörpun</ref>		Skoða þessa skilgreiningu betur
1212	fjöldatalnareikningur, reikningur með fjöldatölum			
1213	fjöldi			
1214	fjöldi, fjöldatala, stétt			
1215	fjölfylgni			
1216	fjölfylgnistuðull			
1217	fjölgeisli			
1218	fjölhlutanet			
1219	fjölhnattaverkefni, fjölagnaverkefni			
1220	fjölkrýppudreifing, fjöltindadreifing			
1221	fjölliða			
1222	fjölliðudreifing, fjölkostadreifing			
1223	fjölliðuregla			

1224	fjöllotubundinn, margfaldlega lotubundinn			
1225	fjölmættisfræði			
1226	fjölnet, net			
1227	fjölskífa			
1228	fjölskipting			
1229	fjölskylda			
1230	fjölstafa tala			
1231	fjölstig			
1232	fjölundirþýður			
1233	fjölvisir			
1234	fjölyfirþýður			
1235	fjölþýður			
1236	fjórða rót			
1237	fjórða stigs			
1238	fjórða stigs ferill			
1239	fjórða stigs flötur			
1240	fjórða stigs jafna			
1241	fjórðungsbogi			
1242	fjórðungsgeiri			
1243	fjórðungsmark			
1244	fjórðungur	Sjá skýringu við <ref id=Term=2554>kartesk hnit</ref>		
1245	fjórflötungsgrúpa			
1246	fjórflötungshnit			
1247	fjórflötungstala			
1248	fjórgrúpa Kleins			
1249	fjórhliða rúmhorn			
1250	fjórлаuаferill, fjögralaуаferill, fjögralaufasmári			
1251	fjórsetning			
1252	fjórskipting, fjórhlutun			
1253	fjórveldi, fjórða veldi			
1254	fjórveldi, fjórða veldi (af heilli tölu)			
1255	fjórvigur, fjórvíður vigur			
1256	flæði			
1257	flæðihraði			
1258	flæðinet			
1259	flæðirit			
1260	flæðistærð			
1261	flæðispéttleiki			
1262	flækja, flækjustig			
1263	flatarheildi, flatartegur			
1264	flatarmælir			
1265	flatarmál			Skilgreina


1266	flatarmál, yfirborðsmál, yfirborð		
1267	flatarmálsform		
1268	flatarmálsfrymi		
1269	flatarrækin		
1270	flatarrækni		
1271	flatarskiki		
1272	flatarskiki		
1273	flatneskja		
1274	flattur sporvölusnúðflötur		
1275	flattur sporvölusnúður		
1276	flatur		
1277	flatur punktur, flatpunktur		
1278	flaumrænn		
1279	flauntölva, flaumræn tölva		
1280	fléttingur		
1281	fléttufræði, samtakagreining, samtekta- greining		
1282	fleygaður		
1283	fleygaður frá hægri, nákvæmur frá hægri		
1284	fleygaður frá vinstri, nákvæmur frá vinstri		
1285	fleygaður varpi		
1286	fleygbogaflötur		
1287	fleygbogaríti		
1288	fleygbogasneið		
1289	fleygbogasnúðflötur		
1290	fleygbogi		
1291	fleygger		
1292	fleygger hlutafleiðujafna		
1293	fleygger hnit		
1294	fleygger punktur		
1295	fleygger Riemannflötur		
1296	fleygger rúmfræði		
1297	fleygger sívalningur		
1298	fleygger sjálfmótun, fleygger færsla		
1299	fleygger slétta		
1300	fleyggerð		
1301	fleyggerð		
1302	fleyggert aðhvarf		
1303	fleyguð lest		
1304	flísalagning		
1305	flokkafjöldi		
1306	flokkatala		
1307	flokksbreidd, flokkslengd		
1308	flokksmark		
1309	flokksmeðaltal		

1310	flokksmiðja, miðpunktur flokkunarbils			
1311	flokksnúmer			
1312	flokkuð gögn			
1313	flokkun			
1314	flokkun			
1315	flokkunarbil			
1316	flokkunarbreyta			
1317	flokkunargögn			
1318	flokkunarhending			
1319	flokkunarrúm			
1320	flokkunarsetning			
1321	flökkupunktur, hlaupapunktur, breytileg- ur punktur			
1322	flokkur			
1323	flokkur			
1324	flötur			
1325	flötur, hliðarflötur, hlið	Sjá <ref idTerm=3133>margflötungur</ref>		
1326	flutningagrúpa, hreyfingagrúpa			
1327	flutningsídal			
1328	flutningur, hreyfing	<ref idTerm=5779>Færsla</ref> á tiltekinni <ref idTerm=4884>sléttu</ref> sem <ref idTerm=5963>varðveitir</ref> <ref idTerm=1204>fjarlægðir</ref>	Sérhvern flutning má fram- kvæma með því að nota <ref idTerm=2056>hliðrun</ref>, <ref idTerm=4954>snúning</ref> og <ref idTerm=4986>línuspeglun</ref>. Eins og aðrar færslur, þá varðveita flutningar <ref idTerm=4509>samsíða</ref> <ref idTerm=2911>línur</ref>. Flutningar varðveita líka <ref idTerm=2223>stærðir</ref> <ref idTerm=2198>horna</ref>	Finna mynd
1329	flytja			
1330	földun			
1331	földunarjafna			
1332	fólgið fall			
1333	fólginn			
1334	for-Hilbert-rúm			
1335	forgrunnur			
1336	forhlutur, fráhlutur, óðal			
1337	forknippi			
1338	forkönnun			
1339	forliður			
1340	form			
1341	form, jafnþætt margliða, einsleit margliða			
1343	formengi, frámengi, skilgreiningarmengi, óðal	Sjá <ref idTerm=3282>vörpun</ref>		

1344	formerki			
1346	formerkisfall			
1347	formerkispróf			
1348	formerkjaregla			
1349	formerkjaskipti			
1350	formerkjatala			
1351	formgera			
1352	formhyggja			
1353	formleg afleiða			
1354	formleg margliða			
1355	formleg rökfræði			
1356	formleg sönnun			
1357	formleg veldaröð			
1358	formlega samkvæmur			
1359	formlegt kerfi, formkerfi			
1360	formlegt mál			
1361	formlegt raunsvið			
1362	formlegur			
1363	formúla, formkorn, formáli			
1364	formúlusafn			
1365	formynd			

1366	formynd, frummynd, öfug mynd	Fyrir $f : X \rightarrow Y$ og hlutmengi B í Y kallast mengi þeirra $f^{-1}(B)$ úr X sem f varpar í stak úr B <i>frummynd</i> vörpunarinnar f af menginu B. Hana má rita á forminu $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$	Fyrir sérhvert $y \in B$ eru þau stök úr X sem f varpar í y lausnir $f(x) = y$. Frummyndina $f^{-1}(B)$ má því einnig skilgreina sem mengi allra lausna jöfnunnar $f(x) = y$ fyrir sérhvert $y \in B$ og þannig má rita hana á forminu $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid \text{til er } y \in B \text{ þ.a. } f(x) = y\}.$ Venn-myndin að neðan sýnir vörpunina $f : X \rightarrow Y$, hlutmengið B í Y og frummynd þess $f^{-1}(B)$:  Frummyndir af sammengjum, sniðmengjum og fyllimengjum fullnægja eftirfarandi reiknireglum, sem segja að fyrir sérhver hlutmengi B_1 og B_2 í Y gildi: $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2).$ $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2).$ $f^{-1}(B_1^c) = (f^{-1}(B_1))^c.$ Ef A er hlutmengi í X og B er hlutmengi í Y fást jafnframt eftirfarandi reiknireglur um samspil myndar og frummynda: $A \subseteq f^{-1}(f(A)).$ $f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$
1367	forraðað mengi		
1368	forrit		
1369	forrit, tölvuforrit		

1370	forritun			
1371	forröðun			
1372	forsagnar- og leiðréttingaraðferð			
1373	forsegjandi, spáfall			
1374	forsenda			
1375	forsenda			
1376	forsenda til einföldunar			
1377	forsenda, krafa			
1378	forsía			
1379	forskema			
1380	forskeyti			
1381	fortáknun, pólskur ritháttur			
1382	fortilraun			
1383	forystuliður			
1384	forystustuðull	Sjá <ref idTerm=1948>margliða</ref>		
1385	forþjappaður			
1386	fossaferli, skriðuferli			
1387	föst færslulíkindi, stöðug færslulíkindi			
1388	fótpunktaþríhyrningur			
1389	fótpunktur	<ref idTerm=4845>Skurðpunktur</ref> <ref idTerm=2911>línu</ref> og <ref idTerm=6483>þverils</ref> síns		
1390	Fourier-, sveiflu-			
1391	Fourier-færsla, Fourier-myndun, Fourier-ummyndun			
1392	Fourier-greining, sveifflugreining			
1393	Fourier-heildi, Fourier-tegur			
1394	Fourier-liður, sveifluliður			
1395	Fourier-mynd, Fourier-færsla			
1396	Fourier-röð			
1397	Fourier-stuðull			
1398	frádragi			
1399	frádráttarstofn			
1400	frádráttur			
1401	fræði			
1402	fræðin um keilusnið			


1403	frændhorn	Tvö <ref idTerm=2198>horn</ref> sem samanlagt <ref idTerm=2223>mælast</ref> 180 <ref idTerm=1667>gráður</ref>	Á eftirfarandi mynd eru $\angle BOA$ og $\angle DPC$ frændhorn:	Laga bakgrunnslit
				
1404	framandlegt hvel			
1405	framfærsla			
1406	framinnsetning, forinnsetning			
1407	framleiða			
1408	framleiðandi fall			
1409	framleiðandi lína, framleiðandi			
1410	framleiðandi veldaröð			
1411	framlenging, útvíkkun			
1412	frammunur			
1413	framsetjandi			
1414	framsetjanlegur			
1415	framsetjanleiki			
1416	framsetning			
1417	framsetning			
1418	framsetningarregla, framsetningarsetning			
1419	framvinda, tilhneiging			
1420	framvindill, útbreiðslufall			
1421	framvindu-			
1422	framvindujafna			
1423	frávik			
1424	frávikshlutfall			
1425	Fréchet-deildanlegur, Fréchet-diffranlegur			
1426	Fréchet-rúm			
1427	Fredholm-skilyrði			
1428	frekar jákvæður deilir			
1429	fremsti tölustafur			
1430	fremsti tölustafur			
1431	frjáls			
1432	frjáls breyta, frjáls breytistærð			
1433	frjáls grunnur			
1434	frjáls grúpa			
1435	frjáls Riemann-flötur			
1436	frjáls spönnuður			
1437	frjáls útvíkkun, frjáls víkkun			

1438	frjáls vigur			
1439	frjáls vísir			
1440	frjáls þáttur			
1441	frjálst margfeldi			
1442	frjálst stak			
1443	frum-			
1444	fruma			
1445	frumbreyta, óháð breyta, óháð breytistærð, frumstærð			
1446	frumbútur (í rúmfræði)			
1447	frumdeilir			
1448	frumhugtak, grunnhugtak, undirstöðu-hugtak			
1449	frumíðal			
1450	frummargliða			
1451	frumsenda um lítil mengi, frumsetning um lítil mengi			
1452	frumsenda, frumsetning	<ref idTerm=1515>Yrðing</ref> sem lögð er til grundvallar en ekki er ætlast til að sé sönnuð	Í fyrstu gæti virst vafasamt að gefa sér að eitthvað sé <ref idTerm=6659>satt</ref> í staðinn fyrir að <ref idTerm=4554>sanna</ref> það enda eru <ref idTerm=4964>sannanir</ref> aðalverkfæri <ref idTerm=5117>stærðfræðinga</ref> til þess að sannfæra sjálfa sig og aðra um að staðhæfingar séu réttar. Því miður er ekki hægt að komast hjá því en það væri eins og að keyra bíl án eldsneytis. Svokölluðu <i>afleiðslukerfin</i> sem stærðfræðingar nota er einungis hægt að nota til þess að álykta nýjar staðreyndir út frá staðreyndum sem er nú þegar búið að sanna. Þess vegna þurfa fyrst að vera til staðreyndir sem er ákveðið að séu sannar. Það er ákveðin hætta að frumsendurnar séu innbyrðis <ref idTerm=3401>mótsagnakenndar</ref> eða að þær endurspegli ekki innsæi okkar varðandi það sem ætti að vera satt	Ég held að það þurfi að koma með eitt-hvað dæmi um seinustu setninguna út af hún er ef til vill mjög villandi eins og er
1453	frumsenduaðferð, frumsetningaraðferð			
1454	frumsendugrip, frumsetningargrip, frumsenduskema, frumsetningaskema			
1455	frumsendukerfi, frumsetningakerfi			



1456	frumsenduleg mengjafræði, frumsendu-mengjafræði			
1457	frumsendulegur, frumsetninga-			
1458	frumstæð margliða			
1459	frumstæð rót			
1460	frumstæð sviðsútvíkkun, frumstæð sviðs-víkkun			
1461	frumstæður			
1462	frumstætt íðal			
1463	frumstætt rakið fall			
1464	frumstætt stak			
1465	frumstak			
1467	frumsvið, frumkroppur			
1468	frumtala, prímtala	<ref idTerm=3475>Náttúruleg tala</ref> $p > 1$ kallast <i>frumtala</i> ef einu náttúrulegu tölurnar sem <ref idTerm=1599>ganga upp í</ref> henni eru <ref idTerm=5397>talan</ref> 1 og talan p	Þessi skilgreining jafngildir því að segja að talan p sé frumtala ef fyrir sérhverjar náttúrulegar tölur a og b þannig að p <ref idTerm=1599>gengur upp í</ref> $a \cdot b$ þá gengur p líka upp í a.m.k. annarri þeirra. Ljóst er að fyrsta frumtalan er 2 og almennt er hægt að ákvarða hvort gefin náttúruleg tala n sé frumtala með því að prófa að <ref idTerm=686>deila</ref> öllum frumtölum frá 2 til $\sqrt{n}$ upp í n. Ef alltaf fæst afgangur þá er talan frumtala. Allar frumtölur minni en 100 eru eftirfarandi: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97	
1469	frumtalnasetning			
1470	frumtalnatafla			
1471	frumtalnatvívurur			
1472	frumu-			
1473	frumuklasi			
1474	frumþáttun			
1475	frumþáttur	Sjá <ref idTerm=5824>undirstöðusetningu reikningslistarinnar</ref>		
1476	frymi			
1477	frymið íðal			
1478	frymin framsetning			
1479	frymin þáttun			
1480	fryminn þáttur			
1481	fullgerð lokun			
1482	fullgerð útvíkkun, heilsteypt útvíkkun, fullgerð víkkun, heilsteypt víkkun			
1483	fullgert svið, heilsteypt svið			


1484	fullheildanlegur, fulltegranlegur			
1485	fullkomið firðrúm			
1486	fullkomið frumsendukerfi, fullkomið frumsetningakerfi			
1487	fullkomið leifamengi, fullkomið leifakerfi			
1488	fullkomið mál			
1489	fullkomið raðsvið, fullkomið raðað svið			
1490	fullkomin kenning			
1491	fullkomin spyrðing			
1492	fullkomin tala			
1493	fullkominn			
1494	fullkominn ferhliðungur			
1495	fullkominn ferhyrningur			
1496	fullkomlega samfelldur			
1497	fullkomlega viðbætinn, fullkomlega samleggjandi			
1498	fullkomleikafrumsenda, fullkomleikafrumsetning			
1499	fullkomleikafrumsenda, fullkomleikafrumsetning, frumsenda um fullkomleika, frumsetning um fullkomleika			
1500	fullkomleikasetning			
1501	fullkomleikasetning Gödels			
1502	fullkomleiki			
1503	fullkomnun			
1504	fullnægja, uppfylla			
1505	fullnægjanlegur, uppfyllanlegur			
1506	fullskipað hlutnet			
1507	fullstytt brot			
1508	fullt hlutríki			
1509	fullt horn, 360° horn			
1510	fullt rúmhorn			
1511	fulltengt net			
1512	fulltrúa-			
1513	fulltrúi			
1514	fullur			
1515	fullyrðing, yrðing	<ref idTerm=5072>Staðhæfing</ref> sem er annaðhvort <ref idTerm=4565>sönn</ref> eða <ref idTerm=3890>ósönn</ref>	Yrðingar eru yfirleitt táknaðar með litlum bókstöfum eins og p , q , r og svo framvegis	
1516	fylgibreyta			
1517	fylgibreyta, fylgistærð, háð breyta, háð breytistærð			
1518	fylgibreyta, fylgistærð, háð breyta, háð breytistærð			


1519	fylginn			
1520	fylgisetning			
1521	fylgipáttur			
1522	fylgnar breytur			
1523	fylgni			
1524	fylgnifall			
1525	fylgnifylki			
1526	fylgnigreining			
1527	fylgnihlutfall			
1528	fylgnireikningur			
1529	fylgnirit			
1530	fylgnisporbaugur			
1531	fylgnisporvala			
1532	fylgnistuðull			
1533	fylgnitafla			
1534	fylki			
1535	fylkja-			
1536	fylkjaalgebra			
1537	fylkjafall			
1538	fylkjafræði			
1539	fylkjagildur			
1540	fylkjagrúpa			
1541	fylkjajafna			
1542	fylkjamargfeldi			
1543	fylkjareikningur			
1544	fylkjaritháttur			
1545	fylkjastaðall			
1546	fylkjaumhverfing, fylkjaandhverfing			
1547	fylkjaútsetning			
1548	fylkjungur			
1549	ylliaðgerð			
1550	yllilega óbreyttur			
1551	yllilega tryggur			
1552	yllilíkindi			

1562	fyrri teljanleikafrumsendan			
1563	fyrsta meginform, fyrsta undirstöðuform			
1564	fyrsta stigs			
1565	fyrstu raðar			
1566	fyrstu stéttar			
1567	gæðaeftirlit			
1568	gagnabanki			
1569	gagnasafn, gagnagrunnur			
1570	gagnasafnsfræði			
1571	gagnavinnsla			
1572	gagnfágaður			
1573	gagnkvæmnissetning			
1574	gagnkvæmur			
1575	gagnræður			
1576	gagnsnið			
1577	gagnsniða			
1578	gagnsniða			
1579	gagnsniðill			
1580	gagnsniðsskilyrði			
1581	gagnstæð stefna, gagnstæð átt			
1582	gagnstæð tala			
1583	gagnstæður			
1584	gagnstætt formerki			
1585	gagntæk samsvörun, gagnkvæm samsvörun			
1586	gagntæk vörpun	<ref idTerm=3282>Vörpun</ref> sem er bæði <ref idTerm=965>eintæk</ref> og <ref idTerm=351>átæk</ref>	Eftirfarandi mynd sýnir gagntæka vörpun: 	
1587	gagntækur			
1588	gagntekt, gagntaka			
1589	gagntilgáta			
1590	gagnvega-			
1591	gagnvegafjarlægð			
1592	gagnvegafullkominn			
1593	gagnvegahnit			
1594	gagnvegastreymi			
1598	gammafall			

1599	ganga upp í	Sagt er að <ref idTerm=3475>náttúruleg tala</ref> <i>n</i> gangi upp í náttúrulegri tölu <i>m</i> ef hægt er að <ref idTerm=685>deila <i>m</i> með <i>n</i> án afgangs</ref>		Koma með dæmi
1600	gangbestun, kvik bestun, hreyfibestun, hreyfin bestun			
1601	gangkerfi, hreyfikerfi			
1602	gataður			
1603	Gauss-dreifing, normleg dreifing			
1604	Gauss-dreifingarfall, normlegt dreifingarfall, normlegt dreififall			
1605	Gauss-ferill, normlegur dreififerill			
1606	Gauss-ferli, normlegt ferli			
1607	Gauss-krappi, Gauss-sveigja, heildar-krappi, heildarsveigja			
1608	Gauss-Markov-metill			
1609	Gauss-tala, Gauss-heiltala			
1610	gegnvirk grúpa			
1611	gegnvirkni			
1612	gegnvirkniregla, gegnvirkniháttur			
1613	gegnvirkniregla, gegnvirknilögmál			
1614	gegnvirkur			
1615	geirahorn			
1616	geiri, hringgeiri	<ref idTerm=4891>Flatarmynd</ref> sem afmarkast af <ref idTerm=1130>ferilhorni</ref> og <ref idTerm=2276>boganum</ref> sem það <ref idTerm=1130>spannar</ref>		Vantar færslu fyrir að spanna í þessum skilningi?
1617	geislahnit			
1618	geisلامarkgildi			
1619	geisli, hringgeisli	<i>Geisli</i> getur bæði átt við <ref idTerm=2958>línustrik</ref> frá miðju <ref idTerm=2295>hrings</ref> í einhvern <ref idTerm=4001>punkt</ref> hans eða lengd línustriksins		
1620	geisli, kúlugeisli	<i>Geisli</i> getur bæði átt við <ref idTerm=2958>línustrik</ref> frá miðju <ref idTerm=2319>kúluhvels</ref> í einhvern <ref idTerm=4001>punkt</ref> á kúluhvelinu eða lengd línustriksins		
1621	gera ráð fyrir, setja sem svo, ganga út frá, gefa sér			
1622	gerð fylkis			

1623	gerð, tag			
1624	gerðarfræði			
1625	gerðarsetning			
1626	gerðarstöðugleiki			
1627	gervi-			
1628	gervihvel			
1629	gervikúptur			
1630	gervimál			
1631	gervislembitölur			
1632	geyma			
1633	geyma			
1634	geymd			
1635	geymd, varðveisla			
1636	geymdur tölustafur			
1637	giftingarsetning			
1638	giftingarverkefni			
1639	gildamengi			
1640	gildi, mynd (staks)			
1641	gildisdreifing			
1642	gildisdreifingarfræði			
1643	gildleiki			
1644	gjaldgeng lausn			
1645	gjaldþrot, hrún			
1646	gleiðhýrndur, sljóhýrndur	<ref idTerm=6438>Þríhyrningur</ref> kallast <i>gleiðhýrndur</i> ef hann hefur eitt <ref idTerm=1647>gleitt</ref> <ref idTerm=2198>horn</ref>	Eftirfarandi mynd sýnir gleiðhýrndan þríhyrning: 	Laga bakgrunnslit
1647	gleiður, sljór	<ref idTerm=2198>Horn</ref> kallast <i>gleitt</i> ef það <ref idTerm=2223>mælist</ref> stærra en <ref idTerm=4167>rétt horn</ref>	Á eftirfarandi mynd er hornið $\angle BOC$ gleitt: 	
1648	gleitt horn, gleiðhorn, sljótt horn, sljóhorn			
1649	gleymskuvarpi			
1650	gleypið ástand			


1651	gleypið mengi			
1652	gleypilíkindi			
1653	gleyping			
1654	gleypinn			
1655	gleypinn tálmi			
1656	gleypiregla			
1657	gloppa			
1658	gloppa, eyða			
1659	gloppuröð, eyðuröð			
1660	gloppusetning, eyðusetning			
1661	gná			
1662	gnæfur			
1663	Gödel-tölusetning			
1664	gögn			
1665	götuð hringskífa			
1666	götuð tvinntalnaslétt			
1667	gráða, horngráða, bogagráða	<ref idTerm=3072>Mælieining</ref> sem oft er notuð til að mæla stærð <ref idTerm=2276>hringboga</ref> og <ref idTerm=2198>horna</ref> sem er fengin með því að skipta hring í 360 <ref idTerm=0>eins</ref> boga sem kallast <i>gráður</i> og eru táknaðar með 1°	Eftirfarandi mynd sýnir ýmis horn <ref idTerm=887>einingarhrings</ref> auk stærð þeirra í bæði gráðum og <ref idTerm=478>radiönunum</ref>: 	
1668	gráðubogi			
1669	grannalgebra			
1670	grannbaugur			
1671	grannfræði			
1672	grannfræðileg óbreyta			
1673	grannfræðilegur, grann-			
1674	grannfræðingur			
1675	granngrúpa			
1676	grannhnútur, grannstæður hnútur			


1677	grannhorn, aðlæg frændhorn	Ef tvö <ref idTerm=2198>horn</ref> hafa einn sameiginlegan <ref idTerm=334>arm</ref> og hinir armarnir eru <ref idTerm=3400>gagnstæðar</ref> <reg idTerm=1840>hálfínur</ref> , þá er sagt að hornin séu <i>grannhorn</i>	Á eftirfarandi mynd eru $\angle COB$ og $\angle BOA$ grannhorn:	Laga bakgrunnslit
				
1678	grannhvel			
1679	grannleggur, grannstæður leggur			
1680	grannmóta			
1681	grannmótun			
1682	grannmynstur			
1683	grannnet			
1684	grannör, grannstæð ör			
1685	grannrúm			
1686	grannstæður hornpunktur			
1687	grannsvið			
1688	grannviðátta			
1689	Grassmann-margfeldi, Grassmann-feldi, ytra margfeldi, útfeldi			
1690	Grassmann-viðátta			
1691	grein breiðboga, grein gleiðboga			
1692	greinargott mengi, Súslín-mengi			
1693	greining, stærðfræðigreining, stærðfræðileg greining			
1694	grennd			
1695	grenndagrunnur, grunnur af grenndum			
1696	grenndakerfi			
1697	grenndarinndragi			
1698	grenndasía			
1699	grennsl			
1700	grennslafylki, hnútafylki			
1701	greyping			
1702	greipt frymið íðal			
1703	greiptur			
1704	grind			
1705	grind			
1706	grindafræði			
1707	grindamótun			
1708	grindargrúpa			
1709	gróf nálgun			

1710	gróf tala, snyrt tala			
1711	grófara grannmynstur, veikara grannmynstur			
1712	gróft mat			
1714	grunnbaugur			
1715	grunneining			
1716	grunnflötur			Hvað á að vísa í hér?
1717	grunnform			
1718	grunnfylki			
1719	grunnhorn			
1720	grunnhringur			
1721	grunnlausn			
1722	grunnlausn, stofnlausn			
1723	grunnlína			
1724	grunnlína			
1725	grunnlota			
1726	grunnlota, stofnlota, minnsta lota			
1727	grunnlotukerfi			
1728	grunnpunktur			
1729	grunnpunktur			
1730	grunnpunktur, miðja			
1731	grunnreikningsaðgerð			
1732	grunnrúm			
1733	grunnstæð sönnun			
1734	grunnstætt fall			
1735	grunnstak, stak í grunni			
1736	grunnsvið			
1737	grunntala náttúrlegs logra, stofntala náttúrlegs logra			
1738	grunntala, stofntala			
1740	grunnur, opinn grunnur			
1741	grunnvigur			
1742	grúpa			
1743	grúpa með virkjum			
1744	grúpuaðgerð			
1745	grúpueinsmótun			
1746	grúpufræði			
1747	grúpumiðja, miðja			
1748	grúpumótun, grúpusammótun			
1749	grúpumynstur			
1750	grúpuríki			
1751	grúputafla			
1752	grúpuútvíkkun, grúpuvíkkun			
1753	grúpuverkun, verkun grúpu			
1755	grýpi			

1756	gullinn rétthyrningur	<ref idTerm=4175>Rétthyrningur</ref> með <ref idTerm=2048>hliðar</ref> a, b þar sem $b > a$ sem uppfylla $\frac{b-a}{a} = \frac{a}{b}$		Sýna mynd
1757	gullinsnið	<ref idTerm=2072>Hlutfall</ref> <ref idTerm=2048>hliða</ref> í <ref idTerm=1756>gullnum rétthyrningi</ref> sem hefur gildið $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, oft táknað φ		
1758	há-, óstækkanlegur			
1759	Haar-mál			
1760	háðar hendingar			
1761	háðir atburðir			
1762	háður			
1763	hæð			
1764	hæðafótpunktaþríhyrningur			
1765	hæðarflötur			
1767	hæðarlína, hæðarferill			
1768	hæðarsetning			
1769	hæðarslétta			
1770	hæðasetning			
1771	hæðaskurðpunktur, hæðapunktur			
1772	hæði			
1773	hægra einingarstak			
1774	hægra hjámengi			
1775	hægra íðal			
1776	hægri aðoki			
1777	hægri afleiða, afleiða frá hægri			
1778	hægri andhverfa, andhverfa frá hægri			
1779	hægri deildanleiki, deildanleiki frá hægri, hægri diffranleiki, diffranleiki frá hægri			
1780	hægri dreifregla	Sjá <ref idTerm=723>dreifiregla</ref>		
1781	hægri endapunktur			
1782	hægri grennd			
1783	hægri handar hnitakerfi			
1784	hægri hávísir			
1785	hægri hlið			
1786	hægri hornklofi			
1787	hægri lágvísir			
1788	hægri mótull			
1789	hægri oddklofi			
1790	hægri oddsvigi			

1791	hægri samsemdarmótun		
1792	hægri svigi		
1793	hægri umhverfa, umhverfa frá hægri, hægri andhverfa, andhverfa frá hægri		
1794	hægrismúin skrúflína		
1795	hægrismúinn		
1796	hægrismúinn ferill		
1797	hægvaxandi, hægstígandi		
1798	hækka upp		
1799	hækkun		
1800	hækkunarskekkja		
1801	hærri afleiða		
1802	hærri liður, liður af hærri röð, liður af herra stigi		
1803	hæsta stig, hástig		
1804	hafa (lausn)		
1805	hafa í för með sér, leiða af sér, leiða til		
1806	háflötur		
1807	hafna, vísa frá		
1808	hágildispunktur		
1810	hágildissetning, hágildislögmál, háalgildissetning, háalgildislögmál		
1811	hagstæður atburður		
1812	hagstætt tilfelli		
1813	hagtölfræði		
1814	háíðal, óstækkanlegt íðal		
1815	háíðalarúm		
1816	hákeðja, óstækkanleg keðja		
1817	hákeðjulögmál Hausdorffs		
1818	hálágmark		
1819	hálágmarkslausn		
1820	hálágmarksleikáætlun, hálágmarksáætlun		
1821	hálágmarkslögmál, fjalldalaregla		
1822	hálágmarkssetning		
1823	haldagripur		
1824	haldahvel, kúluhvel með handföngum		
1825	hálf lota, hálfloða		
1826	hálf-, næstum		
1827	hálfakveðinn		
1828	hálfás		
1829	hálfbaugur		
1830	hálf einfaldur		
1831	hálfirð		
1832	hálfleygaður varpi		
1833	hálf gildingsfirð, gervifirð		


1834	hálfgrúpa			
1835	hálfgrúpumótun			
1836	hálfhlíðarregla			
1837	hálfhornrækinn			
1838	hálfhringur			Skilgreina
1839	hálfhvel			
1840	hálf lína	<ref idTerm=457> Bil</ref> sem hefur nákvæmlega einn endapunktur	Eftirfarandi myndir sýna mismunandi gerðir hálf lína:  Á fyrstu myndinni má sjá hálf línuna $[a, \infty)$, á annarri myndinni hálf línuna (a, ∞) , á þriðju myndinni hálf línuna $(-\infty, a]$ og á seinustu myndinni hálf línuna $(-\infty, a)$	Skilgreina líka hálf línu í flatarmyndarfræði.
1841	hálf línulegur			
1842	hálf flograpappír			
1843	hálf flokað bil	Samheiti fyrir <ref idTerm=1844>hálf opið bil</ref>		


1844	hálfopið bil	<ref idTerm=457>Bil</ref> með tvo endapunkta sem inniheldur nákvæmlega einn þeirra	Eftirfarandi myndir sína hálfopin bil:  Á fyrri myndinni inniheldur bilið einungis hægri endapunkt sinn og á síðari myndinni inniheldur bilið einungis vinstri endapunkt sinn	
1845	hálfgrúm			
1846	hálfsamfelldni			
1847	hálfsamfelldur			
1848	hálfsamfelldur að neðan			
1849	hálfsamfelldur að ofan			
1850	háflslétta			
1851	hálfstaðall, hálfgildingsstaðall			
1852	hálfstig			
1853	hálf tvíflínulegur			
1854	hálfur langás			
1855	hálfur meginás			
1856	hálfur miðstrengur			
1857	hálfur skammás			
1858	hálfur þverás			
1859	hali			
1860	hallahorn			
1861	halli			
1862	halli			
1863	halli, hallatala			Skilgreina
1864	hámarka			
1865	hámarkalágmörkun			
1866	hámarksleikáætlun, hámarksáætlun			
1867	hámarksskekkja			
1868	hámarksstaðall			
1869	hamfarafræði			
1870	hamför			
1871	Hamilton-fertala			
1872	Hamilton-rás			
1873	Hamilton-vegur			

1874	Hamilton-virki			
1875	hámörkun			
1876	handfang			
1877	happ			
1878	harðger			
1879	háreisl			
1880	háreislur			
1881	Hartogs-svæði			
1882	háslétta			
1883	hástak, óstækkanlegt stak			
1884	háttargrind			
1885	háttarlögmál			
1886	háttarökfræði			
1887	háttur			
1888	haus eða sporður			
1889	Hausdorff-grannmýnstur			
1890	Hausdorff-rúm			
1891	Hausdorff-vídd			
1892	hávísir, brjóstvísir			
1893	hefja (í veldi)			
1894	hefja í annað veldi			
1895	heil línuleg færsla			
1896	heil tala, heiltala	<ref idTerm=3270>Mengið</ref> $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N})$ kallast mengi <i>heillra talna</i>		Þessi skilgreiningu er mjög ábótavant en salta hana í bili
1897	heil veldaröð			
1898	heilbaugur			
1899	heild			
1900	heilda-, heildunar-, heildis-, tegur-			
1901	heilda, tegra			
1902	heildajafna, tegurjafna			
1903	heildanlegur, teganlegur			
1904	heildanleikaskilyrði, teganleikaskilyrði			
1905	heildanleiki, teganleiki			
1906	heildarafleiða			
1907	heildareikningur, tegurreikningur			
1908	heildarfylgni			
1909	heildari, tegrari			
1910	heildarlausn, almenn lausn, fullkomin lausn			
1911	heildarskekkja			
1912	heildarsumma			
1913	heildarsumma, lokasumma			
1914	heildarvik			
1915	heildi, tegur			

1916	heildisfærsla, heildismyndun, heildisum- myndun, tegurfærsla, tegurmyndun, teg- urummyndun			
1917	heildisformúla, tegurformúla			
1918	heildismælir, tegurmælir			
1919	heildispróf, tegurpróf			
1920	heildissetning, tegursetning			
1921	heildisstofn, tegurstofn			
1922	heildisteiknari, tegurteiknari			
1923	heildisvíðátta			
1924	heildisvirki, heildunarvirki, tegurvirki, tegrunarvirki			
1925	heildun með innsetningu, tegrun með inn- setningu, innsetningaraðferð			
1926	heildun, tegrun			
1927	heildunarbíl, tegrunarbíl			
1928	heildunarbreyta, tegrunarbreyta			
1929	heildunarfasti, tegrunarfasti			
1930	heildunarferill, heildunarvegur, tegrunar- ferill, tegrunarvegur			
1931	heildunarfræði, tegurfræði			
1932	heildunarsvæði, tegrunarsvæði			
1933	heildunarvirki, tegrunarvirki			
1934	heildunarþáttur, tegrunarþáttur			
1935	heill			
1936	heill snúningur			
1937	heilleg lokun			
1938	heilleg útvíkkun, heilleg baugsútvíkkun, heilleg víkkun, heilleg baugsvíkkun			
1939	heillega lokaður			
1940	heillegur			
1941	heilsteypt grúpa			
1942	heilsteypt mengi			
1943	heilsteypt net			
1944	heilsteyptur töfraferningur			
1945	heilsteyptur, fullgerður			
1946	heilt fall			
1947	heilt margfeldi, margfeldi			

1948	heilt rætt fall, margliða	<ref idTerm=5097>Stæða</ref> af gerðinni $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$ þar sem $a_0, \dots, a_n$ eru <ref idTerm=4093>rauntölur</ref> og $a_n \neq 0$, kallast <i>margliða</i>. Tölurnar $a_0, \dots, a_n$ kallast <i>stuðlar</i> margliðunnar og kallast þá a_n <i>forystustuðull</i> hennar og a_0 <i>fastastuðull</i> hennar. <ref idTerm=5102>Stærðirnar</ref> $a_i x^i$ kallast <i>liðir</i> margliðunnar og kallast þá $a_n x^n$ <i>forystuliður</i> hennar og a_0 <i>fastaliður</i> hennar. Talan n kallast <i>stig</i> margliðunnar og er það táknað með $\deg(P)$	Stuðlar margliðu þurfa ekki endilega að vera rauntölur. Almennt þarf <ref idTerm=3270>stuðlamengið</ref> bara að vera <ref idTerm=419>baugur</ref>. Þegar allir stuðlar gefinnar margliðu koma úr einhverju gefnu <ref idTerm=5415>talnakerfi</ref> $\mathbb{K}$ sem hefur svipaða <ref idTerm=803>eiginleika</ref> og $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ eða $\mathbb{C}$, þá er sagt að hún sé <i>margliða yfir</i> $\mathbb{K}$. Oft má líta á gefna margliðu sem margliðu yfir mörg mismunandi talnamengi	Vantar færslu fyrir fastamargliðu: “Margliða sem hefur enga liði aðra en fastaliðinn kallast <i>fastamargliða</i>” - Hægt að gera skilgreininguna ennþá kjarnyrtari?
1949	heilt stak, heilstak			
1950	heiltölubestun			
1951	heiltölufylki			
1952	heiltölugildur			
1953	heiltöluhjúpur			
1954	heiltöluhlutafall, gólfvall			
1955	heiltöluhluti			
1956	heiltölulausn			
1957	heimfærð stærðfræði			
1958	heimfærður			
1959	heiti			
1960	helminga			
1961	helmingalína			

1962	helmingalína horns	<ref idTerm=2911>Lína</ref> sem fer í gegnum <ref idTerm=3661>oddpunkt</ref> <ref idTerm=2198>horns</ref> og skiptir horninu í tvö <ref idTerm=0>eins</ref> horn kallast <i>helmingalína hornsins</i> Stundum á orðið helmingalína einungis við <ref idTerm=1840>hálfínuna</ref> með endapunkt í oddpunkti hornsins sem liggur innaní horninu. Eftirfarandi mynd sýnir helmingalínu hornsins A:  Helmingalínur horna <ref idTerm=6438>þríhyrnings</ref> <ref idTerm=4771>skerast</ref> allar í einum <ref idTerm=4001>punkti</ref> en <ref idTerm=4845>skurðpunkturinn</ref> er miðja <ref idTerm=2418>innritaðs hrings</ref> þríhyrningsins	
1963	helmingaslétta		
1964	helmingun		
1965	hending, slembibreyta, slembistærð, slemba		
1966	herma, með sveiflun		
1967	herming		
1968	hermísk firð, Hermite-firð		
1969	hermískt form, Hermite-form		
1970	hermískt innfeldi, innfeldi		
1971	hermískt innfeldisrúm, hermískt rúm, innfeldisrúm		
1972	hermískur		
1973	hermískur virki		

1974	Héronsregla	Ef þríhyrningur hefur hliðarlengdir a, b og c og $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$ er hálfth ummálið, þá segir <i>regla Herons</i> að flatarmál þríhyrningsins sé $F = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}.$	 Ef þríhyrningurinn hér að ofan hefur hliðarlengdir $a = 13$, $b = 16$ og $c = 21$ þá er $s = 25$ og við getum reiknað flatarmálið með $F = \sqrt{25 \cdot (25 - 13) \cdot (25 - 16) \cdot (25 - 21)} = 30 \cdot \sqrt{15}$	Vantar færslu fyrir hliðarlengd
1975	herping, samdráttur			
1976	Hesse-ákveða			
1977	Hesse-fylki			
1978	Hilbert-rúm			
1979	Hilbert-teningur			
1980	himinaffræði, himinhreyfingafræði, hnattlhreyfingafræði			
1981	himinhvel, himinhvolf, himinhvelfing, himinkúla			
1982	hindranafræði			
1983	hindrun			
1984	hitajafna, varmaleiðnijafna			
1985	hjáaðoka, aðoka frá hægri			
1986	hjáalgebra			
1987	hjáendanlegur			
1988	hjágrúpa			
1989	hjáhæð, dýpt			
1990	hjájaðar			
1991	hjájaðarvirki			
1992	hjájaðra			
1993	hjájöðrun			
1994	hjákarteskur feringur			
1995	hjákeðja			
1996	hjákeðjufléttingur			
1997	hjákjarni			
1998	hjálokaður			


1999	hjálparlína			
2000	hjálparsetning			
2001	hjálparsetning Zorns			
2002	hjámagurt mengi			
2003	hjá margfeldi, summa			
2004	hjá mengi			
2005	hjá mynd			
2006	hjárás			
2007	hjartaferill			
2008	hjá samtoga			
2009	hjá samtogun			
2010	hjá svipfræði			
2011	hjá svipfræði			
2012	hjá svipfræðibaugur			
2013	hjá svipfræðiflokkur			
2014	hjá svipfræðigrúpa			
2015	hjá trefjasumma, trefjasumma			
2016	hjá trefjun			
2017	hjá varpi, andbrigður varpi, mótbrigður varpi			
2018	hjá vidd, fyllividd			
2019	hjá vigur, hávektor			
2020	hjá þáttafylki, fylgiþáttafylki			
2021	hjá þáttur, fylgiþáttur			
2022	hjóla			
2023	hjóla			
2024	hjólaferill			
2025	hjólaflatarhnútur			
2026	hjólaflötungur, hjólaþykkvi			
2027	hjólaflötur, hringfeldi			
2028	hjúfrun			
2029	hjúfur-			
2030	hjúfurhringur, krappahringur, sveigjuhringur			
2031	hjúfurhvel, krappahvel, sveigjuhvel, hjufrurkúla, krappakúla, sveigjukúla			
2032	hjufrurslétta			
2033	hjufrursnertill			
2034	hjuþferill			
2035	hjuþflötur			
2036	hjuþur			
2037	hjuþur			
2038	hlaupakommureikningur			
2039	hlaupandi meðaltal			
2040	hlaupandi, breytilegur			


2041	hlaupavísir, breytilegur vísir			
2042	hleðsla			
2043	hlekking, hlekkjafesti, festi			
2044	hlekkjaður, samhlekkjaður, samslunginn			
2045	hlekkjunartala			
2046	hlekkur			
2048	hlið, hliðarlína, hliðarstrik	Sjá <ref idTerm=3161>marghyrningur</ref>		
2049	hliðarhorn			
2050	hliðarsetning, samantekt			
2051	hliðarvirki			
2052	hliðhjólferill			
2053	hliðraður			
2054	hliðranagrúpa			
2055	hliðruð línuleg deildajafna, hliðruð línuleg diffurjafna			
2056	hliðrun	<ref idTerm=5779>Færsla</ref> τ á tiltekinni <ref idTerm=4884>sléttu</ref> kallast <i>hliðrun</i> ef hún hefur eftirfarandi tvo <ref idTerm=803>eiginleika</ref>: 1. <ref idTerm=1204>fjarlægðin</ref> milli A og $\tau(A)$ er sú sama fyrir alla <ref idTerm=4001>punkta</ref> A , 2. <ref idTerm=1840>hálfínurnar</ref> frá A í gegnum $\tau(A)$ tilgreina sömu <ref idTerm=5135>stefnuna</ref> fyrir alla punkta $A \neq \tau(A)$	Hlutlausa færslan telst líka til hliðrana; hún hefur hinsvegar enga tiltekna stefnu. Hliðranir hafa eftirfarandi eiginleika: 1. Hliðranir varðveita lengdir allra <ref idTerm=2958>strika</ref> og eru því <ref idTerm=1328>flutningar</ref>. 2. Ef τ er hliðrun, þá eru línurnar l og $\tau(l)$ <ref idTerm=4509>samsíða</ref>. Einu flutningarnir sem hafa þennan eiginleika eru hliðranir og <ref idTerm=0>punktspeglanir</ref>. 3. Flutningur sem heldur engum punkti kyrrum er hliðrun. 4. Samskeyting tveggja hliðrana er hliðrun.	Finna mynd
2057	hliðrun til hægri, hægri hliðrun			
2058	hliðrun til vinstri, vinstri hliðrun			
2059	hlutafleiða			
2060	hlutafleiða (í punkti)			
2061	hlutafleiðujafna			
2062	hlutafleiðuvirki			
2063	hlutákveða			
2064	hlutalgebra			
2065	hlutbaugur			
2066	hlutbil			

2067	hlutbrot			
2068	hlutdeildanlegur, hlutdiffralegur			
2069	hlutdeildun, hlutdiffrun			
2070	hluteinsfirðun			
2071	hluteinungur			
2072	hlutfall	<i>Hlutfallið milli tveggja talna a og $b \neq 0$ er fyrri talan deild með þeirri síðari</i>		
2073	hlutfalla jafna			
2074	hlutfallsleg skekkja			
2075	hlutfallsleg tíðni			
2076	hlutfallslegt tíðnifall			
2077	hlutfallslegur vöxtur			
2078	hlutfallspróf			
2079	hlutfallsstuðull, hlutfallspáttur			
2080	hlutfallstala, hlutfallspáttur			
2081	hlutfjölskylda			
2082	hlutflokkur			
2083	hlutfylgni			
2084	hlutfylgnistuðull			
2085	hlutfylki			
2086	hlutgrind			
2087	hlutgrúpa			
2088	hlutheildun, hluttegrun			
2089	hluti, partur			
2090	hlutíðal			
2091	hlutkenning			
2092	hlutkerfi			
2093	hlutlaus			
2094	hlutlaus rúmfræði			
2095	hlutleysuþáttur			
2096	hlutlíkan			
2097	hlutmargfeldi, margfeldisstúfur			


2121	hlutteljari			
2122	hluttré			
2123	hlutur, gripur			
2124	hlutúrtak			
2125	hlutvera, hlutmengisvensl			
2126	hlutverutákn			
2127	hlutvíðátta			
2128	hlutvíðerni			
2129	hlutvigurrúm, línulegt hlutrúm			
2130	hlutþakning			
2131	hnappelda			
2132	hneppishraði, hnapphraði			
2133	hnig			
2134	hnigaðferð			
2135	hnigaðferð mesta bratta			
2136	hnigskref			
2137	hnik			
2138	hnikaafleiða			
2139	hnikajafna			
2140	hnikalögmál			
2141	hnikareikningur			
2142	hnikaverkefni			
2143	hnit	Sjá <ref idTerm=2145>hnitakerfi</ref>		
2144	hnit, stak, stuðull			
2145	hnitakerfi	<ref idTerm=4541>Samsvörun</ref> milli <ref idTerm=4001>punkta</ref> í <ref idTerm=6087> <i>n</i> -víðu</ref> <ref idTerm=4266>rúmi</ref> og <ref idTerm=6> <i>n</i> -undar</ref> af <ref idTerm=5397>tölum</ref> sem kallast <i>hnit</i> . Hnitin eru notuð til að staðsetja punkta í rúminu	Fjalla um almennari hnitakerfi.	Hægt að skilgreina þetta á formlegri hátt án þess að kafa of djúpt? Endurhugsa aðeins skilgreininguna, hún er ekki mjög skýr - Koma með dæmi um hnitakerfi
2146	hnitapappír			
2147	hnitarúmfræði, hnitafræði			
2148	hnitás, hnitaás			
2149	hnitaskiptafylki, grunnskiptafylki			
2150	hnitaskiptavörpun			
2151	hnitaskipti, hnitafærsla			
2152	hnitfall, hnitafall			
2153	hnitgrennd, hnitagrennd			
2154	hnitrúm, hnitarúm			
2155	hnitslétta, hnitaslétta			
2156	hnöttóttur, kúlulaga			
2157	hnútafræði			
2158	hnútalitun			


2159	hnútamengi			
2160	hnútflötur			
2161	hnútgrúpa			
2162	hnútsnet, örnet			
2163	hnútur			
2164	hnútur, gálma			
2165	hnútur, punktur			
2166	hnýttur			
2167	höfnun, frávísun			
2168	höfnunarfall, styrkleikafall, styrkfall			
2169	höfnunarhætta			
2170	höfnunarlíkindi, frávísunarlíkindi			
2171	höfnunarlíkindi, frávísunarlíkindi			
2172	höfnunarlína, frávísunarlína			
2173	höfnunarmark, frávísunarmark			
2174	höfnunarmistök			
2175	höfnunarsvæði, frávísunarsvæði			
2176	höfuðásaaðferð, meginásaaðferð			
2177	höfuðdeilir			
2178	höfuðgildi, megingildi			
2179	höfuðgrein, megingrein			
2180	höfuðhlutákveða			
2181	höfuðhluti			
2182	höfuðíðal			
2183	höfuðíðalbaugur			
2184	höfuðíðalsetning			
2185	höfuðkrappageisli, meginkrappageisli, höfuðsveigjugeisli, meginsveigjugeisli			
2186	höfuðkrappamiðja, krappamiðja, sveigjumiðja			
2187	höfuðkrappi, meginkrappi, höfuðsveigja, meginsveigja			
2188	höfuðlausn			
2189	höfuðsnertill, meginsnertill			
2190	höfuðstóll			
2191	höfuðturn			
2192	hófur			
2193	höggbylgja			
2194	högun			
2195	hóptíðni			
2196	hópur			
2197	hóppáttur, flokkspáttur			




2198	horn	Tvær <ref idTerm=1840>hálfínur</ref> með sama <ref idTerm=5850>upphafspunktur</ref> eru sagðar mynda <i>horn</i>. Upphafspunktur hálfínanna kallast þá <i>oddpunktur</i> hornsins og hálfínurnar kallast <i>armar</i> þess. Horn með oddpunkt <i>O</i> er táknað $\angle O$. Ef <i>A</i> og <i>B</i> eru tveir punktar sem liggja á sitthvorum armi hornsins þá er einnig hægt að tákna hornið $\angle AOB$	Á eftirfarandi mynd sést horn með oddpunkt <i>O</i> og arma <i>h</i> og <i>k</i>:  Þegar armar horns liggja ekki á sömu <ref idTerm=2911>línu</ref>, þá er sagt að hornið sé <i>eiginlegt</i>. <ref idTerm=4001>Punktur</ref> sem ekki liggur á örmum eiginlegs horns er <i>innaní</i> horninu ef hann liggur á <ref idTerm=2958>línustriki</ref> með endapunkta á örmum þess, en <i>utanvið</i> hornið annars. Athugið að sérhver tvö línustrik með sameiginlegan endapunkt sem eru innihaldin í horninu mynda jafnframt sama horn	
2199	horn, stefnuhorn, áttarhorn, horngildi			
2200	horn, stefnuhorn, áttarhorn, hornhnit			
2201	horna-, hornafræði-			
2202	hornafall			Skilgreina
2203	hornafallamargliða			
2204	hornafallaröð			
2205	hornafleiða			
2206	hornafræði			
2207	horalína			
2208	horalínu-reitafylki			
2209	horalínuaðferð			
2210	horalínuaðferð Cantors			
2211	horalínuaðhvarf			
2212	horalínufylki			
2213	horalínugera, hornalínufæra			
2214	hornalínugerð			
2215	hornalínugerlegur			
2216	hornalínugerningur			
2217	hornalínugná			
2218	hornalínugnæfur			
2219	hornalínureitur			
2220	hornalínustak, hornalínustuðull			

2221	horalínuvörpun			
2222	horalínuþríhyrningur			
2223	hornamál	Til þess að bera saman tvö eiginleg horn, þá flytjum við annað hornið þannig að annar armur hornanna sé sameiginlegur og þannig að sérhver punktur innaní öðru horninu liggi líka innaní hinu horninu. Þá getur þrennt gerst: 1. Hinn armur flutta hornsins fellur saman við hinn arm óhreyfða hornsins. Þá eru hornin <i>jafn stór</i>, eða einfaldlega <i>eins</i> 2. Hinn armur flutta hornsins lendir á milli arma óhreyfða hornsins. Þá er flutta hornið minna en óhreyfða hornið, sem er þá jafnframt <i>stærra</i> en flutta hornið 3. Hinn armur flutta hornsins lendir utanvið óhreyfða hornið. Þá er flutta hornið stærri en óhreyfða hornið, sem er þá jafnframt <i>minna</i> en flutta hornið	Stærð horns er oft mælt í gráðum eða radíönum	Sér færsla fyrir eiginlegur með skilgreiningu og vísa i hana. Spurning líka hvort hér eigi að skilgreinar stærð horns, þ.e. hvernig eigi að mæla horn, ekki samanburð á stærð tveggja horna. Og spurning hvert textinn um samanburð ætti að fara.
2224	hornamál, hornmál			
2225	hornasumma	Summa allra horna í marghyrningi	Auðvelt er að finna hornasummu marghyrnings með því að skipta honum upp í þríhyrninga. Hægt er að skipta n-hyrningi upp í $n - 2$ þríhyrninga, svo að hornasumma n-hyrnings er $(n - 2) \cdot 180$. Sem dæmi er hægt að skipta fimmhyrningnum $ABCDE$ að neðan í þrjá þríhyrninga, svo að hornasumma hans er $(5 - 2) \cdot 180^\circ = 540^\circ$: 	

2226	hornaukasetning			
2227	hornfjarlægð			
2228	hornhraði			
2229	hornhröðun			
2231	hornklofamargfeldi, Lie-margfeldi			
2232	hornklofamargföldun, Lie-margföldun			
2233	hornklofi			
2234	hornmínúta			
2235	hornpunktur, oddpunktur	<ref idTerm=4001>Punktur</ref> þar sem tvær <ref idTerm=2048>hliðar</ref> <ref idTerm=3161>marghyrnings</ref> <ref idTerm=4771>skerast</ref> (í tveimur <ref idTerm=6087>víddum</ref>) eða punktur þar sem þrjár eða fleiri <ref idTerm=1325>hliðar</ref> <ref idTerm=3133>margflötungs</ref> skerast (í þrem víddum)		Ræða almenna margflötunga í skýringu - Þessi skilgreining virkar ekki ef margflötungurinn sker sjálfan sig
2236	hornrækin vörpun			
2237	hornrækinn			
2238	hornrækni			
2239	hornræknirúmfræði			
2240	hornrétt liðun, þverstæð liðun, þverliðun			
2241	hornrétt ofanvarp			
2242	hornréttur			
2243	hornsekúnda			
2244	hraði			
2245	hraði			
2246	hraðminnkandi, hraðfallandi			
2247	hraður			
2248	hraðvaxandi, hraðstækkandi			
2249	hreiðraður			
2250	hreiðruð bíl			
2251	hreiðruð margföldun			
2252	hreiðruð tvískipting			
2253	hreiður			
2254	hrein algebra			
2255	hrein rúmfræði			
2256	hrein stærðfræði			
2257	hrein torræð útvíkkun, hrein torræð víkkun			
2258	hreinlega óaðskiljanleg útvíkkun, óaðskiljanleg útvíkkun, hreinlega óaðskiljanleg víkkun, óaðskiljanleg víkkun			


2259	hreint lotutugabrot, hreint umferðartuga- brot			
2260	hreintóna deildajafna			
2261	hreintóna hreyfing			
2262	hreintóna sveifill			
2263	hreintóna sveifla, hrein sveifla			
2264	hreinvíður			
2265	hreinvíður			
2266	hreyfanleg sérstaða, hreyfanlegur sér- stöðupunktur			
2267	hreyfifræði			
2268	hreyfihnitakerfi			
2269	hreyfilýsing, gangfræði			
2270	hreyfing			
2271	hreyfingarfasti			
2272	hreyfirammi, hreyfigrunnur			
2273	hringabundin, bundin af hringjum			
2274	hringaðferð			
2275	hringbogapríhyrningur			
2276	hringbogi, bogi, örk	Sá hluti <ref idTerm=2295>hrings</ref> sem liggur milli tveggja <ref idTerm=4001>punkta</ref> kallast <i>hringbogi</i>	<ref idTerm=2198>horninu</ref> $\angle AMB$ er dekkri:  Þegar talað er um bogann AB er jafnan átt við þann minni	Laga bakgrunnslit
2277	hringfari			
2278	hringfeldisgrúpa			
2279	hringgrúpa			
2280	hringhreyfing			

2281	hringhverfing punkts, spegilmynd punkts í hring			
2282	hringhverfing, hringspeglun, speglun í hring			
2283	hringjaðar, hringferill			
2284	hringkragi, kragi			
2285	hringlaga, kringlóttur, hring-			
2286	hringsamhverfni			
2287	hringskiptijafna			
2288	hringskiptimargliða			
2289	hringskipting			
2290	hringskiptisvið			
2291	hringsneið, sneið			
2292	hringsvæði			
2294	hringur			
2295	hringur, hringferill, hringlína	<ref idTerm=3270>Mengi</ref> þeirra <ref idTerm=4001>punkta</ref> í tiltekinni <ref idTerm=4884>sléttu</ref> sem eru í sömu <ref idTerm=1204>fjarlægð</ref> frá punkti sem liggur á sléttunni sem kallast þá <i>miðja</i> hringsins	Hring með geisla r má einnig skilgreina sem mengi punkta (x,y) sem uppfylla <ref idTerm=2478>jöfnuna</ref> $x^2 + y^2 = r^2.$ Eftirfarandi mynd sýnir hring með miðju M og <ref idTerm=1619>geisla</ref> r : 	
2296	hringvik			
2297	hringvika			
2298	hringvikshorn			
2299	hrísla			
2300	hröð samleitni			
2301	hröðun			
2302	hugarreikningur			
2303	hugartilraun			
2304	hugbúnaður			


2305	hugsaður			
2306	hugtak			
2307	huldureikningur			
2308	hulduvísir			
2309	hundraðshlutamark, hundraðsmark			
2310	hvarf			
2311	hvarf			
2312	hvarfflötur			
2313	hvarfgildi			
2314	hvarfgildi, stöðugildi			
2315	hvarfpunktur, hvarf, jafnvægispunktur, stöðupunktur			
2316	hvarfsetning			
2317	hvass	<ref idTerm=2198>Horn</ref> kallast <i>hvasst</i> ef það <ref idTerm=2223>mælist</ref> minna en <ref idTerm=4167>rétt horn</ref>	Á eftirfarandi mynd er $\angle AOB$ hvasst horn: 	Laga bakgrunnslit
2318	hvasshyrndur	<ref idTerm=6438>Þríhyrningur</ref> kallast <i>hvasshyrndur</i> ef öll <ref idTerm=2198>horn</ref> hans eru <ref idTerm=2317>hvöss</ref>	Eftirfarandi mynd sýnir hvasshyrndan þríhyrning: 	
2319	hvel, kúluhvel, kúluflötur, kúluyfirborð	<ref idTerm=3270>Mengi</ref> þeirra <ref idTerm=4001>punkta</ref> sem eru í sömu <ref idTerm=1204>fjarlægð</ref> frá tilteknum punkti sem kallast <i>miðja</i> kúluhvelsins	Eftirfarandi er mynd af kúluhveli: 	Finna betri mynd
2321	hvelfdur			


2322	hvelft fall			
2323	hvelft horn			
2324	hverfa alls staðar, vera alls staðar núll			
2325	hverfa, verða núll			
2326	hverfandi, sem hverfur			
2327	hverfipunktur, beygjuskil			
2328	hverfisnertill, beygjuskilasnertill			
2329	hverfitregða, tregðuvægi			
2330	hverfull, svipull			
2331	hverfulleiki			
2332	hverfult ástand			
2333	hvergi deildanlegur, hvergi diffranlegur			
2334	hvergi núll			
2335	hvergi samleitinn			
2336	hvergi þéttur			
2337	hversdagsleg mengjafræði			
2338	hversu lítill sem vera skal			
2339	hversu stór sem vera skal			
2340	hvirfilhringur			
2341	hvirfilpunktur			
2342	hvirfilpunktur			
2343	hvirfilpunktur, miðja			
2344	hyrna			
2345	hyrnt hvel			
2346	hyrnuaðferð			
2347	hyrnubákn, hyrnuþyrping			
2348	hyrnufruma			
2349	hyrnukeðja			
2350	hyrnunálgun			
2351	hyrnurit			
2352	hyrnusvipfræði			
2353	hyrnuvörpun			
2354	í hið óendanlega			
2355	í jöfnum mæli			
2356	í öfugu hlutfalli við			
2357	í punkti, í hverjum punkti			
2358	í samræmi við röðun, raðvís			
2359	iða			
2360	iðal			
2361	iðal-			
2362	iðalflokkagrúpa			
2363	iðalflokkur			
2364	iðalgrúpa			
2365	iðalkeðja			
2366	iðurfeldi			


2367	íholur, íbjúgur			
2368	ílag			
2369	ílags-frálagsgreining			
2370	ílagsgögn			
2371	ílangur sporvölusnúðflötur			
2372	ílangur sporvölusnúðflötur			
2373	ílangur sporvölusnúður			
2374	ílangur sporvölusnúður			
2375	illa framsett verkefni			
2376	ilpunktur			
2377	ímyndaður hringur			
2378	innanmótun			
2379	innanverð víxlhorn, innri víxlhorn			
2380	innbyrðis óháðir atburðir			
2381	innbyrðis óháður			
2382	inndragi			
2383	inndráttur			
2386	inngeisli, geisli innritaðs hrings, geisli inn-ritaðrar kúlu			
2387	inngeisli, innri geisli, skammgeisli			
2388	innhjólferill			
2389	innhorn			
2390	innhyrndur			
2391	innhyrndur marghyrningur	<ref idTerm=832>Einfaldur marghyrningur</ref> sem er ekki <ref idTerm=2717>kúptur</ref>		
2392	innifalinn, umlukinn			
2393	innihald, Jordan-innihald			
2394	innihalda			
2395	innihaldslaus			
2396	innihaldslaus staðhæfing			
2397	innliðavíxl			
2398	innmengi, iður, innri kjarni, opinn kjarni			
2399	innmiðja, miðja innritaðs hrings, miðja innritaðrar kúlu			
2400	innmyndun, staðbundin greyping			
2401	innör			
2402	innra innihald, innra Jordan-innihald			
2403	innra mál, innanmál			
2404	innra margfeldi			
2405	innra meðalfervik, innri dreifni			
2406	innri aðgerð, innri reikniaðgerð			
2407	innri eiginleiki			
2408	innri firð			
2409	innri fylgni			

2410	innri helmingalína			
2411	innri jafna			
2412	innri margföldun			
2413	innri punktur			
2414	innri rúmfræði			
2415	innri sjálfmótun			
2416	innrita			
2417	innritaður			
2418	innritaður hringur, innanverður snerti-hringur	<ref idTerm=2295>Hringur</ref> er <i>innritaður</i> í <ref idTerm=3161>marghyrning</ref> ef allar <ref idTerm=2048>hliðar</ref> marghyrningsins eru <ref idTerm=4912>snertlar</ref> við hringinn	Eftirfarandi mynd sýnir þríhyrning með innrituðum hring: 	Laga bakgrunnslit
2419	innrituð kúla, innanverð snertikúla			
2420	innsæi, skjótsæi, snarskyggni			
2421	innsæiskenning			
2422	innsæisrökfræði			
2423	innsetjanlegur			
2424	innsetning			
2425	innsetning			
2426	innsetningaraðferð	<ref idTerm=41>Aðferð</ref> til þess að <ref idTerm=2870>leysa</ref> <ref idTerm=2548>jöfnuhneppi</ref> þar sem <ref idTerm=538>breytur</ref> eru einangraðar og síðan settar inn í aðrar <ref idTerm=2478>jöfnur</ref>		Koma með dæmi
2427	innsetningarfrumsenda, innsetningar-frumsetning, frumsenda um innsetningu, frumsetning um innsetningu			
2428	innsetningarregla			
2429	innsetningarregla			
2430	innstæður þvervigur, innstæður þverill, innri þvervigur, innri þverill			
2431	innstæður, innri			
2432	innstæður, innri			
2433	innstætt horn			
2434	innstig, inngráða			
2435	innsveifarferill			
2436	ítreka			
2437	ítrekað heildi, ítrekað tegur, endurtekið heildi, endurtekið tegur			

2438	ítrekun			
2439	ítrekun (vörpunar), ítrekuð vörpun			
2440	ítrekunaraðferð			
2441	ítrekunarfræði			
2442	ítrekunarrás, ítrekunarhringur, ítrekun- arlykkja			
2443	ítrekunarreikningur			
2444	ítrekunarskref			
2445	ívera			
2446	íverutákn			
2447	íveruvensl			
2448	Jacobi-ákveða			
2449	Jacobi-fylki			
2450	Jacobi-tákn			
2451	Jacobi-víðerni			
2452	Jacobson-rót			
2453	jaðar			
2454	jaðar			
2455	jaðar, jaðarferill			
2456	jaðarbogi			
2457	jaðarbútur			
2458	jaðardreifing			
2459	jaðarferill			
2460	jaðargildi			
2461	jaðargildisverkefni			
2462	jaðarhegðun			
2463	jaðarhringur			
2464	jaðarkúla			
2465	jaðarlag			
2466	jaðarpunktur			
2467	jaðarskilyrði			
2468	jaðarvíðátta			
2469	jaðarvirki			
2470	jaðarvörpun			
2471	jaðarþéttleiki			
2472	jaðraður			
2473	jafn að ummáli, ummálsjafn			
2474	jafn, jafnstór			
2475	jafn, sléttur			
2476	jafna Pells			
2477	jafna út			



2478	jafna, líking	<ref idTerm=1515>Yrðing</ref> sem lýsir því að tvær <ref idTerm=5102>stærðir</ref> séu <ref idTerm=2474>jafnar</ref>	Dæmi um jöfnu er staðhæfingin $q(x)$: „$x^2 = 1$“ sem er jafna með óþekktu <ref idTerm=5102>stærðina</ref> x. Þegar talan -1 er sett í stað óþekkту stærðarinnar fæst staðhæfingin $p(-1)$: „$(-1)^2 = 1$“, sem er <ref idTerm=6659>sönn</ref> yrðing. Þegar talan -2 er sett í stað óþekkту stærðarinnar fæst hins vegar staðhæfingin $p(-2)$: „$(-2)^2 = 1$“, sem er <ref idTerm=6624>ósönn</ref> yrðing	
2479	jafnaðarmerki, jöfnunarmerki, samasemmerki, samsemdarmerki			
2480	jafnarma	<ref idTerm=6438>Þríhyrningur</ref> kallast <i>jafnarma</i> ef hann hefur tvær jafn <ref idTerm=2860>langar</ref> <ref idTerm=2048>hliðar</ref>	Eftirfarandi er mynd af jafnarma þríhyrningi: 	Finna betri mynd
2481	jafnása breiðbogi, jafnhliða breiðbogi, réttstæður breiðbogi			
2482	jafnbreiður ferill			
2483	jafnbreytinn			
2484	jafndreifður			
2485	jafnfirðarferill			
2486	jafnfirðarferill			
2487	jafnfjarlægur			
2488	jafngildi			
2489	jafngildisflokkur	<ref idTerm=2098>Hlutmengi</ref> A í <ref idTerm=3270>mengi</ref> X sem uppfyllir fyrir öll $x,y \in A$ að x og y séu <ref idTerm=0>vensluð saman</ref> með tilliti til tiltekinna <ref idTerm=6592>jafngildisvensla</ref> og að $x \in A$ sé ekki venslað saman við neitt <ref idTerm=5128>stak</ref> í $X \setminus A$		Koma með dæmi (sama og í færslunni um jafngildisvensl?

2490	jafngildur			
2491	jafngildur í jöfnum mæli			
2492	jafngilt fylki			
2493	jafnhallaferill			
2494	jafnhallaferill			
2495	jafnhliða			
2496	jafnhliða þríhyrningur	<ref idTerm=6438>Þríhyrningur</ref> með allar <ref idTerm=2048>hliðar</ref> jafn <ref idTerm=2860>langar</ref>	Öll <ref idTerm=2198>horn</ref> jafnhliða þríhyrnings eru <ref idTerm=2223>jafn stór</ref>, reyndar mælast þau öll $\frac{2}{3}\pi$ <ref idTerm=478>radíana</ref> eða 60 <ref idTerm=1667>gráður</ref>. Eftirfarandi er mynd af jafnhliða þríhyrningi: 	Finna betri mynd
2497	jafnhlutfallaröð, kvótaröð, rúmkynja röð			
2498	jafnhlutfallaruna, kvótaruna			
2499	jafnhorna, sem mynda sama horn			
2500	jafnhornaferill			
2501	jafnhyrndur, með öll horn jöfn			
2502	jafnhyrningur, jafnhyrndur marghyrningur			
2503	jafnlíklegur			
2504	jafnmælisgrannmynstur			
2505	jafnmælismynstur			
2506	jafnmælisrúm			
2507	jafnmælisskorða			
2508	jafnmættisflötur			
2509	jafnmættislína			
2510	jafnmunaröð			
2511	jafnmunaruna			
2512	jafnsamfelldni			
2513	jafnsamfelldur			
2514	jafnsamleitinn			

2540	japanskur baugur			
2541	japönsk kúlnagrind, japönsk talnagrind, japönsk reiknigrind			
2542	jöðrun			
2543	jöðrunarfræði			
2544	jöfn dreifing			
2545	jöfn hröðun			
2546	jöfn tala, slétt tala	<ref idTerm=1896>Heil tala</ref> sem er <ref idTerm=648>deilanleg</ref> með 2, þ.e. heil tala n sem rita má á forminu $n = 2 \cdot k$ þar sem k er heil tala		
2547	jöfnuður			
2548	jöfnuhneppi	<ref idTerm=3270>Mengi</ref> <ref idTerm=2478>jafna</ref> sem innihalda sameiginlegar <ref idTerm=538>breytur</ref>		
2549	Jordan-ferill, einfaldur lokaður ferill			
2550	kápubrún, möttulbrún			
2551	kápuflatarmál, möttulflatarmál			
2552	kápuflötur, kápa, möttull, möttulflötur			
2553	kápuhlið, kápuhliðarflötur, möttulhlið, möttulhliðarflötur			
2554	karteskhnit, Kartesarhnit	<ref idTerm=2143>Hnit</ref> í <ref idTerm=6596>karteskrei sléttu</ref>		
2556	karteskt rúm, Kartesarrrúm			
2557	karteskur ferningur			
2559	kassi, kubbur, rétthyrndur samhliðungur	<ref idTerm=4625>Sexflötungur</ref> þar sem allar <ref idTerm=1325>hliðar</ref> eru <ref idTerm=4175>rétthyrningar</ref>	Eftirfarandi er mynd af kassa með hliðarlengdir l, b og h : 	
2560	kast			
2561	keðja			
2562	keðjuályktun			
2563	keðjubrot			
2564	keðjubrotsliðun, liðun í keðjubrot			
2565	keðjuferill			
2566	keðjufléttingur			
2567	keðjuflötur			

2568	keðjugrúpa			
2569	keðjuherping			
2570	keðjujaðar			
2571	keðjujafngildi			
2572	keðjuregla			
2573	keðjusamtoga			
2574	keðjusamtogun			
2575	keðjuskilyrði			
2576	keila	<ref idTerm=6532>Rúmmynd</ref> sem afmarkast af <ref idTerm=2579>fleti</ref> með <ref idTerm=488>sveigðum</ref> <ref idTerm=2453>jaðri</ref> og <ref idTerm=2579>fletinum</ref> sem fæst með því að draga <ref idTerm=2958>línustrik</ref> milli <ref idTerm=4001>punkta</ref> jaðarins og eins tiltekins punkts		Má punkturinn liggja í grunnfletinum? - Óþarfi að vitna í færsluna fyrir keilufłöt út af því það er skilgreint hvernig hann er smíðaður hér?
2577	keilu-			
2578	keilu-			
2579	keilufłötur			
2580	keilulaga			
2581	keilulaga			
2582	keilusnið með miðju, miðpunktskeilusnið			
2583	keilustúfur			
2584	keilustúfur, stýfð keila			
2585	kennifall			
2587	kenniferill			
2588	kenniferill			
2589	kenniflokkur			
2590	kennifłötur			
2591	kennifłötur			
2592	kennigrúpa, nykurgrúpa			
2593	kennijafna			
2594	kennileg hlutgrúpa			
2595	kenning			
2596	kenning um mikil frávik			
2597	kennir, grúpukenkir, kennimótun			
2598	kennir, kennimótun			
2599	kennirót			
2600	kennitala			
2601	kennitala			
2602	kennitala sviðs			
2603	keppnisnet			
2604	kerfi			


2605	kerfisbundin skekkja, bjagi, vilhalli, hliðr-unarskekkja, hlutdrægni			
2606	kerfisbundin úrtakskönnun			
2607	kerfisgreining			
2608	kí-dreifing, χ -dreifing			
2609	kí-í-öðru-dreifing, χ^2 -dreifing			
2610	kí-í-öðru-próf, χ^2 -próf			
2611	kíkiströð			
2612	kím			
2613	kínversk talnagrind, kínversk kúlnagrind, kínversk reiknigrind			
2614	kínverska leifasetningin			
2615	kjálki			
2616	kjarnafall			
2617	kjarngóður virki			
2618	kjarngott rúm			
2619	kjarni			
2620	kjarni			
2621	kjörgildi, besta gildi			
2622	kjörgildisskilyrði, útgildisskilyrði			
2623	kjörlausn, besta lausn			
2624	kjörpunktur, besti punktur			
2625	klasaúrtak, hreiðrað úrtak			
2626	klasaúrtaka			
2627	klasi			
2628	klasi			
2629	Klein-flaska			
2630	Klein-grúpa			
2631	klifurferill			
2632	klofin fleyguð lest			
2633	klofin útvíkkun, klofin víkkun			
2634	klofinn			
2635	klofna, þættast			
2636	klofningssvið			
2637	klofningur, klofnun			
2638	knappasti tæmandi metill			
2639	knippafræði			
2640	knippamótun			
2641	knippi			
2642	knippisrúm			
2643	koma á eftir			
2644	koma á undan			
2645	komma			
2646	komma, tugakomma			
2647	kompáslína			


2648	kompassjálfmótun, kompásfærsla			
2649	könnun			
2650	kórbundin			
2651	kórfærsla, kórhnitaskipti			
2652	kórgerð			
2653	kórgerð Jordans, Jordan-kórgerð, Jordan-gerð			
2654	kórsamoka			
2655	kortalitun			
2656	kósekans			
2657	kósínus	Fyrir rétthyrndan þríhyrning ABC þar sem C er rétthorn er hornafallið <i>kósínus</i> af horninu A, táknað $\cos(A)$, skilgreint sem hlutfallið milli lengd aðlægrar skammhliðar og lengd langhliðar. Sjá eftirfarandi mynd: 	Eftirfarandi mynd sýnir hluta grafs kósínusarfallsins: 	Önnur skilgreining undir einingarhring. Laga nöfn? Laga bakgrunnslit
2658	kósínusregla	Um þríhyrning $\triangle ABC$ með hliðarlengdir a, b og c gildir <i>kósínusreglan</i> $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(C).$	Þegar hornið C er rétthorn , þá er síðasti liðurinn 0 og jafnan gefur reglu Pýþagórasar	Koma með dæmi? Útskýra hvernig setningunni er beitt? Finna mynd?
2659	kostnaðarfall, viðfangsfall			
2660	kóta, dulrita, lykla			

2661	kótangens	<ref idTerm=2202>Hornafall</ref> sem er skilgreint sem $\frac{1}{\tan(A)}$ fyrir $A \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$, táknað $\cot(A)$. Fyrir <ref idTerm=4173>rétthyrndan þríhyrning</ref> ABC þar sem C er <ref idTerm=4167>rétt horn</ref> er <i>kótangens</i> af <ref idTerm=2198>horninu</ref> A <ref idTerm=2072>hlutfallið</ref> milli <ref idTerm=2860>lengd</ref> <ref idTerm=65>aðlægrar</ref> <ref idTerm=4725>skammhliðar</ref> og lengd <ref idTerm=3396>mótlægrar</ref> skammhliðar	Eftirfarandi mynd sýnir hluta <ref idTerm=2955>grafs</ref> kótangensfallsins:	Betra að láta táknmál fylgja með? Laga bakgrunnslit - Finna mynd sem skýrir tenginguna við þríhyrning
2662	kóti, lykill, dulmálslykill, lykilmál			
2663	kótun, dulritun, lyklun			
2664	kótunarfræði, lyklunarfræði, dulmálsfræði			
2665	krafa			
2666	krappageisli, sveigjugeisli			
2667	krappamiðja, sveigjumiðja			
2668	krappamiðjuferill			
2669	krappaþinur			
2670	krappi, sveigja, dás (<i>hk.</i>)			
2671	krefjast, gefa sem forsendu			
2672	kristalgrúpa			
2673	Kronecker-tákn			
2674	krosshlutfall			
2675	krosshúfa			
2676	krossmargfeldi, vigurmargfeldi, vektormargfeldi, krossfeldi, vigurfeldi			
2677	krosspunktur			
2678	kúffeldi			
2679	kúfur			
2680	kúla, hnöttur, knöttur	<ref idTerm=6532>Rúmmynd</ref> sem afmarkast af <ref idTerm=2319>kúluhveli</ref>		
2681	kúla, reiknikúla			
2682	kúlunarúmfræði			
2683	kúlnatroðsla			
2684	kúlu-, hnatt-, hvel-			
2685	kúlubelti			
2686	kúlufall, hvelfall			
2687	kúlufleygur			

2688	kúluflutningur, kúluhreyfing			
2689	kúlugeiri			
2690	kúlugrennd			
2691	kúluhattur, kúluhetta			
2692	kúluhelmingur, hálfkúla			
2693	kúluhnit			
2694	kúluhorn, hnattthorn			
2695	kúluhornafræði			
2696	kúluhringgeisli			
2697	kúluhringmiðja			
2698	kúluhverfing punkts, spegilmynd punkts í kúlu			
2699	kúluhverfing, kúluspeglun, speglun í kúlu			
2700	kúlulíki			
2701	kúlumarghyrningur, kúluhyrningur			
2702	kúluofanvarp			
2703	kúlurúmfræði			
2704	kúlusamhverfni			
2705	kúluskel			
2706	kúluskífa			
2707	kúlustrýta, kúlupíramíti			
2708	kúluþríhyrningur			
2709	kúpni			
2710	kúpniskilyrði			
2711	kúpt fall			
2712	kúpt línuleg samantekt			
2713	kúpt mengi			
2714	kúptur			
2715	kúptur ferill			
2716	kúptur hjúpur			
2717	kúptur marghyrningur, úthyrndur marghyrningur	<ref idTerm=3161>Marghyrningur</ref> kallast <i>kúptur</i> ef öll <ref idTerm=2958>línustrik</ref> með endapunkta inni í honum liggja innan marghyrningsins		
2718	kúptur þykkvi			
2719	kúvending			
2720	kvarðagrúpa, kvörðunargrúpa			
2721	kvarðahlutfall			
2722	kvarðaskipting			
2723	kvarði			
2724	kvarði, mælikvarði, stigi			
2725	kvísl, grein			
2726	kvíslað fall, marggilt fall			
2727	kvíslað þekjurúm			

2728	kvíslaður		
2729	kvíslideilir		
2730	kvísliferli, kvíslunarferli		
2731	kvíslipunktur, kvíslunarpunktur		
2732	kvíslisnið		
2733	kvíslivísir, kvíslunarvísir		
2734	kvísluð lausn		
2736	kvíslun, forkun, tvíkvíslun		
2737	kvíslunarfræði, forkunarfræði		
2738	kvörðun		
2739	kvörðunaraðferð		
2740	kvóti, hlutfall, hlutatala		
2741	kyrr, kyrra-, kyrrðar-, fastur, fasta-		
2742	kyrragrúpa		
2743	kyrralína		
2744	kyrrapunktssetning Banachs, fasta- punktssetning Banachs, herpingarsetning Banachs		
2745	kyrrapunktssetning, fastapunktssetning		
2746	kyrrapunktur, kyrr punktur, fastapunkt- ur		
2747	kyrrastak, kyrrt stak, fastastak		
2748	kyrrasvið, kyrrapunktasvið, fastapunkta- svið		
2749	l'Hôpital-regla		
2750	lægri miðjuruna, lægri miðjurn		
2751	lægsta stak, neðsta stak, fyrsta stak, minnsta stak		
2752	lækka niður		
2753	lækkun		
2754	lækkunarskekkja		
2755	lag		
2756	lág-, óminnkanlegur, ósmækanlegur		
2757	lágflötur		
2758	lágfrumíðal, óminnkanlegt frumíðal		
2760	lággildispunktur		
2762	lággildissetning, lággildislögmál, lágál- gildissetning, lágálgildislögmál		
2763	lággrunnur, óminnkanlegur grunnur, ósmækanlegur grunnur		
2764	lágíðal, óminnkanlegt íðal, ósmækanlegt íðal		
2765	lágjafna		
2766	lágmarginliða		
2767	lágmarka		

2768	lágmarksleikáætlun, lágmarksáætlun			
2769	lágörkun			
2770	lagnet			
2771	lagnet			
2772	lágreisn			
2773	lágreistur			
2774	lagsfylki			
2775	lagshorn			
2776	lagshorn	Tvö horn sem samanlagt mælast 90 gráður	Á eftirfarandi mynd eru $\angle BOA$ og $\angle COB$ lagshorn: 	Laga bakgrunnslit
2777	lagskipt úrtak			
2778	lagskipting			
2779	lágstak, óminnkanlegt stak, ósmækkanlegt stak			
2780	lágvísir, knévísir			
2781	láhnit	Sjá skýringu við karteskt slétta		
2782	landabréf, kort			
2783	Landau-tákn			
2784	landmæling, landmælingafræði			
2785	langadeiling			
2786	langalína			
2787	langamargföldun			
2788	langás			


2789	langhlið	Sú hlið rétthyrnds þríhyrnings sem er mótlæg rétta horninu	Á eftirfarandi mynd er CA langhlið þríhyrningsins:  Þessi hlið er nefnd langhlið-in vegna þess að hún er lengri en báðar hinar hliðarnar. Þríhyrningsójafnan segir okkur að $AB + BC \leq CA$ en af því leiðir að ef þríhyrningurinn er ekki úrkyndur þá er $AB > 0$ og $BC > 0$ og því gildir $AB < CA$ og $BC < CA$	Mótlæg hlið - setja inn færslu. Þá bæði hlið sem er mótlæg horni í þríhyrningi og mótlægar hliðar í marghyrningi?
2790	langsveifarferill			
2791	Laplace-færsla, Laplace-myndun, Laplace-ummyndun			
2792	Laplace-liðun			
2793	Laplace-mynd, Laplace-færsla			
2794	Laplace-virki			
2795	láréttur			
2796	lásnertill			
2797	láta kyrrt			
2798	latneskur feringur, rómverskur feringur			
2799	lauf			
2800	laufaður			
2801	laufferill Descartes			
2802	laufun			
2803	Laurent-röð			
2804	lausn			
2805	lausn með rótardrætti			
2806	lausn, úrlausn			
2807	lausnagrunnur			
2808	lausnamengi			
2809	lausnarferill, heildisferill			
2810	lausnarflötur, heildisflötur			
2811	lausnarformúla			
2812	lausnartilgáta			

2813	lausnarúm			
2814	lápverill			
2815	Lebesgue-heildanlegur, Lebesgue-tegranlegur			
2816	Lebesgue-heildi, Lebesgue-tegur			
2817	Lebesgue-mál			
2818	leg			
2819	lega			
2820	leggja saman			
2821	leggja við, bæta við			
2822	leggjalitun			
2823	leggjamengi			
2824	leggjaruna, vegur			
2825	leggur			
2826	legufrumsenda, legufrumsetning			
2827	legufylki			
2828	legumynstur			
2829	legurúmfræði			
2830	leguvensl			
2831	Leibniz-próf, víxlmerkjapróf Leibniz			
2832	Leibniz-röð			
2833	leið			
2834	leiða af			
2835	leiðiliður			
2836	leiðing	Fyrir sérhverjar <ref idTerm=1515>yrðingar</ref> p og q er $p \implies q$ (lesið: „ p leiðir að q “) sú yrðing sem segir að q sé <ref idTerm=4565>sönn</ref> ef p er það. Yrðingin p kallast þá <i>skilyrði</i> og q <i>ályktun</i>	Leiðing $p \implies q$ jafngildir $\neg p \vee q$	Koma með dæmi um leiðingar? Vantar sanntöflu í skýringu
2837	leiðingarmerki			
2838	leiðingarregla			
2839	leiðréttandi			
2840	leiðrétting			
2841	leiðréttingarliður			
2842	leiðréttingarþáttur			
2843	leif			
2844	leif			
2845	leifaflokkasvið			
2846	leifaflokkur			
2847	leifajafna, samleifing			
2848	leifakerfi			
2849	leifareikningur			
2850	leifasetning			
2851	leifastofn			


2852	leikáætlun, áætlun		
2853	leikmaður, keppandi		
2854	leikregla		
2855	leiktré		
2856	leikur		
2857	leit		
2858	leitaraðferð		
2859	leitni, hneigð		
2860	lengd		
2861	lengd, algildi, tölugildi		
2862	lengd, staðall, tölugildi		
2863	lengdarbaugur		
2864	lengdarfrymi		
2865	lengdarsnið		
2866	leppvísir		
2867	lest		
2868	leyfilegur		
2869	leyfilegur		
2870	leysa		
2871	leysanleg grúpa		
2872	leysanleg jafna		
2873	leysanlegur		
2874	leysanleiki		
2875	leysifylki		
2876	leysijafna		
2877	leysimengi		
2878	leysivirki		
2879	lið fyrir lið		
2880	liða		
2881	liðagreining		
2882	liðhnútur		
2883	liðun		
2884	liðun		
2885	liðun í beina summu		
2886	liðun í Dirichlet-röð		
2887	liðun í rásir		
2888	liðun í röð, raðarliðun		
2889	liður		
2890	liður, þáttur		
2891	Lie-algebra		
2892	Lie-grúpa		
2893	Lie-hornklofi, Lie-margfeldi		
2894	líftölfræði		
2895	líkan		
2896	líkanafræði		

2897	líkanagerð			
2898	líkindafall			
2899	líkindafræði			
2900	líkindafræðingur			
2901	líkindaframleiðandi fall			
2902	líkindafylki			
2903	líkindamál			
2904	líkindareikningur			
2905	líkindarúm			
2906	líkindavísir			
2907	líkindi, líkur			
2908	líklegt frávik			
2909	líming			
2910	lína			
2911	lína, bein lína			
2912	lína, ferill			
2913	línuaðgerð			
2914	línubundin			
2915	línuflötur			
2916	línufylki, einlínufylki			
2917	línugera			
2918	línugerningur			
2919	línuleg algebra			
2920	línuleg bestun			
2921	línuleg deildajafna, línuleg diffurjafna			
2922	línuleg fellagreining, línuleg fallagreining			
2923	línuleg grúpa			
2924	línuleg hlutafleiðujafna			
2925	línuleg jafna			
2926	línuleg lokun			
2927	línuleg röðun, fullröðun			
2928	línuleg samantekt			
2929	línuleg spönn, línulegur hjúpur			
2930	línuleg útsetning			
2931	línuleg vörpun, línuleg færsla			
2932	línulega háður, línulega venslaður			
2933	línulega óháður, línulega óvenslaður			
2934	línulega raðað mengi, fullraðað mengi, keðja			
2935	línulegt aðhvarf			
2936	línulegt fall			
2937	línulegt fall, línulegt form			
2938	línulegt felli			
2939	línulegt grannmynstur			
2940	línulegt grannrúm			

2941	línulegt hæði			
2942	línulegt hlutrúm			
2943	línulegt jöfnuhneppi			
2944	línulegt kerfi			
2945	línulegt óhæði			
2946	línulegt rúm, vigurrúm, vektorrúm			
2947	línulegur			
2948	línulegur á köflum			
2949	línulegur grunnur, vigurgrunnur, Hamel-grunnur, grunnur			
2950	línulegur kvarði			
2951	línulegur virki			
2952	línuleiki			
2953	línumeðaltal			
2954	linur			

2955	graf, línurit, fallrit, varprit, ferill (falls)	Fyrir fall $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ þar sem $I \subseteq \mathbb{R}$ kallast mengi allra tvennda af gerðinni $(x, f(x))$, þar sem $x \in I$ <i>graf</i> fallsins f og er táknað með $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in I\}$ Graf falls má teikna í tvívítt hnitakerfi með því að merkja inn alla punkta sem hafa hnit $(x, f(x))$	Venja er að merkja grafið með jöfnunni $y = f(x)$, því hún lýsir hvernig y-hnit punktanna á grafinu fást út frá x-hnitum þeirra. Skoðum sem dæmi fallið $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = x^2$. Graf þess er mengið sem samanstendur af öllum tvenndum af gerðinni $(x, f(x)) = (x, x^2)$ þar sem $x \in \mathbb{R}$, þ.e. $G_f = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}.$ Eins og lýst er að ofan má teikna grafið í hnitakerfi með því að merkja inn alla punkta sem hafa hnit (x, x^2). Nokkur dæmi um punkta af þessari gerð eru $(-3, 9)$, $(-2, 4)$, $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 4)$ og $(3, 9)$. Á myndinni að neðan hefur graf f verið teiknað í hnitakerfi með rauðum lit og eru punktarnir sjö að framan blálitaðir. Grafið er síðan merkt með jöfnunni $y = x^2$:  Almennt fyrir vörpun $f : X \rightarrow Y$ kallast mengi allra tvennda af gerðinni $(x, f(x))$, þar sem $x \in X$ graf vörpunarinnar f og er táknað með $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$. Graf vörpunnar er hlutmengi í faldmenginu $X \times Y$	Laga bakgrunnslit
------	--	--	---	-------------------

2956	línustallagerð, línuprepagerð, línuprepa- skipan			
2957	línustétt			
2958	línustrik, strik	Sá <ref idTerm=2089>hluti</ref> <ref idTerm=2911>línu</ref> sem liggur milli tveggja <ref idTerm=4001>punkta</ref> sem kallast <i>endapunktur</i> línustriksins		Finna mynd
2959	línusumma, línusamtala			
2960	línuuppstokkun, línuumröðun			
2961	línuvigur			
2962	línuvísir			
2963	lit-, lita-			
2964	litamargliða			
2965	litatala			
2966	lítið ríki, smáríki			
2967	lítið úrtak			
2968	lítill			
2969	litla Fermat-setningin			
2970	litun			
2971	litvísir, litaflokkur			
2972	ljósgeislafræði			
2973	lóðhnit	Sjá skýringu við <ref idTerm=6595>karteski slétta</ref>		
2974	loðið mengi			
2975	lóðlína, þverlína, þverill	<i>Þverill</i> á <ref idTerm=2911>línu</ref> <i>l</i> er lína <i>m</i> sem myndar <ref idTerm=4167>rétt horn</ref> við <i>l</i>		
2976	lóðmengi			
2977	lóðrétt ofanvarp			
2978	lóðréttur			
2979	lóðréttur			
2980	loftfall			
2981	lögbundinn, orsaka-, orsakar-			
2982	löggeng bestun			
2983	löggengur			
2984	lögmál Bortkiewicz, markgildissetning Poissons, lögmál lítils fjölda, lögmál sjald- gæfra atburða			
2985	lögmál mikils fjölda, meðalgildislögmál			
2986	lögmál minnstu verkunar			

2987	lögmál um annað tveggja	<ref idTerm=1452>Frumsenda</ref> í <ref idTerm=4642>sígildri rök- fræði</ref> sem segir að um allar <ref idTerm=1515>yrðingar</ref> p gildi annaðhvort að p sé <ref idTerm=6659>sönn</ref> eða að $\neg p$ sé sönn		
2988	lögmál um ofurendanlega þrepun			
2989	lögmál um stærðfræðilega þrepun, þrep- unarlögmál			
2990	lögmál um takmörkun í jöfnum mæli, lög- mál um skorðun í jöfnum mæli, jafnmæl- isskorðunarlögmál			
2991	lögmál, regla			
2992	logra-			
2993	lograafleiða			
2994	lografall			
2995	lograheildi, logrategur			
2996	lograkúptur			
2997	lograkvarði			
2998	lograkvísipunktur, lograkvísilunarpunkt- ur			
2999	lograpappír			
3000	lograpróf			
3001	lograstuðull			
3002	logratafla			
3003	logravefja, lograkuðungur, lograkuðungs- lína			
3004	logri			
3005	logri með grunntölu, logri með stofntölu			
3006	lögun, snið, gerð, mót			
3007	loka-			
3008	lokaákvörðun			
3009	lokaástand			
3010	lokað bil	<ref idTerm=457>Bil</ref> með tvo endapunkta sem inniheldur þá báða	Eftirfarandi er mynd af lokuðu bili: 	
3011	lokað deildaform, lokað diffurform			
3012	lokað hálfrúm			
3013	lokað hlutrúm			
3014	lokað mengi, lokað hlutmengi			
3015	lokaður			

3016	lokaður ferill, lokaður vegur, lykkja	<ref idTerm=1131>Ferill</ref> þar sem báðir <ref idTerm=0>endapunktur</ref> fer- ilsins eru sami punkturinn		
3017	lokaður flötur, þjappaður flötur			
3018	lokaður gagnvegur			
3019	lokaður hjúpur, lokun			
3020	lokaður kúptur hjúpur, kúpt lokun			
3021	lokaður línulegur virki			
3022	lokaður með tilliti til margföldunar, marg- földunarlokaður			
3023	lokaður Riemann-flötur, þjappaður Riemann-flötur			
3024	lokaður straumur			
3025	lokagrannmynstur			
3026	lokahlutur			
3027	lokahnútur			
3028	lokajafna			
3029	lokanlegur			
3030	lokapunktur			
3031	lokastaða			
3032	lokastak			
3033	lokuð fullyrðing			
3034	lokuð hringskífa			
3035	lokuð kúla			
3036	lokuð segð, lokuð fullyrðing, lokuð yrðing	<ref idTerm=1515>Yrðing</ref> sem inniheldur engar óþekktar <ref idTerm=5102>stærðir</ref>		
3037	lokuð vörpun			
3038	lokuð þakning			
3039	lokunarvirki			
3040	lota, raðstig			
3041	lota, umferð			
3042	lotubinding			
3043	lotubundið flökt			
3044	lotubundið keðjubrot			
3045	lotubundin framlenging			
3046	lotubundin Markov-keðja, rásuð Markov- keðja			
3047	lotubundin úrtakskönnun			
3048	lotubundinn, umferðar-			

3049	lotufall, lotubundið fall	<ref idTerm=1078>Fall</ref> $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ er sagt vera <i>lotubundið</i> ef til er <ref idTerm=4093>rauntala</ref> $p > 0$ þannig að fyrir öll $x \in \mathbb{R}$ gildi: $f(x + p) = f(x).$ Talan p kallast þá <i>lota</i> fallsins	<ref idTerm=5673>Tvinngild föll</ref> geta verið lotubundin meðfram <ref idTerm=5416>raunásnum</ref> annars vegar eða <ref idTerm=6473>þverásnum</ref> hins vegar. Ef fall er lotubundið meðfram báðum ásum kallast það <i>tvílotubundið</i>	Þarf skilgreiningarmengið að vera allt $\mathbb{R}$?
3050	lotugrind			
3051	lotugrunnur			
3052	lotugrúpa			
3053	loturæma			
3054	lotusamhliðungur			
3055	lotusamsíðungur			
3056	lotusamsíðungur, lotusamhliðungur			
3057	lotusvæði			
3058	lotutugabrot, umferðartugabrot			
3059	lotutvennd			
3060	lúpa			
3061	lyfta			
3062	lygarþversögn			
3063	lykkjuheildi, lykkjutegur, heildi yfir lokaðan feril, tegur yfir lokaðan feril			
3064	lykkjurúm			
3065	lýsandi tölfræði			
3066	mælanleg vörpun			
3067	mælanlegt fall			
3068	mælanlegt mengi			
3069	mælanlegt rúm			
3070	mælanlegur			
3071	mælanleiki			
3072	mælieining	<i>Mælieining</i> er ákveðið <ref idTerm=3081>magn</ref> tiltekinnar <ref idTerm=5102>stærðar</ref> sem er notað sem viðmið við mælingu slíkra stærða	Mælieiningar eru oft staðlaðar en til að mynda heldur <i>Bureau international des poids et mesures</i> (BIPM) utan um SI-einingakerfið sem er mikið notað í vísindum.	Þarf að bæta við að allar mælingar eru þá margfeldi einingarinnar eða setja það í skýringu eða segir það sig kannski sjálft? - Koma með dæmi um mælieiningar
3073	mælingarskekkja			
3074	mælirúmfræði			
3075	mæliskekkja, athugunarskekkja			
3076	mælistika			
3077	mætti			
3078	mættisfall			
3079	mættisfræði			
3080	magn			
3081	magn			


3082	magnaralaus			
3083	magnari, magnvirki, kvantari, kvöðull			
3084	magur			
3085	magurt mengi, magurt hlutmengi			
3086	mál			
3087	mál fyrstu stéttar			
3088	mál, tungumál			
3089	málalgebra			
3090	málfræði, mælifræði			
3091	málrækinn, málheldinn			
3092	málrúm			
3093	málsamleitni, samleitni í máli			
3094	málskipan			
3095	málskipanarbreyta			
3096	málskipanarfræði			
3097	málskipti			
3098	margblaða flötur			
3099	margbreytuaðhvarf, fjölbreytuaðhvarf			
3100	margein samsvörun			
3101	margfalda			
3102	margfalda í kross			
3103	margfalda í kross			
3104	margfalda upp úr sviga			
3105	margfaldanlegur			
3106	margfaldari			
3107	margfaldlega			
3108	margfaldlega samanhangandi, margfald- lega samhangandi			
3109	margfaldur			
3110	margfaldur			
3111	margfaldur leggur			
3112	margfaldur punktur			
3113	margfaldur samanburður			
3114	margfaldur snertill			
3115	margfalt heildi, margfalt tegur			
3116	margfalt próf			
3117	margfeldi			
3118	margfeldi			Skilgreina
3119	margfeldi, feldi, fald			
3120	margfeldið fall			
3121	margfeldinn			
3122	margfeldisfrumsenda, margfeldisfrum- setning			
3123	margfeldisgrannmynstur, faldgrann- mynstur			

3124	margfeldisregla			
3125	margfeldistákn, feldistákn, faldtákn			
3126	margfeldni			
3127	margfeldni			
3128	margfeldni			
3129	margflötungsgrúpa			
3130	margflötungshorn			
3131	margflötungsnet			
3132	margflötungstala			
3133	margflötungur, flötungur			“<ref idTerm=6532>Rúmmynd</ref> sem samanstendur af <ref idTerm=1009>endanlega</ref> mörgum <ref idTerm=3161>marghyrningum</ref> sem kallast <i>hliðar</i> margflötungsins” Parf aðeins að endurhugsa skilgreininguna
3141	margföldun			Skilgreina
3148	margföldunargrúpa			
3149	margföldunarmerki			
3150	margföldunarsetning			
3151	margföldunarstofn			
3152	margföldunartafla			
3154	marggild rökfræði			
3155	marggild vörpun			
3156	marggildni			
3157	marggildur			
3158	marghliðungur			
3159	marghyrninganet			
3160	marghyrningstala			
3161	marghyrningur, hyrningur	<ref idTerm=4891>Flatarmynd</ref> sem samanstendur af <ref idTerm=1009>endanlega</ref> mörgum <ref idTerm=2958>línustrikum</ref> (sem kallast <i>hliðar</i> marghyrningsins) þannig að sérhvert línustrik deili endapunkti með nákvæmlega einu öðru línustriki	Hugtakið marghyrningur er oft notað til að vísa í <ref idTerm=832>einfalda marghyrninga</ref> en almennt mega hliðar marghyrnings skera hvor aðra	
3162	margkynjuð tala			
3163	margliða með mörgum breytum			
3164	margliðuaðhvarf			
3165	margliðubaugur			
3166	margliðufall			
3167	margliðuíðal			
3168	margliðujafna			
3169	margliðujafna			

3170	margliðuliðun			
3171	margliðunálgun			
3172	margliðuvöxtur			
3173	margliðubáttun			
3174	marglínuleg algebra, fjöllínuleg algebra			
3175	marglínulegur, fjöllínulegur			
3176	margra manna spil			
3177	margræð jafna			
3178	margræðni			
3179	margrætt jöfnukerfi, margrætt jöfnu- hneppi			
3180	margstæð umsögn, umsögn með mörgum breytum			
3181	margtækur			
3182	margvíð dreifing			
3183	margvíð dreifing			
3184	margvíð fervikagreining, fjölbreytu- fervikagreining			
3185	margvíð tölfræði			
3186	margviðbættinn, margsamleggjandi			
3187	margvíður			
3188	margvíður			
3189	margvitt rúm			
3190	margþætt tala			
3191	margþrepa aðferð			
3192	margþrepa bestun, margþrepabestun			
3193	margþrepa leikur			
3194	markfall, markgildisfall			
3195	markgildi			
3196	markgildi frá hægri, hægra markgildi			
3197	markgildi frá vinstri, vinstra markgildi			
3198	markgildi í jöfnum mæli			
3199	markgildispunktur			
3200	markgildissetning			
3201	markgildissetning Bernoullis, Bernoulli- lögmál mikils fjölda			
3202	markgildisstak			
3203	markgildistaka			
3204	markmeðaltal			
3205	Markov-ferli			
3206	Markov-keðja			
3207	Markov-reiknanlegur			
3208	markraðtala			
3209	markstaða			
3210	marktækur			

3211	marktækur tölustafur			
3212	marktekt			
3213	marktektarstig, prófstig			
3214	marktilfelli			
3215	marktökulíkur, prófstig			
3216	markverður			
3217	massi			
3218	mat			
3219	mat			
3220	mát			
3221	mat að ofan, yfirmat			
3222	mat, stikabundið mat			
3223	mátað við			
3224	mátfall			
3225	mátform			
3226	mátgæði			
3227	mátgrúpa			
3228	mátrúm			
3229	matsfræði			
3230	mátstikar			
3231	mátverkefni			
3232	með endanleg gildi			
3233	með sömu brennipunkta			
3234	meðal-, meðaltals-, að meðaltali			
3235	meðalferskekkja			
3236	meðalfervik úrtaks, úrtaksdreifni			
3237	meðalfervik, dreifni, brigði			
3238	meðalframleiðslugæði			
3239	meðalfrávik			
3240	meðalgildi			
3241	meðalgildiseiginleiki			
3242	meðalgildissetning			
3243	meðalkrappi, meðalsveigja			
3244	meðalmunur			
3245	meðalreisl			
3246	meðalreistur			
3247	meðalsamleitni, meðaltalssamleitni, samleitni í L_1 -staðli			
3248	meðalskekkja			
3249	meðalstærð úrtaks			
3251	meðaltal, hreint meðaltal, venjulegt meðaltal			
3252	meðaltap			
3253	meðalþéttleiki			
3254	meðgin-, höfuð-, aðal-			

3255	meginákveða, höfuðákveða			
3256	meginás			
3257	meginás, höfuðás			
3258	meginásafærsla, höfuðásafærsla			
3259	meginásasetning			
3260	megináslausn			
3261	megingrein, höfuðgrein			
3262	meginhorn			
3263	meginhringur			
3264	meginhringur, meginhvírfilhringur, hjálparhringur			
3265	meginkrappastefna, höfuðkrappastefna, meginsveigjustefna, höfuðsveigjustefna			
3266	meginmarkgildissetning tölfræðinnar, höfuðsetning tölfræðinnar			
3267	meginþáttur			
3268	meginþverill, höfuðþverill			
3269	meirihlutaákvörðun			
3270	mengi	Safn <ref idTerm=5114>hluta</ref>	Þessi skilgreining á mengi skilgreinir svokallaða <ref idTerm=2337>hversdagslega mengjafræði</ref> sem ekki er unnt að nota í stærðfræði vegna þess að hún leiðir til mótsagnar (samanber <ref idTerm=4294>þversögn Russell</ref>). Sú mengjafræði sem er mest notuð nú til dags er mengjafræðin sem byggir á frumsendum Ernst Zermelo og Abraham Fraenkel og kölluð <ref idTerm=6314>Zermelo-Fraenkel-mengjafræði</ref> eða ZF. Oft er einnig gert ráð fyrir <ref idTerm=5954>valfrumsendunni</ref> og þá talað um <ref idTerm=6315>Zermelo-Fraenkel-mengjafræði með valfrumsendu</ref> eða ZFC	
3271	mengjaaðgerð			
3272	mengjaalgebra			
3273	mengjaalgebra			
3274	mengjafall			
3275	mengjafræði			
3276	mengjafræðilegur			
3277	mengjagildur			
3278	mengjahlutvera			

3279	mengjamargfeldi, faldmengi, Kartes-armargfeldi, karteskt margfeldi	<i>Faldmengi</i> tveggja <ref idTerm=3270>mengja</ref> X og Y, táknað $X \times Y$, er mengi <ref idTerm=5627>para</ref> (x, y) þannig að $x \in X$ og $y \in Y$	Almennt ef $I \subseteq \mathbb{N}$ er <ref idTerm=457>bil</ref> og $(X_i)_{i \in I}$ er <ref idTerm=3684>runa</ref> af mengjum þá er faldmengi þeirra skilgreint sem mengi runa $(x_i)_{i \in I}$ þannig að $x_i \in X_i$ fyrir öll $i \in I$	
3280	mengjamunur, mengjamismunur	<i>Mengjamunur</i> tveggja <ref idTerm=3270>mengja</ref> A og B er mengi þeirra <ref idTerm=5128>staka</ref> sem eru í A en ekki í B. Þetta mengi er táknað með $A \setminus B$ (lesið: A án B) og það má rita á forminu $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$	Óformlega má segja að mengjamunurinn $A \setminus B$ sé sá hluti mengisins A sem er utan mengisins B og á <ref idTerm=6050>Venn-myndinni</ref> hér að neðan er hann litaður rauður:  Fyrir öll mengi A og B má rita mengjamuninn $A \setminus B$ sem <ref idTerm=4928>sniðmengi</ref> A og <ref idTerm=1553>fyllimengis</ref> B, þ.e. $A \setminus B = A \cap B^c.$ Jafnframt gildir fyrir öll mengi A að $A \setminus \emptyset = A$ og $A \setminus A = \emptyset$	
3281	mengjaríki			

3282	vörpun	<i>Vörpun</i> $f : X \rightarrow Y$ frá <ref idTerm=3270>mengi</ref> X yfir í mengið Y er forskrift eða regla sem úthlutar sérhverju <ref idTerm=5128>staki</ref> úr X nákvæmlega einu staki úr Y. Mengið X kallast <i>skilgreiningarmengi</i> vörpunarinnar og mengið Y kallast <i>bakmengi</i> hennar	Í <ref idTerm=3275>mengjafræði</ref> er vörpun $f : X \rightarrow Y$ skilgreind sem <ref idTerm=6051>vensl</ref> sem uppfylla eftirfarandi tvö <ref idTerm=4797>skilyrði</ref>: 1. Sérhvert stak $x \in X$ er <ref idTerm=0>venslað við</ref> eitt-hvert stak $y \in Y$ 2. Ef $x \in X$ er venslað við $y \in Y$ og x er einnig venslað við $z \in Y$, þá gildir $y = z$ Fyrri skilyrðið tryggir að vörpunin sé skilgreind á öllu <ref idTerm=1343>formengi</ref> sínu og seinna skilyrðið tryggir það að vörpunin taki ekki mörg <ref idTerm=5968>gildi</ref> í einum <ref idTerm=4001>punkti</ref>	
3283	merkingafræði			
3284	Mersenne-frumtala			
3285	meta			
3286	meta að ofan, yfirmeta			
3287	metakerfi, stigveldi			
3288	metill			
3289	mettað mengi			
3290	mettaður			
3291	mettun			
3292	mið (punkts) við kúlu, veldi (punkts) við kúlu			
3293	mið-, miðju-, miðpunkts-			
3294	mið, veldi			
3295	miðalína, jafnveldislína			
3296	miðamiðja, jafnveldismiðja			
3297	miðaslétta, jafnveldisslétta			
3298	miðbaugur			
3299	miðgildi, miðtala			
3300	miðgildispróf			
3301	miðhlutfalla stærð			
3302	miðhlutfallajafna, samfelld hlutfallajafna			
3303	miðja sjónhorfsmyndunar, sjónhorfsmiðja			
3304	miðja, miðdepill, miðpunktur			
3305	miðjuþjarlægð			
3306	miðjuhorn, miðpunktshorn			

3307	miðjungur			
3308	miðjuofanvarp, miðjuvarp, keiluofanvarp			
3309	miðjuruna, miðjuturn			
3310	miðjusamhverfni, miðjusamhvarf			
3311	miðjusamhverfur, samhverfur um punkt			
3312	miðjusjónhorf			
3313	miðjustak			
3314	miðjuvíðátta			
3315	miðliður			
3316	miðlína			
3317	miðlína	<ref idTerm=2911>Lína</ref> sem fer í gegnum <ref idTerm=3661>oddpunkt</ref> <ref idTerm=6438>þríhyrnings</ref> og <ref idTerm=3319>miðpunkt</ref> <ref idTerm=3396>mótlægrar hliðar</ref>		
3318	miðmunur			
3319	miðpunktur	<ref idTerm=4001>Punktur</ref> á <ref idTerm=2958>línustriki</ref> sem er í sömu fjarlægð frá endapunktum þess		
3320	miðsett hending, miðsett slembibreyta			
3321	miðsett úrtak			
3322	miðsett vikkil			
3323	miðsettur			
3324	miðslétta			
3325	miðstrengur	Sjá <ref idTerm=5261>strengur</ref>		
3326	miðtengilína			
3328	miðþverill, miðþverlína	<ref idTerm=2911>Lína</ref> sem liggur í gegnum <ref idTerm=3319>miðpunkt</ref> annarrar línu og er <ref idTerm=6469>hornrétt</ref> á hana		
3329	miðþverslétta			
3330	miklu minni			
3331	miklu stærri			
3332	milli, á milli			
3333	milligildi			
3334	milligildissetning			
3335	milliliðalaus faguð framlenging			
3336	milliliður, innliður			
3337	millimetrappír			
3338	millireikningur			
3339	millisvið			
3340	millumleikafrumsenda			

3341	millumleikavensl			
3342	millumleiki			
3343	Minkowski-rúm			
3344	Minkowski-rúmfræði			
3345	minni			
3346	minni eða jafn, minni en eða jafn og, frekar minni			
3347	minni, smærri			
3348	minni, smærri			
3349	minnka, falla, lækka			
3350	minnkandi atburðaruna			
3351	minnkandi, fallandi, lækkandi			
3352	minnsta frávik			
3353	minnsta samfeldi, minnsta sameiginlega margfeldi	<ref idTerm=3347>Minnsta</ref> <ref idTerm=4343><i>samfeldi</i></ref> tveggja <ref idTerm=1896>heiltalna</ref> n og m, táknað $\text{lcm}(n, m)$	Til þess að finna minnsta samfeldi talna n og m er byrjað á að <ref idTerm=5824>frumþátta</ref> þær. Ef $p_1, \dots, p_k$ eru allir þeir frumþættir sem tilheyra að minnsta kosti annarri tölunni n eða m, og $a_1, \dots, a_k$ og $b_1, \dots, b_k$ eru margfeldni þeirra í n og m, þá er minnsta samfeldi þeirra: $\text{lcm}(n, m) = p_1^{c_1} \cdot p_2^{c_2} \cdot \dots \cdot p_{k-1}^{c_{k-1}} \cdot p_k^{c_k}$ þar sem $c_i = \max\{a_i, b_i\}$	
3354	minnsta stig, lágstig			
3355	minnsti samnefnari			
3356	mínus, mínusmerki, frádráttarmerki			
3357	mínus, mínusmerki, mínusformerki, neikvætt formerki			
3358	mínúta			
3359	mínúta, hornmínúta, bogamínúta			
3360	misgeng ósamfelldni			
3361	misgilding, misgildi			
3362	mishverf marglínuleg vörpun, misvíxlin marglínuleg vörpun			
3363	mishverft fall, misvíxlið fall			
3364	mishverft fylki, misvíxlið fylki			
3365	mishverft tvílínulegt form, misvíxlið tvílínulegt form			
3366	mishverfur hnútur			
3367	mishverfur, misvíxlinn			
3368	mislægar línur			
3369	misleit hnit			

3370	misleitur			
3371	mismunaaðferð			
3372	mismunaaðferð			
3373	mismunahlutfall, mismunakvóti			
3374	mismunajafna			
3375	mismunareikningur			
3376	mismunavirki			
3377	missamhverf vensl, mishverf vensl			
3378	missamhverfur, mishverfur			
3379	misstór, misjafn			
3380	mjúkt knippi			
3381	mjúkur			
3382	Möbúsarræma			
3383	Möbúsarrúmfræði, hringarúmfræði			
3384	Möbúsarslétta			
3385	möndulslétta			
3386	Monte-Carlo-aðferð			
3387	Monte-Carlo-útreikningur, hermiútreikningur			
3388	mörkuð reglustika			
3389	mörkun, tölusetning			
3390	möskvahnútur, hnútur			
3391	möskvaskipting			
3392	möskvastærð			
3393	möskvi			
3394	mótanaríki, örvaríki			
3395	mótdæmi, gagnðæmi			
3396	mótlæg hlið, öndverð hlið, gagnstæð hlið			Skilgreina
3397	mótlæg horn			
3398	mótlægt horn	Sjá <ref idTerm=5568>gagnstæð horn</ref>		
3399	mótlægur hliðarflötur, öndverður hliðarflötur			
3400	mótlægur, mótstæður, gagnstæður, öndverður, andstæður, öfugur			
3401	mótsagnakenndur, í mótsögn			
3402	mótskilyrðing	Fyrir <ref idTerm=2836>leiðingu</ref> $p \implies q$ kallast leiðingin $\neg q \implies \neg p$ <i>mótskilyrðing</i> hennar	Mótskilyrðing leiðingar hefur sama <ref idTerm=4560>sanngildi</ref> og leiðingin sjálf	
3403	mótsögn	Það að <ref idTerm=1515>yrðing</ref> r og <ref idTerm=3507>neitun</ref> hennar $\neg r$ séu báðar <ref idTerm=6659>sannar</ref> samtímis kallast <i>mótsögn</i>		
3404	mótulfræði			

3405	mótulgrunnur			
3406	mótulinnanmótun			
3407	mótull			
3408	mótulmótun, línuleg vörpun			
3409	mótun			
3410	mótun, sammótun			
3411	munur, mismunur, afgangur (í frádrætti)			
3412	mynd			
3413	mynd			
3414	mynd, rit			
3415	mynd, rúmmynd			
3416	mynda, setja upp			


Fyrir [<ref idTerm=3282>vörpun</ref>](#) $f : X \rightarrow Y$ kallast [<ref idTerm=3270>mengi</ref>](#) allra [<ref idTerm=2478>jafnan</ref>](#) $y = f(x)$ hafi lausn úr X og þannig má rita hana á forminu

$$f(X) = \{f(x) \in Y \mid x \in X\}.$$

Myndina $f(X)$ má einnig skilgreina sem mengi allra $y \in Y$ þannig að [<ref idTerm=2478>jafnan</ref>](#) $y = f(x)$ hafi lausn úr X og þannig má rita hana á forminu

$$f(X) = \{y \in Y \mid \text{til er } x \in X \text{ þ.a. } y = f(x)\}.$$


[<ref idTerm=6050>Venn-myndin</ref>](#) að neðan sýnir vörpunina $f : X \rightarrow Y$ og mynd hennar $f(X)$:



Myndin $f(X)$ er alltaf [<ref idTerm=2098>hlutmengi</ref>](#) í bakmenginu Y , en eins og Venn-myndin sýnir þurfa þau ekki að vera [<ref idTerm=2474>jöfn</ref>](#), þ.e. til geta verið [<ref idTerm=5128>stök</ref>](#) í bakmenginu sem eru ekki í myndinni. Með sama móti má tala um mynd vörpunar af hlutmengi í skilgreiningarmenginu. Ef $A \subseteq X$ þá kallast mengi allra gilda sem f tekur á menginu A (táknað með $f(A)$) mynd vörpunarinnar f af menginu A . Hana má rita á forminu

$$f(A) = \{f(x) \in Y \mid x \in A\}.$$

Venn-myndin að neðan sýnir vörpunina $f : X \rightarrow Y$, hlutmengið A í X og mynd þess $f(A)$:



Myndir af [<ref idTerm=4464>sammengjum</ref>](#) og [<ref idTerm=4928>sniðmengjum</ref>](#)

3418	myndmengi, seiling		
3419	myndrit		
3420	myndtala		
3421	myndun, uppsetning		
3422	myndunarregla		
3423	mynstur		
3424	mynsturgrúpa		
3425	mynsturknippi		
3426	nægjanleg hending, tæmandi hending, nægjanleg reiknihending, tæmandi reikni- hending		
3427	nægjanlegt skilyrði, fullnægjandi skilyrði, tæmandi skilyrði		
3428	nægjanlegur, fullnægjandi, tæmandi		
3429	nægjanleiki		
3430	nægjanleiki, tæmanleiki		
3431	nærbaugur		
3432	nærfágað deildi		
3433	nærfágað fall		
3434	nærfágaður		
3435	nærfáguð vörpun		
3436	nærfágun		
3437	nærsvið		
3438	nærþjappaður		
3439	nærþjappleiki		
3440	næstum alls staðar, nærri alls staðar		
3441	næstum lotubundið fall		
3442	næstum örugglega		
3443	næstum öruggur, öruggur með líkindum		
3444	næstum sjálfoka		
3445	nafla, naflavirki		
3446	naflapunktur		
3447	nágranni, granni		
3448	nákvæm deilda­jafna		
3449	nákvæm lausn		
3450	nákvæmni, hittni		
3451	nákvæmt deildaform		
3452	nákvæmt deildi, fleygað deildi		
3453	nákvæmur		
3454	nálægð, nánd		
3455	nálægur		
3456	nálga, nálægja, námunda		
3457	nálgast		
3458	nálgast		
3459	nálgun í jöfnum mæli		

3460	nálgun, námundun			
3461	nálgunar-			
3462	nálgunaraðferð			
3463	nálgunarbrot			
3464	nálgunareining			
3465	nálgunarfall			
3466	nálgunarfræði			
3467	nálgunargildi			
3468	nálgunarlausn			
3469	nálgunarsetning			
3470	nálgunarskekkja			
3471	nálgunarstaðall, nákvæmd			
3472	náttúrleg einsmótun			
3473	náttúrleg færsla, varpafærsla, varpamótun			
3474	náttúrleg mótun			

3475	náttúrleg tala	$\langle \text{ref idTerm=5128} \rangle \text{Stak} \langle / \text{ref} \rangle$ í $\langle \text{ref idTerm=3270} \rangle \text{menginu} \langle / \text{ref} \rangle$ $\{0, 1, 2, \dots\}$ (stundum er $\langle \text{ref idTerm=5397} \rangle \text{talan} \langle / \text{ref} \rangle$ $\langle \text{ref idTerm=3549} \rangle 0 \langle / \text{ref} \rangle$ ekki tekin með), táknað með $\mathbb{N}$	Fyrsta tilraun til að skilgreina náttúrulegar tölur formlega var gerð af ítalska $\langle \text{ref idTerm=5117} \rangle \text{stærðfræðingnum} \langle / \text{ref} \rangle$ Giuseppe Peano árið 1889. Hann setti fram eftirfarandi fimm $\langle \text{ref idTerm=1452} \rangle \text{frumsendur} \langle / \text{ref} \rangle$: 1. <i>Núll</i> er náttúruleg tala, táknuð með 0 2. Sérhver náttúruleg tala n á sér $\langle \text{ref idTerm=759} \rangle \text{eftirfara} \langle / \text{ref} \rangle$ sem er náttúruleg tala, táknað með $S(n)$ 3. Núll er ekki eftirfari neinnar náttúrulegrar tölu, það er að segja $0 \neq S(n)$ fyrir neina náttúrulega tölu n 4. Ef eftirfarar tveggja náttúrulegra talna n og m eru jafnir, þá eru n og m jafnar, í táknmáli $S(n) = S(m) \implies n = m$ 5. Ef mengi inniheldur núll og það að náttúruleg tala n sé innihaldin í menginu hafi í för með sér að $S(n)$ sé einnig innihaldið í menginu, þá inniheldur mengið náttúrulegu tölurnar Seinasta frumsendan er kölluð <i>þrepunarfrumsendan</i> en hún gerir okkur kleift að tala um $\langle \text{ref idTerm=803} \rangle \text{eiginleika} \langle / \text{ref} \rangle$ allra náttúrulegra talna (sem eru óendanlega margar) í endanlega mörgum skrefum. Ef $P : \mathbb{N} \rightarrow \{\perp, \top\}$ er $\langle \text{ref idTerm=3800} \rangle \text{opin yrðing} \langle / \text{ref} \rangle$ og við skoðum mengið $X = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n)\}$ þá segir frumsendan að ef $P(0)$ sé $\langle \text{ref idTerm=6659} \rangle \text{sönn} \langle / \text{ref} \rangle$ og $P(S(n))$ sé sönn að því gefnu að $P(n)$ sé sönn fyrir einhverja náttúrulega tölu n, þá er $X = \mathbb{N}$ og þar með gildir P fyrir allar náttúrulegar tölur
------	----------------	--	--


3476	náttúrleg vörpun			
3477	náttúrlegt grannmynstur			
3478	náttúrlegt ívarp			
3479	náttúrlegt jafngildi, varpajafngildi			
3480	náttúrlegt ofanvarp			
3481	náttúrlegur logri			
3482	náttúrlegur, náttúrulegur, eðlilegur			
3483	náttúrlegur, varpa-			
3484	náttúrlegur, viðtekinn, sjálfgefinn, aðallegur, eðlilegur, kór-			
3485	náttúrleiki			
3486	nauðsyn			
3487	nauðsynlegt og nægjanlegt skilyrði, nauðsynlegt og fullnægjandi skilyrði			
3488	nauðsynlegur			
3489	neðra heildi, neðra tegur			
3490	neðra mark, lágmark			Skilgreina
3491	neðra markgildi, minnsti þéttipunktur, neðsti þéttipunktur			
3492	neðra öryggisbil			
3493	neðra þríhyrningsfylki			
3494	neðri stallagerð, neðri þrepagerð, neðri þrepaskipan			
3495	neðri þríhyrningsgrúpa			
3496	neðsta gildi, lægsta gildi, minnsta gildi, minnsta lággildi, viðfeðmt lággildi			
3497	nefnari	Sjá <ref idTerm=234>almennt brot</ref>		
3498	neikvæð fylgni			
3499	neikvæð stefna			
3500	neikvæður atburður, óhapp, bilun			
3501	neikvæður hluti			
3502	neikvæður snúningur, snúningur réttsælis			
3503	neikvæður, frádrægur			
3504	neikvætt ákveðinn			
3505	neikvætt áttaður			
3506	neikvætt hálfákveðinn			
3507	neitun	Fyrir sérhverja <ref idTerm=1515>yrðingu</ref> p er $\neg p$ (lesið: „ekki p “) sú yrðing sem fæst með því að <i>neita</i> yrðingunni p	Þessari staðreynd má lýsa með eftirfarandi töflu, sem sýnir <ref idTerm=4560>sanngildi</ref> $\neg p$ eftir ólíkum sanngildum p :	Búa til mynd
3508	neitunarháttur			
3509	neitunarmerki			
3510	net			
3511	net			

3512	netafræði, netjafræði, graffræði		
3513	Newton-aðferð		
3514	niðji		
3516	niðurstaða		
3517	niðurstaða, ályktun, lokaályktun	Sjá <ref idTerm=2836>leiðing</ref>	
3518	níhyrningstala, níhyrnd tala		
3519	níhyrningur		
3520	níupróf		
3521	níupunktahringur		
3522	níusetning		
3523	Noether-baugur		
3524	Noether-mótull		
3525	noetherskur, Noether-		
3526	norðurskaut, norðurpóll		
3527	normgera		
3528	normleg hending		
3529	normleg hlutgrúpa, óbreytt hlutgrúpa		
3530	normleg hnit		
3531	normleg jafna		
3532	normleg útvíkkun, normleg víkkun		
3533	normlegt fylki		
3534	normlegt grannmynstur		
3535	normlegt rúm		
3536	normlegt svið		
3537	normlegt tíðnifall		
3538	normlegt víðerni		
3539	normlegt þýði		
3540	normlegur		
3541	normlegur ferill		
3542	normlegur flötur		
3543	normlegur grunnur		
3544	normlegur turn		
3545	normlegur virki		
3546	normleikafrumsenda		
3547	normleikagrúpa		
3548	normleiki		
3550	núllbaugur		
3551	núllbaugur, örbaugur		
3552	núlldeilir		
3553	núllendurkvæmur		
3554	núllendurkvæmur, núllafturkvæmur		
3555	núllfall		
3556	núllfylki		
3557	núllgagnvegur		
3558	núllgild margliða		

3559	núllhlutur			
3560	núllíðal			
3561	núlllausn			
3562	núlllausn			
3563	núllmargliða	<ref idTerm=0>Fastamargliðan</ref> 0 kallast <i>núllmargliðan</i> .		
3564	núllmengi			
3565	núllrót			
3566	núllrót			
3567	núllsækin runa			
3568	núllsamtoga			
3569	núllsamtogun			
3570	núllstætt fall			
3571	núllstöð			
3572	núllstöðvamengi			
3573	núllstöðvasetning			
3574	núllsummuleikur			
3575	núlltilgáta			
3576	núllvalda			
3577	núllvíður			
3578	núllvigur, núllvektor			
3579	nútímarökfræði			
3580	nýgráða			
3581	nykra			
3582	nykrað vigurrúm, nykurrúm			
3583	nykraður, nykur-			
3584	nykruð samlínumótun			
3585	nykrun			
3586	nykrunarsetning			
3587	nykrunarvarpi			
3588	nykurbundin			
3589	nykurfærsla			
3590	nykurferill			
3591	nykurgrind			
3592	nykurgrunnur			
3593	nykurgrúpa, nykurvíxlgrúpa			
3595	nykurlögmál, nykurvensl			
3596	nykurnet			
3597	nykurríki			
3598	nykursetning, nykruð setning			
3599	nykurvarpslétt, nykurslétt			
3600	nykurverkefni			
3601	nykurvirki			
3602	nykurvörpun, nykruð vörpun			
3603	nýmínúta			

3604	nýraferill			
3605	nyrðra hálfhvel, norðurhvel			
3606	nýsekúnda			
3607	nyt			
3608	nytjafall			
3609	nytjafræði			
3610	óabelskur			
3611	óaðgengileg fjöldatala			
3612	óaðgengilegur jaðarpunktur			
3613	óaðlægur, ósamlægur, ósamliggjandi, grunnstæður			
3614	óaðskiljanlegt net			
3615	óaðskiljanlegur			
3616	óaðskiljanleikaröð			
3617	óaðskiljanleikastig			
3618	óaðskiljanleikavísir			
3619	óaðskiljanleiki			
3620	óafmáanlegur			
3621	óafsannanlegur			
3622	óákvarðaður, óákveðinn			
3623	óákveðið form			
3624	óákveðið heildi, óákveðið tegur			
3625	óákveðin stærð			
3626	óákveðinn stuðull			
3627	óákveðinn, óákvarðaður			
3628	óákveðnipunktur			
3629	óandhverfanlegur			
3630	óargeskur			
3631	óarkimedísk rúmfræði			
3632	óarkimedískur			
3633	óáttaður			
3634	óáttaður, óstefndur, óstefnubundinn			
3635	óáttanlegur			
3636	óaugljós			
3637	óbein ályktun			
3638	óbein deildun, óbein diffrun, fólgin deildun, fólgin diffrun			
3639	óbein skilgreining, fólgin skilgreining			


3640	óbein sönnun	<ref idTerm=4964>Sönnun</ref> á <ref idTerm=1515>yrðingingu</ref> p með því að gera ráð fyrir $\neg p$ og sýna að það leiði til <ref idTerm=3403>mótsagnar</ref>, það er að einhver yrðing r og $\neg r$ séu báðar <ref idTerm=6659>sannar</ref> samtímis	Til þess að geta gert ráð fyrir því að p sé <ref idTerm=6624>ósönn</ref> þarf að nota <ref idTerm=1452>frumsendu</ref> sem kallast <ref idTerm=2987>lögmál um annað tveggja</ref> sem segir að fyrir allar yrðingar p gildi annaðhvort p eða $\neg p$. Í <ref idTerm=4642>sígildri rökfræði</ref>, sem er sú rökfræði sem <ref idTerm=5117>stærðfræðingar</ref> nota allra mest, er gert ráð fyrir þessari frumsendu og því eru óbeinar sannanir notaðar óspart þegar það einfaldar hlutina. Í svokallaðri <ref idTerm=2422>innsæisrökfræði</ref> hins vegar er ekki gert ráð fyrir þessari frumsendu og því einungis hægt að styðjast við <ref idTerm=425>beinar sannanir</ref>. Vert er að nefna að yrðing af taginu $p \implies \neg q$ er hægt að sanna í innsæisrökfræði með því að gera ráð fyrir p og q og sýna að það leiði til mótsagnar. Það krefst ekki lögmáls um annað tveggja vegna þess að neitun $\neg q$ er skilgreind sem $q \implies \perp$ þar sem $\perp$ merkir mótsögn. Því jafngildir $p \implies \neg q$ yrðingunni $p \implies q \implies \perp$	
3641	óbein úrtaka			
3642	óbjagað próf			
3643	óbjagað úrtak			
3644	óbjagað vikbil, óbjagað öryggisbil			
3645	óbjagaður metill, meðalgildisréttur metill			
3646	óbjöguð úrtaka			
3647	óblandaður			
3648	óbreyta			
3649	óbreytni			
3650	óbreytt hlutrúm			
3651	óbreytt mengi			
3652	óbreyttur			
3653	óbreyttur eiginleiki			
3654	óbreyttur frá hægri			
3655	óbreyttur frá vinstri			
3656	óbreyttur við hliðrun, óháður hliðrun			
3657	óðal			
3658	odda-, ójafn, hvass			

3659	oddatala, ójöfn tala, hvöss tala	<ref idTerm=1896>Heil tala</ref> sem er <ref idTerm=3666>ekki deilanleg</ref> með 2, þ.e. heil tala n sem rita má á forminu $n = 2 \cdot k + 1$ þar sem k er heil tala		
3660	oddklofi			
3661	oddpunktur, topppunktur, broddur	Sjá <ref idTerm=2198>horn</ref>		
3662	oddstæðni, oddleiki, hvassleiki			
3663	oddstæður	<ref idTerm=1078>Fall</ref> $f : X \rightarrow Y$ þar sem X og Y eru <ref idTerm=2098>hlutmengi</ref> í <ref idTerm=3270>mengi</ref> <ref idTerm=4093>rauntalna</ref> kallast <i>oddstætt</i> ef fyrir öll $x \in X$ gildir að $f(-x) = -f(x).$	<ref idTerm=2955>Graf</ref> oddstæðs falls fellur í sjálft sig þegar því er <ref idTerm=4986>speglað</ref> um <ref idTerm=6253>y-ásinn</ref> og spegilmyndinni síðan speglað um <ref idTerm=6252>x-ásinn</ref>. Þetta má einnig orða svo að graf oddstæðs falls falli í sjálft sig ef því er snúið um <ref idTerm=1838>hálfhring</ref>. Eftirfarandi mynd sýnir oddstætt fall: 	
3664	oddstæður			
3665	oddsvigi			
3666	ódeilanlegur			Skilgreina
3667	ódeilishluti, hluti en ekki deilir			
3668	óeiginleg afleiða			
3669	óeiginleg deildun, óeiginleg diffrun			
3670	óeiginleg evklíðsk hreyfing			
3671	óeiginleg ósamleitni			
3672	óeiginleg þverstaðalvörpun, snúspeglun			
3673	óeiginlega heildanlegur, óeiginlega teganlegur			
3674	óeiginlegt brot			
3675	óeiginlegt heildi, óeiginlegt tegur			
3676	óeiginlegt rætt fall			

3677	óeiginlegur			
3678	óeiginlegur flokkur			
3679	óeiginlegur strengur			
3680	óeind			
3681	óendanleg fjöldatala, ofurendanleg fjöldatala			
3682	óendanleg raðtala, ofurendanleg raðtala			
3683	óendanleg röð, röð			
3684	óendanleg runa, runa			Skilgreina
3685	óendanleg slétta			
3686	óendanleg stærð			
3687	óendanleg tala			
3688	óendanleg þáttun, margfeldisliðun, feldisliðun			
3689	óendanlega lítill			
3690	óendanlega margir			
3691	óendanlega oft deildanlegur, óendanlega oft diffranlegur, þjáll			
3692	óendanlega stór			
3693	óendanlega vaxandi			
3694	óendanlega víður			
3695	óendanlegt margfeldi			
3696	óendanlegt mengi			
3697	óendanlegt tugabrot			
3698	óendanlegur	<ref idTerm=3270>Mengi kallast <i>óendanlegt</i> ef það er ekki <ref idTerm=1009>endanlegt</ref>		Tala um teljanleika
3699	óendanlegur fjöldi			
3700	óendanlegur, endalaus			
3701	óendanleikafrumsenda, óendanleikafrumsetning, frumsenda um óendanleika, frumsetning um óendanleika			
3702	óendanleikapunktur			
3703	óendanleiki			
3704	óendurkvæmur, óafturkvæmur			
3705	óevklíðsk rúmfræði	<ref idTerm=4271>Rúmfræði</ref> sem byggir á fyrstu fjórum <ref idTerm=1030>frumsendum Evklíðs</ref> en hafnar þeirri fimmtu. Það eru tvær gerðir óevklíðskar rúmfræðar en þær eru <ref idTerm=520>breiðger rúmfræði</ref> og <ref idTerm=5008>sporger rúmfræði</ref>		
3706	óevklíðskur			

3707	óevklíðskur flutningur, óevklíðsk hreyfing			
3708	ófær, ómögulegur			
3709	ófærusönnun, ómöguleikasönnun			
3710	ofanvarp	<i>Ofanvarp</i> <ref idTerm=4001>punkts</ref> <i>P</i> á <ref idTerm=2911>línu</ref> <i>l</i> er <ref idTerm=4845>skurðpunktur</ref> línunnar <i>l</i> og <ref idTerm=6483>þverilsins</ref> á <i>l</i> gegnum <i>P</i> . <i>Ofanvarp</i> <ref idTerm=2958>striks</ref> á línu er <ref idTerm=3270>mengið</ref> af ofanvörpum allra punkta striksins á línuna		Ræða almennari ofanvörp í skýringu
3711	ofanvarpi, ofanvarp			
3712	ofanvarpslína			
3713	ofaukinn, óþarfur			
3714	ofhorn			
3715	öfug röð, gagnstæð röð			
3716	öfug þríliða			
3717	öfugt markgildi			
3718	ófullgerður			
3719	ófullkomin tala			
3720	ófullkominn			
3721	ófullkomleikasetning Gödels			
3722	ofurbreiðger			
3723	ofurendanleg rakning			
3724	ofurendanleg tala			
3725	ofurendanleg þrepun			
3726	ofurendanleg þrepunarsönnun, ofurendanleg þrepasönnun			
3727	ofurendanlegur			
3728	ofurfirð			
3729	ofurfirðarójafna, sterk þríhyrningsójafna			
3730	ofurfirðrúm			
3731	ofurmargfeldi, ofurfeldi			
3732	ofurnet			
3733	ofurrúmkynja fall			
3734	ofurrúmkynja röð			
3735	ofursía			
3736	ofurveldi			
3737	ofurvirðing, óarkimédísk virðing			
3738	ofurþéttipunktur			
3739	og			
3740	og-tákn			

3741	ógegnvirkur																		
3742	ógegnvirkur, ekki gegnvirkur																		
3743	ögn																		
3744	ogun	Fyrir sérhverjar <ref idTerm=1515>yrðingar</ref> p og q er $p \wedge q$ (lesið: „ p og q “) sú yrðing sem segir að p og q séu báðar <ref idTerm=4565>sannar</ref> . Yrðingin $p \wedge q$ er þess vegna sönn þegar yrðingarnar p og q eru báðar sannar, en annars er hún <ref idTerm=3890>ósönn</ref>	Þessu má lýsa með eftirfarandi töflu, sem sýnir <ref idTerm=4560>sanngildi</ref> yrðingarinnar $p \wedge q$ eftir ólíkum sanngildum p annars vegar og q hins vegar: <table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \wedge q$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	p	q	$p \wedge q$	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	Búa til mynd í betri gæðum
p	q	$p \wedge q$																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
3745	ogunarhluti, ogunarþáttur																		
3746	óháð úrtaka																		
3747	óháðar frumsendur, óháðar frumsetningar																		
3748	óháðar hendingar																		
3749	óháðir atburðir																		
3750	óháðir tveir og tveir																		
3751	óháður																		
3752	óhæði																		
3753	óhæðisönnun																		
3754	óhliðrað jöfnuhneppi																		
3755	óhliðraður																		
3756	óhliðruð línuleg jafna																		
3757	óhlutbundinn hyrnuklasi																		
3758	óhlutvera																		
3759	óhnýttur																		
3760	ójafn																		
3761	ójafn, ólíkur																		
3762	ójafna																		
3763	ójafnaðarmerki																		
3764	ójafnarma þríhyrningur, mishliða þríhyrningur																		
3765	ójafnhliða og skakkur samsíðungur																		
3766	ójöfnumerki																		
3767	ójöfnumerki, ójöfnutákn																		

3768	ójöfnuþvingun			
3769	ókleyfi, óþættanleiki, ókljúfanleiki			
3770	ókleyft tilvik			
3771	ókljúfanleg algebrulegt mengi			
3772	ókvíslaður			
3773	óleysanlegur			
3774	óleysanlegur			
3775	ólínuleg hneigð			
3776	ólínulegt aðhvarf			
3777	ólínulegur			
3778	ólínuleiki			
3779	ólokuð segð, ólokuð fullyrðing, ólokuð yrðing			
3780	ólotubundið ástand, lotulaust ástand			
3781	ólotubundinn			
3782	ólotubundinn, lotulaus			
3783	ómælanlegur			
3784	ómagur, ekki magur			
3785	ómagurt mengi, ómagurt hlutmengi			
3786	ómarkverður, fánýtur, klénn			
3787	ómega-fullkominn			
3788	óminnkanleiki			
3789	ómögulegur atburður			
3790	öndverð aðferð, gagnstæð aðgerð			
3791	öndverð grúpa, gagnstæð grúpa			
3792	önnur afleiða			
3793	opið bil	<ref idTerm=457>Bil</ref> sem inniheldur ekki endapunkta sína	Eftirfarandi er myndir af opnum bilum:	
				
3794	opið hálfrúm			
3795	opið hlutrúm			

3796	opið mengi, opið hlutmengi			
3797	opin grennd			
3798	opin hringskífa			
3799	opin kúla			
3800	opin segð, opin fullyrðing, opin yrðing	<ref idTerm=1515>Yrðing</ref> sem inniheldur eina eða fleiri <ref idTerm=538>breytur</ref>	Staðhæfingin $p(x)$: “x er <ref idTerm=2546>slétt tala</ref>” er opin yrðing með óþekkту stærðina x. Þegar talan 1 er sett í stað óþekkту stærðarinnar fæst staðhæfingin $p(1)$: “1 er slétt tala”, sem er <ref idTerm=6624>ósönn</ref> yrðing. Þegar talan 2 er sett í stað óþekkту stærðarinnar fæst hins vegar staðhæfingin $p(2)$: “2 er slétt tala”, sem er <ref idTerm=6659>sönn</ref> yrðing. Látum $p(x)$ vera opna yrðingu og X vera <ref idTerm=3270>mengi</ref>. Þau <ref idTerm=5128>stök</ref> úr X sem gera $p(x)$ að sannri yrðingu þegar þau eru sett í stað óþekkту stærðarinnar kallast <i>lausnir</i> opnu yrðingarinnar $p(x)$ í menginu X. Ennfremur kallast mengi allra lausna $p(x)$ í X <i>lausnamengi</i> $p(x)$ í X og það er táknað með $P = \{x \in X \mid p(x)\}$	
3801	opin vörpun			
3802	opin þakning			
3803	opinleiki			
3804	opinn			
3805	opinn ferill			
3806	opinn flötur			
3807	opinn forgrunnur			
3808	opinn og lokaður			
3809	ör, örvarleggur, stefndur leggur			
3810	ör, píla			
3811	óráðið form, óákveðið form			
3812	óráðið stærðtákn			
3813	óræðni			
3814	óræður	<ref idTerm=4093>Rauntala</ref> kallast <i>óræð</i> ef hún er ekki <ref idTerm=4039>ræð</ref>		Koma með dæmi, til dæmis $\sqrt{2}$?
3815	órásaður fléttingur, óhringaður fléttingur			
3816	órásaður, óhringaður			
3817	orð			

3818	orðalengd			
3819	orðaverkefni			
3820	óregluleg frumtala			
3821	óreglulegur			
3822	óreglulegur sérstöðupunktur			
3823	óreiða			
3824	óreiknanlegur			
3825	óreiknanleiki			
3826	örfærsla			
3827	örgrúpa			
3828	órífkandi			
3829	óröðuð tvennd			
3830	örsmæð			
3831	örsmæða-			
3832	örsmár			
3833	örspönnuður			
3834	örvaelti			
3835	örvahringur			
3836	örvanet, stefnt net, áttað net			
3837	örvarás			
3838	örvarit			
3839	örvasamanhangandi, örvasamhangandi			
3840	öryggisbelti			
3841	öryggisbil, vikbil			
3842	öryggisbilsmat, bilsmat			
3843	öryggislíkindi			
3844	öryggismark, vikmark			
3845	öryggismat			
3846	öryggismengi			
3847	öryggissporbaugur			
3848	öryggissporvala			
3849	öryggisstig, öryggi			
3850	öryggisstuðull			
3851	öryggissvæði			
3852	öryggissvæðismat			
3853	ós, svelgur			
3854	ósamanhangandi, ósamhangandi			
3855	ósambærilegur			
3856	ósamfelldni			
3857	ósamfelldni frá hægri			
3858	ósamfelldni frá vinstri			
3859	ósamfelldnipunktur			
3860	ósamfelldur			
3861	ósamfelldur frá hægri			
3862	ósamfelldur frá vinstri			

3863	ósamfellt fall			
3864	ósamhverf dreifing			
3865	ósamhverfur			
3866	ósamhverfur			
3867	ósamkvæmni, ósamrýmanleiki			
3868	ósamkvæmur metill			
3869	ósamkvæmur, ósamrýmanlegur			
3870	ósamleifa			
3871	ósamleitinn			
3872	ósamleitni			
3873	ósamleitnipunktur			
3874	ósamlína			
3875	ósammælanlegur			
3876	ósammælanleiki			
3877	ósammiðja, hjámiðja			
3878	ósampunkta			
3879	ósamrýndur bútur			
3880	ósamsnið			
3881	ósamsniða			
3882	ósamsniða			
3883	ósambátta tveir og tveir, ósambættir tveir og tveir			
3884	ósambátta, ósambættur			
3885	ósambjappanlegur			
3886	ósannanlegur			
3887	ósannanleiki			
3888	ósanngjarn leikur			
3889	ósannindi, ósannleikur			
3891	ósérstæður algebrulegur ferill, reglulegur algebrulegur ferill			
3892	ósérstæður algebrulegur flötur, reglulegur algebrulegur flötur			
3893	ósérstæður fágáður ferill, reglulegur fágáður ferill			
3894	ósérstæður fágáður flötur, reglulegur fágáður flötur			
3895	ósérstæður, reglulegur			
3896	ósérstæður, reglulegur			
3897	ósérstætt algebrulegt víðerni, reglulegt algebrulegt víðerni			
3898	ósérstætt fágað víðerni, reglulegt fágað víðerni			
3899	óskilgreindur			
3900	óskilvirkur			
3901	óskilvirkur metill			

3902	óskilyrt ójafna			
3903	óslembdur			
3904	óslembinn			
3905	ósléttanlegur			
3906	ósmækkanlegt spannmengi, ósmækkanlegt spannandi mengi, óminnkanlegt spannmengi, óminnkanlegt spannandi mengi			
3907	óspegilvirkur			
3908	óstækkanleiki			
3909	óstefnt net, óáttað net			
3910	óstöðugleiki			
3911	óstöðugur			
3912	óstrjáll			
3913	óstyttanleg frymin þáttun			
3914	ósundurlægur, skaraður			
3915	ótakmarkað bil, óskorðað bil			
3916	ótakmarkað fall, óskorðað fall			
3917	ótakmarkaður virki, óskorðaður virki			
3918	ótakmarkaður, óskorðaður			
3919	óteljanlegur			
3920	ótenginn			
3921	ótiltekið stak			
3922	ótiltekinn			
3923	ótiltekinn, hver sem er			
3924	ótvíræð lausn, ótvírætt ákvörðuð lausn			
3925	ótvíræð skilgreining			
3926	ótvíræð þáttun			
3927	ótvíræðni, einræðni			
3928	ótvíræðnifrumsenda, ótvíræðnifrumsetning			
3929	ótvíræðnisetning			
3930	ótvíræðniskilyrði			
3931	ótvíræður, einræður			
3932	ótvírætt ákvarðaður	<ref idTerm=5102>Stærð</ref> A kallast <i>ótvírætt ákvörðuð</i> af tilteknum <ref idTerm=4797>skilyrðum</ref> ef hún 1. uppfyllir þau skilyrði (A er <i>ákvörðuð</i> af skilyrðunum), 2. ef önnur stærð B uppfyllir sömu skilyrði þá gildir $A = B$		
3933	óumhverfanlegur			
3934	óuppbyggjandi			

3935	óuppbyggjandi tilvistarsönnun			
3936	óurkynjaður, ósérstæður			
3937	óurskurðanleg fullyrðing, óurskurðanleg yrðing			
3938	óurskurðanleg kenning			
3939	óurskurðanlegur			
3940	óurskurðanleikasetning			
3941	óurskurðanleiki			
3942	óvanaleg stærðfræðigreining, óvanaleg greining			
3943	óvanaleg tala			
3944	óvanalegur			
3945	óverulegur			
3946	óverulegur sérstöðupunktur			
3947	óverulegur, hverfandi			
3948	óveruritháttur			
3949	óviðkennd tala			
3950	óviðkomandi rót			
3951	óvissa			
3952	óvíxlanlegur			
3953	óvíxlinn			
3954	óvíxlinn, óabelskur			
3957	ópættanlegur, ókljúfanlegur, ókleyfur			
3959	ópættanleiki, ókljúfanleiki, ókleyfi			
3960	óþekkt stærð			
3961	óþekktur			
3962	óþjappaður			
3963	ópörf frumsenda, ópörf frumsetning			
3964	Papposar-, pappeskur			
3965	Papposarregla			
3966	Papposarsetning, setning Papposar			
3967	Papposarslétta, pappesk slétta			
3968	paraður samanburður			
3969	Pascal-þríhyrningur, þríhyrningur Pascals			
3970	Peano-ferill			
3971	Peano-talnafræði, Peano-reikningur			
3972	Pfaff-ákveða			
3973	Pfaff-ferill			
3974	Pfaff-form, 1-deildaform, 1-diffurform			
3975	Phragmén-Lindelöf-fall, vísifall			



3976	þí (π)	<ref idTerm=2072>Hlutfallið</ref> milli hálfis <ref idTerm=5774>ummáls</ref> <ref idTerm=2295>hrings</ref> og <ref idTerm=1619>geisla</ref> hans		Strangt til tekið ætti að standa hérna hlutfall milli ummál hringskífu og geisla hringsins sem hún afmarkast af
3977	Picard-setningin meiri, stóra Picard-setningin			
3978	Picard-setningin minni, litla Picard-setningin			
3979	platónskt net			
3980	platónskur			
3981	plús, plúsmerki, samlagningarmerki			
3982	plúsformerki, jákvætt formerki			
3983	Poisson-dreifing			
3984	Poisson-ferli			
3985	pólskt rúm			
3986	próf			
3987	próf			
3988	prófhending			
3989	prófunarfall			
3990	prósent, hundraðshluti, hundraðstala			
3991	prósenta	<ref idTerm=5397>Tala</ref> a er p prósent af tölunni b ef <ref idTerm=2072>hlutfall</ref> á milli a og b er $\frac{p}{100}$		
3992	prósentureikningur			
3993	prósentustöplarit, hlutfallsstöplarit			
3994	punktað mengi			
3995	punktað rúm			
3996	punktamengi, mengi			
3997	punktaröð, punktavöndur			
3998	punktferli			
3999	punktmat, stakt mat			
4000	punktur sem er ekki hvarfpunktur			
4001	punktur, depill			
4002	Pýþagórasarregla, setning Pýþagórasar	Setning Pýþagórasar segir að fyr- ir <ref idTerm=4173>rétthyrndan þríhyrning</ref> með <ref idTerm=4725>skammhliðar</ref> a og b og <ref idTerm=2789>langhlið</ref> c gildi $c^2 = a^2 + b^2$		
4003	Pýþagórasarsvið, pýþagórskt svið			
4004	pýþagórsk aljafna			


4005	pýþagórsk þrennd		
4006	pýþagórskur þríhyrningur		
4007	raða		
4008	raða		
4009	raðað mengi, raðmengi, hlutraðað mengi, hlaðmengi		
4010	raðað úrtak		
4011	raðaður grunnur, raðgrunnur		
4012	raðaður, hlutraðaður		
4013	raðaður, rað-		
4014	raðanlegur		
4015	raðanleiki		
4016	raðarlausn		
4017	raðeinsmótun		
4018	raðfylgni		
4019	raðfylgnistuðull		
4020	raðfylgnistuðull Kendalls		
4021	raðfylgnistuðull Spearmans		
4022	raðgerð		
4023	raðgrúpa, röðuð grúpa		
4024	raðhending, sætishending		
4025	raðhyrna		
4026	ráðinn, ákveðinn		
4027	raðkvarði, raðstigi		
4028	raðmynstur		
4029	raðrækinn		
4030	raðslétta		
4031	raðstig		
4032	raðsvið, raðað svið, raðkroppur, raðaður kroppur		
4033	raðtölu-		
4034	raðtölureikningur		
4035	raðtöluruna		
4036	raðvarpslétta, röðuð varpslétta		
4037	raðvildarslétta, röðuð vildarslétta		
4038	raðþrennd, þrennd, röðuð þrennd		
4039	ræð tala	<ref idTerm=4093>Rauntala</ref> sem er hægt að rita sem <ref idTerm=234>almennt brot</ref>	
4040	ræður		
4041	ræður ferill		
4042	ræma		
4043	rætt fall		
4044	rakið fall		
4045	rakið mengi		

4046	rakið reiknirit			
4047	rakin nálgunaraðferð			
4048	rakin runa			
4049	rakin umsögn			
4050	rakin vensl			
4051	rakinn			
4052	rakningarformúla			
4053	rakningarfræði			
4054	ramma			
4055	rammanlegur			
4056	rammanleiki			
4057	rammasvið			
4058	rammi			
4059	rangstöðuaðferð			
4061	rás, lokuð keðja			
4062	rás, rásuð uppstökkun, rásuð umröðun			
4063	rásað hlutmengi			
4064	rásað rúm			
4065	rásað svið			
4066	rásaður			
4067	rásaður ferhyrningur, hringferhyrningur			
4068	rásaður turn			
4069	rásaður vigur, rásaður vektor			
4070	rásaframsetning			
4071	rásuð grúpa			
4072	rásuð útvíkkun, rásuð víkkun			
4073	raufasvæði			
4074	raun-			
4075	raunbreyta, raunbreytistærð			
4076	raundreifingarfall, hlutfallslegt safntíðni- fall, mælt dreifingarfall			
4077	raunfágað fall			
4078	raunfágað mynstur			
4079	raunfágað rúm			
4080	raunfágaður			
4081	raunfáguð víðátta			
4082	raunfall, raungilt fall, rauntölugilt fall			
4083	raunfallagreining, raungreining			
4084	raunfylki, rauntalnafylki			
4085	raungildur			
4086	raungildur, rauntölugildur			
4087	raunhluti			
4088	raunlína			
4089	raunlokun			
4090	raunpunktur			

4091	raunrúmfræði			
4092	raunslétta			
4093	rauntala			
4094	rauntalnakerfi			
4095	rauntalnarúm			
4096	rauntalnaslétta			
4097	rauntalnasvið			
4098	raunvarplína, varplína yfir rauntölurnar			
4099	raunvarprúm, varprúm yfir rauntölurnar			
4100	raunvarpslétta, varpslétta yfir rauntölurnar			
4101	raunvigurrúm, raunlínulegt rúm, vigurrúm yfir rauntölurnar, línulegt rúm yfir rauntölurnar			
4102	refsifall			
4103	regla			
4104	regla, lögmál			
4105	regluleg skilyrt dreifing			
4106	regluleg strýta, reglulegur píramíti			
4107	reglulegt gildi			
4108	reglulegt keilusnið			
4109	reglulegt mál			
4110	reglulegt net			
4111	reglulegt rúm			
4112	reglulegt víðerni			
4113	reglulegur			
4114	reglulegur að innan			
4115	reglulegur að utan			
4116	reglulegur áttflötungur			
4117	reglulegur ferilbogi			
4118	reglulegur ferill			
4119	reglulegur fjórflötungur			
4120	reglulegur margflötungur, platónskur margflötungur			
4121	reglulegur marghyrningur, reglulegur hyrningur			
4122	reglulegur punktur			
4123	reglulegur sérstöðupunktur			
4124	reglulegur strendingur			
4125	reglulegur tólflötungur			
4126	reglulegur tvítugflötungur			
4127	regluleiki			
4128	reglustika			
4129	reikna, reikna út			
4130	reikna, reikna út			

4131	reiknanlegur			
4133	reiknanleikafræði			
4134	reiknanleiki			
4135	reikni-			
4136	reikniaðferð			
4137	reikniborð, reiknibretti			
4138	reiknihending, lýsifall			
4139	reiknimeistari, reikningsmaður, reikn- ingsgarpur			
4140	reiknimeistari, reikningsmeistari			
4141	reiknimynd			
4142	reiknimyndafræði			
4143	reiknings-, reikni-			
4144	reikningsaðferð			
4145	reikningsaðgerð, grunnreikningsaðgerð			
4146	reikningsdæmi			
4147	reikningur í tugakerfi			
4148	reikningur í tylftakerfi			
4149	reikningur, talnareikningur, reikningslist, tölvísi			
4150	reikniregla			Skilgreina
4151	reiknirit Evklíðs, keðjudeiling			
4152	reiknirit Gauss, útrýmingaraðferð Gauss, eyðingaraðferð Gauss			
4153	reiknirit, algórismi, reikningsaðferð			
4154	reiknirits-, reikni-			
4155	reikniskekkja			
4156	reiknistokkur			
4157	reiknivél, reiknir			
4158	reiknivilla			
4159	reikul runa, hvarflandi runa			
4160	reisa			
4161	reitafylki			
4162	reitahögun			
4163	reitarit			
4164	reitur			
4166	rekjanlega teljanlegur			

4167	rétt horn	<ref idTerm=2198>Horn</ref> kallast <i>rétt horn</i> ef <ref idTerm=334>armar</ref> þess eru <ref idTerm=6469>þverstæðir</ref>. Slíkt horn <ref idTerm=2223>mælist</ref> $\frac{\pi}{2}$ <ref idTerm=478>radíana</ref> eða 90 <ref idTerm=1667>gráður</ref>	Á eftirfarandi mynd er $\angle AOB$ rétt horn (og þar með líka $\angle BOC$):  Laga bakgrunnslit á mynd
4168	réttanlegur		
4169	réttanlegur ferill		
4170	rétthyrnd dreifing		
4171	rétthyrndur		
4172	rétthyrndur		
4173	rétthyrndur þríhyrningur	<ref idTerm=6438>Þríhyrningur</ref> með eitt <ref idTerm=4167>rétt horn</ref>	Eftirfarandi er mynd af rétthyrndnum þríhyrningi: 
4174	rétthyrni		
4175	rétthyrningur	<ref idTerm=1127>Ferhyrningur</ref> með öll <ref idTerm=2198>horn</ref> <ref idTerm=4167>rétt</ref>	Eftirfarandi er mynd af rétthyrningi: 
4176	réttilína		
4177	réttslétta		
4178	réttsælis, sólarinnis		
4179	réttsköpuð segð, segð		
4180	réttsköpuð stæða		
4181	rétstæð keila		
4182	rétstæð snúðkeila, réttstæð hringkeila		
4183	rétstæð strýta, réttstæður píramíti		

4184	sívalningur, réttstæður sívalningur	^{<ref idTerm=6532>Rúmmynd</ref>} sem afmarkast af tveimur jafnstórum ^{<ref idTerm=6589>hringskífum</ref>}, sem liggja í ^{<ref idTerm=4509>samsíða</ref>} ^{<ref idTerm=4884>sléttum</ref>} og hafa miðjur sem liggja á ^{<ref idTerm=2911>línu</ref>} sem er ^{<ref idTerm=6469>hornrétt</ref>} á skífurnar, og ^{<ref idTerm=488>sveigðum</ref>} ^{<ref idTerm=4171>rétthyrndum</ref>} ^{<ref idTerm=4660>hliðarfleti</ref>} sem fæst með því að tengja saman ^{<ref idTerm=4001>punkta</ref>} ^{<ref idTerm=2295>hringjanna</ref>} sem skífurnar afmarkast af með ^{<ref idTerm=2958>línustriki</ref>}	Einnig er hægt að smíða sí- valning með því að snúa ^{<ref idTerm=4175>rétthyrningi</ref>} heilan hring um eina af ^{<ref idTerm=2048>hliðum</ref>} sínum. ^{<ref idTerm=2860>Lengd</ref>} hliðarinnar sem rétthyrningnum var snúið um kallast þá <i>hæð</i> sívalnings- ins og lengd hliðanna sem eru ^{<ref idTerm=6469>þverstæðar</ref>} á hana kallast <i>geisli</i> sívalningsins. Sveigði flötur- inn sem myndast við að rétthyrningnum er snúið kallast textitmöttull sívaln- ingsins. Hæð sívalnings er oft táknuð með bókstafnum <i>h</i> og geisli hans með bókstafnum <i>r</i>. Eftirfarandi er mynd af sívalningi: 	Dálítið óþjál skilgreining
4185	réttstæður snúðsívalningur, réttstæður hringsívalningur			
4186	réttsýnishringur			
4187	réttur			
4188	réttur tölustafur			
4189	Riemann-firð			
4190	Riemann-flötur			
4191	Riemann-heildi, Riemann-tegur			
4192	Riemann-krappaþinur, Riemann-sveigjuþinur, krappaþinur Riemanns, sveigjuþinur Riemanns			

4193	Riemann-samgangur			
4194	Riemann-Stieltjes-heildi, Riemann-Stieltjes-tegur			
4195	Riemann-víðátta			
4196	Riesz-framsetningarsetning			
4197	rífkandi			
4198	ríki			
4199	ríki af ríkjum, ríkjaríki			
4200	ríkjafræði			
4201	ríkuleg tala			
4202	rim			
4203	ris			
4204	risaðferð			
4205	risaðferð			
4206	risaðferð mesta bratta			
4207	risskref			
4208	rit			
4209	ritháttur			
4210	röð			
4211	röð			
4214	röðuð skipting			
4220	róf, litróf			
4221	róffræði, litrófsfræði			
4222	rófgeisli			
4223	rófgreining			
4224	rófheildi, róftegur			
4225	rófliðun			
4226	rófmál			
4227	rófsetning			
4247	rómverskar tölur, rómversk tölutákn			
4248	rós, rósarferill			
4249	rót			
4250	rót			
4251	rót			
4252	rót			
4253	rót, lausn	Sú rauntala $x \geq 0$ sem uppfyllir $x^n = a$ þar sem $n \geq 1$ er náttúruleg tala kallast <i>n-ta rótin</i> af a og táknuð með $\sqrt[n]{a}$. Talan a kallast <i>rótarstofn</i> og n kallast <i>rótarvísir</i>	Rætur fullnægja tveimur reiknireglum sem oft eru kallaðar <i>rótarreglurnar</i>. Þær segja: $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	Pússa orðalag - Þarf að koma með dæmi? Minnst líka á tvinntölur?

4254	rót, núllstöð	Fyrir <ref idTerm=1948>margliðu</ref> P kallast <ref idTerm=4093>rauntala</ref> r þannig að $P(r) = 0$ <i>rót</i> eða <i>núllstöð</i> margliðunnar	Skilgreiningin á einnig við um marglið-ur sem eru ekki raungildar. Sjá <ref idTerm=1948>margliða</ref>	
------	---------------	--	---	--

4255	rótarfall	<ref idTerm=1078>Fall</ref> sem varpar sérhverju <ref idTerm=5128>staki</ref> x úr <ref idTerm=1343>skilgreiningarmenginu</ref> í n-tu <ref idTerm=4253>rót</ref> þess $\sqrt[n]{x}$, þar sem $n \geq 2$ er <ref idTerm=3475>náttúruleg tala</ref>	Ef n er <ref idTerm=2546>slétt tala</ref> sýnir myndin að neðan hvernig <ref idTerm=2955>graf</ref> rótarfallsins $g_s : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[; \quad g_s(x) = \sqrt[n]{x}$ lítur út. Eins og grafið endurspeglar er g_s <ref idTerm=5250>stranglega vaxandi</ref> og <ref idTerm=1586>gagntækt</ref> og þar með <ref idTerm=274>andhverfanlegt</ref>. Andhverfa þess er <ref idTerm=927>einskorðun</ref> n-ta <ref idTerm=6009>veldisfallsins</ref> við <ref idTerm=457>bilið</ref> $[0, \infty[$, þ.e. $f_s _{[0, \infty[} : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[; \quad f_s _{[0, \infty[}(x) = x^n$ Ef n er <ref idTerm=3659>oddatala</ref> sýnir myndin að neðan hvernig graf rótarfallsins $g_o : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad g_o(x) = \sqrt[n]{x}$ lítur út. Eins og grafið endurspeglar er g_o stranglega vaxandi og gagntækt og því andhverfanlegt. Andhverfa þess er n-ta veldisfallið $f_o : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad f_o(x) = x^n$
------	-----------	---	--


4256	rótaríðal			
4257	rótarpróf			
4258	rótarstæða			
4259	rótarstofn			
4260	rótartré			
4261	rótarvísir			
4262	rótlaus, rótvana, hvirflalaus			
4263	rudd algebra			
4264	rudd stallagerð, rudd þrepagerð, rudd þrepaskipan			
4265	ruðningur			
4266	rúm			
4267	rúm sem fullnægir fyrri teljanleikafrumsendu			
4268	rúm sem fullnægir seinni teljanleikafrumsendu			
4269	rúm-, rúmstæður, rúmlægur			
4270	rúmferill, rúmlægur ferill, undinn ferill			
4271	rúmfræði			
4272	rúmfræði fjölda, talningarrúmfræði			
4273	rúmfræði talna			
4274	rúmfræðilegt meðaltal, faldmeðaltal			
4275	rúmfræðilegur, rúmfræði-			
4276	rúmheildi			
4277	rúmhnit			
4278	rúmhorn			
4279	rúmlægur ferhliðungur			
4280	rúmlægur marghyrningur			
4281	rúmmál, rúmtak, rýmd			
4282	rúmmálsform			
4283	rúmmálsfrymi			
4284	rúmpunktur, punktur í rúmi			
4285	rúmstæða, stæða í rúmi			
4286	runa			
4287	runa, samstæða			
4288	runa, töluhlaup			
4289	runufullkominn			
4290	runulokaður			
4291	runurúm			
4292	runusamleitinn			
4293	runuþjappaður			
4294	Russell-þversögn			
4295	rússnesk talnagrind, rússnesk kúlnagrind, rússnesk reiknigrind			
4296	rutt leifakerfi			

4297	ryðja			
4298	sæti			
4299	sæti			
4300	sætiskerfi			
4301	sætisritun, sätistalnaritun			
4302	sätisröðun			
4304	sätistala, sæti			
4305	safn			
4306	safn, mengi			
4307	safn, samsafn, mengi			
4308	safn, samsafn, mengi			
4309	safnast fyrir, hlaðast upp			
4310	safneðlisfræði, safnaflfræði			
4311	safnferill, summuferill			
4312	safntíðni, hlaðin tíðni			
4313	safntíðnifall			
4314	sáldur			
4315	sáldur Eratosþenesar			
4316	samanburðarfall			
4317	samanburðarhópur, viðmiðunarhópur			
4318	samanburðarpróf			
4319	samanburðarsetning			
4320	samanburður			
4321	samanhangandi mengi, samhangandi mengi			
4322	samanhangandi, samhangandi, tengdur			
4323	samantekt, samtak, samtekt			
4324	samása			
4325	sambærilegur			
4326	samblástur			
4327	sambrigðin afleiða			
4328	sambrigðinn varpi, meðbrigðinn varpi			
4329	sambrigðinn þinur, meðbrigðinn þinur			
4330	sambrigðni			
4331	sambrigður, meðbrigður			
4332	samdeilir			
4333	samdrægni, herpanleiki			
4334	samdrægur, herpanlegur			
4335	samdráttur			
4336	samdreginn þinur			
4337	samdreifing			
4338	sameiginleg lóðlína, sameiginleg þverlína			
4339	sameiginlegt mál			
4340	sameiginlegur þáttur			
4341	sameinað úrtak			



4342	samfallandi			
4343	samfeldi, sameiginlegt margfeldi	<ref idTerm=3475>Náttúruleg tala</ref> n kallast <i>samfeldi</i> tveggja <ref idTerm=1896>heiltalna</ref> ef þær <ref idTerm=1599>ganga báðar upp í</ref> n		Finna dæmi
4344	samfella			
4345	samfelld hending			
4346	samfelldni			
4347	samfelldni frá hægri			
4348	samfelldni frá vinstri			
4349	samfelldni í jöfnum mæli, jöfn samfelldni			
4350	samfelldnibil			
4351	samfelldnipunktur			
4352	samfelldur			
4353	samfelldur á köflum			
4354	samfelldur deildanleiki, samfelldur diffranleiki			
4355	samfelldur frá hægri			
4356	samfelldur frá vinstri			
4357	samfelldur í jöfnum mæli			
4358	samfelld deildanlegur, samfelld diffranlegur			
4359	samfelld fall			
4360	samfelld ferli			
4361	samfelld róf			
4362	samfelld samleitinn			
4363	samfelld slembiferli			
4364	samfellufrumsenda Cantors, samfellufrumsetning Cantors, samfelldnifruksenda Cantors, samfelldnifrumsetning Cantors			
4365	samfellufrumsenda Dedekinds, samfellufrumsetning Dedekinds, samfelldnifruksenda Dedekinds, samfelldnifrumsetning Dedekinds			
4366	samfellufrumsenda, samfellufrumsetning, samfelldnifruksenda, samfelldnifrumsetning			
4367	samfellutilgáta			
4368	samfellutilgáta Cantors			
4369	samfylgni, samdreifni, samvik			
4370	samfylgnifall, samvikafall			
4371	samfylgnifylki, samvikafylki			
4372	samfylgnigreining, samvikagreining			

4373	samfylgnitala, samfylgnivísir		
4374	samgangsform		
4375	samgangshliðrun		
4376	samgangur		
4377	samheldinn		
4378	samheldni		
4379	samhending		
4380	samhengi		
4381	samhengi		
4382	samhengispáttur, páttur		
4384	samhliðungur		
4385	samhliðungur (í n víddum)		
4386	samhlutfalla, í beinu hlutfalli við, í réttu hlutfalli við		
4387	samhverfsás, samhverfuás		
4388	samhverf algebra		
4389	samhverf grúpa		
4390	samhverf margliða		
4391	samhverf vensl		
4392	samhverfa, samhverf		
4393	samhverfing		
4394	samhverfni		
4395	samhverft deildaform, samhverft diffur-form		
4396	samhverft fall		
4397	samhverft fylki		
4398	samhverft tvífnulegt form		
4399	samhverfugrúpa		
4400	samhverfugrúpa		
4401	samhverfumiðja, samhverfsmiðja		
4402	samhverfur		
4403	samhverfur mismunur		
4404	samhverfur virki		
4405	samhverfur þinur		
4406	samhverfusléttu		
4407	samkvæmni		
4408	samkvæmt mat		
4409	samkvæmt próf		
4410	samkvæmur, mótsagnalaus		
4411	samlagning		
4412	samlagning		
4413	samlagning fjöldatalna		
4414	samlagning horna, hornasamlagning		
4415	samlagningar-		
4416	samlagningargrúpa		

4417	samlagningarhlutleysa, núllstak, núll			
4418	samlagningarlokaður, lokaður með tilliti til samlagningar			
4419	samlagningarregla			
4420	samlagningarríki			
4421	samlagningarsetning			
4422	samlagningartafla			
4423	samlagningarumhverfa, samlagningar-andhverfa	Fyrir gefna <ref idTerm=4093>rauntölu</ref> x kallast rauntala y þannig að $x + y = 0$ <i>samlagningarandhverfa</i> x , táknuð $-x$	Almennt ef X er <ref idTerm=17>víxlin grúpa</ref> með <ref idTerm=6586>hlutleysu</ref> e þar sem <ref idTerm=1744>grúpuaðgerðin</ref> er táknuð $+$ kallast stak y þannig að $x + y = e$ samlagningarandhverfa x	
4424	samlega			
4425	samleggjandi, liður			
4426	samleggjanlegur			
4427	samleggjanleiki			
4428	samleguaðferð			
4429	samleifa			
4430	samleitið heildi, samleitið tegur			
4431	samleitinn en ekki alsamleitinn			
4432	samleitinn röð			
4433	samleitinn runa			
4434	samleitinn			
4435	samleitinn í hverjum punkti			
4436	samleitinn í jöfnum mæli			
4437	samleitni			
4438	samleitni fyrstu stéttar			
4439	samleitni í hverjum punkti			
4440	samleitni í jöfnum mæli, jöfn samleitni			
4441	samleitnibil			
4442	samleitnigeisli			
4443	samleitnihálfslétt			
4444	samleitnihegðun			
4445	samleitnihraði			
4447	samleitnihringskífa			
4448	samleitnihringur			
4449	samleitnilína			
4450	samleitnimark, samleitniláhnit			
4451	samleitnimengi, samleitnisvæði			
4452	samleitnipunktur			
4453	samleitniraðstig, samleitnistétt			
4454	samleitniskilyrði, samleitniþróf			
4455	samleitnisvæði			

4456	samleitnisvæði			
4457	samliggjandi heilar tölur (í vaxandi röð)			
4458	samliggjandi, í röð			
4459	samlína, á sömu línu			
4460	samlínuleiki, línulega (<i>kvk.</i>)			
4461	samlínumótun, samlínuvörpun			
4462	sammælanlegur			
4463	sammælanleiki			
4464	sammengi	<i>Sammengi</i> tveggja <ref idTerm=3270>mengja</ref> A og B er mengi þeirra <ref idTerm=5128>staka</ref> sem eru að minnsta kosti í öðru þeirra. Þetta mengi er táknað með $A \cup B$ (lesið: A sam B) og það má rita á forminu $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ eða } x \in B\}.$	Á <ref idTerm=6050>Venn-myndinni</ref> hér að neðan er $A \cup B$ litað rautt:  Til að einfalda rithátt er sammengi n mengja $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ oft ritað á forminu $\bigcup_{i=1}^n A_i$. Sammengi eru <ref idTerm=5472>tengin</ref> og <ref idTerm=6228>vixlin</ref>, þ.e. fyrir öll mengi A, B og C gildir að $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad \text{og} \quad A \cup B = B \cup A.$ Jafnframt eru sammengi <ref idTerm=722>dreifin</ref> yfir <ref idTerm=4928>sniðmengi</ref>, þ.e. fyrir öll mengi A, B og C gildir að $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{og} \quad (B \cap C) \cup A = (B \cup A) \cap (C \cup A).$ Loks gildir fyrir öll mengi A að $A \cup \emptyset = A$ og $A \cup A = A$	
4465	sammengisfrumsenda, sammengisfrumsetning, frumsenda um sammengi, frumsetning um sammengi			
4466	sammengismerki, sammengistákn			
4467	sammerking			
4468	sammiðja			
4469	samnefnari			

4470	samnefnd brot			
4471	samneitun, sameiginleg neitun			
4472	samok, samoka fall			
4473	samok, samoka fylki			
4474	samok, samoka tala, samoka tvinntala			
4475	samoka			
4476	samoka algebruleg tala			
4477	samoka fylki			
4478	samoka hlutgrúpa			
4479	samoka latneskur feringur			
4480	samoka miðstrengur			
4481	samoka röðun			
4482	samoka virki			
4483	samoka þýtt fall			
4484	samokun			
4485	samokunarflokkur			
4486	sampunkta, sem liggja gegnum sama punkt			
4487	sampunktleiki			
4488	samruna			
4489	samrýmanlegur			
4490	samrýmanleiki			
4491	samrýnd fjölskylda			
4492	samrýndur bútur			
4493	samsama			
4494	samsemd			
4495	samsemdarmótun			
4496	samsemdarsetning			
4497	samsemdarvensl			
4498	samsemdarvörpun	<ref idTerm=3282>Vörpun</ref> f sem varpar sérhverju <ref idTerm=5128>staki</ref> úr <ref idTerm=3270>mengi</ref> X í sjálft sig, það er $f(x) = x$ fyrir öll $x \in X$. Táknuð id_X		
4499	samsett dreifing			
4500	samsett Markoff-keðja			
4501	samsett tala, þættanleg tala			
4502	samsett tilgáta			
4503	samsett þríliða			
4504	samsettur atburður			
4505	samsettur, þættanlegur			
4506	samsíða leggur			
4507	samsíða lína			
4508	samsíða ofanvarp			



4509	samsíða, samhliða			
4510	samsíðufrumsenda, samsíðufrumsetning, frumsetning um samsíða línur, frumsenda um samsíða línur			
4511	samsíðuhorn			
4512	samsíðungsjafna			
4513	samsíðungsregla			
4514	samsíðungur	<ref idTerm=1127>Ferhyrningur</ref> þar sem sérhver <ref idTerm=2048>hlið</ref> er <ref idTerm=4509>samsíða</ref> <ref idTerm=3396>mótlægri hlið</ref> sinni	Eftirfarandi er mynd af samsíðungi: 	
4515	samsíðuskipan			
4516	samskeytanlegur			
4517	samskeyting			
4518	samskeyting	Fyrir <ref idTerm=3282>varpanir</ref> $f : X \rightarrow Y$ og $g : Y \rightarrow Z$ kallast vörpunin $g \circ f : X \rightarrow Z$ sem skilgreind er með forskriftinni $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ <i>samskeyting</i> varpananna f og g	<ref idTerm=6050>Venn-myndin</ref> að neðan sýnir varpanir $f : X \rightarrow Y$ og $g : Y \rightarrow Z$ og samskeytingu þeirra $g \circ f : X \rightarrow Z$: 	
4519	samskeytt fall			
4520	samskeytt vörpun			
4521	samskeyttur			
4522	samskrepping			
4523	samslétta, í sömu sléttu			
4524	samslyngir			
4525	samslyngja, samhlekkja, hlekkja saman			
4526	samsnið, aljöfnuður			
4527	samsníða fylki			

4528	samsniða myndir, aljafnar myndir, eins myndir			
4529	samsniða, aljafn, eins			
4530	samsniðafrumsenda			
4531	samsömun			
4532	samstak, ok			
4533	samstétta			
4534	samstíga			
4535	samstíga hornalínugerningur			
4536	samstríkkaðar myndir			
4537	samsvarandi			
4538	samsvarandi horn			
4539	samsvipa			
4540	samsvipur			
4541	samsvörun	<ref idTerm=5705>Tvístæð vensl</ref> milli tveggja <ref idTerm=3270>mengja</ref> þar sem sérhvert <ref idTerm=5128>stak</ref> í öðru hvoru menginu er venslað við nákvæmlega eitt stak í hinu menginu	Ef við lítum á <ref idTerm=3282>vörpun</ref> milli mengja X og Y sem vensl þá jafn- gildir samsvörun milli X og Y <ref idTerm=1586>gagntækri vörpun</ref>	Finna mynd?
4542	samtakagrannfræði, samtektagrannfræði, fléttugrannfræði			
4543	samtakarúmfræði, samtektarúmfræði, flétturúmfræði			
4544	samtenging, tenging, tengill			
4545	samtoga			
4546	samtogun, togun			
4547	samtogunarflokkur, togflokkur			
4548	samtogunarlyfting, togunarlyfting			
4549	samur			
4550	samur, alsamur, aljafn			
4551	sambætting			
4552	sambættur			
4553	sambáttur, sameiginlegur þáttur			
4554	sanna			
4555	sannanafræði			
4556	sannanleg segð, sannanleg yrðing, sannanleg fullyrðing			
4557	sannanlegur			
4558	sannanleiki			
4559	sannfall			


4560	sanngildi	Í <ref idTerm=4642>sígildri rök- fræði</ref> er sérhver <ref idTerm=1515>yrðing</ref> annað- hvort <i>sönn</i> eða <i>ósönn</i> en kallast það <i>sanngildi</i> yrðingarinnar	Sanngildi eru ýmist táknuð með $1, T$ eða $\top$ þegar um sannar yrðingar er að ræða en annars $0, F$ eða $\perp$	
4561	sanngjarn leikur			
4562	sannleikapróf, sannpróf			
4563	sannleiki			
4564	sanntafla			
4566	segð			
4567	seinni teljanleikafrumsendan			
4568	seintekinn			
4569	sekans			
4570	sekúnda			
4571	sekúnda, hornsekúnda, bogasekúnda			
4572	sem gera átti			
4573	sem sanna átti			
4574	sem snertir að innan, sem snertir að inn- anverðu			
4575	sem snertir að utan, sem snertir utan frá			
4576	sennileikaaðferð			
4577	sennileikahlutfall, líknahlutfall			
4578	sennileikamat			
4579	sennileikamat			
4580	sennileikametill			
4581	sennileiki, líkur			
4582	sérfræðingur í algebru			
4583	sérfræðingur í stærðfræðigreiningu			
4584	sérlausn			
4585	sérlausn, sérstök lausn			
4586	sérlausn, sérstök lausn			
4587	sérstaða, sérstæða			
4588	sérstæð hjásvipfræði			
4589	sérstæð keðja			
4590	sérstæð rás			
4591	sérstæð svipfræði			
4592	sérstæður			
4593	sérstæður ferill			
4594	sérstæður línulegur virki, óandhverfanleg- ur línulegur virki			
4595	sérstætt fylki, óandhverfanlegt fylki, óumhverfanlegt fylki, óreglulegt fylki			
4596	sérstakt gildi			
4597	sérstöðuleg			
4598	sérstöðupunktur			

4599	sérstök línuleg grúpa			
4600	sértækur, óhlutbundinn, hlutfirrtur			
4601	sértak			
4602	sértekinn			
4603	sértekning, hlutfirring			
4604	setafall Riemanns, zetafall Riemanns, ζ-fall Riemanns			
4605	setafall, zetafall, ζ-fall			
4606	setja			
4607	setja í staðinn, setja inn			
4608	setja í sviga			
4609	setja inn			
4610	setja jafnt			
4611	setja út horn			
4612	setja út strik			
4613	setning			
4614	setning			
4615	setning um einhalla samleitni			
4616	setning um fólgin föll			
4617	setning um lokað varprit			
4618	setning um opna vörpun			
4619	setning um ótvíræða þáttun			
4620	setning um staðbundið markgildi			
4621	setning, meginsetning, höfuðsetning			
4622	setningin um fjóra hvirfipunkta			
4623	setningin um níupunktahringinn			
4624	setningin um ytra horn	<ref idTerm=4621>Setning</ref> í <ref idTerm=1030>Evklíðskri rúmfræði</ref> sem segir að <ref idTerm=6295>ytra horn</ref> <ref idTerm=6438>þríhyrnings</ref> sé jafn <ref idTerm=2223>stórt</ref> og <ref idTerm=2225>summa</ref> <ref idTerm=1205>fjarlægari innri horna</ref>	Látum ABC vera þríhyrning þar sem $\angle BAC$ er 35° og $\angle ACB$ er 30° . Bæði <ref idTerm=1677>grannhorn</ref> $\angle CBA$ eru þá $35^\circ + 30^\circ = 65^\circ$ samkvæmt setningunni um ytra horn	Smíða mynd af þessu dæmi
4625	sexflötungur	<ref idTerm=3133>Margflötungur</ref> með sex <ref idTerm=1325>hliðar</ref>		
4626	sexhyrndur			
4627	sexhyrningstala, sexhyrnd tala			
4628	sexhyrningur			Skilgreina
4629	sexstrendingur			


4630	sextándakerfi	<ref idTerm=6668>Talnaritunarkerfi</ref> með grunntölu 16. Oft notað <ref idTerm=5538>tölustafina</ref> 0-9 og síðan A, B, C, D, E og F fyrir tölurnar 10, 11, 12, 13, 14 og 15	Ræða not í skýringu?
4631	sextugakerfi		
4632	sexund		
4633	sía		
4634	síaður		
4635	síðasta setning Fermats		
4636	sigð		
4637	sigð Hippókratesar		
4638	sigð, hringbogasigð		
4639	sígild affræði		
4640	sígild grúpa		
4641	sígild mengjafræði, mengjafræði Cantors		
4642	sígild rökfræði		
4643	sígild yrðingarökfræði		
4644	sigma-algebra		
4645	síkveða		
4646	Simpson-regla		

4647	sínus	Fyrir rétthyrndan þríhyrning ABC þar sem C er rétthorn er hornafallið $sínus$ af horninu A, táknað $\sin(A)$, skilgreint sem hlutfallið milli lengd mótlægrar skammhliðar og lengd langhliðar. Sjá eftirfarandi mynd: 	Eftirfarandi mynd sýnir hluta grafs sínusarfallsins: 	Laga nöfn? Laga bakgrunnslit
4648	sínusferill			
4649	sínusregla	Um þríhyrning $\triangle ABC$ gildir <i>sínusreglan</i> $\frac{\sin(A)}{a} = \frac{\sin(B)}{b} = \frac{\sin(C)}{c},$ þ.e. hlutfallið milli sínusar af horni þríhyrnings og mótlægrar hliðar hornsins það sama fyrir öll hornin.	Þetta hlutfall er einnig jafnt $\frac{1}{2R}$ þar sem R er geisli umritaðs hrings þríhyrningsins.	Finna mynd til þess að taka dæmi?
4650	sínusvefja			
4651	síósanna			
4652	sísanna			
4653	sísannur			
4654	sístætt ástand, æstætt ástand			

4655	sístætt ferli, æstætt ferli, jafnvægisferli, ferli í jafnvægi			
4656	sístætt Markov-ferli, æstætt Markov-ferli, Markov-ferli í jafnvægi			
4657	sístætt streymi, æstætt streymi, jafnvæg-isstreymi			
4658	síugrunnur			
4659	síun			
4660	sívalningsflötur	<ref idTerm=3279>Faldmengi</ref> $\mathcal{C} \times I$ þar sem $\mathcal{C} \in \mathbb{R}^2$ er <ref idTerm=1131>ferill</ref> og $I \subseteq \mathbb{R}$		Þarf eitthvað að útskýra þetta nánar? Ég held að mynd sé ábyggilega ekki svo gagnleg
4661	sívalningsshnit			
4662	sívalningsstúfur, stýfður sívalningur			
4663	sívalningur			
4664	sjaldgæfur atburður			
4665	sjálfgefin lausn			
4666	sjálfhverf vensl, spegilvirk vensl			
4667	sjálfhverfa, sjálfhverf vörpun			
4668	sjálfhverfni, spegilvirkni			
4669	sjálfhverft Banach-rúm			
4670	sjálfhverfumíðja			
4671	sjálfhverfur			
4672	sjálfhverfur, spegilvirkur			
4673	sjálfmóta fall			
4674	sjálfmótanagrúpa			
4675	sjálfmótanagrúpa			
4676	sjálfmótun			
4677	sjálfnykraður			
4678	sjálfoka fylki, hermískt fylki			
4679	sjálfoka virki			
4680	sjálfoka, sjálftengdur			
4681	sjálfskautaður þríhyrningur			
4682	sjálfskerandi			
4683	sjálfskerandi ferhliðungur			
4684	sjálfskerandi marghyrningur			
4685	sjálfskurðarpunktur			
4686	sjálfskurður			
4687	sjálfstýring			
4688	sjálfsvipaður			
4689	sjálfsvipur			
4690	sjálfvalda			
4691	sjálfvalda stak			
4692	sjálfvirki			
4693	sjálfvirkjafræði			
4694	sjálfvirkur			


4695	sjálfþver			
4696	sjálfþver vigur			
4697	sjöhyrningstala, sjöhyrnd tala			
4698	sjöhyrningur			
4699	sjóndeildar-			
4700	sjóndeildarjaðar			
4701	sjóndeildarlína			
4702	sjóndeildarpunktur			
4703	sjóndeildarslétta			
4704	sjóndeildarstak			
4705	sjónhorf			
4706	sjónhorfs-, í sjónhorfi			
4707	sjónhorfsás			
4708	sjónhorfsmiðja			
4709	sjónhorfsmótun, sjónhorfsfærsla			
4710	sjónhorfsmyndun			
4711	sjötta stigs			
4712	sjötta stigs ferill			
4713	sjötta stigs flötur			
4714	sjötta stigs jafna			
4715	sjöttungsmark			
4716	skæling			
4717	skælingarhlutfall			
4718	skælingarhorn			
4719	skáhæð			
4720	skáhorn			
4721	skáhyrndur þríhyrningur			
4722	skakkt ofanvarp			
4723	skakkur samhliðungur, skásettur samhlið- ungur			
4724	skammás			
4725	skammhlið	<ref idTerm=2048>Hlið</ref> <ref idTerm=4173>rétthyrnds þríhyrn- ings</ref> sem er aðlæg rétta horninu	Á eftirfarandi mynd eru AB og BC skammhliðar þríhyrningsins: 	Vísa í skilgreiningu á aðlægri hlið.
4726	skammleiðarverkefni, verkefni skemmstu leiðar			
4727	skammsveifarferill			

4728	skammtímaferill			
4729	skarast			
4730	skásett hnit, skökk hnit			
4731	skásett hnitakerfi, skakkt hnitakerfi			
4732	skásett hringkeila, skökk hringkeila			
4733	skásettur hringsívalningur, skakkur hringsívalningur			
4734	skásettur, skakkur			
4735	skástrendingur, skakkur strendingur			
4736	skástýfð keila			
4737	skástýfður sívalningur			
4738	skaut			
4739	skaut, póll			
4740	skaut, póll, skauthnitamiðja, pólhnitamiðja			
4741	skautframsetning, skauthnitaframsetning, framsetning í skauthnitum (pólhnitum)			
4742	skauthluti			
4743	skauthnit, pólhnit	<ref idTerm=2143>Hnit</ref> í <ref idTerm=4746>pólhnitakerfi</ref>		
4744	skauthnitaferill, pólhnitaferill, ferill í skauthnitum (pólhnitum)			
4745	skauthnitajafna, pólhnitajafna			


4746	skauthnitakerfi, pólhnitakerfi	$\langle \text{ref idTerm=2145} \rangle$ Hnitakerfi $\langle / \text{ref} \rangle$ á $\langle \text{ref idTerm=1031} \rangle$ evklíðska sléttu $\langle / \text{ref} \rangle$ þar sem $\langle \text{ref idTerm=4001} \rangle$ punktar $\langle / \text{ref} \rangle$ eru staðsettir með því að tilgreina $\langle \text{ref idTerm=1204} \rangle$ fjarlægð $\langle / \text{ref} \rangle$ þeirra og $\langle \text{ref idTerm=5135} \rangle$ stefnu $\langle / \text{ref} \rangle$ séð frá gefnum punkti O sem er kallaður <i>skaut</i> eða <i>póll</i>	Eftirfarandi mynd sýnir hvernig hægt er að tilgreina staðsetningu punkts í $\langle \text{ref idTerm=2554} \rangle$ karteskum hnitum $\langle / \text{ref} \rangle$ annars vegar og pólhnitum annars vegar:  Látum $O = (0, 0)$ vera $\langle \text{ref idTerm=5839} \rangle$ upphafspunktur $\langle / \text{ref} \rangle$ karteska hnitakerfisins og $E = (1, 0)$ vera einingarpunktinn á x-ásnum. Ef $P = (x, y)$ er punktur í sléttunni, þá mælir $r = OP = \sqrt{x^2 + y^2}$ fjarlægð P frá O. Stefnu P séð frá O má tilgreina með $\langle \text{ref idTerm=483} \rangle$ bogamáli $\langle / \text{ref} \rangle$ hornsins $\angle EOP$, sem við köllum <i>stefnuhorn</i> punktsins P. Ef P liggur ekki á neikvæða x-ásnum, þá liggur stefnuhornið á $\langle \text{ref idTerm=457} \rangle$ bilinu $\langle / \text{ref} \rangle]-\pi, \pi[$ og það er gefið með $\arccos\left(x/\sqrt{x^2 + y^2}\right)$ ef $y \geq 0$ en annars með $\arccos\left(x/\sqrt{x^2 + y^2}\right)$. Skauthnit punktsins $P = (x, y)$ eru því gefin með $\langle \text{ref idTerm=5627} \rangle$ tvenndinni $\langle / \text{ref} \rangle (r, \theta)$. Ekki er hægt að útvíkka skilgreininguna á stefnuhorni með skynsamlegum hætti fyrir punkta á neikvæða x-ásnum eða skautpunktinn O. Hinsvegar má snúa hnitakerfinu, og undanskilja í staðinn einhverja aðra hálflínu út frá O. Þannig mætti til dæmis láta stefnuhornið vera á bilinu $]-\pi/2, 3\pi/2[$ og undanskilja í staðinn neikvæða hluta y-ássins. Ef punktur hefur skauthnit (r, θ), þá eru kartesk hnit hans gefin með $x = r \cos \theta \quad \text{og} \quad y = r \sin \theta$
------	--------------------------------	--	--


4747	skauthnitás, skauthnitaás, pólhnitás, pólhnitaás			
4748	skauthringur			
4749	skautlína			
4750	skautun			
4751	skautunarjafna			
4752	skautunarmiðja			
4753	skautþáttun, pólpáttun			
4754	skautþríhyrningur			
4755	skeif dreifing			
4756	skeifni			
4757	skekking			
4758	skekka			
4759	skekkiubil			
4760	skekkiufall, Gauss-skekkiufall			
4761	skekkiugreining			
4762	skekkiuliður			
4763	skekkiuliður			
4764	skekkiulíkindi			
4765	skekkijumark, skekkijuskorða			
4766	skekkiumat			
4767	skekkiuútbreiðsla			
4768	skelferill			
4769	skema			
4770	skera, sníða			
4771	skerast, sníðast, skarast	Ef sniðmengi tveggja punkta mengja er ekki tómt er sagt að mengin <i>skerist</i>		
4772	skerðing			
4773	skert dreifing			
4774	skeyta saman			
4775	skífurit			
4776	skila			
4777	skilapunktur			
4778	skilgreina með þrepun			
4779	skilgreina, skýrgreina			
4780	skilgreinandi			
4781	skilgreinandi jafna			
4782	skilgreinandi, skilgreiningarorð			
4783	skilgreinanlegur			
4784	skilgreinanleiki			
4785	skilgreining, skýrgreining			


4786	skilgreiningarbil			
4787	skilgreiningarefni			
4788	skilgreiningarmengi virkja			
4789	skilorðslaus samleitni			
4790	skilorðslaust samleitinn			
4791	skilun			
4792	skilvirkasti metill			
4793	skilvirkni			
4794	skilvirkt mat			
4795	skilvirkt próf			
4796	skilvirkur metill			
4797	skilyrði	Sjá <ref idTerm=2836>leiðingu</ref>		
4798	skilyrði um fallandi keðjur, skilyrði um minnkandi keðjur			
4799	skilyrði um vaxandi keðjur, skilyrði um stígandi keðjur			
4800	skilyrðing			
4801	skilyrt dreifing			
4802	skilyrt líkindi			
4803	skilyrt mál			
4804	skilyrt meðalgildi			
4805	skilyrt meðalgildisfall			
4806	skilyrt óreiða			
4807	skilyrt próf			
4808	skilyrt samleitinn, skilorðssamleitinn			
4809	skilyrt samleitni, skilorðsbundin samleitni			
4810	skilyrt þéttleikafall			
4811	skilyrtur atburður			
4812	skilyrtur þéttleiki			
4813	skilyrtur, skilorðsbundinn			
4814	skipta í þríhyrninga			
4815	skipta, hluta			
4816	skiptanlegur í þríhyrninga			
4817	skiptanleiki í þríhyrninga			
4818	skiptihlutfall			
4819	skipting			
4820	skipting í tilfelli, skipting í tilvik			
4821	skipting, deildaskipting, flokkaskipting, hlutun			
4822	skipting, hlutun			
4824	skiptingarfall, hlutunarfall			
4825	skiptipunktur, hlutunarpunktur			
4826	skipun			
4827	skógur			


4828	skorða, takmörkun			
4829	skorðumynstur			
4830	skorðun			
4831	skorðurúm			
4832	skörun			
4833	skrá			
4834	skráarvinnsla			
4835	skref			
4836	skrefabestun			
4837	skrefaður, skrefa-			
4838	skrefagreining			
4839	skrefamat			
4840	skrefapróf			
4841	skrúflötur			
4842	skrúflína, gormur			
4843	skrúfuflutningur, skrúfuhreyfing			
4844	skúffuregla Dirichlets, skúffuregla			
4845	skurðpunktur, sniðpunktur	<ref idTerm=4001>Punktur</ref> þar sem tvö <ref idTerm=2911>línurnar</ref> l og m í <ref idTerm=3270>mengi</ref> <ref idTerm=4771>skerast</ref>	Á eftirfarandi mynd skerast <ref idTerm=2911>línurnar</ref> l og m í punktinum A: 	Laga bakgrunnslit á myndinni
4846	skurður			
4847	skýjakljúfsknippi			
4848	skylt horn			
4849	skyndiúrtak			
4850	skýribreyta			
4851	skýringabreyta			
4852	skýringarmynd			
4853	slakbreyta			
4854	slanga			
4855	slanga			
4856	slemba			
4857	slembdur			
4858	slembi-, slembinn, tilviljanakenndur			
4859	slembíáhrif			
4860	slembibestun			
4861	slembidreifing			
4862	slembiferli			

4863	slembiferli með óháðum viðbótum		
4864	slembifræði		
4865	slembifylki		
4866	slembigangur, slembiganga		
4867	slembiheildi, slembitegur		
4868	slembileikur		
4869	slembilíkan, líkindalíkan		
4870	slembing		
4871	slembingur, slembileiki		
4872	slembíóháður, óháður		
4873	slembíóhæði, óhæði		
4874	slembiruna		
4875	slembiskekkja		
4876	slembistak		
4877	slembistund		
4878	slembitala		
4879	slembitalnatafla		
4880	slembiúrtak		
4881	slembiúrtaka		
4882	sleppa		
4883	sleppa		
4884	slétta, sléttur flötur, plan		
4885	sléttanlegur		
4886	sléttanlegur flötur		
4887	sléttu-		
4888	sléttuferill, ferill í sléttu		
4889	sléttuhnit		
4890	sléttuhornafræði		
4891	sléttumynd, flatarmynd		
4892	sléttunet		
4893	slétturúmfræði, flatarmyndafræði		
4894	sléttuskiki		
4895	sléttusnið		
4896	sléttustæða		
4897	sléttuþríbaugur		
4898	slönguferill		
4899	slöngugrennd		
4900	smáhringur		
4901	smárahnútur, einfaldur hnútur		
4902	smituð dreifing		
4903	snara		
4904	sneið, kúlusneið, kúlukollur		
4905	snemmtekinn		
4906	snerti-, snertil-		
4907	snertibundin, snertlabundin		

4908	snertiferill			
4909	snertihringur			
4910	snertihvel, snertikúla			
4911	snertikeila, snertlakeila			
4912	snertill, snertilína	<ref idTerm=2911>Lína</ref> sem liggur gegnum nákvæmlega einn <ref idTerm=4001>punktur</ref> á <ref idTerm=2295>hring</ref>	Á eftirfarandi mynd má sjá hring með miðju M og snertil sem liggur í gegnum punktinn C : 	Minnast á að snertillinn sé hornréttur á geislann? - Laga bakgrunnslit á myndinni
4913	snerting			
4914	snertingarslétta			
4915	snertipunktur			
4916	snertirúm, snertlarúm			
4917	snertislétta			
4918	snertistig			
4919	snertistrengur			
4920	snertivigur, snertill			
4921	snertiþáttur, snertiliður			
4922	snertlahorn			
4923	snertlasvið			
4924	snertlasvið			
4925	snið			
4926	snið			
4927	snið, mót			

4928	snið, sniðmengi, skurðmengi, skarmengi	<i>Sniðmengi</i> tveggja <ref idTerm=3270>mengja</ref> A og B er mengi þeirra <ref idTerm=5128>staka</ref> sem eru í báðum þeirra. Þetta mengi er táknað með $A \cap B$ (lesið: A snið B) og það má rita á forminu $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ og } x \in B\}.$	Á <ref idTerm=6050>Venn-myndinni</ref> hér að neðan er $A \cap B$ litað rautt. Til að einfalda rithátt er sniðmengi n mengja $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ oft ritað á forminu $\bigcap_{i=1}^n A_i$.  Sniðmengi eru <ref idTerm=5472>tengin</ref> og <ref idTerm=6228>vixlin</ref>, þ.e. fyrir öll mengi A, B og C gildir að $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \quad \text{og} \quad A \cap B = B \cap A.$ Jafnframt eru sniðmengi <ref idTerm=722>dreifin</ref> yfir <ref idTerm=4464>sammengi</ref>, þ.e. fyrir öll mengi A, B og C gildir að $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{og} \quad (B \cup C) \cap A = (B \cap A) \cup (C \cap A).$ Loks gildir fyrir öll mengi A að $A \cap \emptyset = \emptyset$ og $A \cap A = A$
------	--	--	--

4929	sniðill	<ref idTerm=2911>Lína</ref> sem <ref idTerm=2295>hring</ref> í tveimur ólíkum <ref idTerm=4001>punktum</ref>	Á eftirfarandi mynd má sjá hring með miðju M og sniðil sem liggur í gegnum punktana A og B:  Ekki skal rugla saman sniðli og <ref idTerm=5261>streng</ref> en munurinn er sá að sniðill er lína og strengur er <ref idTerm=2958>línustrik</ref>. Sérhver strengur hrings er innihaldinn í sniðli	Laga bakgrunnslit á myndinni
4930	sniðkrappi, sniðsveigja, Riemann-krappi, Riemann-sveigja			
4931	sniðlína, skurðlína			
4932	sniðmargfeldni			
4933	sniðmengismerki, sniðmengistákn			
4934	sniðstak, mót			
4935	snigill, snigilferill, snigillína			
4936	snúðflötur			
4937	snúðhjólflötur			
4938	snúðkeila			

4939	keila, snúðkeila, hringkeila	<ref idTerm=6532>Rúmmynd</ref> sem afmarkast af <ref idTerm=6589>hringskífu</ref> og <ref idTerm=2579>fletinum</ref> sem fæst með því að draga <ref idTerm=2958>línustrik</ref> milli <ref idTerm=4001>punkta</ref> <ref idTerm=2295>hringsins</ref> sem skífan afmarkast af og eins punkts sem liggur á <ref idTerm=2911>línu</ref> sem er <ref idTerm=6469>hornrétt</ref> á skífuna og fer í gegnum miðju hennar	Einnig er hægt að smíða keila með því að snúa <ref idTerm=4173>rétthyrndum þríhyrningi</ref> heilan hring um aðra af <ref idTerm=4725>skammhliðum</ref> sín-um. <ref idTerm=2860>Lengd</ref> skammhliðarinnar sem þríhyrningnum var snúið um kallast þá <i>hæð</i> keilunnar og lengd hinnar skammhliðarinnar kallast <i>geisli</i> hennar. Sveigði flöturinn sem <ref idTerm=2789>langhliðin</ref> myndar kallast <i>möttull</i> keilunnar. Hæð keilu er oft táknuð með bókstafnum <i>h</i> og geisli hennar með bókstafnum <i>r</i>. Eftirfarandi er mynd af keilu: 	Þarf punkturinn að liggja fyrir utan grunnflötinn? - Rosalega óþjál skilgreining
4940	snúðkeilufloður, hringkeilufloður			
4941	snúðsívalningsfloður, hringsívalningsfloður			
4942	snúðsívalningur, hringsívalningur			
4943	snúðsívalningur, hringsívalningur			
4944	snúður, snúðþykkvi			
4945	snúningagrúpa			
4946	snúningsás, möndull			
4947	snúningshorn			
4948	snúningsóbreyta			
4949	snúningsóbreyttur			
4950	snúningssamhverfni, snúsamhverfni			
4951	snúningssamhverfur, snúsamhverfur			
4952	snúningsskaut, snúningspóll, snúningsmiðja			

4953	snúningur			
4954	snúningur	Ef ρ er færsla á tiltekinni sléttu og M er punktur í sléttunni þá kallast ρ <i>snúningur með miðju í punktinum</i> <i>Mefhnhefureftirfarandieiginleika</i> : <i>punktarnir A og $\rho(A)$ eru í sömu fjarlægð frá M fyrir alla punkta A í sléttunni,</i> <i>hornin $\angle AM\rho(A)$ eru jafn stór fyrir alla punkta $A \neq M$.</i>		Finna mynd
4955	snústríkkun			
4956	snyrta, jafna			
4957	snyrting, jöfnun			
4958	snyrtiskekkja, jöfnunarskekkja			
4959	söðulflötur			
4960	söðulpunktsaðferð			
4961	söðulpunktur			
4962	sólspoti			
4963	sönn fullyrðing, sönn yrðing			
4964	sönnun			
4965	sóphorn			
4966	spá, forsögn			
4967	spáfræði			
4968	spágildi, reiknað gildi			
4969	spanna			
4970	spanna			
4971	spanna, framleiða			
4972	spannandi hlutnet			
4973	spannandi skógur, spannskógur			
4974	spannandi tré, spanntré, hátré			
4975	spannandi vensl			
4976	spannarmiðja			
4977	spannfjölskylda, spannandi fjölskylda			
4979	spannmengi (íðals), íðalspannmengi, framleiðandi mengi, spannandi mengi			
4980	spáskekkja			
4981	spegilmynd			

4982	spigilsamhverf, spigilsamhverfni, sléttu-samhverfni, tvíhverf, tvíhverfni, tvíhliða samhverf, tvíhliða samhverfni			
4983	spigilsamhverfur			
4984	spigilsamsniða, óeiginlega samsniða			
4985	spigiltala			
4986	spiglun			
4987	speglunarsetning, speglunarlögmál			
4988	spenna			
4989	spennuþinur			
4990	spil, leikur, keppni			
4991	spilfræði, spilafræði, leikjafræði, keppnis-fræði			
4992	spinalgebra			
4993	spingreining, spinagreining			
4994	spingrúpa			
4995	spinsvið, spinasvið			
4996	spinur, spunaðinur			
4997	splæsifall			
4998	spönn			
4999	spönnuður			
5000	spor			
5001	sporbaugsfari			
5002	sporbaugur	<ref idTerm=3270>Mengi</ref> allra <ref idTerm=4001>punkta</ref> (x, y) í <ref idTerm=4884>sléttu</ref> sem uppfylla <ref idTerm=2478>jöfnu</ref> af taginu $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ fyrir að $a, b > 0$. Punktarnir $(a, 0)$, $(0, b)$, $(-a, 0)$ og $(0, -b)$ uppfylla jöfnuna að ofan og ef $b > a$ kallast <ref idTerm=2958>línustrikið</ref> frá $(0, -b)$ til $(0, b)$ <i>langás</i> og línustrikið frá $(-a, 0)$ til $(a, 0)$ <i>skammás</i>	Önnur leið til þess að skilgreina sporbaug er sem mengi punkta í sléttu þannig að summa <ref idTerm=1204>fjarlægða</ref> þeirra frá tveim föstum punktum sé fasti. Punktarnir tveir kallast <i>brennipunktar</i>	Finna mynd
5003	sporger			
5004	sporger ferill			
5005	sporger fleygbogaflötur			
5006	sporger hlutafleiðujafna			
5007	sporger hreyfing, hreyfing á sporbaug			

5008	sporger rúmfræði	<ref idTerm=4271>Rúmfræði</ref> sem byggir á fyrstu fjórum <ref idTerm=1452>frumsendum</ref> <ref idTerm=1030>evklíðskar rúmfræði</ref> en í staðinn fyrir fimmtu frumsenduna er gert ráð fyrir eftirfarandi frumsendu: “Fyrir gefna <ref idTerm=2911>línu</ref> og gefinn <ref idTerm=4001>punkt</ref>, sem ekki er á línunni gildir að allar línur sem fara í gegnum punktinn <ref idTerm=4771>skera</ref> línuna”	Í þessari rúmfræði skerast tvær línur ávallt og <ref idTerm=2225>hornasumma</ref> <ref idTerm=6438>þríhyrnings</ref> er stærri en 180 <ref idTerm=1667>gráður</ref>	
5009	sporger sjálfmótun, sporger færsla			
5010	sporger virki			
5011	sporgerð			
5012	sporgerð			
5013	sporgert fall			
5014	sporgert fall Jacobis			
5015	sporgert heildi, sporgert tegur			
5016	sporlína			
5017	sporvala			
5018	sporvölufötur, sporbaugsflötur			
5019	sporvöluhnit			
5020	sporvölusnúðflötur			
5021	sporvölusnúður			
5022	spunabundin			
5023	spunaferill			
5024	spunafylki			
5025	spunagrúpa			
5026	spunaútsetning			
5027	spuni			
5028	spyrðing			
5029	spyrðing af hámarksstærð			
5030	spyrðingarsetning			
5031	spyrður			
5032	spyrtur hnútur			
5033	stað-			
5034	staða			
5035	staða, stelling			
5036	staðal-			
5037	staðal-			
5038	staðalfrávik			
5039	staðalfrávik úrtaks			


5040	staðalgebra			
5041	staðalgerð, normleg gerð, staðalframsetning, normleg framsetning			
5042	staðalgrannmynstur			
5043	staðalgrannmynstur			
5044	staðaljafna			
5045	staðall, lengd			
5046	staðalrækinn			
5047	staðalsamleitinn			
5048	staðalsamleitni			
5049	staðalsamleitni			
5050	staðalskekkja			
5051	staðalskekkja meðaltals			
5052	staðalþverlægni			
5053	staðarfall			
5054	staðarvigur, stöðuvigur			
5055	staðaugljós			
5056	staðbaugað rúm			
5057	staðbaugur			
5058	staðbinda			
5059	staðbinding			
5060	staðbundið hágildi, hágildi			
5061	staðbundið lággildi, lággildi			
5062	staðbundið útgildi			
5063	staðbundin Lie-grúpa, Lie-grúpukím			
5064	staðbundinn eiginleiki			
5065	staðbundinn, stað-			
5066	staðendanlega spannaður			
5067	staðendanlegur			
5068	staðfastur			
5069	staðfrjáls			
5070	staðgengill			
5071	staðgrannmóta			
5072	staðhæfing			
5073	staðhnit, staðhnitafall			
5074	staðhnitakerfi, staðhnit, kort			
5075	staðkúptur			
5076	staðla			
5077	staðlað línulegt rúm, staðlað vigurrúm, staðlað vektorrúm			
5078	staðlaður			
5079	staðlaður			
5080	staðlaður			
5081	staðlaður grunnur			
5082	staðlanlegur			

5083	staðlanlegur			
5084	staðlítill, staðsmár			
5085	staðlokaður			
5086	staðsamanhangandi, staðsamhangandi			
5087	staðstiki, staðbundinn stiki			
5088	staðstikun, staðbundin einstikun			
5089	staðsvið, staðkroppur			
5090	staðtakmarkaður, staðskorðaður			
5091	staðtala, lýsitala			
5092	staður			
5093	staðvegsamanhangandi, staðvegsamhangandi			
5094	staðþjappaður			
5095	staðþjappleiki, staðþjöppun			
5096	stæða			
5097	stæða, stærðtákn			
5098	stæðafjöldi			
5099	stæði			
5100	stækkun, viðbót, auki			
5102	stærð			
5103	stærð, fjöldatala			
5104	stærð, stórleiki			
5105	stærð, þrep			
5106	stærðarþrep, tugaþrep			
5107	stærðfræði			
5113	stærðfræðilegt líkan			
5114	stærðfræðilegur hlutur			
5116	stærðfræðimynstur, stærðfræðilegt mynstur			
5117	stærðfræðingur	Einstaklingur sem iðkar <ref idTerm=5107>stærðfræði</ref>		
5118	stærri			
5119	stærri eða jafn, stærri eða jafn og, frekar stærri			
5120	stærsta stak, efsta stak, hæsta stak, síðasta stak			
5121	stærsti samdeilir, stærsti sameiginlegi deilir			
5122	stafræn tölva			
5123	stafrænn			
5124	stafrófsröð, stafrófsröðun			
5125	stafur, bókstafur, tákn			
5126	stak fylkis, stuðull fylkis			
5127	stak utan hornalínu			
5128	stak, íbúi			

5129	stak, stuðull			
5130	stakbreyta			
5131	stallagerð, þrepagerð, þrepaskipan			
5132	standandi bylgja			
5133	stefna			
5134	stefna á			
5135	stefna, átt			
5136	stefnd lína, áttuð lína			
5137	stefndur til hægri			
5138	stefndur til vinstri			
5139	stefnt línustrik			
5140	stefnt mengi			
5141	stefnu-			
5142	stefnuafleiða			
5143	stefnubundin fjarlægð			
5144	stefnudeildun, stefnudiffrun			
5145	stefnuhorn			
5146	stefnuskrá Hilberts			
5147	stefnustuðull, stefnukósínus			
5148	stefnusvið, einingarvigursvið			
5149	stefnuvigur			
5150	sterk fylgni			
5151	sterk lausn			
5152	sterk samleitni			
5153	sterkari kenning			
5154	sterklega			
5155	sterklega samleitinn			
5156	sterkt grannmynstur			
5157	sterkur			
5158	stétt, myndvídd, metorð, tign			
5159	stétt, tign			
5160	stig			
5161	stig	Sjá <ref idTerm=1948>margliða</ref>	Stig <ref idTerm=3563>núllmargliðunnar</ref> er ekki unnt að skilgreina með skynsamlegum hætti sem <ref idTerm=1896>heila tölu</ref> og er því stig hennar sagt vera óskilgreint	
5162	stig			
5164	stíga, vaxa, hækka			
5165	stigaður			
5166	stígandi keðja, vaxandi keðja			
5167	stígandi, vaxandi			
5168	stígandi, vaxandi, hækkandi			
5169	stiglækkun			
5170	stigskipt úrtaka			

5171	stigulaðferð, aðferð mesta bratta		
5172	stigull		
5173	stigun		
5174	stika, hlaupa		
5175	stikabundið próf		
5176	stikabundin tilgáta		
5177	stikaður ferill, hlaupinn ferill		
5178	stikaður, hlaupinn		
5179	stikaður, stika-		
5180	stikaframsetning, hlaupaframsetning		
5181	stikajafna, hlaupajafna		
5182	stikalaus		
5183	stikalaus		
5184	stikalaust próf		
5185	stikarúm, hlauparúm		
5186	stiki, hlaupi, hlaupabreyta, aukabreyta, hlaupastærð, færíbreyta		
5187	stikun		
5188	stilkur		
5189	Stirling-tala		
5190	stjarfleiki		
5191	stjarfur		
5192	stjarfur hlutur		
5193	stjarna		
5194	stjarna		
5195	stjökun		
5196	stjökunarvirki		
5197	stjörf hreyfing, stjarfur flutningur		
5198	stjórn, stýring		
5199	stjórna, stýra		
5200	stjórnabreyta, stýribreyta, ákvörðunar-breyta		
5201	stjörnualgebra		
5202	stjörnuferill		
5203	stjörnumargflötungur, stirndur marg-flötungur		
5204	stjörnusvæði, stjörnulaga svæði		
5205	stjörnuþykkvi, stjörnulaga þykkvi, stjörnulaga rúmmynd		
5206	stoð		
5207	stoðafjölskylda		
5208	stoðfall		
5209	stoðhending, hjálparhending		
5210	stoðlína		
5211	stöðluð algebra		

5212	stöðluð dreifing			
5213	stöðluð Gauss-dreifing, stöðluð normal-dreifing, stöðluð normleg dreifing			
5214	stöðluð hending			
5215	stöðluð margliða	<ref idTerm=1948>Margliða</ref> þar sem gildi <ref idTerm=1384>forystustuðulsins</ref> er 1	Margliðan $x^2 + 2x + 3$ er stöðluð margliða af <ref idTerm=5161>stigi</ref> 2	
5216	stöðlun			
5217	stöðslétta			
5218	stöðug lausn			
5219	stöðugleikagrúpa			
5220	stöðugleiki			
5221	stöðugt ástand			
5222	stöðugt ferli			
5223	stöðugt hlutmengi			
5224	stöðugur			
5225	stöðugur, stöðu-			
5226	stöðurúm, svigrúm, stellingarúm			
5227	stofnbrot	<ref idTerm=234>Almennt brot</ref> á forminu $\frac{1}{n}$ þar sem n er <ref idTerm=2535>jákvæð</ref> <ref idTerm=1896>heiltala</ref>		
5228	stofnbrot, hlutbrot			
5229	stofnbrotaliðun, hlutbrotaliðun, liðun í stofnbrot, liðun í hlutbrot			
5230	stofnfall			
5231	stofnfrumsenda, stofnfrumsetning, frumsenda um stofn, frumsetning um stofn, regluleikafrumsenda, regluleikafrumsetning			
5232	stökk, misgengi			
5233	stökkfall			
5234	stöng hlutvera			
5235	stöplarit			
5236	stórgeisli, umgeisli, geisli umritaðs hrings, geisli umritaðrar kúlu			
5237	stórhringur			
5238	stórt ríki			
5239	stórt ríki			
5240	stranglega			
5241	stranglega einhalla			
5242	stranglega jákvæður, stranglega viðlægur			
5243	stranglega margfeldinn			

5244	stranglega neikvæður, stranglega frá-drægur			
5245	strangleiki			
5246	strangminnkandi, stranglega minnk-andi, strangfallandi, stranglega fallandi, stranglækkandi, stranglega lækkandi, síminnkandi, sífallandi, sílækkandi			
5247	strangt þríhyrningsfylki			
5248	strangur			
5249	strangur, rökfastur			
5250	strangvaxandi, stranglega vaxandi, strangstígandi, stranglega stígandi, stranghækkandi, stranglega hækkandi, sívaxandi, sistígandi, síhækkandi			
5251	straumfall			
5252	straumlína			
5253	straumur			
5254	strendingsbróðir			
5255	strendingsflötur			
5256	strendingsfrændi			
5257	strendingsstúfur, stýfður strendingur			
5258	strendingur			
5259	streng-			
5260	strengfirð			
5261	strengur	<ref idTerm=2958>Línustrik</ref> sem hefur báða endapunkta sína á <ref idTerm=2295>hring</ref> kallast <i>strengur</i> í hringnum	Ef miðja hringsins liggur á streng kallast sá strengur <i>miðstrengur</i>. Á eftirfarandi mynd má sjá hring með miðju <i>M</i>:  Strikið <i>AB</i> er strengur í hringnum og strikið <i>CD</i> er miðstrengur	Laga bakgrunnslit á myndinni
5262	strengur			
5263	streymi			
5264	strik, merki			

5265	stríkkun	<ref idTerm=5779>Færsla</ref> λ kallast <i>stríkkun</i> með <i>miðju</i> í punktinum M ef fyrir alla punkta P gildir að <ref idTerm=2072>hlutfallið</ref> milli <ref idTerm=2860>lengda</ref> <ref idTerm=2958>strikanna</ref> MP og $M\lambda(P)$ er fasti k, sem kallast þá <i>kvarði</i> stríkkunarinnar		Finna mynd
5266	stríkkunarhlutfall			
5267	stríkkunarstuðull			
5268	strjál bestun			
5269	strjál breyta			
5270	strjál dreifing			
5271	strjál hending			
5272	strjál stærðfræði			
5273	strjála			
5274	strjáll tími			
5275	strjált dreifingarfall			
5276	strjált ferli			
5277	strjált róf			
5278	strjált streymi			
5279	strjálun			
5280	strjálunarskekkja			
5281	ströng leiðing			
5282	ströng ójafna			
5283	ströng röðun			
5284	ströng sönnun			
5285	strútur			
5286	strýta, píramíti	<ref idTerm=6532>Rúmmynd</ref> sem afmarkast af <ref idTerm=3161>marghyrnings</ref> <ref idTerm=2579>fleti</ref> <ref idTerm=2579>fletinum</ref> sem fæst með því að draga <ref idTerm=2958>línustrik</ref> milli <ref idTerm=4001>punkta</ref> marghyrningsins og eins tiltekens punkts		
5287	strýtustúfur, píramítastúfur, stýfð strýta, stýfður píramíti			
5288	stuðlafylki			
5289	stuðlasamanburður, stuðlaákvörðun			
5290	stuðull	Sjá <ref idTerm=1948>margliða</ref>		
5291	stúfabundin			
5292	stúfur			
5293	stúfur			


5294	stuttur, skammur			
5295	stýfa			
5296	stýfð röð			
5297	stýfður			
5298	stýfing			
5299	stýfingarskekkja			
5300	stýrð breyta			
5301	stýriferill			
5302	stýrifræði			
5303	stýrifræði			
5304	stýrilína			
5305	styrkur, styrkleiki			
5306	stytt margföldun, stuttamargföldun			
5307	styttu			
5308	styttu, styttu út, styttu burt			
5309	styttanlegt stak			
5310	styttanlegur			
5311	styttanleiki			
5312	styttin hálfgrúpa			
5313	styttning			
5314	styttning			
5315	styttningarskekkja			
5316	styttinn			
5317	styttiregla			
5318	suðurskaut, suðurpóll			
5319	súlurit, stuðlarit			
5320	summa, samtala			Skilgreina
5321	summumyndun			
5322	summumyndunaraðferð, summuaðferð			
5323	summutákn			
5324	sundurgreining, greining, krufning			
5325	sundurlæg skipting			Skilgreina
5326	sundurlægir atburðir			
5327	sundurlægir tveir og tveir			
5328	sundurlægt sammengi			
5329	sundurlægur, óskaraður	Tvö $\langle \text{ref idTerm=3270} \rangle$ mengi $\langle \text{ref idTerm=5128} \rangle$ stak $\langle \text{ref idTerm=5128} \rangle$, þ.e. ef $X \cap Y = \emptyset$		Finna mynd? Er það nauðsynlegt?
5330	sundurlaus, strjáll			
5331	sundurlaust grannmynstur, strjált grannmynstur			
5332	sundurlaust rúm, strjált rúm			
5333	sundurleitni			

5334	sundurliðun			
5335	svæði			
5336	svæðisheildi, svæðistegur			
5337	svæðismat			
5338	svar, svörun			
5339	svarferill			
5340	svarflötur			
5341	sveifarferill			
5342	sveifla			
5343	sveifla			
5344	sveigð hnit			
5345	sveigfeldi			
5346	sveimferli			
5347	sveimstuðull			
5348	sveipferill			
5349	svið			
5350	svið ræðra talna			
5351	svið, kroppur			
5352	sviðaðfræði, kroppafræði			
5353	sviðsfræði			
5354	sviðsútvíkkun, sviðsvíkkun			
5355	svigalaus ritháttur			
5356	svigi			
5357	svigrúmsvídd			
5358	svipalgebra			
5359	svipflokkur			
5360	svipfræði			
5361	svipgrúpa			
5362	sviphjávídd, hjávídd, dýpt			
5363	svipjafngildi			
5364	svipjafngildur			
5365	svipkenning			
5366	sviplest			
5367	svipvídd			
5368	syðra hálfhvel, suðurhvel			
5369	Sylow-hlutgrúpa, Sylow-grúpa			
5370	sýndaróendanleiki			
5371	tæming			
5372	tæmingaraðferð			
5373	tafla			
5374	taka			
5375	taka (gildi)			
5376	taka enda			
5377	taka saman			
5378	taka til láns			

5379	taka út fyrir sviga			
5380	takmarkað fall, skorðað fall	$\langle \text{ref idTerm=1078} \rangle \text{Fall} \langle / \text{ref} \rangle \quad f : X \rightarrow Y$ kallast <i>takmarkað</i> ef til er $\langle \text{ref idTerm=4093} \rangle \text{rauntala} \langle / \text{ref} \rangle \quad C$ þannig að $ f(x) \leq C$ fyrir öll $x \in X$	Það að fall sé takmarkað jafngildir því að $\langle \text{ref idTerm=3417} \rangle \text{myndmengi} \langle / \text{ref} \rangle$ þess sé $\langle \text{ref idTerm=5381} \rangle \text{takmarkað mengi} \langle / \text{ref} \rangle$. Til dæmis er $\langle \text{ref idTerm=4647} \rangle \text{sínusfallið} \langle / \text{ref} \rangle$ $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takmarkað vegna þess að $\sin(\mathbb{R}) = [-1, 1]$ sem er takmarkað mengi	
5381	takmarkað mengi, skorðað mengi	$\langle \text{ref idTerm=4093} \rangle \text{Rauntalna} \langle / \text{ref} \rangle \langle \text{ref idTerm=3270} \rangle \text{mengi} \langle / \text{ref} \rangle \quad A$ kallast <i>takmarkað</i> ef til er rauntala C þannig að $ x \leq C$ fyrir öll $x \in A$	Skilgreiningin á líka við $\langle \text{ref idTerm=5682} \rangle \text{tvinntalna} \langle / \text{ref} \rangle$ mengi. Almennt er sagt að $\langle \text{ref idTerm=1200} \rangle \text{firðrúm} \langle / \text{ref} \rangle \quad (X, d)$ sé takmarkað ef til er rauntala C þannig að $d(x, y) \leq C$ fyrir öll $x, y \in X$	
5382	takmarkað svæði, skorðað svæði			
5383	takmarkað vik			
5384	takmarkað vik, skorðað vik			
5385	takmarkaður að mestu, næstum takmarkaður, skorðaður að mestu, næstum skorðaður			
5386	takmarkaður að neðan, skorðaður að neðan	$\langle \text{ref idTerm=4093} \rangle \text{Rauntalna} \langle / \text{ref} \rangle \langle \text{ref idTerm=3270} \rangle \text{mengi} \langle / \text{ref} \rangle$ kallast <i>takmarkað að neðan</i> ef það hefur $\langle \text{ref idTerm=5818} \rangle \text{undirtölu} \langle / \text{ref} \rangle$	Almennt er sagt að $\langle \text{ref idTerm=4009} \rangle \text{hlutráðað mengi} \langle / \text{ref} \rangle$ sé takmarkað að neðan ef það hefur undirstak. Til dæmis er $\langle \text{ref idTerm=1840} \rangle \text{hálfínan} \langle / \text{ref} \rangle \quad [0, \infty)$ takmörkuð að neðan en talan 0 er sjálf undirtala	
5387	takmarkaður að ofan, skorðaður að ofan	$\langle \text{ref idTerm=4093} \rangle \text{Rauntalna} \langle / \text{ref} \rangle \langle \text{ref idTerm=3270} \rangle \text{mengi} \langle / \text{ref} \rangle$ kallast <i>takmarkað að ofan</i> ef það hefur $\langle \text{ref idTerm=6280} \rangle \text{yfirtölu} \langle / \text{ref} \rangle$	Almennt er sagt að $\langle \text{ref idTerm=4009} \rangle \text{hlutráðað mengi} \langle / \text{ref} \rangle$ sé takmarkað að ofan ef það hefur yfirstak. Til dæmis er $\langle \text{ref idTerm=1840} \rangle \text{hálfínan} \langle / \text{ref} \rangle \quad (-\infty, 0]$ takmörkuð að ofan en talan 0 er sjálf yfirtala	
5388	takmarkaður í hverjum punkti, skorðaður í hverjum punkti			
5389	takmarkaður í jöfnum mæli, skorðaður í jöfnum mæli			
5390	takmarkaður, skorðaður			
5391	takmörkuð afstæðiskenning			
5392	takmörkuð keðja, skorðuð keðja			
5393	takmörkun í jöfnum mæli, skorðun í jöfnum mæli, jafnmælisskorðun			
5395	táknmál			
5396	táknrænn			



5397	tala			
5398	tala			
5399	tala með formerki			
5400	tálmafall			
5401	tálmi			
5402	talnabil			
5403	talnabrot			
5404	talnaeining			
5405	talnafasti			
5406	talnafræði margföldunar			
5407	talnafræði samlagningar			
5408	talnafræði, talnalist			
5409	talnafræðifall, talnafræðilegt fall			
5410	talnafræðilegur			
5411	talnafræðingur			
5412	talnagögn			
5413	talnagrind, kúlnagrind, reiknigrind			
5414	talnahvel Riemanns			
5415	talnakerfi			
5416	talnalína, talnaás, rauntalnalína, raun- talnaás, raunás	<ref idTerm=2911>Lína</ref> með tvo aðgreinda <ref idTerm=4001>punkta</ref> <i>O</i> (<i>núllpunktur</i>) og <i>E</i> (<i>eingarpunktur</i>) sem svara til <ref idTerm=3475>náttúrulegu talnanna</ref> 0 og 1. <ref idTerm=1204>Fjarlægðin</ref> milli þessa punkta er notuð sem <ref idTerm=2860>lengdareining</ref> og <ref idTerm=1896>heiltölunum</ref> er raðað á línuna þannig að <ref idTerm=4458>samliggjandi</ref> tölur eru í þessari fjarlægð frá hvor annarri		Skóða.

Parf
að
minn-
ast á
hvernig
ræð-
ar og
óræð-
ar
tölur
dreifast
inn á
lín-
una
líka?
Ætti
frek-
ar að
skil-
greina
talnalín-
una
beint
með
tilliti
til
raun-
talna
og
nota
þá
eftir-
far-
andi
mynd



-
Skoða
betur

5417	talnalykill		
5418	talnareikningur		
5419	talnaröð		
5420	talnarúm		
5421	talnaruna		


5422	talnaslétta			
5423	talnastærð			
5424	talnastuðull			
5425	talnatákn, tölutákn			
5426	talnatvennd			
5427	talning, upptalning			
5428	talningarferli			
5429	talningarfræði			
5430	talningarmál			
5431	tangens	<ref idTerm=2202>Hornafall</ref> sem er skilgreint sem $\frac{\sin(A)}{\cos(A)}$ fyrir $A \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, táknað $\tan(A)$. Fyrir <ref idTerm=4173>rétthyrndan þríhyrning</ref> ABC þar sem C er <ref idTerm=4167>rétt horn</ref> er <i>tangens</i> af <ref idTerm=2198>horninu</ref> A <ref idTerm=2072>hlutfallið</ref> milli <ref idTerm=2860>lengd</ref> <ref idTerm=3396>mótlægrar</ref> <ref idTerm=4725>skammhliðar</ref> og lengd <ref idTerm=65>aðlægrar</ref> skammhliðar. Sjá eftirfarandi mynd: 	Eftirfarandi mynd sýnir hluta <ref idTerm=2955>grafs</ref> tangensfallsins: 	Laga nöfn?
5432	tangensregla			
5433	tapfall			
5434	Tauber-setning			
5435	Taylor-liðun			
5436	Taylor-röð			
5437	tegund			
5438	tegund			
5439	teikna			
5440	teikna, draga			
5441	teikna, draga			

5442	teiknifræði, lýsandi rúmfræði			
5443	teikniheildun, teiknitegrun			
5444	teiknihorn			
5445	teiknilausn			
5446	teikning			
5447	teikning með hringfara			
5448	teikning með hringfara og reglustiku			
5449	teikning, dráttur, uppdráttur, rúmfræðileg teikning			
5450	teikning, uppdráttur, dráttur			
5451	teikniverkefni, dráttardæmi			
5452	telja			
5453	teljanlega óendanlegur			
5454	teljanlega viðbætinn, sigma-viðbætinn, teljanlega samleggjandi, sigma-samleggjandi			
5455	teljanlega þjappaður, sigma-þjappaður			
5456	teljanlegt mengi			
5457	teljanlegur			
5458	teljanlegur óendanleiki			
5459	teljanleikafrumsenda, teljanleikafrumsetning			
5460	teljanleikaskilyrði, teljanleikafor-senda, teljanleikafrumsetning, teljanleikafrumsenda			
5461	teljanleiki			
5462	teljari	Sjá <ref idTerm=234>almennt brot</ref>		
5463	tempruð dreif, temprað dreififelli			
5464	tengd ástönd			
5465	tengi-			
5466	tengilína			
5467	tengill			
5468	tengimótun			
5469	tengin aðgerð, tengin reikniaðgerð			
5470	tengin algebra			
5471	tenging			
5472	tenginn	<ref idTerm=46>Reikniaðgerð</ref> $\odot$ sem uppfyllir <ref idTerm=5473>tengiregluna</ref>		

5473	tengiregla	$\odot : X \times X \rightarrow X$ á X er sögð fullnægja <i>tengireglunni</i> ef fyrir sérhver $x, y, z \in X$ gildi að $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	Margar aðgerðir í algengri notkun uppfylla tengiregluna en þó eru til ótengnar aðgerðir. Sem dæmi má nefna veldishafningu en til að mynda er $(2^3)^2 \neq 2^{(3^2)}$. Athugum að $(2^3)^2 = 8^2 = 64$ en $2^{(3^2)} = 2^9 = 512$	
5474	tengivegur			
5475	tengni			
5476	tengslatafla, slembitafla			
5477	tengt frumíðal			
5478	teningsgrúpa, áttflötungsgrúpa			
5479	teningstala, verpítala			
5480	teningur, verpill, reglulegur sexflötungur	K þar sem allar h eru f	Eftirfarandi er mynd af teningi:	
5481	tíðni			
5482	tíðnidreifing			
5483	tíðnifall			
5484	tíðnirit			
5485	tígulflötungur			
5486	tígull, tígull	F með allar h jafn l	Eftirfarandi er mynd af tígli:	
5487	tílhyrningur			
5488	tilfærsla			
5489	tilfærsla á stuðlum, stuðlatilfærsla			
5490	tilfelli, tilvik			
5491	tilgáta			

5492	tilgáta			
5493	tilgáta Riemanns			
5494	tilheyra, vera í, vera stak í			
5495	tilraun			
5496	tilraunafall			
5497	tilraunahögun, högun			
5498	tilraunaskekkja			
5499	tilsvarandi óhliðrað hneppi			
5500	tiltölulega lokað mengi			
5501	tiltölulega opið mengi			
5502	tiltölulega þjappað mengi			
5503	tilvikasönnun			
5504	tilviljun			
5505	tilviljunarákvörðun, tilviljanakennd ákvörðun			
5506	tilvist			
5507	tilvistar- og ótvíræðnisetning			
5508	tilvistarleysi			
5509	tilvistarlokun			
5510	tilvistarmagnari, tilvistarvirki			
5511	tilvistarsetning			
5512	tilvistarsönnun			
5513	tilvistartákn			
5514	tímabreyta			
5515	tímaóháður, sjálfstýrandi			
5516	tímaraðagreining			
5517	tímaröð, tímaruna			
5518	tímarúm			
5519	töfraferningur			
5520	togferill			
5521	togfræði			
5522	toggerð			
5523	toggrúpa			
5524	togjafngildi			
5525	togjafngildur			
5526	toglest			
5527	togunarinndragi			
5528	togunarinndráttur			
5529	tólflata			
5530	tólflötungsgrúpa, tvítugflötungsgrúpa			
5531	tólflötungur			
5532	tólfhyrningur			
5533	tölfræði			
5534	tölfræðileg ályktun			
5535	tölfræðileg marktekt			

5536	tölfræðileg tilgáta			
5537	tölfræðilega marktækur			
5538	tölfræðilegt eftirlit			
5539	tölfræðilegt próf, marktektarpróf			
5540	tölfræðingur			
5541	tölugildur			
5542	tölukrappi, krappatala			
5543	töluleg aðferð			
5544	töluleg deildun, töluleg diffrun			
5545	töluleg gögn, staðtölur, lýsitölur			
5546	töluleg greining			
5547	töluleg heildun, töluleg tegrun			
5548	töluleg lausn, talnalausn			
5549	töluleg línuleg algebra			
5550	töluleg nálgunarfræði			
5551	tölulegur, talnalegur			
5552	tölumargfeldi (vigurs)			
5553	tölumargföldun			
5554	töluóbreyta			
5556	tölusett net, markað net, merkt net			
5557	tölusettur			
5558	tölustafur	<ref idTerm=5394>Tákn</ref> sem stendur fyrir ákveðna <ref idTerm=3475>náttúrulega tölu</ref>	Algengustu tölustafirnir sem notaðir eru í stærðfræði eru svokallaðir arabískir tölustafir: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 sem eru notaðir í <ref idTerm=5415>talnakerfum</ref> með grunntölu minni en eða jöfn 10. Fyrir talnakerfi með stærri grunntölum er síðan yfirleitt sótt tákn úr rómverska stafrófinu: A, B, C og svo framvegis til þess að tákna tölur stærri en 9	
5559	tölustafur, fingur			
5560	tölustafur, fingur			
5561	tölusvið			
5562	tölva, reiknivél			
5563	tölvufræði, tölvunarfræði			
5564	tómt mengi, tómamengi	<ref idTerm=3270>Mengið</ref> með engin <ref idTerm=5128>stök</ref>, ýmist táknað með $\emptyset$, $\varnothing$ eða $\{\}$		
5565	tómur			
5566	tómur flokkur			

5567	topphorn	<i>Topp horn</i> getur ýmist átt við <ref idTerm=2198>hornið</ref> sem jöfnu <ref idTerm=2048>hliðar</ref> <ref idTerm=2496>jafnhliða þríhyrnings</ref> mynda eða tvöfalt <ref idTerm=0>áshorn</ref> <ref idTerm=2576>keilu</ref> eða <ref idTerm=5286>píramída</ref>		Vantar færslu fyrir áshorn
5568	topphorn, gagnstæð horn	<ref idTerm=2198>Hornið</ref> sem <ref idTerm=3400>gagnstæðar</ref> <ref idTerm=1840>hálfínur</ref> við <ref idTerm=334>arma</ref> <ref idTerm=2198>horns</ref> mynda kallast <i>mótlægt horn</i> upphaflega hornsins og sagt er að þessi tvö horn séu <i>gagnstæð horn</i>	Eftirfarandi er mynd sem sýnir gagnstæð horn:  Rauðu hálfínurnar eru mótlægar við bláu hálfínurnar og rauða hornið er því mótlægt við bláa hornið. Gagnstæð horn eru alltaf jafn stór	Reyna að gera skýrar.
5569	topppunktur			
5570	topppunktur, tindur, toppur, broddur			
5571	torræð tala			
5572	torræðni			
5573	torræðnigrunnur			
5574	torræðnistig			
5575	torræður			
5576	torrætt fall			
5577	trapisa, hálfamsíðungur	<ref idTerm=1127>Ferhyrningur</ref> þar sem einhver <ref idTerm=2048>hlið</ref> er <ref idTerm=4509>samsíða</ref> <ref idTerm=3396>mótlægri hlið</ref> sinni	Eftirfarandi er mynd af trapisu: 	
5578	tré			

5579	trefja	<ref idTerm=1366>Frummynd</ref> <ref idTerm=3282>vörpunar</ref> $f : X \rightarrow Y$ af <ref idTerm=963>einstökunum</ref> $\{y\}$ þar sem $y \in Y$, oft táknuð $f^{-1}(\{y\})$ eða $f^{-1}(y)$ ef engin hættu er á misskilningi		
5580	trefjabundin			
5581	trefjamargfeldi			
5582	trefjarækin vörpun			
5583	trefjarúm			
5584	trefjun			
5585	tregða			
5586	tregðuregla, tregðuregla Sylvesters			
5587	tregðuvísir			
5588	troðsla			
5589	troðsluverkefni			
5590	troðslubéttleiki			
5591	truflaður			
5592	truflanafræði			
5593	truflanaliður			
5594	truflanastiki			
5595	truflun			
5596	trygg túlkun			
5597	trygg útsetning			
5598	trygg verkun			
5599	tryggilega flatur			
5600	tryggingastærðfræði			
5601	tryggur			
5602	tryggur mótull			
5603	tryggur varpi			
5604	Tsjebysjev-margliða			
5606	tugabrot			
5607	tugabrot			
5608	tugabrotshluti			
5609	tugabrotshliðun, tugabrotsrakning, tugabrotsteygð			
5611	tugakerfi			
5612	tugalogri, venjulegur logri, logri með grunntölu, logri með stofntölu, Briggs-logri			
5613	tugasæti			
5614	tugastafur			
5615	tugastafur			
5616	tugatala, tala í tugakerfi			


5617	túlkun			
5618	tunna			
5619	tunnurúm			
5620	Turing-reiknanlegur			
5621	Turing-vél			
5622	turn			
5623	turn af sviðum			
5624	tveggja manna leikur			
5625	tveggjaferningasetning			
5626	tveir og tveir			
5627	tvennd, raðtvennd, röðuð tvennd	Par <ref idTerm=2123>hluta</ref> í tiltekinni röð	Fyrir tvo hluti $x \in X$ og $y \in Y$ þar sem X og Y eru <ref idTerm=3270>mengi</ref> er tvenndin (x,y) stak í <ref idTerm=3279>faldmenginu</ref> $X \times Y$	
5628	tvíaðfelldur þríhyrningur			
5629	tvíblaða			
5630	tvíblaða breiðbogaflötur, tvískála breiðbogaflötur			
5631	tvíblaða þekjurúm			
5632	tvídeildanlegur, tvídifffranlegur			
5633	tvífléttingur			
5634	tvíflokkun			
5635	tvíflötungsgrúpa			
5636	tvíflötungur			
5637	tvígild rökfræði			
5638	tvígildur			
5639	tvígildur			
5640	tvíhliða			
5641	tvíhliða flötur			
5642	tvíhliða íðal			
5643	tvíhliða mótull			
5644	tvíhliða öryggisbil			
5645	tvíhliða próf			
5646	tvíhliða umhverfa			
5647	tvíhliða, frá báðum hliðum			
5648	tvíhlutanet			
5649	tvíhoralínufylki			
5650	tvíhyrningur			
5651	tvíhyrningur, kúlutvíhyrningur, kúlusigð			
5652	tvíkeila, tvöföld keila			
5653	tvíkostur			
5654	tvíkostur Fredholms, tilvik Fredholms			
5655	tvíkryppudreifing, tvítindadreifing			

5656	tvíliða jafna, tvíliðujafna			
5657	tvíliða, tvíliða stærð			
5658	tvíliðu-, tvíliða			
5659	tvíliðudreifing, tvíkostadreifing, Bernoulli-dreifing			
5660	tvíliðuregla			
5661	tvíliðuröð			
5662	tvíliðusetning			
5663	tvíliðustuðull			
5664	tvílíkindafylki			
5665	tvílínuleg vörpun			
5666	tvílínulegt form			
5667	tvílínulegur			
5668	tvílitun			
5669	tvílotubundinn, tvílotulegur	Sjá skýringu við <ref idTerm=3049>lotubundið fall</ref>		Finna mynd?
5670	tvílotuleiki			
5671	tvinn-, tvinntalna-			
5672	tvinnbreyta, tvinnbreytistærð			
5673	tvinnfall, tvinngilt fall, tvinntölugilt fall			Skilgreina
5674	tvinnfallagreining, tvinnfallafræði, tvinn-greining			
5675	tvinnfylki, tvinntalnafylki			
5676	tvinngildur, tvinntölugildur			
5677	tvinnlína			
5678	tvinnlínubundin			
5679	tvinnpunktur			
5680	tvinnrúmfræði			
5681	tvinnslétta			
5682	tvinntala			Skilgreina
5683	tvinntalnakerfi			
5684	tvinntalnarúm			
5685	tvinntalnaslétta, tvinnslétta			
5686	tvinntalnasvið			
5687	tvinnun			
5688	tvinnvarplína			
5689	tvinnvarprúm, varprúm yfir tvinntölurnar			
5690	tvinnvarpslétta, varpslétta yfir tvinntölurnar			
5691	tvinnvigurrúm, tvinnlínulegt rúm, vigurrúm yfir tvinntölurnar, línulegt rúm yfir tvinntölurnar			
5692	tvinnþverstaðalgrúpa, þverstaðalgrúpa yfir tvinntölurnar			
5693	tvípunktur, tvöfaldur punktur			


5694	tvíraðafylgni, tvírunufylgni			
5695	tvírétthyrndur			
5696	tvískífa			
5697	tvískilyrðing, gagnkvæm skilyrðing			
5698	tvískipting			
5699	tvískipting, tvíhlutun			
5700	tvískiptitala			
5701	tvísniðill			
5702	tvístæð aðgerð	<ref idTerm=46>Aðgerð</ref> á <ref idTerm=3270>mengi</ref> X af gerð-inni $X \times X \rightarrow X$ kallast <i>tvístæð aðgerð</i>	Dæmi um tvístæðar aðgerðir eru <ref idTerm=0>samlagning</ref> og <ref idTerm=3141>margföldun</ref> á <ref idTerm=3270>mengi</ref> <ref idTerm=4093>rauntalna</ref> $\mathbb{R}$	
5703	tvístæð samtenging, tvístæður tengill			
5704	tvístæð umsögn			
5705	tvístæð vensl			Skilgreina
5706	tvístæður			
5707	tvístakaruna			
5708	tvístigaður			
5709	tvístika fjölskylda			
5710	tvístökungur, tveggjastakamengi			
5711	tvístrun			
5712	tvisvar, tvisvar sinnum, tví-			
5713	tvítengt net			
5714	tvítugakerfi			
5715	tvítugflata			
5716	tvítugflötungur			
5717	tvíunda-			
5718	tvíundaframsetning			
5719	tvíundakerfi	<ref idTerm=6668>Talnaritunarkerfi</ref> með grunntölu 2. Yfirleitt notað <ref idTerm=5558>tölustafna</ref> 0 og 1		Ræða not í skýringu?
5720	tvíundasæti			
5721	tvíundatala			
5722	tvíundatalnaritun			
5723	tvíundatré, tvískiptitré			
5724	tvíveldasumma, feringasumma			
5725	tvíveldi, annað veldi, feringur			
5726	tvívíð dreifing			
5727	tvívíð Gaussdreifing, tvívíð normleg dreifing, tvívíð normaldreifing			
5728	tvívíðbætinn, tvísamleggjandi			
5729	tvívíður			
5730	tvívíður			
5731	tvívigur			

5732	tvívíxill			
5733	tvíþverill			
5734	tvíþýð deildajafna, tvíþýð hlutafleiðujafna			
5735	tvíþýtt fall			
5736	tvöfaldlega samanhangandi, tvöfaldlega samhangandi			
5737	tvöfaldur			
5738	tvöfaldur beygjuskilakrosspunktur			
5739	tvöfalt heildi, tvöfalt tegur			
5740	tvöföld neitun			
5741	tvöföld röð			
5742	tvöföld rót			
5743	tvöföld runa			
5744	tvöföldun tenings			
5745	tvöföldunarregla			
5746	tylfta-, í tylftakerfi			
5747	tylftabrot			
5748	tylftakerfi			
5749	tylftaritháttur			
5750	úffeldi			
5751	úfur			
5752	umáttun			
5753	umbunarfall			
5754	umfangsfrumsenda, umfangsfrumsetning, frumsenda um umfang, frumsetning um umfang			
5755	umferðarheildi, umferðartegur			
5756	umhverf tala, umhverfa, margföldunarumhverfa, andhverf tala, andhverfa, margföldunarandhverfa, gagnkvæm tala	Fyrir gefna <ref idTerm=4093>rauntölu</ref> $x \neq 0$ kallast rauntala y þannig að $xy = 1$ <i>margföldunarandhverfa</i> x , táknuð með $\frac{1}{x}$ eða x^{-1}	Almennt ef X er <ref idTerm=1742>grúpa</ref> með <ref idTerm=6586>hlutleysu</ref> e þar sem <ref idTerm=1744>grúpuaðgerðin</ref> er táknuð $\cdot$ kallast stak y þannig að $x \cdot y = e$ margföldunarandhverfa x , táknuð x^{-1}	

5757	umhverfa, andhverfa	<i>Andhverfa</i> <ref idTerm=5128>staks</ref> x í <ref idTerm=3270>mengi</ref> X með tilliti til <ref idTerm=46>reikniaðgerðarinnar</ref> $\odot$ með <ref idTerm=0>hlutleysu</ref> e er stak $y \in X$ sem uppfyllir $x \odot y = y \odot x = e$	Ef $\odot$ er <ref idTerm=5473>tengin</ref> <ref idTerm=3932>ákvarðast umhverf-an ótvírætt</ref> af þessum <ref idTerm=4797>skilyrðum</ref> og sér-hvert stak tenginnar reikniaðgerðar hefur því í mesta lagi eina andhverfu. Athugið að andhverfa staks þarf ekki endilega að vera til. Ef reikniaðgerðin sem um ræðir er <ref idTerm=0>samlagning</ref> , þá er andhverfa staksins x yfirleitt táknuð með $-x$. Ef reikniaðgerðin er hins vegar <ref idTerm=3141>margföldun</ref> , þá er andhverfa staksins x yfirleitt táknuð með x^{-1} eða $\frac{1}{x}$.	Vantar færslu fyrir samlagningu
5758	umhverfanlegt fylki, andhverfanlegt fylki, reglulegt fylki, ósérstætt fylki			
5759	umhverfanlegur, andhverfanlegur			
5760	umhverfanlegur, andhverfanlegur, reglu-legur, ósérstæður			
5761	umhverfður veldisvísiferill			
5762	umhverfing			
5763	umhverfing			
5764	umhverfingarhringur, spegilhringur			
5765	umhverfingarmiðja, speglunarmiðja			
5766	umhverft brot			
5767	umhverft fall, margföldunarumhverfa falls, margföldunarandhverfa falls			
5768	umhverfur			
5769	umhverfur, margföldunarumhverfur, and-hverfur, margföldunarandhverfur			
5770	umhverfuröð, þýð röð			
5771	umkvörðun, kvarðafærsla, kvarðabreyt-ing			
5772	umlykja, fela í sér, innifela			
5773	umlykjandi			
5774	ummál	<ref idTerm=2860>Lengd</ref> <ref idTerm=2453>jaðars</ref> <ref idTerm=4891>flatarmyndar</ref> (ef lengdin er <ref idTerm=1009>endanleg</ref>)	Ummál <ref idTerm=6589>hringskífu</ref> er fengið með <ref idTerm=1363>formúlunni</ref> $2\pi r$ þar sem r er geisli skífunnar. Ummál <ref idTerm=3161>marghyrnings</ref> fæst með því að <ref idTerm=2820>leggja saman</ref> allar <ref idTerm=0>hliðarlengdir</ref> hans	Koma með fleiri þekktar formúlur? Er skilgreiningin of torskilin?

5775	ummálsjafnaðarójafna			
5776	ummálsjafnaðarverkefni			
5777	ummálsregla, hálfhornsregla			
5778	ummiðja			
5779	ummyndun, myndun, færsla	<ref idTerm=3282>Vörpun</ref> ϕ : $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sem uppfyllir 1. punktar í tiltekinni röð á sömu línu varpast í punkta í sömu röð á einhverri línu, 2. strik sem eru jafn löng varpast í strik sem eru líka jafn löng		Sömu röð?
5780	ummyndun, umskrift, umritun, breyting			
5781	umreikningur			
5782	umrita			
5783	umritaður			
5784	umritaður hringur	Ef <ref idTerm=2235>hornpunktar</ref> <ref idTerm=3161>marghyrnings</ref> liggja allir á gefnum <ref idTerm=2295>hring</ref>, þá kallast hringurinn <i>umritaður hringur</i> marghyrningsins	Eftirfarandi mynd sýnir umritaðan hring <ref idTerm=4628>sexhyrnings</ref>: 	Laga bakgrunnslit á myndinni
5785	umrituð kúla			
5786	umritun			
5787	umritun			
5788	umröðun			
5789	umröðunarsetning Riemanns			
5790	umsagnarbreyta			
5791	umsagnareikningur			
5792	umsagnarökfræði			
5793	umsagnartákn			
5794	umskiptanleiki			
5795	umskipting, tvírás			
5796	umsögn			

5797	umstikun, endurstikun, stikabreyting, stikaskipti			
5798	umtak, yfirgrip, umfang			
5799	undanfari			
5800	undantekningar-			
5801	undinn			
5802	undinn þriðja stigs ferill			
5803	undirbúningssetning			
5804	undirfall			
5805	undirferðarpunktur			
5806	undirforrit			
5807	undirhoralína			
5808	undirliður			
5809	undirmat, mat að neðan			
5810	undirmeta, meta að neðan			
5811	undirmetanlegur			
5812	undirröð			
5813	undirsetning, undirforsenda			
5814	undirskipað mengi			
5815	undirskipaður			
5816	undirsporger			
5817	undirstaða			
5818	undirstak, undirskorða, undirtala	Fyrir A kallast rauntalan L <i>undirtala</i> mengisins A ef fyrir öll $x \in A$ gildir að $x \geq L$	Almennt getur hluttraðað mengi hugsanlega átt sér <i>undirstak</i> . Slíkt þarf hins vegar ekki endilega að vera til, sem dæmi á mengi rauntalna $\mathbb{R}$ sér ekkert undirstak	
5819	undirstöðuflokkur			
5820	undirstöðugrúpa			
5821	undirstöðugrýpi			

5822	undirstöðusetning algebrunnar, grunnsetning algebrunnar	<i>Undirstöðusetning algebrunnar</i> segir að sérhver <ref idTerm=1948>margliða</ref> yfir <ref idTerm=5682>tvinntölurnar</ref> $\mathbb{C}$ með <ref idTerm=5161>stig</ref> ≥ 1 eigi sér <ref idTerm=4254>núllstöð</ref> í $\mathbb{C}$	Þar sem tvinntala r er núllstöð í margliðu P yfir $\mathbb{C}$ þá og því aðeins að margliðan $(x-r)$ gangi upp í P, þá gefur undirstöðusetningin að sérhverja margliðu P yfir $\mathbb{C}$ megi skrifa á eftirfarandi formi: $P = (x - r_1)^{a_1} (x - r_2)^{a_2} \dots (x - r_k)^{a_k}$ Þar sem $r_1, \dots, r_k$ eru allar núllstöðvar P í $\mathbb{C}$ og $a_1, \dots, a_k$ kallast <i>margfeldni</i> þeirra. Að rita margliðuna á þessu formi kallast að <i>frumþátta</i> hana yfir $\mathbb{C}$. Yfir <ref idTerm=4093>rauntölurnar</ref> tekur undirstöðusetningin eftirfarandi form: Ef P er <ref idTerm=5215>stöðluð margliða</ref> yfir $\mathbb{R}$, þá má skrifa P sem margfeldi af fyrsta stigs margliðum $(x-r_i)$ og <ref idTerm=316>annars stigs margliðum</ref> $x^2 + ax + b$ sem hafa enga núllstöð yfir $\mathbb{R}$. Tölurnar r_i eru allar núllstöðvar margliðunnar	Vantar færslu fyrir fyrsta stigs margliðu?
5823	undirstöðusetning örsmæðareikningsins, grunnsetning reiknivísinnar			
5824	undirstöðusetning reikningslistarinnar, grunnsetning reikningslistarinnar, frumþáttunarsetning	<i>Undirstöðusetning reikningslistarinnar</i> segir að sérhverja <ref idTerm=3475>náttúrulega tölu</ref> n megi skrifa á nákvæmlega einn hátt sem <ref idTerm=3118>margfeldi</ref> af <ref idTerm=1468>frumtölum</ref>. Nánar tiltekið gildir fyrir sérhverja náttúrulega tölu n að til eru <ref idTerm=3932>ótvírætt ákvarðaðar</ref> frumtölur $p_1, \dots, p_k$ og náttúrulegar tölur $a_1, \dots, a_k$ þannig að: $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_{k-1}^{a_{k-1}} \cdot p_k^{a_k}$ Þar sem $p_i < p_j$ þegar $i < j$. Að skrifa töluna n á þessu formi kallast að <i>frumþátta</i> hana. <ref idTerm=5397>Tölurnar</ref> $p_1, \dots, p_k$ kallast þá <i>frumþættir</i> tölunnar n og a_i kallast <i>margfeldni</i> frumþáttarins p_i	Eftirfarandi er frumþáttun á tölunni 252:  Af myndinni sést að 252 frumþáttast sem $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$	Laga bakgrunnslit á myndinni

5825	undirsumma			
5826	undirviðbættinn, undirsamleggjandi			
5827	undirþýður			
5828	upplástur			
5829	uppbygging, smíð			
5830	uppbyggingaraðferð			
5831	uppbyggingarhyggja			
5832	uppbyggjandi			
5833	uppbyggjandi greining			
5834	uppbyggjandi tilvistarsetning			
5835	uppfylling fernings			
5836	uppfyllingarsetning			
5837	uppfyllingarsetning Steinitz			
5838	upphæð			
5839	upphaf, upphafspunktur, hnitmiðja, hnitamiðja			
5840	upphafs-			
5841	upphafsástand			
5842	upphafsgildi, byrjunargildi			
5843	upphafsgildisverkefni, byrjunargildisverkefni, Cauchy-verkefni			
5844	upphafsgrannmynstur			
5845	upphafshlutur			
5846	upphafshnútur, upphafsendi			
5847	upphafslíður			
5848	upphafspunktur			
5849	upphafspunktur			
5850	upphafspunktur			
5851	upphafsskilyrði, byrjunarskilyrði			
5852	upphafsstúfur			
5853	upphenging, hengirúm			
5854	uppleysing			
5855	upplýsingafræði			
5856	upplýsingamagn			
5857	upplýsingar			
5858	uppröðun			
5859	uppsafnaður, hlaðinn			
5860	uppsöfnuð áhrif			
5861	uppsöfnuð skekkja, heildarskekkja			
5862	uppspretta, lind			
5863	uppsprettulaus			
5864	uppsprettulaust svið			
5865	uppsprettustyrkur, lindarstyrkur			
5866	uppstokka, stokka upp, umraða			
5867	uppstokkanagrúpa, umraðanagrúpa			


5868	uppstokkanaútsetning, umraðanaútsetning			
5869	uppstokkun með endurtekningu, umröðun með endurtekningu			
5870	uppstokkun, umröðun			
5871	úrkyndaður			
5872	úrkyjun			
5873	úrskurðanleg fullyrðing, úrskurðanleg yrðing			
5874	úrskurðanleg kenning			
5875	úrtak			
5876	úrtaka án skila			
5877	úrtaka með skilum			
5878	úrtaka, úrtakskönnun, könnun (með úrtaki)			
5879	úrtakseinkenni			
5880	úrtakshögun			
5881	úrtaksmeðaltal, meðaltal			
5882	úrtaksmiðtala			
5883	úrtakssamfylgni, úrtakssamvik			
5884	úrtaksskekkja			
5885	úrtaksspönn			
5886	úrtaksstærð, stærð úrtaks			
5887	út-, útgildis-			
5888	utanverð víxlhorn, ytri víxlhorn			
5889	útbreiddur			
5890	útbreiðsla			
5891	útbreiðsla			
5892	útbreiðslutala			
5893	útbreitt rúm			
5894	útflötur, hlið			
5895	útgeisli			
5896	útgildispunktur			
5897	útgildisverkefni			
5898	úthjólferill			
5899	úthluta			
5900	úthlutun			
5901	úthlutunarverkefni	<ref idTerm=4271>Rúmfræði</ref> í þrem <ref idTerm=6087>víddum</ref>		
5902	úthorn, fyllihorn	Tvö <ref idTerm=2198>horn</ref> sem samanlagt <ref idTerm=2223>mælast</ref> 360 <ref idTerm=1667>gráður</ref>		Finna mynd
5903	útilokun			
5904	útinnritaður			

5905	úttinnritaður hringur, úthringur, utanverður snertihringur		
5906	úttinnrituð kúla, útkúla, utanverð snertikúla		
5907	útkoma, niðurstaða		
5908	útkomandi		
5909	útkomurúm		
5910	útlíður		
5911	útlína, myndjaðar		
5912	útmengi, útsvæði		
5913	útmíðja, úthringsmíðja		
5914	útör		
5915	útpunktur		
5916	útpunktur		
5917	útreikningur		
5918	útreikningur, reikningur		
5919	útrýma, eyða		
5920	útrýming, eyðing		
5921	útrýmingaraðferð, eyðingaraðferð		
5922	útsetning		
5923	útsetningafræði		
5924	útsetningarrúm		
5925	útslag, sveifluhæð, ölduhæð		
5926	útstæður þvervigur, útstæður þverill, ytri þvervigur, ytri þverill		
5927	útstætt horn		
5928	útstig		
5929	útsveifarferill		
5930	úttak		
5931	útvíkka, framlengja		
5932	útvíkkannlegur, framlengjanlegur		
5933	útvíkkuð rauntalnalína		
5934	útvíkkuð tvinntalnaslétt		
5935	útvíkkun		
5936	útvíkkun grunnbaugsins, víkkun grunnbaugsins		
5937	útvíkkun, víkkun		
5938	vægi		
5939	vægi		
5940	vægi um meðalgildi		
5941	vægisfall		
5942	vægisframleiðandi fall		
5943	vægisstuðull		
5944	vægisverkefni		
5945	vægjaaðferð		

5946	vægjafylki			
5947	vægjahlutfall			
5948	vætanlegt gildi, væntigildi, meðalgildi			
5949	vafningstala			
5950	val			
5951	val			
5952	val, valfrelsi			
5953	valfall, valvörpun			
5954	valfrumsenda, valfrumsetning, frumsenda um val, frumsetning um val			
5955	valstund			
5956	valtari			
5957	valúrtaka			
5958	vanákvarðað kerfi			
5959	vanaleg tala			
5960	vanalegur			
5961	vanhorn			
5962	varðveisla, rækni			
5963	varðveita, rækja			
5964	varfærið próf			
5965	varp-			
5966	varpanarúm			
5967	varparíki			
5968	varpgildi			
5969	varphnit			
5970	varpi			
5971	varpkeilusnið			
5972	varplína			
5973	varpmótull			
5974	varpmótun, línuleg varpmótun			
5975	varpmyndun			
5976	varpóháður			
5977	varprúm			
5978	varprúmfræði			
5979	varpsléttu			
5980	vaxtarfall			
5981	vaxtarhraði			
5982	vaxtarregla			
5983	vaxtarröð, vaxtarraðstig			
5984	vaxtavextir			
5985	veðfé			
5986	veðmál			
5987	vefja Arkimedesar, kuðungur Arkimedes- ar, kuðungslína Arkimedesar, snigill Arki- medesar			

5988	vefja, kuðungslína, kuðungsferill, kuðungur, snigill			
5989	vefur			
5990	vegið meðaltal			
5991	veik lausn			
5992	veik lokun			
5993	veik ójafna			
5994	veik samleitni			
5995	veikt grannmynstur, gróft grannmynstur			
5996	veikt markgildi			
5997	veikur			
5998	vel framsett verkefni			
5999	vel skilgreindur			
6000	vélarmál			
6001	vélbúnaður			
6002	veldaraðaaðferð			
6003	veldaraðabaugur			
6004	veldaraðarframsetning			
6005	veldaraðarliðun			
6006	veldaröð			
6007	veldi			Skilgreina
6008	veldi af frumtölu			
6009	veldisfall	<ref idTerm=1078>Fall</ref> sem varpar sérhverju <ref idTerm=5128>staki</ref> x í n -ta <ref idTerm=6007>veldi</ref> þess x^n , þar sem $n \geq 2$ er <ref idTerm=3475>náttúruleg tala</ref>		
6010	veldisfrumsenda, veldisfrumsetning, frumsenda um veldismengi, frumsetning um veldismengi			
6011	veldisleif			
6012	veldisleifatákn			

6013	veldismengi	<ref idTerm=3270>Mengið</ref> sem samanstendur af öllum <ref idTerm=2098>hlutmengjum</ref> í tilteknu mengi X, táknað með $\mathcal{P}(X)$	Almennt gildir að ef fjöldi <ref idTerm=5128>staka</ref> í mengi X er n, þar sem n er <ref idTerm=3475>náttúruleg tala</ref>, er fjöldi staka í veldismengi þess 2^n. Dæmi um veldismengi fæst með því að setja $X = \{1, 2, 3\}$. Hlutmengjunum í X má þá skipta í fjóra hópa eftir fjölda staka: $\emptyset$ er það hlutmengi í X sem hefur ekkert stak. $\{1\}$, $\{2\}$ og $\{3\}$ eru þau hlutmengi í X sem hafa eitt stak. $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ og $\{2, 3\}$ eru þau hlutmengi í x sem hafa tvö stök. $\{1, 2, 3\}$ er það hlutmengi í X sem hefur þrjú stök. Veldismengið $\mathcal{P}(X)$ er þá mengið sem samanstendur af öllum framantöldum mengjum, þ.e. $\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$	
6014	veldisstofn			
6015	veldisvísajafna			
6016	veldisvísaregla			
6017	veldisvísir			
6018	veldisvísis-			
6019	veldisvísisdreifing, vísisdreifing			
6020	veldisvísisfall, vísisfall			
6021	veldisvísisferill, vísisferill			
6022	veldisvísisgerð			
6023	veldisvísisvöxtur, vísisvöxtur			
6024	vélheildun, véltegrun			
6025	vellauðugur			
6026	velraða			
6027	velraðað mengi			
6028	velraðaður			
6029	velröðun			
6030	velröðunarlögmál, velröðunarsetning			
6031	veltibraut			
6032	veltiferill			
6033	veltilína, veltibraut			
6034	vélvit, tölvuvit, gervigreind			
6035	vendi-			
6036	vendiaðferð			
6037	vendidáلكur			
6038	vendifylki			
6039	vendilína			

6040	vendistak			
6041	vendistuðull			
6042	venjuleg deildajafna, venjuleg diffurjafna, venjuleg afleiðujafna			
6043	venjuleg firð			
6044	venjulegt grannmynstur			
6045	venjulegt innfeldi			
6046	venjulegt róf			
6047	venjulegur			
6048	venjulegur			
6049	venjulegur punktur			
6050	Venn-mynd	Myndræn <ref idTerm=1416>framsetning</ref> í <ref idTerm=4884>sléttu</ref> á innbyrðis afstöðu ólíkra <ref idTerm=3270>mengja</ref> þar sem <ref idTerm=3016>lokaðir ferlar</ref> (eins og <ref idTerm=2295>hringir</ref>, <ref idTerm=5002>sporbaugar</ref>, <ref idTerm=1127>ferhyrningar</ref> o.s.frv.) eru notaðir til að tákna mengi og <ref idTerm=5335>svæðið</ref> sem er innan ferlanna tákna <ref idTerm=5128>stökin</ref> í menginu	Eftirfarandi mynd er dæmi um Venn-mynd:  Hringurinn tákna <ref idTerm=4175>mengið A</ref> og svæðið innan hans tákna <ref idTerm=4175>stökin í A</ref>, <ref idTerm=4175>rétthyrningurinn</ref> tákna <ref idTerm=4175>mengið B</ref> og svæðið innan hans tákna <ref idTerm=4175>stökin í B</ref>. Bláa svæðið samanstendur af þeim stökum sem eru í <ref idTerm=4175>A</ref> en ekki í <ref idTerm=4175>B</ref> (þau eru innan hringsins en utan rétthyrningsins), gula svæðið samanstendur af þeim stökum sem eru í <ref idTerm=4175>B</ref> en ekki í <ref idTerm=4175>A</ref> (þau eru innan rétthyrningsins en utan hringsins) og græna svæðið samanstendur af þeim stökum sem eru bæði í <ref idTerm=4175>A</ref> og í <ref idTerm=4175>B</ref> (þau eru innan bæði hringsins og rétthyrningsins)	
6051	vensl			Skilgreina
6052	venslarit, vensl			
6053	venslastæða			
6054	venslatenging			
6055	vera á eftir			
6056	vera jafn			
6057	vera ósamleitinn			
6058	vera samleitinn			
6059	vera samur			
6060	vera til			

6061	vera víxlinn			
6062	verka			
6063	verka frá hægri			
6064	verka frá vinstri			
6065	verka frjálslega, verka án kyrrapunkta, verka án fastapunkta			
6066	verka samfellt, verka með samfelldum hætti			
6067	verka tryggilega			
6068	verkefni			
6069	verkröðun			
6070	verkröðunarverkefni			
6071	verkun			
6072	verkun frá hægri			
6073	verkun frá vinstri			
6074	verulegur sérstöðupunktur			
6075	vextir			
6076	víðátta			
6077	víðátta án jaðars			
6078	víðátta með jaðri			
6079	viðbætið fall, samleggjandi fall			
6080	viðbætið mengjafall, samleggjandi mengjafall			
6081	viðbætinn, samleggjandi			
6082	viðbót			
6083	viðbótarskilyrði, viðbótarkrafa, viðbótarforsenda			
6084	viðbótarupplýsingar, fylgiupplýsingar			
6085	vídd, stétt			
6086	vídd, stig			
6087	vídd, víddartala, rúmvídd			
6088	víddarfræði			
6089	víðerni			
6090	viðfangskenning			
6091	viðfangsmál			
6092	viðfangssetning			
6093	víðfeðm einstikun			
6094	víðfeðm greining, víðgreining			
6095	víðfeðm tilvist			
6096	víðfeðmt sterkasta próf			
6097	víðfeðmt útgildi			
6098	víðfeðmur			
6099	víðfeðmur hágildispunktur			
6100	víðfeðmur lággildispunktur			
6101	víðfeðmur útgildispunktur			


6102	víðgildi			
6103	viðkennd tala			
6104	viðmið			
6105	viðmiðun			
6106	víðtækur, almennur, víður			
6107	viðtaka, viðtekt			
6108	viðtökulíkindi			
6109	viðtökumark			
6110	viðtökupróf			
6111	viðunandi			
6112	viðunandi gæðamörk			
6113	viðureign			
6114	viðvörunarmörk			
6115	vigur-			
6116	vigur, vektor			
6117	viguralgebra			
6118	vigurbundin			
6119	vigurfall			
6120	vigurgildur			
6121	vigurgilt fall, vigurfall			
6122	vigurgreining			
6123	vigursamlagning, vigrasamlagning			
6124	vigursumma			
6125	vigursumma			
6126	vigursvið			
6127	vik			
6128	vild samlínumótun			
6129	vildarás			
6130	vildarfall, línufall			
6131	vildargrúpa			
6132	vildarhjúpur			
6133	vildarhnit, samsíða hnit			
6134	vildarlína			
6135	vildarlokun, vildarhjúpur			
6136	vildarrúm			
6137	vildarrúmfræði			
6138	vildarsamgangur			
6139	vildarsléttu			
6140	vildarvíðerni			
6141	vildarvörpun, vildarmótun			
6142	vildur, vildar-			
6143	villa, mistök			
6144	vinatölur			
6145	vindingalaus grúpa, vindinglaus grúpa			
6146	vindingsefði			

6147	vindingsgeisli			
6148	vindingsgrúpa			
6150	vindingslaus, vindingalaus			
6151	vindingsmótull			
6152	vindingsstak			
6153	vindingsþinur			
6154	vindingur			
6155	vindingur			
6156	vinningsbandalag			
6157	vinningsfall			
6158	vinningsfylki			
6159	vinningur			
6160	vinnsla			
6161	vinstra einingarstak			
6162	vinstra hjámengi			
6163	vinstra íðal			
6166	vinstri deildanleiki, deildanleiki frá vinstri, vinstri diffranleiki, diffranleiki frá vinstri			
6167	vinstri dreifiregla	Sjá <ref idTerm=723>dreifiregla</ref>		
6168	vinstri endapunktur			
6169	vinstri grennd			
6170	vinstri handar hnitakerfi			
6171	vinstri hávísir			
6172	vinstri hlið			
6173	vinstri hornklofi			
6174	vinstri lágvísir			
6175	vinstri mótull			
6176	vinstri oddklofi			
6177	vinstri oddsvigi			
6178	vinstri samsemdarmótun			
6179	vinstri svigi			
6180	vinstri umhverfa, umhverfa frá vinstri, vinstri andhverfa, andhverfa frá vinstri			
6181	vinstrisnúin skróflína			
6182	vinstrisnúinn			
6183	vinstrisnúinn ferill			
6184	virðing			
6185	virðingarbaugur			
6186	virðingarfræði			
6187	virðingargrannmynstur			
6188	virki			
6189	virkjagildur			
6190	virkjajafna			
6191	virkjareikningur			

6192	virkjastaðall			
6193	virkni			
6194	virkt hliðarskilyrði			
6195	virkt mengi			
6196	virkt stak			
6197	vísajafna, veldisvísajafna			
6198	vísalækkun			
6199	vísamengi, vísitölumengi, skilgreiningar- mengi			
6200	vísasetja			
6201	vísasetning			
6202	vísasettur			
6203	vísir, vísitala			
6204	vísis-			
6205	vísisfallaröð			
6206	vísissetning			
6207	vísisvirðing			
6208	vísitala			
6209	vísitala			
6210	vísitala			
6211	vísitala			
6212	vísitala			
6213	viss atburður, öruggur atburður			
6214	viss, öruggur			
6215	vissa, fullvissa			
6216	vítahringur, hringrök			
6218	víxill			
6219	víxla			
6220	víxlagrúpa, afleidd grúpa			
6221	víxlanlegur			
6222	víxlast, vera víxlanlegur			
6223	víxlbaugur, víxlinn baugur			
6224	víxlhorn			
6225	víxlið örvarit			
6226	víxlimengi, víxlialgebra			
6227	víxlin aðgerð, víxlin reikniaðgerð			
6228	víxlinn			
6229	víxlmerkjamengi			
6230	víxlmerkjaröð			
6231	víxlmerkjasumma			
6232	víxlni			

6233	víxlregla	<ref idTerm=5702>Tvístæð reikni- aðgerð</ref> $\odot : X \times X \rightarrow X$ á <ref idTerm=3270>mengi</ref> X kallast <i>víxlin</i> eða að hún full- nægi <i>víxlreglunni</i> ef fyrir sérhver <ref idTerm=5128>stök</ref> $x, y \in X$ gildir að $x \odot y = y \odot x$	Dæmi um víxlna reikniadgerð er <ref idTerm=3141>margföldun</ref> <ref idTerm=4093>rauntalna</ref> en um öll $x, y \in \mathbb{R}$ gildir $xy = yx$	Færa í víxlin
6234	víxlstefnuaðferð			
6235	víxlunarjafna			
6236	vogarskálaaðferð			
6237	vökvaafllfræði, straumfræði			
6238	vökvastöðufraði, kyrrðarfræði			
6239	vöndur af hringum, hringavöndur, hneppi af hringum, hringahneppi			
6240	vöndur af línnum, línuvöndur, hneppi af línnum, línuhneppi			
6241	vöndur af samsíða línnum, samsíðuvöndur, hneppi af samsíða línnum, samsíðuhneppi			
6242	vöndur af sléttum, sléttuvöndur, hneppi af sléttum, sléttuhneppi			
6243	vöndur, hneppi			
6244	vörpunarkeila			
6245	vörpunarsetning Riemanns			
6246	vörpunarsívalningur			
6247	vörpunarstig			
6248	vöxtur			
6249	Weierstrass-próf			
6250	Wiener-ferli			
6251	Wronski-ákveða			
6252	x-ás			Skilgreina
6253	y-ás			Skilgreina
6254	yfirákvarðaður, ofákvarðaður			
6255	yfirbaugur			
6256	yfirbord			
6257	yfirbreyta			
6258	yfirferðarpunktur			
6259	yfirgnæfa			
6260	yfirgnæfa			
6261	yfirgnæfð röð			
6262	yfirgnæfð samleitni			
6263	yfirgrípsregla			
6264	yfirhjólferrill			
6265	yfirhornaflína			
6266	yfirkenning			
6267	yfirliður			


6268	yfirmál, yfirtungumál			
6269	yfirmengi			
6270	yfirmetanlegur			
6271	yfirmótull			
6272	yfirráðasvæði			
6273	yfirrásuð grúpa			
6274	yfirregla			
6275	yfirsetning			
6276	yfirsetning, yfirforsenda			
6277	yfirsporger			
6278	yfirstærðfræði			
6279	yfirstærðfræðilegur			
6280	yfirstak, yfirskorða, yfirtala	Fyrir <ref idTerm=4093>rauntalna</ref><ref idTerm=3270>mengi</ref> A kallast rauntalan U <i>yfirtala</i> mengisins A ef fyrir öll $x \in A$ gildir að $x \leq U$	Almennt getur <ref idTerm=4009>hlutráðað mengi</ref> hugsanlega átt sér <i>yfirstak</i>. Slíkt <ref idTerm=5128>stak</ref> þarf hins vegar ekki endilega að vera til, sem dæmi á mengi rauntalna $\mathbb{R}$ sér ekkert yfirstak	
6281	yfirstrik			
6282	yfirsumma			
6283	yfirsvið			
6284	yfirviðbættinn, yfirsamleggjandi			
6285	yfirvínlin grúpa			
6286	yfirþýður			
6287	yrðingabreyta, fullyrðingabreyta			
6288	yrðingafall			
6289	yrðingamót			
6290	yrðingareikningur, fullyrðingareikningur			
6291	yrðingarökfræði, fullyrðingarökfræði			
6292	ytra deildaform, ytra diffurform, deildaform, diffurform			
6293	ytra deildi, ytra diffur			
6294	ytra flatarmál			

6295	ytra horn, utanvert horn	<ref idTerm=1677>Grannhorn</ref> tiltekins <ref idTerm=2198>horns</ref> í <ref idTerm=3161>marghyrningi</ref>. Horn marghyrningsins kallast þá <i>innri horn</i>	Á eftirfarandi mynd er <ref idTerm=6438>þríhyrninginn</ref> ABC því það er grannhorn $\angle CBA$:  Hornin $\angle BAC$ og $\angle ACB$ kallast jafnframt <i>fjarlæg innri horn</i> við ytra hornið $\angle DBC$	Laga bakgrunnslit á myndinni
6296	ytra horn, utanvert horn			
6297	ytra innihald, ytra Jordan-innihald			
6298	ytra mál, utanmál			
6299	ytra mál, utanmál			
6300	ytra meðalfervik, ytri dreifni			
6301	ytra veldi			
6302	ytri aðgerð, ytri reikniaðgerð			
6303	ytri afleiða			
6304	ytri algebra, Grassmann-algebra			
6305	ytri einslögunarmiðja			
6306	ytri fylgni			
6307	ytri gagnstæð horn, utanverð gagnstæð horn			
6308	ytri helmingalína			
6309	ytri margföldun			
6310	ytri punktur			
6311	ytri sjálfmótun			
6312	ytri, utanverður			
6313	z-ás			
6314	Zermelo-Fraenkel-mengjafræði			
6315	Zermelo-Fraenkel-mengjafræði með valfrumsendu			
6316	þætta, kljúfa, sundurliða			
6317	þætta, leysa upp í þætti			
6318	þættaður			
6319	þættanleg margliða			
6320	þættanlegur			
6321	þættanlegur, kljúfanlegur, kleyfur			
6322	þættanleiki, kljúfanleiki, kleyfi			

6323	þak			
6324	þakning			
6325	þáttabaugur			
6326	þáttagreining			
6327	þáttalíkan			
6328	þáttatilraun			
6330	þáttun			
6331	þáttun, klofningur, sundurliðun, skipting			
6332	þáttur			
6333	þáttur			
6334	þekjufærsla			
6335	þekjugrúpa			
6336	þekjurúm			
6337	þekjuvidd			
6338	þetafall			
6339	þéttast			
6340	þéttibil			
6341	þéttipunktur			
6342	þéttipunktur			
6343	þéttipunktur			
6344	þéttisporbaugur			
6345	þéttleikafall, líkindaþéttleikafall, dreifing- arþéttleikafall			
6346	þéttleiki			
6347	þéttraðað mengi			
6348	þéttskipaður			
6349	þéttteljanlegt firðrúm			
6350	þéttteljanlegt grannmynstur			
6351	þéttteljanlegt grannrúm			
6352	þéttteljanlegur			
6353	þéttteljanleiki			
6354	þéttur			
6355	þinalgebra			
6356	þinbundin			
6357	þinfeldi			
6359	þinföldun			
6360	þinföldun			
6361	þingreining			
6362	þinreikningur			
6363	þinsvið			
6364	þinur			
6365	þjál víðátta, óendanlega oft deildanleg víðátta			
6366	þjál vörpun			
6367	þjálga			

6368	þjálgun			
6369	þjáll á köflum			
6370	þjáll ferill			
6371	þjáll flötur			
6372	þjált fall			
6373	þjappað mengi			
6374	þjappað rúm			
6375	þjappað rúm, þjappað mengi			
6376	þjappaður			
6377	þjappaður virki			
6378	þjappleiki			
6379	þjöppuð eyðing			
6380	þjöppuð samleitni			
6381	þjöppuð víðátta, lokuð víðátta			
6382	þjöppun			
6383	þol, þolstig			
6384	þolandi			
6385	þolbil			
6386	þoldreifing			
6387	þolmark			
6388	þolmat			
6389	þolsvæði			
6390	þolþáttur			
6391	þraut			
6392	þrefaldur			
6393	þrefalt heildi, þrefalt tegur			
6394	þreföld rót			
6395	þrenging, takmörkun, takmarkandi skil- yrði			
6396	þrengja			
6397	þrennd			
6398	þrep			
6399	þrep, kvíslitala, kvíslunartala			
6400	þrep, stig			
6401	þrepafall			


6402	þrepasönnun, þrepunarsönnun, rakin sönnun	Aðferð til þess að <ref idTerm=4554>sanna</ref> <ref idTerm=803>eiginleika</ref> <ref idTerm=3475>náttúrulegu talnanna </ref> . Hún snýst út á það að sýna fyrst að talan 0 (eða 1) hafi umræddan eiginleika (sem kallast <i>grunnþrepið</i>) og síðan sýna að ef einhver tala k uppfylli skilyrðin þá uppfylli $k + 1$ þau líka. Sú forsenda að talan k hafi þann eiginleika sem um ræðir kallast <i>þrepunarforsenda</i> og það að sýna að $k + 1$ hafi einnig eiginleikann kallast <i>þrepunarskref</i> . Þegar þrepunarforsendan gerir ráð fyrir að allar tölur minni en eða jöfn k uppfylli skilyrðin kallast sönnunin <i>sterk þrepunarsönnun</i>		
6403	þrepun niður á við			
6404	þrepun upp á við			
6405	þrepun, stærðfræðileg þrepun			
6406	þrepunarályktun, þrepunarniðurstaða			
6407	þrepunarforsenda			
6408	þrepunarfrumsenda, þrepunarfrumsetning, frumsenda um þrepun, frumsetning um þrepun			
6409	þrepunarnálgun			
6410	þrepunarskilgreining, rakin skilgreining			
6411	þrepunarskref			
6412	þrepunarupphaf			
6413	þríaðfelldur þríhyrningur			
6414	þríbaugur			
6415	þríblaða rós, smáraferill			
6416	þriðja rót, teningsrót, verpilrót			
6417	þriðja stigs ferill			
6418	þriðja stigs flötur			
6419	þriðja stigs, tenings-, verpils-			
6420	þrífeldi			
6421	þríflokkun			
6422	þríforkur Newtons			
6423	þrígild rökfræði			
6424	þríhliðungur			
6425	þríhnattaverkefni, þríagnaverkefni			
6426	þríhoralínufylki			
6427	þríhyrningar í sjónhorfi			
6428	þríhyrningaregla			

6429	þríhyrningaskipting			
6430	þríhyrningaskipting			
6431	þríhyrningaskipting			
6432	þríhyrningsfylki			
6433	þríhyrningsgerlegur			
6434	þríhyrningsgerningur			
6435	þríhyrningshnit			
6436	þríhyrningsójafna			Skilgreina
6437	þríhyrningstala, þríhyrnd tala			
6438	þríhyrningur	<ref idTerm=3161>Marghyrningur</ref> með þrjár idTerm=2048>hliðar</ref>	Eftirfarandi er mynd af þríhyrningi: 	
6439	þríhyrnt reitafylki			
6440	þríliða			
6441	þrílínulegur			
6442	þrírétthyrndur			
6443	þrískiptiferill			
6444	þrískiptilína			
6445	þrískipting			
6446	þrístæð vensl			
6447	þrístæður			
6448	þrístrendingur			
6449	þríunda-			
6450	þríundakerfi			
6451	þríundamengi			
6452	þríundatala			
6453	þríveldi, þriðja veldi, teningur, verpill			
6454	þríviður			
6455	þrívitt rúm			
6456	þröngur			
6457	þröngur, í þröngum skilningi			
6458	þröngvaður			
6459	þröngvun			
6460	þröngvunarfall			
6461	þröskuldsfall			
6462	þungahnit, þungamiðjuhnit, voghnit			
6463	þungamiðja, þyngdarpunktur			
6464	þungamiðja, þyngdarpunktur			
6465	þungamiðjuhlutun			


6466	þunnskipað fylki			
6467	þvælistiki, amastiki			
6468	þver-, þverkyns, ímyndaður			
6469	þver, þverstæður, hornréttur, þverlægur			
6470	þvera			
6471	þverafleiða			
6472	þverás			
6473	þverás			Skilgreina
6474	þverbrennistrengur			
6475	þverbundin, þverlabundin			
6476	þvereining, þvertalan <i>i</i>			
6477	þverferill, þverbraut			
6478	þverfyllirúm, hornrétt fyllirúm			
6479	þvergrunnur, þverstæður grunnur, horn- réttur grunnur			
6480	þverhluti			
6481	þverhnit, þverstæð hnit, hornrétt hnit, rétthyrnd hnit			
6482	þverhnitakerfi, þverstætt hnitakerfi, hornrétt hnitakerfi, rétthyrnt hnitakerfi			
6483	þverill, þverlína			Skilgreina
6484	þverjafna			
6485	þverkyns rót			
6486	þverlæg fjölskylda, þverstæð fjölskylda			
6487	þverlægni, þverstaða			
6488	þverlarammi, þverrammi			
6489	þvermál	<ref idTerm=2860>Lengd</ref> <ref idTerm=0>miðstrengs</ref> í <ref idTerm=2295>hring</ref>		
6490	þversagnakennt mengi			
6491	þverslétt			
6492	þverslétt			
6493	þversnið			
6494	þversnið, snið			
6495	þversögn Bertrands, Bertrand-þversögn			
6496	þversögn, þverstæða			
6497	þverstaðalámóta			
6498	þverstaðalgrúpa			
6499	þverstaðalvörpun, þverstaðalfærsla			
6500	þverstaðlað fylki, þverfylki			
6501	þverstaðlað hnitakerfi			
6502	þverstaðlaður			
6503	þverstaðlaður grunnur, staðlaður þvergrunnur, hornréttur einingargrunnur			
6504	þverstæð röð			

6505	þverstæð runa			
6506	þverstæð þáttun, þverþáttun, hornrétt þáttun			
6507	þverstætt rúm, þverlægt rúm, hornrétt rúm			
6508	þverstöðluð hnit			
6509	þverstöðlun			
6510	þverstöðlunaraðgerð			
6511	þversumma			
6512	þvertala			
6513	þverun			
6514	þverunaraðferð, þverunaraðgerð			
6515	þvervigur, þvervektor			
6516	þverþáttur, þverliður			
6517	þvingaður, með hliðarskilyrðum			
6518	þvingandi			
6519	þvingun, aukaskilyrði, hliðarskilyrði			
6520	þýð fernd (af punktum)			
6521	þýð skipting			
6522	þýða			
6523	þýðandi			
6524	þýði			
6525	þýðing			
6526	þýðismeðalgildi, raunverulegt meðalgildi			
6527	þýðisstiki			
6528	þýður			
6529	þýður ferhliðungur			
6530	þykkt			
6531	þykkvafræði, þrívíð rúmfræði	...		
6532	þykkvi, rúmskiki, líkami, hlutur, rúm-mynd, gripur			
6533	þyrping			
6534	þýtt fall			
6535	þýtt hlutfall			
6536	þýtt meðaltal			
6537	þýtt samok			
6539	aðfeldisfall			
6540	aðfeldi, hrópmerkt tala			
6541	aðgreinandi, aðgreinir, aðskilja (<i>kvk.</i>)			
6542	aðoka fylki			
6543	aðoki, aðoka varpi			
6544	aðoki, aðoka virki			
6545	alhæfður			
6546	alhæfð runa, nót, net			
6547	alhæfing			

6548	alhæfingarregla			
6549	alhæfi, altæki			
6550	alhæft meðaltal			
6551	alhæfur, altækur			
6552	andhverf vensl			
6553	andsamhverfur, oddhverfur			
6554	andsamhverf marglínuleg vörpun, oddhverf marglínuleg vörpun			
6555	andsamhverf vensl			
6556	angle: þríhyrningur ákvarðast af tveimur hliðum og horninu á			
6557	annars stigs jafna, ferningsjafna			
6558	annars stigs jafna, ferningsjafna, annars stigs flötur			
6559	biðröð			
6560	biðröð			
6561	biðtími			
6562	bil			
6563	bilanatíðni, óhappatíðni			
6564	bilanet			
6565	binda			
6566	biti, tvíundatölustafur			
6567	deildastuðull, deildahlutfall, diffurkvóti, afleiða (í punkti)			
6568	eining, einingarstak, margföldunarhlutleysa			
6569	einmóta, ímóta			
6570	endapunktur, heildunarmark, heildismark, tegrunarmark, tegurmark			
6571	eyðir, eyðingaríðal			
6572	eyðir, eyðingarvirki			
6573	formerkislaus, án formerkis			
6574	formleg kenning, formgerð kenning			
6575	frumstak			
6576	frumstak			
6577	fullt horn, 360° horn			
6578	fylliatburður, andstæða, andstæður atburður			
6579	færslulíkindi			
6580	gagnvegur			
6581	Galois-grúpa			
6582	Galois-kenning			
6583	Galois-útvíkkun, Galois-víkkun			
6584	grunn-, undirstöðu-, megin-			

6585	hjáfylki, bylt hjáþáttafylki, bylt fylgiþáttafylki			
6586	hlutleysa, hlutlaust stak			
6587	hlutmengjafrumsenda, hlutmengjafrumsetning, frumsenda um hlutmengi, frumsetning um hlutmengi			
6588	hornið á milli			
6589	hringskífa, hringflötur	$\langle$ref idTerm=4891>Sléttumynd</ref> sem af $\langle$ref idTerm=2295>hring</ref>	Eftirfarandi er mynd af hringskífu með miðju M og geisla r. Skyggða $\langle$ref idTerm=5335>svæðið</ref> tilheyrir allt hringskífunni: 	
6590	hægri hlutleysa, hlutleysa frá hægri			
6591	ívarp			

6592	jafngildisvensl	<ref idTerm=5705>Tvístæð vensl</ref> ~ á <ref idTerm=3270>mengi</ref> X sem uppfylla eftirfarandi þrjú <ref idTerm=4797>skilyrði</ref>: 1. $x \sim x$ fyrir öll $x \in X$ (<i>spegilvirkni</i>) 2. Fyrir sérhver stök $x, y \in X$ gildir að ef $x \sim y$ þá gildir einnig $y \sim x$ (<i>samhverfni</i>) 3. Fyrir sérhver stök $x, y, z \in X$ gildir að ef $x \sim y$ og $y \sim z$, þá gildir einnig $x \sim z$ (<i>gegnvirkni</i>) Jafngildisvensl á mengi X eru ákveðin útvíkkun á hugtakinu að tvö <ref idTerm=5128>stök</ref> úr X séu <ref idTerm=2474>jöfn</ref>, enda uppfylla venslin = skilyrði þess að vera jafngildisvensl. Sérhver jafngildisvensl á X mynda <ref idTerm=5325>skiptingu</ref> á X í <ref idTerm=5329>sundurlæga</ref> <ref idTerm=2489>jafngildisflokka</ref>. Venslin = eru sértilfelli þar sem jafngildisflokkarnir eru allir <ref idTerm=963>einstökungar</ref>, með öðrum orðum eru tvö stök $x, y \in X$ jöfn þá og því aðeins að þau séu sama stakið. Almenn jafngildisvensl gera manni hins vegar kleift að einblína á ákveðna <ref idTerm=803>eiginleika</ref> stakanna og líta á tvö stök sem eru vensluð saman sem jafngild þó að þau séu ekki jöfn stök. Dæmi um jafngildisvensl eru venslin “eru <ref idTerm=4509>samsíða</ref>” á mengi <ref idTerm=2911>lína</ref> í <ref idTerm=1031>evklíðskri sléttu</ref> en þá ákveðum við að einblína einungis á <ref idTerm=1863>halla</ref> línanna og hunsum alveg hvaða <ref idTerm=4001>punktar</ref> liggja á þeim		
6593	karteskur, Descartes-, Kartesar-.			
6594	kartesk hnit, Kartesarhnit			

6595	karteski sléttan, Kartesarsléttan	<ref idTerm=1031>Evklíðski sléttan</ref> með <ref idTerm=2145>hnitakerfi</ref> sem fæst með því að setja upp <ref idTerm=6469>þverstæðar</ref> <ref idTerm=5416>tálnalínur</ref> sem kallast <i>hnitaásar</i> og <ref idTerm=4771>skerast</ref> í núllpunktum sínum. Þessi <ref idTerm=4845>skurðpunktur</ref> kallast þá <i>upphafspunktur</i> hnitakerfisins sem er yfirleitt táknaður með O og venja er að kalla aðra tálnalínuna x-ás og hina y-ás	Eftirfarandi er mynd af kartesku hnita-kerfi:  Upphafspunkturinn skiptir x-ás í tvær <ref idTerm=1840>hálfínur</ref>; þá sem hefur <ref idTerm=4001>punkta</ref> með <ref idTerm=981>frekar jákvæð</ref> hnit og kallast <i>jákvæði x-ás</i>, og aðra sem hefur punkta með <ref idTerm=980>frekar neikvæð</ref> hnit og kallast <i>neikvæði x-ás</i>. Sama á við um y-ás. Jákvæðu ásarnir tilgreina <ref idTerm=5135>stefnu</ref> á hnitaásunum. Á mynd er venja að gefa jákvæðu stefnu hnitaásanna til kynna með <ref idTerm=3810>ör</ref> og merkja ásana við örina með x eða y. Hnitaásarnir skipta sléttunni í fjóra <i>fjórðunga</i>: 1. Fyrsti fjórðungur samanstendur af þeim punktum sléttunnar sem eru innaní <ref idTerm=4167>rétta horninu</ref> sem hefur jákvæða x-ás og jákvæða y-ás fyrir <ref idTerm=334>arma</ref> sína, 2. Annar fjórðungur samanstendur af þeim punktum sléttunnar sem eru innaní rétta horninu sem hefur neikvæða x-ás og jákvæða y-ás fyrir arma sína, 3. Þriðji fjórðungur samanstendur af	Er þetta nógu nákvæm skilgreining? - Vantar færslu fyrir áttaða sléttu (áttað rúm er hins vegar til)
------	-----------------------------------	--	---	---

6596	keilusnið		
6597	kennimargliða		
6598	leggjanet, aðoka net, afleitt net		
6599	leysikjarni		
6600	líkindaþéttleiki, dreifingarþéttleiki, þéttleiki		
6601	lyfting		
6602	margföldunar-		
6603	margföldun fjöldatalna		
6604	margföldun frá hægri, hægri margföldun		
6605	margföldun frá vinstri, vinstri margföldun		
6606	margföldun í kross		
6607	margföldun, reikniaðgerð rituð sem margföldun		
6608	margföld flokkun		
6609	margföld núllstöð		
6610	margföld rakning		
6611	margföld rót		
6612	margföld runa		
6613	margföld röð		
6614	margföld ör		
6615	milli þeirra		
6616	millumleikafrumsenda, millumleikafrumsetning		
6617	niðurstigningaraðferð		
6618	niðurstigning, niðurstigningaraðferð		
6619	nykurrúm		
6620	ofanvarpsmiðja, varpmiðja		
6621	óhliðruð línuleg deildajafna, óhliðruð línuleg diffurjafna		
6622	óræð tala		
6623	ósamrýmanlegir tveir og tveir, sundurlægir tveir og tveir		
6624	ósannur	Sjá <ref idTerm=4560>sanngildi</ref>	
6625	óþættanleg margliða		
6626	óþættanleg Markov-keðja		
6627	raðtala		
6628	rakning		
6629	reitur (í töflu)		
6630	rótarmerki		
6631	röðuð <i>n</i> -d, röðuð <i>n</i> -und, <i>n</i> -d, <i>n</i> -und		
6632	röðunareinsmótun, raðeinsmótun		
6633	röðunarfrumsenda, raðfrumsenda, röðunarfrumsetning, raðfrumsetning		
6634	röðunargrannmynstur		

6635	röðunarsjálfmótun, raðsjálfmótun		
6636	röðun, hlutröðun, raðvensl		
6637	röð, þrep		
6638	röð, þrep		
6639	rökaðgerð		
6640	rökálgebra		
6641	rökbreyta		
6642	rökfasti		
6643	rökfesta, stærðfræðileg rökfesta		
6644	rökfrumsenda, rökfrumsetning		
6645	rökfræði		
6646	rökfræðilegur, rök-, röklegur, rökrænn		
6647	rökfræði annarrar stéttar		
6648	rökfræði fyrstu stéttar		
6649	rökhenda		
6650	rökhyggja		
6651	rökleiðsla, röksemdafærsla		
6652	rökleiðsluregla, rökregla, ályktunarregla, afleiðsluregla		
6653	rökreikningur		
6654	röktákn		
6655	röktenging, röktengill, tengill, tending		
6656	rökvilla		
6657	rökvirki		
6658	samoka stak		
6659	sannur	Sjá <ref idTerm=4560>sanngildi</ref>	
6660	spannmengi, íðalspannmengi, framleiðandi mengi, spannandi mengi		
6661	stýrihringur		
6662	stærðfræðilegur, stærðfræði-		
6663	stærðfræðileg bestun, bestun		
6664	stærðfræðileg frumsenda, stærðfræðileg frumsetning		
6665	stærðfræðileg rökfræði		
6666	stærðfræðileg tölfræði		
6667	stærðfræðileg þversögn		

6668	talnaritunarkerfi	Aðferð til þess að rita <ref idTerm=5397>tölur</ref> með því að nota <ref idTerm=1009>endanlega</ref> marga <ref idTerm=5558>tölustafi</ref> . Fjöldi tölustafanna n kallast <i>grunntala</i> talnakerfisins og sérhverja tölu má þá skrifa sem <ref idTerm=5320>summu</ref> <ref idTerm=4425>liða</ref> á forminu an^k þar sem $ a < n$ og $k \in \mathbb{Z}$		Orðalag er óskýrt, mengið sem þú dregur tölustafina úr er endanlegt en ekki fjöldi tölustafanna sem þú þarft til að rita tiltekna tölu
6669	tugafylling, tugafyllitala			
6670	tugatala, tala í tugakerfi			
6671	tuga-			
6672	umhverfa, andhverfa			
6673	útgildi			
6674	vinstri aðoki			
6675	vinstri afleiða, afleiða frá vinstri			
6676	vinstri andhverfa, andhverfa frá vinstri			
6677	vinstri hlutleysa, hlutleysa frá vinstri			
6678	vörpun, færsla, myndun, ummyndun			
6679	yfirfall			
6680	yfirröð			
6681	þekjuvörpun			
6682	þriðja stigs jafna			
6683	þýð fernd			
6684	-gildur			