

## TD1: Analyse a posteriori par dualité pour un problème modèle 1d

On considère le problème aux limites suivant :

$$\begin{cases} -u'' + b(x)u' + c(x)u = f(x), & 0 < x < 1, \\ u(0) = 0, \\ u(1) = 0, \end{cases} \quad (1)$$

où

- $b \in W^{1,\infty}(0,1)$ ,
- $c \in L^\infty(0,1)$ ,
- $f \in L^2(0,1)$ .

1. Ecrire la formulation variationnelle correspondante.
2. Supposons que

$$c(x) - \frac{1}{2}b'(x) \geq 0, \quad \text{pour } x \in (0,1),$$

Montrer que le problème variationnel est bien posé.

3. L'approximation par éléments finis de ce problème consiste à subdiviser l'intervalle  $[0,1]$  par les points

$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = 1$$

et de définir l'espace des éléments finis  $V_h^1 \subset H_0^1(0,1)$  de fonctions continues et  $\mathbb{P}_1$  par morceaux.

(a) Donner le problème approché et montrer qu'il est bien posé.

On pose :

$$h_i = x_i - x_{i-1}, \quad i = 1, \dots, N, \text{ et } h = \max_i h_i.$$

Notre objectif est de trouver une estimation *a posteriori* de l'erreur  $\|u - u_h\|$ .

4. Trouver le problème dual ou adjoint pour l'inconnu  $w$  du problème (??) et montrer qu'il est bien posé.
5. Montrer que

$$\|u - u_h\|_{L_2(0,1)}^2 = a(u - u_h, w). \quad (2)$$

6. Montrer que

$$\|u - u_h\|_{L_2(0,1)}^2 = (f, w - \mathcal{I}_h w) - a(u_h, w - \mathcal{I}_h w).$$

7. Montrer que

$$a(u_h, w - \mathcal{I}_h w) = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} [-u_h''(x) + b(x)u_h'(x) + c(x)u_h(x)] (w - \mathcal{I}_h w)(x) dx.$$

8. D  duire que

$$\|u - u_h\|_{L_2(0,1)}^2 = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} R(u_h)(x) (w - \mathcal{I}_h w)(x) dx$$

o    $i = 1, \dots, N$ ,

$$R(u_h)(x) = f(x) + u_h''(x) - b(x)u_h'(x) - c(x)u_h(x), \quad x \in (x_{i-1}, x_i).$$

9. La fonction  $R(u_h)$  est appel  e le r  sidu. Dites pour quelle raison on a choisit cette appellation ?

10. Montrer que

$$\|u - u_h\|_{L_2(0,1)}^2 \leq \sum_{i=1}^N \|R(u_h)\|_{L_2(x_{i-1}, x_i)} \|w - \mathcal{I}_h w\|_{L_2(x_{i-1}, x_i)}.$$

11. Montrer que

$$\|u - u_h\|_{L_2(0,1)}^2 \leq \frac{1}{\pi^2} \sum_{i=1}^N h_i^2 \|R(u_h)\|_{L_2(x_{i-1}, x_i)} \|w''\|_{L_2(x_{i-1}, x_i)}$$

et par cons  quent,

$$\|u - u_h\|_{L_2(0,1)}^2 \leq \frac{1}{\pi^2} \left( \sum_{i=1}^N h_i^4 \|R(u_h)\|_{L_2(x_{i-1}, x_i)}^2 \right)^{1/2} \|w''\|_{L_2(0,1)}.$$

12. Finalement, d  duire que

$$\|u - u_h\|_{L_2(0,1)} \leq K_0 \left( \sum_{i=1}^N h_i^4 \|R(u_h)\|_{L_2(x_{i-1}, x_i)}^2 \right)^{1/2},$$

o  

$$K = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \|b\|_{L_\infty(0,1)} + \frac{1}{2} \|c - b'\|_{L_\infty(0,1)}, \quad K_0 = K/\pi^2$$

13. Donner un indicateur local de cet estimateur a posteriori.