

100 китоб тўплами

ГАЗОН ЎТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШИ

90-китоб



**Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас эканмиз,
соҳада ривожланиш бўлмайди.
Ш. МИРЗИЁЕВ.**

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

«Агробанк» АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпلامда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштираемиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси**

УЎК 635.928

КБК 42.23

М 17

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчилар:

У.Н. Норкулов – Тошкент давлат аграр университети “Деҳқончилик ва мелиорация” кафедраси профессори.

Ж.С. Эшонкулов – Тошкент давлат аграр университети “Деҳқончилик ва мелиорация” кафедраси ассистенти.

Н.Н. Ирисметова – Тошкент давлат аграр университети “Деҳқончилик ва мелиорация” кафедраси таянч докторанти.

Такризчилар:

Г.Н. Абдалова – Тошкент давлат аграр университети “Деҳқончилик ва мелиорация” кафедраси доценти, катта илмий ходим.

Ҳ.М. Хасанов – ЎҒРИТИ мева-резавор экинлари ва узум генафонди бўлими мудир, катта илмий ходим.

Лойиҳа иштирокчилари: У.Ф. Файзуллаев, М.С. Ҳайитбоев

Муҳаррир: Г.А. Чоршанбиева – Шарқшунослик университети таржимашунослик ва халқаро журналистика кафедраси ўқитувчиси, таржимон.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр этирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўплам мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва тақлифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ тухфасидир

© “Агробанк” АТБ – 2021

© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021

© “Colorpack” МЧЖ – 2021

ISBN 978-9943-7174-6-6

МУНДАРИЖА

Кириш.....	7
Газон тарихи ва аҳамияти.....	9
Газон ўсимлигини ўрганиш натижалари.....	10
Газонбоп ўтларнинг турлари.....	12
Газон барпо этиш технологияси.....	22
Газон экиш усули	26
Газондаги бегона ўтларнинг турлари ва уларга қарши курашиш усуллари.....	33
Зараркунандалар.....	38
Газонбоп ўт касалликлари.....	42
Газонбоп ўт муаммолари.....	46
Газон ўстиришда қўлланиладиган асбоб-ускуналар.....	46
Қаттиқ қопламалар.....	47
Сунъий газон.....	48
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	50



■ I КИРИШ

Ўзбекистон Республикасида мустақилликнинг илк йиллариданоқ ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларига алоҳида эътибор қаратилди. Бунини “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги 2009 йил 26 ноябрдаги 50-51-сон, “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги; 1996 йил 27 декабрдаги 353-1-сон, “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги; 2009 йил 52-сон Қонунлар ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 14 февралдаги “Обод турмуш йили” Давлат дастури тўғрисидаги ПҚ-1920-сон қарори ва “Аҳоли турар жойларини ободонлаштириш” каби бир қатор Фармон ва қарорларда кўриш мумкин. Республикамизда атроф-муҳит ва аҳоли саломатлиги муҳофазаси бўйича қонунчиликни ривожлантириш ва янада такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Шунини эътиборга олган ҳолда, 2012 йилда “Экологик назорат тўғрисида”ги янги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Бундан ташқари, “Ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш, ундан фойдаланиш ва қайта тиклаш тўғрисида”ги (1998й) янги қонун лойиҳаси тайёрланди. Атроф-муҳит мусаффолигини асраш мақсадида “Экологик ҳаракат” гуруҳи ташкил қилинган.

Республикамиз миқёсида кейинги 10 йил ичида ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича катта ишлар амалга оширилмоқда. Шаҳарда дарахт ва бутазорлар ҳамда гулзорларни барпо қилиш билан бир қаторда бино атрофлари, йўл четлари бўйлаб яшил ўт қопламалари вужудга келтирилмоқда. Бундай ўт қопламалар бошоқдошлар

оиласига мансуб фотосинтез бўйича С3 циклига кирувчи доим ўриб янгиланиб турувчи ўтлардан иборат бўлиб, у “Чим” ёки “Газон” деб аталади. Ҳозирда газонлар учун туман, шаҳар, хиёбонлар атрофлари ва сайлгоҳларда кўп майдонлар ажратилмоқда. Янги қурилган биноларга файз киритишда газонлар катта аҳамиятга эга.

■ I ГАЗОН ТАРИХИ ВА АҲМИЯТИ

Тарихий манбаларнинг гувоҳлик беришича, бундан 2500 йил олдин қадимий Эрон боғларида кўп йиллик бошоқдош ўтлар экилиб, чимзорлар барпо этилган. Яна бошқа маълумотларга кўра, милoddан бир неча минг йил илгари Хитой императорларининг Чеу боғида ана шундай газон бунёд этилган экан. Оврупода XIII аср бошларидаёқ ўйингоҳларда ўт қопламалари вужудга келтирилгани ва бундай майдонлар французча “Gazon” номи билан аталиши маълум. Бизнинг юртимизда ҳам азалдан гўзал боғлар, сарой ва хонадонларда чимзорлар барпо этишга алоҳида эътибор берилган. Хусусан, Камолиддин Беҳзод асарларида “Бобурнома” миниатюраларида юксак маҳорат билан тасвирланган яшил чимзорлар шундан далолат беради. XX аср ўрталарига келиб, дунё мамлакатларининг деярли барчасида газон ўтини экиш ва парвариш этиш кенг тарқалади.



- Газон қишин-ёзин яшил либосга бурканиб туриши сабабли йўллар, бинолар, ҳайкаллар атрофини ва истироҳат боғларини кўркамлаштиради ҳамда экологик вазиятни барқарорлаштиради.

- Газон ўти экилган майдонларда ва уларнинг аторфида ўзига хос мўтадил микроиклим вужудга келади.
- Иссиқ кунларда ҳаво ҳароратини пасайтириб, намлигини оширади.
- Атроф-муҳитдаги чанг заррачаларини ютиб, ҳавонинг шаффофлигини таъминлайди.
- Кучли фотосинтез жараёни натижасида атмосфера ҳавосининг кислород билан тўйинишига ва аксинча, карбонад ангидрид газининг камайишига хизмат қилади.
- Газон ўти фитомецидлик, яъни патоген бактерия ва замбуруғларга қарши турли моддалар ишлаб чиқариш хусусиятига ҳам эга.
- Газон ўтининг тўқ яшил манзараси кўз нуруни равшанлаштиради.

I ГАЗОН ЎСИМЛИГИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

Ҳозирги вақтгача мамлакатимизда кўкаламзорлаштириш учун дарё соҳиллари ва тўқайларда ўсадиган табиий чимлардан ёки чет элдан келтирилган ўт навларидан фойдаланиб келинмоқда. Маълумки, табиий чимлоқлар кўп йиллик бегона ўтлардан, хусусан, ажриқдан (*Cynodon dactylon*) иборат бўлганлиги сабабли, у фотосинтезнинг C-4 циклига мансуб. Бу ўт тури қурғоқчилик ва гармсел таъсирига ўта чидамли, илдиз тизимининг жадал ривожланиши ва ер устидаги поясининг тез ўсиши туфайли қисқа вақт мобайнида ер юзасини қоплаб олиш хусусиятига эга. Аммо, камчилиги шундаки, унинг ўсиш даври 6-7 ойдан ошмайди (апрель-сентябрь). Шу боис,

қолган 5-6 ой давомида аста-секин сарғайиб, кўримсиз ҳолга келиб қолади. Хориждан асосан Европадан келтириладиган газонбоп ўт навлари эса иқлим-тупроқ шароитимизга мослаштирилмасдан, тўғридан-тўғри экилмоқда. Ваҳоланки, ушбу мамлакатларда ҳаво ҳарорати ёз ойларида $+25 +30^{\circ}\text{C}$ дан ошмаслиги, ҳавонинг намлиги юқори бўлиши газон ўтининг меъёрида ўсиши ва ривожланишини таъминлайди. Ўзбекистон иқлими эса кескин ўзгарувчан, ёз ойларида иссиқ ва қуруқ ($+40 +50^{\circ}\text{C}$), қиш ойларида қор қоплами қалин бўлмасда, совуқ ($-10 -20^{\circ}\text{C}$) кунлар нисбатан кўп бўлади. Бундан ташқари, бизда йил давомида тунги ва кундузги ҳарорат ўртасида жуда катта тафовут мавжуд. Албатта, бундай ўзгарувчан иқлим шароити газон ўтининг ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир этади. Ҳатто мўътадил сув ва озуқа режимининг яратилиши, бошқа агрокимёвий ҳамда фитосанитар тадбирларнинг ўтказилишидан қатъий назар, газон ўти турли касалликларга чалиниб, нобуд бўлмоқда. Мазкур муаммоларни илмий жиҳатдан ўрганиш ва ҳал этиш мақсадида 1999 йилдан бошлаб Тошкент давлат аграр университетининг Экология маркази олимлари ТошДАУ тажриба станциясида АҚШнинг Ратгерс университети билан ҳамкорликда хориждан келтирилган газон ўти тури ва навлари бўйича кенг кўламли изланишлар олиб борилган. Жумладан, ҳозирги вақтда тажриба станциясида 4 та ўт турига мансуб 28 та нав синаб кўрилмоқда. Тўрт йиллик илмий тадқиқот натижаларига кўра, Ўзбекистон шароитида АҚШда яратилган *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca arundinacea* турларига мансуб 4 та навининг яхши мослашувчанлиги, меъёрида ўсиб, ривожланиши ҳамда касалликларга чидамли эканлиги аниқланди.

Сараланган навларни ўстириш технологиясига оид ўтказилган тадқиқот натижасига асосланган ҳолда Ўзбекистонда илк бор ўзбек ва рус тилларида “Чимзорлар барпо этиш, ўстириш ва ишлов бериш” бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Шунингдек, Ўзбекистон шароитида ўсадиган ёввойи бошоқдошларга мансуб кўп йиллик, йил давомида яшил ёввойи ўт турларини танлаш ва саралаш борасида ҳам жиддий изланишлар олиб борилмоқда. Жумладан, республикаимизнинг тоғ, тоғолди ҳудудлари, адир ва текисликларида, Оролбўйи ҳамда дарё соҳилларида ёввойи ҳолда ўсадиган мастак, кўнғирбош, ўт турларига мансуб 2000 дан зиёд ўт уруғи ва кўчатлари ТошДАУ тажриба станциясининг иссиқхонасида ҳамда дала шароитида синовдан ўтказилган, уруғлари олиниб, сараланмоқда, сараланган уруғлар газон сифатида экилиб ўрганилмоқда.

I ГАЗОНБОП ЎТЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Газонбоп ўтларнинг бир йиллик, икки йиллик ва кўп йиллик турлари мавжуд. Бир йиллик ўт ўсиш жараёнининг тўлиқ босқичини (уруғидан уруғича) шу давр мобайнида босиб ўтади, уруғи етилиши билан унинг ер юзасидаги пояси, барги ҳамда ер остидаги илдизи қуриydi. Икки йиллик ўт илк ўсиш даврида, пояси ва барглари шаклланса, гуллайдиган, мева берадиган ва уруғлайдиган поялари иккинчи йили ҳосил беради. Газонбоп ўтларнинг аксарияти кўп йиллик бошоқдош ўсимлик ҳисобланади. Улар йил давомида яшил рангга бурканиб туриши, ўрилганидан сўнг янгиланиш хусусиятига

эга экани ҳамда унинг асосий барглари ўсимликнинг қуйи бўғинида вужудга келиши, баргининг тик ва мустаҳкам ўсиши билан ажралиб туради.

Манзарали газон



Истироҳат боғи чимлоқлари



Оддий ўтзор



Мавритания



Гулзор



Кичик чимзор

Спорт иншоотлари учун



Футбол майдони



Ипподром



Ўйин майдончалари

Қияликлардаги газон



*Магистраль транспорт
йўллари ва гидротехник
иншоотлар қияликлари*



*Шаҳар ва шаҳар атрофидаги
дарё қирғоқлари ҳамда
жарликларда*

Газонбоп чим қопламалар



*Қаттиқ қопламдаги (грунт)
аэродромларнинг учиш ва
қўниш майдонида*



*Қаттиқ қопламадаги (бетон)
аэродромларнинг учиш ва
қўниш майдони оралиқларида*

Кўкаламзорлаштириш амалиётида газонбоп ўтларнинг бир қанча турлари парвариш этилади. Ўтлоқ ва оддий қўнғирбоши, қизил ва ўтлоқ бетагаси, сочсимон, оқ ва судралувчи полевица (дала ўти) яйлов ёки инглиз райграси, оқ ва қизил йўнғичқа, шохли лядвенец шулар жумласидандир. Қуйида чимзор барпо этишда кенг қўлланиладиган айрим ўт турлари хусусида батафсил тўхталиб ўтамыз.



Ўтлоқ қўнғирбоши – бошоқдошлар оиласига мансуб ҳамда ҳар қандай манзарали газонга мос кўп йиллик ўсимликлар сирасига киради. Бу газонбоп ўт илдизининг катталиги, ўтининг қаттиқлиги ҳамда бир текис тўқ яшил ранги билан ажралиб туради. Илдизининг учи тупроққа чуқурлашиб

кетса-да, аммо илдизи асосан тупроқ юзасида тўпланади. Ўсимлик илдизларидан янги илдизчалар ҳосил бўлиб, кўплаб ёнлама поя ва шохчаларнинг шаклланишига шароит яратади. Тўқ яшил рангли баргларнинг эни 1-4 мм, узунлиги 20-30 см келади. Экилган йили ўтлоқ қўнғирбошининг асосан илдизлари ривожланиши сабабли поя ва баргларининг ўсиши суст бўлади. Иккинчи-учинчи йили у тўлиқ шаклланади. Ушбу газонбоп ўт вақтида озиқлантириб, парвариш этиб турилса, 15 йилдан кўпроқ давр мобайнида чиройини йўқотмайди. Унинг яна бир афзаллиги – қаттиқ совуқ ва қурғоқчиликка ҳамда қатқалоққа чидамлилиги. Ўрилгандан кейин тез ва бир текис ўсади. Бу ўтни тупроқ шароити турлича бўлган ерга мослаштириш мумкин. Аммо яхши озиқлантирилган, ўртача намликдаги ва ишқори кам тупроқда ривожланиши янада жадаллашиб, газон ранги тўқ яшил бўлади.

Ўтлоқ бетагаси – илдизлари ниҳоятда бақувват (ерга 1,5 м. гача чуқурлашади), бўйи баланд кўп йиллик ўсимлик. Бу ўсимлик чими қўнғирбошига нисбатан юмшоқроқ. Ўсимликнинг тепа қисмидаги барглари тўқ яшил, қуйидагилари товланувчан бўлади; баргларининг эни 5-7 мм, бўйи 20-30 см. келади. Бетага эрта баҳорда ўса бошлайди, ўрилганидан кейин янги поя ва барг ҳисобига жадал тўпланади. Ўсимлик қўнғирбоши сингари иккинчи-учинчи йили тўлиқ шаклланади. Бетага қаттиқ



совуқ ва қурғоқчилликка чидамсиз. Ер сатҳи музлаб қолганида нобуд бўлиши мумкин. Бундан ташқари, у қумлоқ ерда яхши ўсмайди. Яхши озиклантириб парвариш этиб турилса, 12 йилгача узлуксиз ўсиб туриши мумкин. Газонбоп ўтнинг бу тури кўпроқ боғ-ҳиёбон ва ўтлоқ чимзорлари барпо этишда, партер газонлари яратишда эса камроқ қўлланади.



“Манзара-1” газон ўт нави – бошоқдошлар оиласига мансуб кўп йиллик ўт. *Poa pratensis* – маятник луговой – ўтлоқ қўнғирбоши. Генератив шохлар узунлиги – 30-45 см. Барг узунлиги – 9-12 см. Барг ранги – тўқ яшил. Иссиқ ҳароратда чидамлиги –

юқори. Қурғоқчиликда чидамлилиги – 3 балл. Совуққа чидамлилиги – ўрта. Йил давомида тўқ яшил манзарали газон вужудга келтиради. Яшил рангли барглар билан қишлайди. Турли тоифадаги газонлар барпо қилиш учун мўлжалланган.



“Манзара-2” газон ўт нави – бошоқдошлар оиласига мансуб кўп йиллик ўт. *Lolium Perenne* – многолетний райграс-яйлов мастаги. Генератив шохлар узунлиги 15 – 32 см. Барг узунлиги – 7 – 15 см. Барг ранги яшил, иссиқ ҳароратга чидамлилиги

– юқори, курғоқчиликка чидамлилиги – 4 балл. Совуққа чидамлилиги – юқори. Йил давомида яшил манзарали газон вужудга келтиради, оч яшил рангли барглар билан қишлайди. Турли тоифадаги газонлар барпо қилиш учун мўлжалланган.

Яйлов райграси (фанда у баъзан англиз райграси деб ҳам юритилади) биринчи йилиёқ қалин тўқ яшил, ёрқин чимзор ҳосил қиладиган кўп йиллик ўсимлик. Илдизлари бақувват, ер остига анчагина чуқурликка ёйилиб кетади. Юқори қисми қорамтир яшил, қуйи қисми тўқ яшил баргларининг эни 1-5 мм, узунлиги 8-17 см келади. Баҳорда гуллаб, уруғи июль ойида пишиб етилади. Райграснинг асосий афзаллиги шундаки, у экилган йилиёқ жуда чиройли, тўқ яшил чимзор ҳосил қилади. Ўрилганидан кейин тез ва бир текис ўсади ҳамда кеч кузгача тўқ яшил рангини йўқотмайди. Илдизининг бақувватлиги туфайли тупроқнинг босилиши ва зичлашувига дош беради. Аммо қаттиқ совуқ ва тупроқнинг музлашига ўта чидамсиз. Бундай ҳолларда чимзорнинг у ёки бу жойида тақирликлар пайдо бўлиб, ўсимлик бутунлай ёки қисман nobud бўлиши мумкин. Ушбу газонбоп ўт экилган чимзор беш йилгача ўз кўринишини йўқотмайди. Чимининг қаттиқлиги билан у қўнғирбоши ва бетагадан анча фарқ қилса-да, тез ўсиб, ривожланиши туфайли чимзорлар барпо этишда энг кўп қўлланиладиган газонбоп ўтлар сирасига киради.

Ўзбекистонда экиш учун хорижий мамлакатлардан келтириладиган газон ўт турлари ва навлари

Ҳозирги пайтда Ўзбекистонга асосан Европа мамлакатларидан, жумладан Дания, Голландия ва АҚШдан газон ўт уруғлари келтирилмоқда. Бу газон уруғлари 3 тоифага хос бўлиб, улар:



1. Мастерлайн



2. Универсал



3. ДЛФ Трифолиум

Юқорида келтирилган газон уруғини етиштирувчилар ичида, энг кўп уруғ тайёрловчи ва экспорт қилувчи ДЛФ-Трифолиум гуруҳи бўлиб, уларнинг йиллик газон уруғларини ишлаб чиқариш қуввати 120 000 тоннани ташкил қилади ва ишлаб чиқилган уруғни асосий қисми бутун дунёга экспорт қилинади.

Хорижий мамлакатларда ишлаб чиқиладиган газон ўт уруғлари қуйидаги ўт турларидан ташкил топган:

- овсяница красная (қизил бетага) – *Festuca rubra*;
- овсяница овечья (оддий бетага) – *Festuca*;
- овсяница тростниковая (қамишсимон бетага) – *Festuca arundina* sea;
- мятлик луговой (ўтлоқи қўнғирбош) – *Poa pratensis*;
- райграс многолетний (кўп йиллик мастак);
- (пастбищный) – *Lolium Perenne*;

Ҳозирги пайтда келтирилган ўт турларидан 100 дан кўпроқ турли газон ўт навлари яратилган. Газон ўт навлари ўзининг морфологик белгилари, биологик хусусиятлари билан бир-биридан тубдан фарқ қилади.

Бу ўт турлари йил давомида яшил ҳолда ўсиб, кўп йиллик ўтлар таркибига киради, улар жуда яхши манзара бериб, тўқ яшил рангли бўлади, тез тўпланувчи, жуда секин ўсувчи ўсимликлардир. Газонлар барпо қилишда юқорида келтирилган ўт турлари минтақанинг иқлим-тупроқ шароитларига, газон турларига, қайси мақсад учун экилишига (спорт, гольф в.ҳ.) ва жойнинг соя ёки ёруғлик ҳолатига боғлиқ ҳолда турли нисбатларда ўт аралашмалари тайёрланади. Ўт аралашмалари асосан қуйидагиларга бўлинади:

1. Манзарали газон ўтлар аралашмаси.
2. Спорт майдонлари учун аралашма.
3. Соя ерлар учун ўт аралашмаси.
4. Қуёш нури тик тушадиган ерлар учун ўт аралашмаси.
5. Йўл четларига экиладиган ўт аралашмаси.

Газон ўт аралашмаларини биргаликда ўстириш натижасида қалин ўт қоплами вужудга келиб, улар узоқ йиллар давомида ўз манзарасини сақлаб яхши ўсади, эстетик ҳолатини ўзгартирмайди. Газон ўт аралашмалари белгиланган жойларнинг (соя, қуёшли, йўл четлари, стадионлар) табиий шароитларига (иқлим, тупроқ, рельеф) тез мослашувчан, пайҳон қилинишга, ўта совуқ ва иссиқ ҳароратга, касалликларга чидамли, иқтисодий жиҳатдан юқори самарали (кўп йиллик, секин ўсувчи, кам ўрилувчи, озуқа, сув ишлаб бериш ва бошқа ресурсларга талабчан бўлмаган) бўлиши керак.

Қуйидаги кенг қўлланиладиган газон ўт аралашмалари қуйидаги ўт турлари, навлари ва уларнинг ўзаро нисбатлари келтирилган.

1-жадвал

Манзарали газон ўт аралашмалари

Ўт тури	Нави	Аралашмадаги миқдори, %
Ўтлоқ қўнғирбоши	Геронимо	30
Яйлов райграси	Мондиал	10
Қизил бетага	Раймонд	30
Қизил бетага	Франклин	25
Оддий бетага	Кристал	5

2-жадвал

Спорт майдонлари учун ўт аралашмаси

Ўт тури	Нави	Аралашмадаги миқдори, %
Ўтлоқ қўнғирбоши	Геронимо	40
Яйлов райграси	Мондиал	20
Қизил бетага	Раймонд	30
Оддий бетага	Кристалл	10

3-жадвал

Соя ерлар учун ўт аралашмалари

Ўт тури	Нави	Аралашмадаги миқдори, %
Қизил бетага	Франклин	40
Қизил бетага	Раймонд	30
Қизил бетага	Даусон	30

4-жадвал

Қуёш нури тик тушадиган ерлар учун ўт аралашмаси

Ўт тури	Нави	Аралашмадаги миқдори, %
Қамишсимон бетага	Апаче/тулса	50
Ўтлоқ қўнғирбоши	Геронимо	20
Яйлов райграси	Мондиал	20
Қизил бетага	Франклин	10

5-жадвал

Ўт тури	Нави	Аралашмадаги миқдори, %
Ўтлоқ бетагаси	Даримо	25
Яйлов райграси	Мондиал	10
Қизил бетага	Франклин	30
Қизил бетага	Раймонд	30
Қизил бетага	Кристал	5

■ | ГАЗОН БАРПО ЭТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Газоннинг меъёрида ўсиши, ривожланиши ва унинг сифати кўп жиҳатдан тупроқ унумдорлиги ҳамда дондорлигига боғлиқ. Мутахассисларнинг таъкидлашича, тупроқ шу қадар майин бўлиши лозимки, унинг энг катта бўлаги жўхори уруғидек келиши даркор. Чунки фақат унумдор, юмшоқ ва майда донали тупроқда сув, ҳаво, озуқа моддалари алмашувининг талаб

этиладиган меъёردа бўлишини таъмин этиш мумкин. Унумсиз, таркибида органик моддалар етарли бўлмаган, қурилиш майдонининг чуқур қатламларидан олинган тупроқлар газон учун ярқисиз ҳисобланади. Бундай тупроққа экилган ўт уруғлари тўлиқ униб чиқиши мумкин, аммо кейинчалик чимзор суғорилиши оқибатида тупроқ зичлаша бошлайди, ўсимлик илдизи чуқурроқ қатлам ва ён томонга ривожланмасдан сиқилиб қолади. Натижада ўсимликнинг асосий қисми нобуд бўлади, қолгани эса жуда суст ривожланади, чимлоқнинг ҳолати ва умумий кўриниши бузилади. Шунинг учун чимзор барпо этишда жой танлаш ва тупроқни тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади. Чимзор барпо қилиш учун, аввало, ер тўғри танланиши ва тегишли лойиҳа тузилиши талаб этилади. Одатда лойиҳада ерни рельефи бўйича текислаш, йўл ва дарахтларнинг жойлашуви ҳамда тупроқни тайёрлаш ишлари акс эттирилади. Ерни тайёрлаш дастлаб 30 см чуқурликда чопиш, текислашдан бошланади.



Ерни шудгорлаш



Ерни текислаш ва тирмалаш



Экишдан олдин ўғитлаш



Ерни зичлаш



Уруғ экиш



Газон уругини экиш



Уруғни ундириб олиш учун
сугориш



Газон майсалари униб чиқиши

Газонбоп ўтни экиш муддати

Уруғнинг бир текис униб чиқиши ҳамда яхши ривожланиши у йилнинг қайси фаслида экилганига боғлиқ. Киш фаслининг охири ва кеч кузда экилган газонбоп ўт уруғи тупроқдаги намлик даражасининг юқорилиги сабабли чириб кетиши ва бутунлай нобуд бўлиши мумкин. Шунинг учун уруғ баҳорда март-апрель, кузда сентябрь-октябрь ойлари оралиғида экилгани маъқул. Агар уруғни ёз ойларида экишга тўғри келса, у ҳолда газон юмшоқ тешикчали мато (марля) ёки бўз билан ёпилиши лозим. Уруғ ерга тўлиқ қўмилиши шарт эмас. Аммо уруғни қурт-қумурсқа, қушлар ва сув етишмовчилигини назарда тутиб, экин майдони тирнагич билан бир текисда тирмаланиши, сўнг ер юзасига 0,5-1,0 см қалинликда ёғоч қириндиси, шоли қипиғи ёки чириган гўнг мульча сифатида солинади. Сўнг ер юзасига чириган гўнг ($10-15 \text{ кг/м}^2$), майда қум (енгил тупроққа $8-10 \text{ кг/м}^2$, оғир тупроққа $10-15 \text{ кг/м}^2$), аммофос ($200-250 \text{ г/м}^2$) ва калий ($70-100 \text{ г/м}^2$) ўғит аралашмаси бир текис ёйиб чиқилади ва аралашманинг тупроқ билан қоришиб кетиши учун 10-15 см чуқурликда майда қилиниб, тирнагич ёрдамида яна бир бор аралаштирилади. Ниҳоят, ер юзаси тахтача ёрдамида текисланиб, оғирлиги 20-30 кг бўлган ғалтак ёрдамида зичланади. Тупроқни сифатли тайёрлаш учун яна бошқа бир усулдан ҳам фойдаланиш мумкин. Бунинг учун унинг 30-40 см устки қатлами олиб ташланади, ўрни текисланиб, дастлаб 15-20 см қалинликда шағал, шағалнинг устидан 10-15 см қалинликда сараланган йирик қум ҳамда шу чуқурликда тупроқ-қум-биогурус (10 кг/м^2 чириган гўнг, 5 кг/м^2 қум ва 5 кг/м^2 тупроқ ёки 15 кг/м^2 гўнг ва 5 кг/м^2 қум) аралашмаси солиниб текисланади. Тупроқ маълум даражада ёгин-сочин таъсирида табиий зичланишини назарда тутиб, уни тайёрлаш ишлари куз

фаслининг бошларида бажарилгани маъкул.

Ўт аралашмасини экиш меъёри газон барпо қилишда, аввало, унинг тури, экин майдонига қуёш нурунинг кўп ёки кам тушиши эътиборга олинган ҳолда, турли ўт аралашмаси ва экиш меъёри белгиланади.

Юқори сифатли газон (партер) учун ўт аралашмаси.

1. Ўтлоқи қўнғирбоши – 30 г/м².
2. Қизил бетага – 20 г/м².


Оддий газон учун ўт аралашмаси:

1. Кўп йиллик райграс – 10 г/м².
2. Ўтлоқи қўнғирбоши – 20 г/м².
3. Бетага – 10 г/м².


Соя жойдаги газон учун:

1. Кўп йиллик райграс – 10 г/м².
2. Ўтлоқи қўнғирбоши – 20г/м².
3. Бетага – 20 г/м².

■ | ГАЗОН ЭКИШ УСУЛИ



30-50 г/м² уругининг бир текис униб чиқишига эришиш учун 1х1 м майдончаларга бўлиб экилади



Уругининг 50 фоизи майдоннинг узунасига, қолгани эса кўндалангига экилади

Ўришда ўт узунлиги

1	Бир йиллик газоннинг биринчи ўрими	Ўт узунлиги 10-12 см	Ўрим баландлиги 6 см
2	Бир йиллик газоннинг кейинги ўрими	Ўт узунлиги 10-12 см	Ўрим баландлиги 5см
3	Газонни кейинги йилларда ўриш	Ўт узунлиги 8-10 см	Ўрим баландлиги 3-4 см

*Газон ўтларини ўриш*

Газон ўтини суғориш муддати

Суғориш муддати, давомийлиги, меъёри ҳавонинг ҳароратига ҳамда тупроқнинг намлигига боғлиқ. Бир галги суғориш меъёри тахминан 8-10 л/м² ташкил этади. Баҳор ва куз ойларида бир кеча-кундуз давомида бир марта, ёз ойларида эса икки марта суғориш талаб этилади. Ўсимлик сув кам бўлганадиган пайтда, яъни эрталаб ёки кечки пайт суғорилгани маъқул. Сув тупроқнинг 10-15 см қатламини намласа, бас. Унинг ўт устида тўпланиб қолиши ёки оқим вужудга келишига асло йўл қўймаслик даркор. Акс ҳолда тупроқ ҳаво режимининг бузилиши ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир этиши мумкин.



Газон ўтларини суғориш

Газонбоп ўтни ўриш муддатлари

Газон ўтини ўриш муддати, давомийлиги ва тартиби ўт нави ҳамда иқлим шароитига қараб белгиланади. Хусусан, барча ўт навлари баҳор ва куз ойларида жадал, ёз ойларида эса сусти ўсиши маъқул. Шунингдек, катта баргли навлар тез, майда баргли навлар эса секин ўсиши ҳам амалиётда ўз исботини топган. Ўриш тадбири ўсиб кетган ўтни қисқартириш учунгина бажарилмайди. Уни вақтида ва тўғри амалга оширилиши туфайли яшил қопламанинг зичлигига ҳамда чиройли ташқи кўринишига эришиш мумкин бўлади.

Чимзорга ўғит солиш муддатлари

Юқорида баҳор ва ёз фаслида, яъни ўсимлик жадал ривожланаётган даврда вақти-вақти билан ўриб туриш лозимлигини таъкидланган эди. Аммо чимзорнинг ўрилиши оқибатида тупроқ таркибидаги озуқа моддалари (айниқса, азот) миқдори кескин камаяди. Агар ана шу моддалар ўрни қопланмаса, ўт сийраклашиб, барг ва поялари нозиклашиб қолади. Шу боис газонбоп ўт доимий равишда ва керакли миқдорда озиклантирилиши шарт. Натижада ўсимлик:

- жадал биомасса тўплайди ва қалинлашади;
- Бегона ўтларни сиқиб, йўқотади;
- Тўқ яшилранг олиб, гўзал манзара ҳосил қилади.
- Ҳаддан ташқари иссиқ ва совуқ ҳароратга, қурғоқчиликка, касалликларга чидамлироқ бўлади.



Газон ўтларини ўғитлаш

Ўғитлар меъёри

Газон учун зарур моддалар	Қўлланадиган ўғит тури	Қўллаш муддати (N.P.K. аралаш ҳолда)	Меъёри, г/м ² (физик масса ҳисобида)
Азот	Аммиак селитраси	Март-июнь	10-12
Фосфор	Суперфосфат аммофос	Март-июнь	12-15
Калий	Калий сульфати, калий хлор	Март-июнь	6-8

Ўсимликни озиклантиришда қуйидаги талабларга риоя этиш лозим:

- ёмғир пайтида ўғит солиш тақиқланади;
- ўғит солаётган тупроқ нам, ўт эса қуруқ бўлиши керак;
- ўғит солинган заҳоти ўсимлик суғорилиши шарт;
- ўғит қўлда ёки махсус кичик ўғитлагич мослама

ёрдамида солиниши зарур.

Мульчалош учун зарур аралашмани тайёрлаш:

Аралашма меъёри 1,5 кг/м².

Муддати: октябрь-ноябрь.

Сепиш усули: қўлда бир текисда сепилади ва тирнагич билан ёйилади.

Мульчалошнинг аҳамияти

Мульчалош деганда органик моддаларнинг газонбоп ўт сиртида жойлашуви, тақсимоли тушунилади. Мульча унумдор тупроқ, қум ва гумус аралашмасидан иборат бўлади. Ваҳоланки, тажрибали боғбонлар бу ишни ҳар йили бажаради. Хўш, бунинг боиси нимада? Гап шундаки, мульчалош чимзорда йил давомида вужудга келган чуқурликларни тўлдириш, тупроқ унумдорлигини ошириш, қуриб қолган ўт қолдиқларини чириш жараёнини тезлаштириш ҳамда ўтнинг янада қалинлашуви ва тўпланишига шароит яратиш мақсадида амалга оширилади. Мульча таркиби: тупроқ, қум, гўнг ёки биогумус.

Тупроқдаги ҳаво алмашинуви

Маълумки, чимзор ўти ҳаддан ташқари қалинлашгани, кўпгина янги ўсимталар пайдо бўлгани, ўсимликнинг эски барги, илдизи ва шохлари тўкилиши тупроқнинг устки қатламида жуда кўп миқдорда органик моддаларнинг тўпланиб қолиши сабабли унда ҳаво ва сув режимининг бузилиши ҳоллари тез-

тез учраб туради. Бу ҳол, ўз навбатида, ўсимлик қолдиқларининг парчаланмасдан қолиши ҳолатини юзага келтиради. Натижада ўтнинг ўсиши ва ривожланиши кескин сусаяди, у турли касалликларга чалинади. Бунга йўл қўймаслик мақсадида ҳамда тупроқ ҳаво алмашинувини яхшилаш учун чимзорга махсус асбоб-ускуна ёрдамида ишлов берилади. Бунинг учун тупроқнинг ўта зичлашиб, хас-хашак ҳамда органик моддалар тўпланиб қолган жойлари паншаха ёрдамида тешиб чиқилади. Бу тадбир тупроқдаги газ алмашинувини мўътадиллаштиради, ўсимлик илдизи учун зарур кислороднинг қуйи қатламларгача киришига ва аксинча, зарарли карбонат ангидрид газининг чиқиб кетишига имкон яратади. Уни ҳар йили бир марта куз фаслининг бошларида (октябрь ойида) ўтказиш мақсадга мувофиқ.



Газон ўтларини ўғитлаш

■ I ГАЗОНДАГИ БЕГОНА ЎТЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ УСУЛЛАРИ

Одатда, бегона (ёввойи) ўт ўз ҳолига ташлаб қўйилган, қаровсиз чимзорларда учрайди. Аммо чимзор ўт илдизлашуви ва газон белгиланган муддатларда ўрила бошлаши билан вазият тубдан ўзгаради. Чунки буғдойиқ, ойболдирғон, чирмовиқ, қичитқи каби бегона ўтлар ўримга дош беролмай, қуриб қолади. Аммо айрим бўйи паст бегона ўтлар ўримдан қолиб кетиши сабабли газонбоп ўтнинг ривожини ва ҳолатига катта зарар етказиши мумкин. Бундан ташқари, бегона ўт уруғи шамол ёки қушлар орқали ҳам келиши мумкин. Шу боис ҳаваскор боғбон бегона ўтга қарши воситалардан хабардор бўлибгина қолмай, улардан самарали фойдаланиш усуллари ҳам эгалламоғи лозим.



Айиқтовон



Қоқиўт



Себарга



Зубтурум

Бегона ўт етказадиган зарар умумлаштирилган ҳолда қуйидагиларда намоён бўлади:

- бегона ўт нисбатан тез ўсиши ва пояси узунроқ бўлиши сабабли газон ўтини босиб кетади;
- тупроқдаги озуқа моддалари ва намликни сўриб олиши оқибатида газоннинг озикланиши ҳамда сув режими издан чиқади;
- бегона ўт турфа рангда гуллаши боис чимзорнинг умумий манзараси бузилади.

Чимзорда бегона ўт унчалик кўп бўлмаганда аксарият хаваскор боғбонлар бунга жиддий эътибор бермайди. Аммо бегона ўт гуллаб, анчагина жойни эгаллаб олганидан кейин унга қарши курашиш қийинлашади. Демак, бундай ўтларга қарши кураш уларнинг гуллаши ва кўпайиб кетишидан олдин бошланиши лозим. Бунда, одатда, оддий механик ва кимёвий усуллар қўлланади.



Бегона ўтларга қарши кураш

Механик усул

Янги барпо этилган чимзорда пайдо бўлган бир йиллик бегона ўт қўл билан осонгина юлиб ташланади. Бунинг учун бир қўл билан газонбоп ўт босиб турилади, иккинчиси билан эса бегона ўт илдизи билан юлиб олинади. Аммо

кўп йиллик чимзорда бундай натижага эришиш қийин ва бундай вазиятларда бегона ўтни илдизи билан қазиб олишга тўғри келади. Имкон қадар чимзорга зарар етказмасдан, боғ паншахаси ёки пичоқ ёрдамида бегона ўт олиб ташланади. Очилиб қолган жойга гўнг солиб, бир оз босиб қўйилади. Аммо айрим илдизи қаттиқ бегона ўтга ҳатто гербицид ҳам таъсир этмаслигини назарда тутиб, ўрим пайтида ана шу илдизни қирқиб ташлаш лозим.



Чимзорга механик ишлов беришда керакли асбоб-ускуналар

Кимёвий усул

Бегона ўтга қарши кимёвий кураш воситаларининг (гербицид) икки тури: умумий ва танлаб таъсир этувчи гербицидлар қўлланилади. Бу препарат эҳтиёткорлик билан қўлланиши лозим, чунки ҳаддан ташқари кўп солиниши оқибатида бегона ўт илдизларига деярли таъсир этмасдан, чимзор ўт баргларини куйдириши мумкин. Шу боис препарат ёрлиғидаги йўриқномада келтирилган тавсияларга қатъий риоя этиш шарт. Бундан ташқари, бу каби кимёвий воситаларни қўллаганда яна қуйидаги талаблар:

- препарат тупроқ бир оз нам бўлганда қўлланиши ва аксинча, қурғоқчилик пайтида умуман қўлланмаслиги даркор;
- препарат қўлланган пайтда чимзор ўрилмаслиги,

суғорилгунга қадар ёки ёмғир ёғишидан олдин унинг устида юрилмагани маъқул;

- препарат қўлланилганидан икки кундан кейин ёмғир ёғмаса, чимзор яхшилаб суғорилиши лозим;

- препарат қўлландан кейин қуриб қолган бегона ўт қолдиқлари йиғиб олиниши зарур, агар бегона ўт тўлиқ йўқотилмаган бўлса чимзорга яна бир бор кимёвий ишлов бериш лозим.



Ҳаваскор боғбон яна бир нарсани ёдда тутиши даркор. Гап шундаки, препаратнинг бу тури (яъни умумий таъсир этувчи) айиқтовон ва зубтурум каби бегона ўтларни йўқота олмайди. Бундай ҳолларда танлаб таъсир этувчи кимёвий воситалар, хусусан айиқтовон ва зубтурумга қарши 2,4-Д (2-метил-4-хлорфенонуксус ва дихлорфеноксиуксус) препарати яхши самара беради. Маълумки, ҳар бир кимёвий воситанинг таъсир доираси, ўзига хос хусусиятлари бўлади. Танлаб таъсир этувчи препаратлар ҳам бундан мустасно эмас, улардан айримларининг шакли, таъсир доираси ва қўллаш усули тўғрисида маълумот берилган.

Чимзорга ишлов усуллари

Чимзорга кимёвий ишлов берганда гербицидларнинг ўзига хос хусусияти, таъсир этиш доираси ҳамда вақти эътиборга олиниши лозим. Жумладан, суюқ гербицид орқага кийиб олинадиган конуссимон пуркагич ёрдамида сепилгани маъқул. Майдони нисбатан кичик чимзорларда кичик пуркагич ёки махсус қалам ёрдамида ишлов берилса, газон ён-атрофидаги дарахт ва гул кўчатларига зарар етказилмайди. Кукуссимон ёки гранулали гербицид махсус дорилаш ускунаси ёрдамида солинади. Бундай ускунадан фойдаланганда чимзорнинг дориланмаган жойи қолмаслиги ҳам, бир жойга икки марта ишлов берилмаслигига ҳам алоҳида эътибор қаратиш лозим. Баъзи боғбонлар бундай вазиятларда чимзорнинг ишлов берилган ёки берилмаган жойини аниқ билиш учун рангли (масалан, кўк) гербицидлардан фойдаланишни афзал кўришади.

Кимёвий воситалар қўллаш

Умумий таъсир этувчи гербицидлар апрелнинг учинчи декадасидан июль ойининг биринчи декадасигача қўлланиши мақсадга мувофиқ. Агар кузда ҳам кимёвий ишлов бериш зарурати туғилса, масалан, пўпанаксимон мохга қарши умумий таъсир этувчи гербициддан ташқари дихлорофен препаратининг қўлланиши яхши самара беради, танлаб таъсир этувчи гербицидлар апрелнинг ўрталарида июнь ойининг охиригача қўлланиши яхши самара беради.

Танлаб таъсир этувчи гербицидлар апрелнинг ўрталаридан июнь ойининг охиригача қўлланиши мумкин. Кузда бу гербицидга азот ўғити қўшиб ишлов берилгани маъқул.

Чимзорга ишлов бериш жараёнида ҳар бир боғбон

кимёвий воситаларнинг таъсир этиш доираси ва вақтини яхши билиши лозим.

Маълумки, гербициддаги таъсир этувчи модда бегона ўт барглари орқали унинг пояси ва илдизларига тарқатади. Натижада бегона ўт дастлаб жадал ривожлана бошлайди, сўнг маълум вақтдан кейин сўлиб, қурий бошлайди. Ваҳоланки, гербицид самараси бирданига эмас, маълум вақтдан кейин (одатда 2-6 ҳафта ичида) намоён бўлади. Бу турдаги воситаларнинг яна бир афзаллиги шундаки, улар бегона ўт баргларига таъсир этибгина қолмай, уни таг-томирлари билан қуритади.

■ | ЗАРАРКУНАНДАЛАР

Иқлими мўътадил минтақаларда (масалан, Ўрта Ер денгизи, Ирландия ва ҳоказо) газонбоп ўтга зарар келтирадиган курт-қумурсқа, ҳашарот ва бошқа жониворлар кўп эмас. Аммо бизнинг иқлимда чимзорнинг ўсиши ва ривожланишига жиддий зарар етказадиган бир қанча зараркунандалар бор.

Чувалчанг. Баъзи боғбонлар чувалчанг тупроқни илма-тешиқ қилиб, унда ҳаво айланишини яхшилайти деб ҳисоблайди. Дарҳақиқат, чувалчангларнинг шундай турлари ҳам мавжуд. Аммо уларнинг аксарияти чиқиндилари



билан ҳамда ер остида қолиб кетган ўт, оёқ кийим ёки ўт ўриш қурилмаси билан босилиши билан nobud бўлади. Натижада чимзорнинг айрим жойларида паст-баланд тупроқ уюмлари ҳосил бўлади. Кейинчалик ана шу тупроқ уюмларига бегона ўт уруғи тушиб, атрофдаги газонбоп ўт ривожига салбий таъсир этади. Қолаверса, тупроқда чувалчангларнинг ҳаддан ташқари кўпайиши юмронқозикларни жалб этишини ҳам эътиборга олиш лозим.

Кураш усули: Агар газонбоп ўт майдонидаги тупроқ оғир, гўнг ва чириндиларга бой бўлса, чувалчанглар тез орада бу чимзорни ишдан чиқаради. Шу боис, ўрилган ўтни тўлиқ йиғиштириб олиш ҳамда тупроқнинг ишқорланиш даражасини бир оз ошириш талаб этилади. Бунинг учун ҳар йили тупроқ гўнг ва аммоний сульфати билан озиклантирилиши лозим. Лекин, ҳеч қачон тупроққа оҳак солинмаслиги керак.

Узуноёқ курти. Бу зараркунанда захланиб қоладиган чимзорларда (айниқса, кузда ёғин-сочин кўп бўлган пайтда) кўпроқ учрайди. У ёзнинг охирида ўтда тухум қўяди. Кузда тухумдан чиққан курт газонбоп ўт поя ва илдизи билан озикланиб чимзорга жиддий зарар етказди. Натижада чимзорнинг айрим жойларида сарғиш ва қўнғир доғлар пайдо бўлиб, унинг ташқи кўринишини бузади. Чимзор майдонида узунёқнинг пайдо бўлишини бу ерда чуғурчиқларнинг кўпайиб қолганидан ҳам аниқлаш мумкин.



Кураш усули: Узуноёққа қарши курашнинг энг самарали усули – тупроқни юмшатиш орқали унда ҳаво алмашинувини яхшилашдир. Зараркунанда ҳаддан ташқари кўпайган ҳолатда янада таъсирчан чора, масалан, баҳор фаслида узуноёқ куртига қарши махсус кимёвий восита инсектициди билан чимзорга ишлов бериш мумкин.

Юмронқозиқ.

Юмронқозиқ нисбатан кичик жонивор бўлгани билан чимзорнинг ўсишига, айниқса, ташқи кўринишига жиддий зарар етказди. Шунинг учун ҳар бир боғбон унинг чимзорда пайдо бўлишига қарши зарур чоратадбирлар кўриши шарт. Маълумки, юмронқозиқ



чувалчанглар билан озиқланади. Демак, асосий эътибор чавалчангларга қаратилиши лозим. Аммо шунга қарамай, улар чимзорда пайдо бўлиб қолса, нима қилиш керак?

Кураш усули:

Мутахассислар нафталин, ёнадиган қоғон, турли дезинфекция воситалари, махсус тутун шашкалари ҳамда қопқонлардан фойдаланишни маслаҳат беради.

Чумоли. Чувалчангдан фарқли ўлароқ, чумолилар



одатда бошқа зараркунандалар чиқариб ташлаган тупроқ уюмларида, ёзнинг жазирамасида пайдо бўлади. Чумолилар чимзорга у қадар катта зарар етказмаса-да, унинг ташқи кўринишини бузади, ўриш ишларига ҳам халақит беради.

Кураш усули: Чумолидан халос бўлиш учун ўришдан олдин тупроқ уюмини супурги билан текислаш, агарда уюм кўп бўлса, чумоли уясини топиб, текислаб ташлаш керак.

Тупроқ ариси.

Бу зараркунанда чимзор тупроғида ёки йўлаклар остига ин қўяди. Улар тупроқни чимзор юзаси юқори қисмида ўзига хос чуқурчаси бўлган конуссимон уюмларга йиғади.

Кураш усули: Тупроқ арига чумолига қарши қўлланилган усулдан фойдаланиш мумкин. Аммо ҳар йили газоннинг бир хил жойида улар пайдо бўлиб қолса, у ҳолда апрель ойида тупроқ уюми гексохлоран моддаси билан ишлов берилиши лозим.

Ит. Чимзорга имкон қадар итларни яқинлаштирмаган маъқул. Чунки уларнинг чиқиндиси, айниқса, пешоби газон ўтини куйдириб, умумий кўринишини бузади. Ўтнинг куйган жойини шу заҳоти яхшилаб суғориш лозим. Агар шунда ҳам ўт қайтадан тикланмаса, газоннинг куйган жойига қайтадан уруғ экишга тўғри келади.



■ I ГАЗОНБОП ЎТ КАСАЛЛИКЛАРИ

Фузариоз (оқтақир) – газонбоп ўтларда энг кўп учрайдиган касалликлардан бири. Замбуруғ келтириб чиқарадиган бу касаллик кузда ёки ёгин-сочинли қишдан кейин эрта баҳорда пайдо бўлади. Дастлаб чимзорда диаметри 30 см гача сарғишранг доғлар пайдо бўлади. Шунингдек, чимзор чеккаларида оқимтир ёки пуштиранг тақирликлар ҳосил бўлади. Ушбу касалликдан халос бўлиш осон кечмаслигини назарда тутиб, олдиндан хавфсизлик чора-тадбирларини кўриб қўйиш лозим.



Кураш усули: Бунинг учун чимзорни вақти-вақти билан шамоллатиб туриш ҳамда куз фаслида азот ўғити солмаслик даркор. Касалликнинг биринчи белгилари пайдо бўлган заҳоти чимзорга карбендазамин сингари фунгициднинг суюқ эритмаси билан ишлов бериш мумкин.

Офиоболус – ўта хавфли замбуруғли касаллик. У асосан бетаганинг турли навларида учрайди. Касаллик чимзор етарли ёки умуман озиқлантирилмаганлиги,



тупроқнинг захлаб кетиши ҳамда оҳак миқдорининг кўпайиб кетиши оқибатида пайдо бўлади. Унга чалинган чимзорнинг айрим жойларида чуқурликлар ҳосил бўлиб, унинг четидаги ўтлар сарғая бошлайди, чуқурлик ўртасидан бегона ва пояси қаттиқ ўтлар ўсиб чиқади.

Кураш усули: Касаллик олдини олиш учун баҳор фаслида чимзорга умумий таъсир этувчи гербицид билан ишлов берилиши, кузда эса шамоллатиб турилиши лозим. Агарда бу тадбирлар самара бермаса, чимзорнинг ўша жойи қайтадан экилиши ёки чим қоплама ётқизилиши талаб этилади.

Қизил ип – ёзнинг охири ёки куз фаслида чимзорнинг айрим жойларида қорамтир қизғишранг доғлар ана шу касалликнинг пайдо бўлганидан дарак беради. Чимзорга диққат билан



қараганда касалликнинг яна бир белгиси – ўт орасида қизғишранг ипсимон ингичка пояларни кузатиш мумкин. Касаллик чимзорга жиддий зарар етказмаса-да, унинг ташқи кўринишини бузади.

Кураш усули: Бу касалликка чалинмаслиги учун чимзор вақтида озиклантирилиши, шамоллатилиши ва тўғри ўрилиши лозим. Шунингдек, унга қарши карбендазамин фунгициди ҳам яхши самара беради.

Доллор спорт – партер шаклидаги газонларда учрайдиган касаллик. Унга чалинган ўсимлик баргларида зарҳал ёки



қўнғирсимон доғлар пайдо бўлади. Уларнинг диаметри 2,5-5 см ни ташкил этса-да, доғлар бир-бири билан бирикиб, чимзорнинг каттагина майдонини эгаллаб олиши мумкин. Бунга йўл қўймаслик мақсадида эрта баҳорда чимзорни азот ўғити билан озиқлантириш, кузда эса вақти-вақтида чим қопламани шамоллатиб, ундаги пўпанак ва хас-хашакни тозалаб олиш лозим.

Кураш усули: бу касалликка қарши энг самарали восита – карбензамин сингари суюлтирилган фунгицид.

Қурбақасалла (заҳарли замбуруғ) – чимзорда бу замбуруғнинг бир қанча турлари учраши мумкин. Замбуруғ у қадар кўп бўлмаса, хавотирланишга асос йўқ. Чунки улар органик қолдиқларда пайдо бўлади. Шу боис чимзордан органик модда қолдиқлари чиқариб ташланса, замбуруғ ўз-ўзидан йўқ бўлади. Баъзи ҳолларда, айниқса, касаллик ўтказиб юборилса, чимзор юзасида қорамтир доғлардан иборат ҳалқалар ҳосил бўлиши мумкин.



Кураш усули: Бу замбуруғнинг хавфли жиҳати шундаки, ҳозиргача унга қарши самарали восита яратилмаган. Айрим мутахассислар чимзорнинг касалланган жойига темир сульфати (1 м^2 ерга 1 л сувга 10 г) ёки кир ювиш воситасининг эритмаси билан ишлов бериш лозим, дейди. Бошқа олимлар эса зарарланган тупроқни (30 см чуқурликда) чиқариб ташлаш ва унинг ўрнига янги тупроқ солиб, газонбоп ўт уруғини экишни маслаҳат беради.

Газонбоп ўтлар музлашининг оқибатлари

Ернинг музлаши ўсимлик ташқи кўринишининг бузилиши ва нобуд бўлишининг асосий сабабларидан ҳисобланади. Бу ҳол куздан қиш фаслига ўтиш даврида ҳароратнинг кескин пасайиб, ер музлаганда содир бўлади. Ҳарорат тўсатдан пасайиб кетган вазиятда ўсимлик чиниқишга улгурмайди ва кўпинча нобуд бўлади. Ернинг музлаши ўсимлик тўқималарининг зарарланишига олиб келади. Натижада поя, барг ва илдизлари бутунлай ёки қисман нобуд бўлади.



Газон ўтларининг кучли совуқдан кейинги ҳолати

Маълумки, усти қалин қор билан қопланган газонбоп ўт ҳар қандай совуққа дош бера олади. Демак, ўсимликни музлашдан ҳимоя этиш учун қиш палласида газон устидаги қорни имкон қадар узоқроқ туришига шароит яратиш зарур (Бунинг учун, масалан, қор эриши бошланишидан олдин газон устидаги қорни яхшилаб босиб чиқиш мумкин). Аммо энг муҳим омил – бу агротехника талабларига риоя этишдир. Хусусан, ер яхшилаб тайёрланиши, кузда фосфор ва калий, эрта баҳорда азотли ўғитлар билан меъёрида озиклантирилиши лозим.

■ I ГАЗОН ЎТ ЕТИШТИРИШДАГИ МУАММОЛАР

Яқинда экилган ва ундириб олинган чимзорда тақир ер қуйидаги сабабларга кўра пайдо бўлиши мумкин.

Ернинг яхши тайёрланмаганлиги. Ер нотўғри чопилиши оқибатида унинг айрим жойларида унумдор тупроқ етарли бўлмайди.

Ноқулай об-ҳаво шароити. Енгил тупроқда тақирлик қурғоқчилик оқибатида пайдо бўлса, оғир тупроқларда – ҳаддан ташқари намгарчилик туфайли вужудга келади.

Ўтнинг бир текис ўсмаслиги. Бу ҳолат тупроқнинг захлаб кетиши, сифатсиз, эскириб қолган уруғдан фойдаланиш, совуқ ва зах ҳавода юз беради. Баъзан экилган ўт сийрак ўсиб чиқиши оқибатида чимзорнинг айрим жойлари очилиб қолади. Бу қуйидаги ҳолатларда юз бериши мумкин.



– уруғ ҳаддан ташқари сийрак экилганда; у бир текис ва керакли зичликда униб чиқиши учун 1 м² ерга 30-45 г уруғ сепилиши керак;

– ўтнинг сийрак ўсиб чиқишига қушлар ҳам сабабчи бўлади;

– ўтнинг сийраклашуви тупроқнинг захлашуви, ерга яхши ишлов берилмаганлиги, тупроқости қатламларнинг ернинг юза қисмига чиқиб қолиши оқибатида ҳам рўй бериши мумкин.

Ўт пояси қуйи қисмининг қорайиши унинг “қораоёқ” касалига чалинганлигидан дарак беради. Бундай ҳолларда ўт поясининг қуйи қисми қорайиб, барглари сарғайиб кетади,

уни осонгина ердан суғуриб олиш мумкин. Агар зудлик билан зарур чора-тадбирлар қўрилмаса, касаллик тезда тарқалиб бутун чимзорни нобуд қилади. Бунинг учун ўсимликнинг касалланган, сарғиш ва қорамтир доғлар пайдо бўлган жойига фундазол воситаси билан ишлов бериш лозим. Бундан ташқари, бу касаллик тупроқда қолиб кетган гишт ва ахлат, унинг ҳаддан ташқари қуриши ёки захлаб кетиши оқибатида ҳам пайдо бўлиши мумкин. Бундай ҳолат баҳор фаслида юз берса, ўсимлик чидамлилигини ошириш мақсадида чимзор ўсишини жадаллаштирувчи азотсимон модда билан ишлов берилиши лозим. Будаврда умумий таъсир этувчи гербицид ёки комплекс ўғит солинмаслиги лозим. Айрим ҳолларда чимзор қопламаларининг чўкиши оқибатида улар орасида ёриқлар пайдо бўлади. Бу ҳол асосан чимзор иссиқ кунларда ўз вақтида суғорилмаганлиги сабабли юз беради. Ёриқларни йўқотиш учун чимзор суғорилади ва ёриқларга мульча (гўнг) солинади. Баъзан экилган чимзордаги ер ости сув етишмовчилиги ҳамда уруғ баҳор фаслида таркиби оғир тупроққа экилгани сабабли ёрилиб кетиш ҳоллари юз беради. Ёриқларни бартараф этиш учун чимзор, аввало, суғорилади, сўнг ёриқларга мульча солиб, ўша жойга бир оз уруғ сепилади. Бу каби таъмирлаш ишларидан кейин ҳаво қуруқ келса, чимзорда яна ёриқлар пайдо бўлмасидан, у вақтида суғорилиши керак. Бундай ҳолат одатда ер яхши тайёрланмагани ёки қоплама пала-партиш ётқизилгани оқибатида юз беради. Тупроқ чўкиши экилган чимзор сиртида ҳам ана шундай чуқурликлар ҳосил бўлишига олиб келади. Вақти-вақти билан мульча (гўнг) солиш йўли билан уларни тўлдириш мумкин.

Тош чимзор сиртига тупроқ обдон тайёрланмагани оқибатида пайдо бўлиб қолади. Унинг хавфи шундаки, ўзи

ётган жойда ўтни босиб қолишидан ташқари, ўрим пайтида ўриш машинасининг пичоқларини ишдан чиқариши мумкин. Шу боис чим қоплама ёйиш ёки уруғ экишдан олдин тупроқ тош, ғишт ва бошқа қурилиш ахлатидан тозаланмоғи лозим.

■ | СУНЪИЙ ГАЗОН

Юқорида биз газонбоп ўт турлари, уларни экиш ва парвариш этиш усуллари хусусида батафсил сўз юритдик. Энди манзарали газоннинг яна бир тури – сунъий қопламалар тўғрисида қисқача тўхталамиз. Кейинги вақтда стадион ва спорт майдончалари, турли бино ва иншоотлар, ҳатто дала ҳовли йўлчаларини газонбоп сунъий қопламалар воситасида безаш ҳамда кўкаламзорлаштириш кўзга ташланмоқда. Албатта, табиий чимзорга кўникиб қолган одамларга сунъий газон ғалати, нотабиий туюлиши мумкин. Аммо жиддийроқ ўйлаб кўрилса, ҳар қандай боғнинг табиий газонбоп ўт ўсмайдиган жойи бўлади.



Масалан, кўпчилик дала ҳовлисидаги бассейн атрофи ёки оранжерея (гулхона) йўлакчасига тош, шағал ёки бетон плита ётқизишни афзал кўради. Аслида, бу жойга сунъий яшил қоплама ётқизилса, унинг ташқи кўриниши табиий чимзордан деярли фарқ қилмайди. Бундан ташқари, сунъий газонни озиклантириш, ўриш талаб этилмайди; ўз вақтида супуриб, ювиб турилса бас. Қолаверса, бундай сунъий чимзор атрофи ва бурчакларини суратда акс эттирилганидек, гултувак ҳамда бошқа идишларга экилган турфа ўсимлик ва гуллар билан безатиш мумкин. Ҳозирги вақтда синтетик сунъий қопламалар асосан полипропилендан тайёрланади ва эни икки ёки тўрт метрлик рулонларда сотилади. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, бундай қоплама иқлим ва ҳаво ўзгаришига чидамлилиги, осонгина тўшалиши ҳамда кўп парвариш талаб этмаслиги билан ажралиб туради. Шубҳасиз, сунъий қоплама ҳеч қачон табиий газон ўрнини боса олмайди. Шу боис газон қоплама ётқизилиши ёки чимзор ўт экилиши мўлжалланган майдонда сунъий қопламадан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас. У тош, шағал ва бетон йўлакчалар ўрнига қўллангани маъқул.

■ | Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Обод турмуш йили Давлат дастури тўғрисидаги” ПҚ-1920-сонли қарори.

2. Бўриев Ҳ.Ч., Астанов. Р, Норкулов. У «Газон ўтлари» қўлланма – Тошкент, 2002– б 1-32.

3. Туркия Республикаси Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китобдан” иборат тўплами.

4. Ш.А.Холова, Сафаров К.С., “Гулчилик ва газон барпо этиш” услубий кўрсатма. Тошкент – 2019. б 34.

5. Астанов Р.А., Буриев Х.Ч., Норкулов У. “Чимзорлар барпо қилиш, ўстириш ва ишлов бериш бўйича тавсиялар”. Тошкент, ТошДАУ – 2001 й. б 22.

6. Zaurov.D, James.A, Astanov.R, Norkulov.U, and Sodombekov.I. “Turfgrass Collection from Central Asia”, Proceedings of the twelfth annual Rutgers turfgrass symposium. January 9–10, 2003. Cook College.

7. Zaurov.D, James.A, Astanov.R, Norkulov.U, and Sodombekov.I. “ A Summary of 10 Years of Turfgrass Collection in Central Asia” , Proceedings of the Seventeenth annual Turfgrass symposium. January 10-11, 2008.

8. Зауров Д.Э., Астанов Р.А., Норкулов У. «Подбор видов и сортов злаковых трав для создания озеленения в условиях Узбекистана». ТЖ «Вестник аграрной наук Узбекистана». № 1(3), 2001 г., с. 11-16.

9. Музафарова Д. Ш. «Газоны в Узбекистане», «Научные труды первой республиканской научной конференции сту-

дентов магистратуры по направлению сельское хозяйство 28-29 мая 2003 года”. Ташкент 2003 г., с. 217-218.

10. Норкулов У., Ҳамроева Д. “Газон ўтининг тарихи ва аҳамияти” Муҳофаза журнали. 2013 й. №1 (99) б. 24.

11. Норкулов У., Ҳамроева Д. “Газон ўтлари” Муҳофаза журнали. 2014 й №4 (114), б. 22.

Blank lined area for writing, consisting of 20 horizontal green lines.

[illegible]

Blank lined area for writing, consisting of 20 horizontal green lines.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

42.23
М 17

Газон ўтларини етиштириши [Матн] : илмий нашр / «Агробанк» АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 56 б.

ISBN 978-9943-7174-6-6

УЎК 635.928

КБК 42.23

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ

100 китоб тўплами

ГАЗОН ЎТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШИ

90-китоб

Нашриёт уйи “Тасвир”
Тошкент – 2021

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳиҳ:
Г. Мусахонова

Компьютерда тайёрловчилар:
З.Б. Хошимов, Н.С. Сайидаҳмадов

Дизайнер:
А.Х. Комилов

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021
Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.
Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.