

Diferenciação logarítmica:

1) Derive as funções abaixo:

a) $y = (2-x)^{\sqrt{x}}$ R.: $y = (2-x)^{\sqrt{x}} \left(\frac{\ln(2-x)}{2\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{2-x} \right)$

b) $y = x^{\cos 3x}$ R.: $x^{\cos 3x} \left(-3 \sin 3x \cdot \ln x + \frac{\cos 3x}{x} \right)$

c) $y = \frac{x^2 \sqrt[3]{7x-14}}{(1+x^2)^4}$ R.: $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 \sqrt[3]{7x-14}}{(1+x^2)^4} \left[\frac{2}{x} + \frac{1}{3x-6} - \frac{8x}{1+x^2} \right]$

III) Derivação Implícita

1) Considere $y = f(x)$ definida implicitamente por $x^4 - xy + y^4 = 1$. Calcule $f'(0)$ sabendo que

$$f(x) > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad f'(0) = \frac{1}{4}$$

2) Considere a curva dada por $x^3 + y^3 = 3xy$. Esta curva é conhecida como *folium de Descartes*. Derive implicitamente para obter o coeficiente angular da reta tangente a esta curva em um ponto arbitrário (x_0, y_0) .

$$\text{R.: } \begin{cases} \frac{y_0 - x_0^2}{y_0^2 - x_0}, & x_0 \neq 0 \\ 0, & x_0 = 0 \end{cases}$$

3) Considere a curva conhecida como *cissóide de Diocles* e dada por $(2-x)y^2 = x^3$.

a) Obtenha a equação da reta tangente ao gráfico da curva em $(1, 1)$. $y = 2x - 1$

b) Obtenha as equações das retas tangentes ao gráfico da curva nos pontos em que $x = \frac{3}{2}$.

$$\text{R.: } y = 3\sqrt{3}x - 3\sqrt{3} \text{ ou } y = -3\sqrt{3}x + 3\sqrt{3}$$

4) Considere a elipse dada por $x^2 - xy + y^2 = 9$.

a) Encontre as equações das retas tangentes à curva nos pontos em que a curva intercepta o

eixo y e verifique que estas retas são paralelas. R.: $y = \frac{x}{2} + 3$ e $y = \frac{x}{2} - 3$

b) Encontre os pontos da curva nos quais a reta tangente é horizontal. R.: $(\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ e $(-\sqrt{3}, -2\sqrt{3})$

c) Encontre os pontos da curva nos quais a reta tangente é vertical. R.: $(2\sqrt{3}, \sqrt{3})$ e $(-2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$

5) Determine os pontos da *lemniscata* de equação $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ em que a reta tangente é vertical. R.: $(0,0); (1,0); (-1,0)$

6) Em que ponto da curva $x + \sqrt{xy} + y = 1$ a reta tangente é paralela ao eixo dos x ? R.: $\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$

7) Mostre que se $xy = 1$, então $\frac{d^2 y}{dx^2} \cdot \frac{d^2 x}{dy^2} = 4$.

8..Encontre a reta tangente e normal à curva $x \sin 2y = y \cos 2x$ no ponto $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

10. Prove que as retas tangentes às curvas:

$$4y^3 - x^2 y - x + 5y = 0 \text{ e } x^4 - 4y^3 + 5x + y = 0 \text{ na origem são perpendiculares.}$$

Diferenciação exponenciais

Para obter uma fórmula para a derivada de funções exponenciais $y = b^x$ reescrevemos esta equação como

$$x = \log_b y \text{ e diferenciamos implicitamente usando } \frac{d}{dx} [\log_b u] = \frac{1}{u \ln b} \cdot \frac{du}{dx} \text{ Assim, mostrando que se } y = b^x$$

for uma função diferenciável, então sua derivada em relação a x é $\frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln b$. No caso especial onde $b = e$ temos $\ln e = 1$, assim $\frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln b$ torna-se $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$. Além disso, se u for uma função diferenciável de x , então tem-se a partir de $\frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln b$ que $\frac{d}{dx}(b^u) = b^u \ln b \frac{du}{dx}$ e $\frac{d}{dx}(e^u) = e^u \frac{du}{dx}$

LOGARITMO E EXPONENCIAL

Derive:

$$1) y = \ln(x^3) \quad y' = \frac{3}{x} \quad 2) y = \ln^3(x) \quad y' = \frac{3 \ln^2(x)}{x} \quad 3) y = x e^{\sin(x)} \quad y' = e^{\sin(x)}(1 + x \cos(x))$$

$$4) y = e^{e^x} \quad y' = e^x e^{(e^x)} \quad 5) y = \ln(\ln(x)) \quad y' = \frac{1}{x \ln(x)} \quad 6) y = \ln(x + e^{-x}) \quad y' = \frac{1 - e^{-x}}{x + e^{-x}}$$

$$7) y = \ln(x\sqrt{x^2+1}) \quad y' = \frac{\sqrt{x^2+1} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}}{x\sqrt{x^2+1}} \quad 8) y = \ln(t^3 \ln(t^2)) \quad y' = \frac{3t^2 \ln(t^2) + 2t^2}{t^3 \ln(t^2)}$$

$$9) y = e^{\sqrt{x}} \ln(\sqrt{x}) \quad y' = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2} \left(\frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x} \right) \quad 10) y = \ln\left(\sqrt[3]{\frac{x}{x^2+1}}\right) \quad y' = \frac{1-x^2}{3x(x^2+1)}$$

$$11) y = 2^{\lg(x^2)} \quad y' = 2^{\lg(x^2)} \ln(2) \sec^2(x^2) 2x \quad 12) y = \log_2(x^2) \quad y' = \frac{2}{x \ln(2)}$$

Ache $\frac{dy}{dx}$ por derivação implícita

$$1) \ln\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) = 5 \quad y' = \frac{y}{x} \quad 2) xy = \ln(\sin(y)) \quad y' = \frac{-y \sin(y)}{x \sin(y) - \cos(y)}$$

$$3) x \sin(y) = e^{x+y} \quad y' = \frac{e^{x+y} - \sin(y)}{x \cos(y) - e^{x+y}} \quad 4) xy + x^2 \ln^2(y) = 4 \quad y' = \frac{-y(y + 2x \ln^2(y))}{x(y + 2x \ln(y))}$$

$$5) y = (\ln(x))(\ln(y)) \quad y' = \frac{\ln(y)y}{x(y - \ln(x))} \quad 6) \sin(e^{xy}) = x \quad y' = \frac{-\cos(e^{xy})e^{xy}y - 1}{\cos(e^{xy})e^{xy}x}$$

$$7) \text{ Se } \frac{y^2 \cos(x)}{e^x} = 2^{\ln(y)}, \text{ calcule } \frac{dy}{dx} \text{ em } x=0 \text{ e } y=1 \quad y' = \frac{y^3(\sin(x) + \cos(x))}{2y^2 \cos(x) - 2^{\ln(y)} \ln(2) e^x}; \quad y'(0,1) = \frac{1}{2 - \ln(2)}$$

Use derivação logarítmica para encontrar $\frac{dy}{dx}$.

$$1) y = x^5 \sin(x^3) \sqrt{\cos(3x+7)} \quad y' = x^5 \sin(x^3) \sqrt{\cos(3x+7)} \left(\frac{5}{x} + 3x^2 \cotg(x^3) - \frac{3}{2} \tg(3x+7) \right)$$

$$2) y = \frac{\sin(x) \sqrt[3]{1+\sec(x)}}{e^{x^5}} \quad y' = \frac{\sin(x) \sqrt[3]{1+\sec(x)}}{e^{x^5}} \left(\cotg(x) + \frac{\sec(x) \tg(x)}{3(1+\sec(x))} - 5x^4 \right)$$

$$3) y = [\sin(x^2)]^{3x} \quad y' = 3[\sin(x^2)]^{3x} (\ln(\sin(x^2)) + 2x^2 \cotg(x^2))$$

$$4) y = (x)^{x^3} \quad y' = x^2 x^{(x^3)} (3 \ln(x) + 1) \quad 5) y = (e^x)^x \quad y' = 2x(e^x)^x$$

$$6) y = e^{(x^x)} \quad y' = x^x e^{(x^x)} (\ln(x) + 1) \quad 7) y = \sqrt{\frac{\sin(2x)}{\cos(2x)}} \quad y' = \frac{\cos^2(2x) + \sin^2(2x)}{\sqrt{\tg(2x) \cos^2(2x)}}$$

$$8) y = (\sin(x))^{\sin(x)} \quad y' = (\sin(x))^{\sin(x)} \cos(x) (\ln(\sin(x)) + 1)$$