Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele

16 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi dati **3**
3.1 Fit unico 3
3.2 Fit separati 4
3.3 Correzione dello Shift Sistematico 5

4 Conclusione **6**

5 Dati **8**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare la legge delle lenti sottili, graficando la distanza tra lo schermo q, e la lente in funzione della distanza tra la lente e la sorgenete p.

1 Legge fisica da verificare

Per una lente a cui si possono applicare l'apprssoimazione dei raggi parassiali e l'approssimazione delle lenti sottili, l'inverso della distanza focale è dato da:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{q} + \frac{1}{p}$$

dove f rappresenta la distanza dal centro di curvatura della lente in cui tutti i raggi che incidono sulla lente convergono in uno stesso punto.

2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale per l'esecuzione della misura della distanza focale è schematizzato nella figura seguente:




Figura 1: Apparato sperimentale e schema per la determinazione delle distanze p e q

Dove la lampadina funge da sorgente luminosa, e lo schermo, sul quale verrà riflessa l'immagine del filamento della lampadina, è necessario per individuare la distanza dalla lente tale per cui l'immagine riflessa è a fuoco. Le distanze p e q come si può osservare dallo schema si possono determinare tramite le seguenti relazioni:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0)$$

$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2}$$

Dove x_0, y_0 sono le posizioni iniziali della lente e dello schermo sul binario, L è la lunghezza dellla sbarra di metallo utlizzata per individuare tali posizioni e D è il diametro della lampadina. x_0, y_0 sono state lette sulla scala millimetrata del binario, mentre L e D sono state misurate con un calibro ventesimale.

3 Analisi dati

L'andamento atteso per i nostri dati sperimentali (p_i, q_i) è dato dalla funzione di fit:

$$\frac{1}{x - A} + \frac{1}{y - B} = \frac{1}{C}$$

da cui:

$$y = B + \frac{C(x - A)}{(x - A) - C}$$

A,B,C sono parametri da stimare. Gli errori sui parametri A,B sono stati calcolati come la somma degli errori sulle grandezze utilizzate nelle espressioni di p e q:

$$\Delta A = \sigma_{fit} + \sigma_{x_0} + \sigma_{\frac{D}{2}} + \sigma_L$$

$$\Delta B = \sigma_{fit} + \sigma_{y_0} + \sigma_L$$

Con

$$\sigma_{x_0}, \sigma_{\frac{D}{2}}, \sigma_L, \sigma_y = \frac{Sens}{\sqrt{3}}$$

Per verificare la compatibilità del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e A con 0. Dai dati si ottengono tre grafici: il primo mette a confronto l'andamento dei dati raccolti con la funzione di fit, il secondo è un istogramma con le differenze tra i valori teorici della distanza q e quella che abbiamo misurato diviso l'errore sulla distanza (residuo normalizzato) e infine il terzo, il quale ci permette di graficare l'andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina.

Ci si aspetta che μ e σ della gaussiana standard siano rispettivamente compatibilo con 0 e 1.

Nel terzo grafico ci si aspetta che sia il coefficiente angolare che l'intercetta siano compatibili con 0.

Nel seguito verrano svolte due analisi dati: questa scelta è dovuta dal fatto che a causa di una discontinuità della curva sperimentale registrata nel primo grafico il χ^2 del fit assume un valore molto grande il che ci farebbe dedurre la non riuscita dell'esperimento, per provare a capire l'anomalia si sono svolte due operazioni: un doppio fit sulle due parti del curva prima e dopo la discontinuità e uno shift sui dati campionati.

3.1 Fit unico

Dai dati sono stati eliminate le misure: 1. 76, 77, 78, 83. Le quali rappresentavano code anomale nel grafico dei residui normalizzati.




Figura 2: Andamento di q in funzione di p

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(0.7089 \pm 4.665) \times 10^{-1}$ mm	[no]
B	2.605 ± 0.207mm	[no]
C	$(200.3 \pm 0.0.913)$ mm	[-]

Tabella 1: Parametri estratti dal fit di figura 2.

Come detto in precedenza si può evincere che ad una distanza dalla lampadina intorno ai 400 mm è presente una anomalia rispetto alla curva teorica: c'è un leggero discostamento dei dati sperimentali, per 4-8 mm si nota che la distanza q rimane costante, è possibile attribuire il motivo di un valore del χ^2 dell'ordine di $\simeq 5000$ a questo fatto. Per questo motivo abbiamo deciso di ovviare al problema come esposto in precedenza, la trattazione completa verrà fatta nel paragrafo succesivo.




Figura 3: istogramma residui normalizzati

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	(2.155 ± 0.252)	[no]
σ	$(2.155 \pm 0166) \times 10^{-7}$	[no]

Tabella 2: μ, σ dei residui normalizzati 2.

La normale standard attesa per i residui normalizzati non descrive bene l'andamento dei nostri dati, come si può evincere anche dalla non compatibilità (fissata a 3σ) dei parametri μ e σ con 0 e 1.




Figura 4: andamento dei residui in funzione di p

Parametri	Valori	Compatibilità
m	$(6.707 \pm 0.5704) \times 10^{-4} 1/mm$	[no]
q	$(4.554 \pm 0.4314) \times 10^{-1} 1/mm$	[no]

Tabella 3: μ, σ dei residui normalizzati 2.

Da quest'ultimo grafico invece, possiamo constatare come le misure iniziali abbiano un residuo sistematicamente maggiore rispetto a quelle finali. Questo perchè tali misure hanno un errore maggiore (ovvero la semidispersione fra y_{max} e y_{min}, valori massimi e minimi per cui l'immagine sullo schermo era fuoco) e contano meno nel fit della curva. Tali misure coincidono (non esattamente) con le misure prima della discontinuità. Le ultime invece hanno errore molto minore (ovvero $\sigma = \frac{0.2}{\sqrt{3}}$) e sono quelle che influenzano di più la forma del fit.

Ovviamente anche in questo caso otteniamo un valore del χ^2 dello stesso ordine di grandezza del primo grafico.

3.2 Fit separati

Anche in questo caso sono stati rimossi i punti sopracitati. Inoltre sono stati eliminati altri due punti, individuabili nel grafico dei residui (Figura 4) e mostrati in dettaglio in Figura 5. Questi presentano residui anomali e contribuiscono in misura non trascurabile al valore elevato del χ^2.




Figura 5: Dati eliminati al fine del miglioramento dei fit

Nei residui del fit unico si osserva una discontinuità attorno a $p \simeq 400$ mm (vedi figura 6): tra la misura a $x = 415$ mm ($p = 396.5$ mm, $q = 397$ mm) e quella a $x = 420$ mm ($p = 401.5$ mm, $q = 400$ mm). Per capire se l'anomalia dipenda dalla regione di p esplorata, i dati sono stati divisi in due insiemi, $p < 400$ mm (76 punti) e $p > 400$ mm (37 punti), e ciascuno p stato fittato in modo indipendente con la stessa funzione del fit unico.




Figura 6: andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina




Figura 7: Fit separati per la zona prima (rosso) e dopo (verde) la discontinuità.

Par.	$p < 400$	$p > 400$	$\lvert\Delta\rvert/\sigma$	**Comp.**
A [mm]	-15.3 ± 1.1	-8.67 ± 0.55	5.5	[no]
B [mm]	-43.5 ± 1.6	-3.79 ± 0.29	24.2	[no]
C [mm]	213.59 ± 0.64	204.44 ± 0.20	13.6	[no]
χ^2/ndf	1570.0/73	2611.9/34		

Tabella 4: Parametri dei due fit separati. $|\Delta|/\sigma$ è la differenza tra i due valori in unità della somma in quadratura dei loro errori.

Il χ^2 complessivo dei due fit è 4182.0 ($\chi^2_{ridotto} = 39.1$), contro 14473.8 ($\chi^2_{ridotto}$131.6) del fit unico: la divisione riduce il χ^2 di circa il 70%, ma in entrambe le regioni il valore resta molto più grande di 1 (21.5 e 76.8). Inoltre, *nessuno* dei tre parametri è compatibile tra le due regioni (Tabella 4).

	$p < 400$	$p > 400$
μ (istogramma)	1.33 ± 0.15 [no]	-2.1 ± 2.8 [si]
σ (istogramma)	0.97 ± 0.07 [si]	10.5 ± 3.2 [si]*
m (retta residui)	$(-3.5 \pm 2.6) \times 10^{-3}$ [si]	$(1.90 \pm 0.62) \times 10^{-4}$ [no]*
q [mm] (retta residui)	1.3 ± 1.0 [si]	-0.139 ± 0.050 [si]
dev. std. dei residui norm.	4.5	8.5

Tabella 5: Analisi dei residui dei fit separati.

In conclusione, i fit separati non isolano una regione 'buona' dei dati e non spiegano da soli le deviazioni dal modello. Si è quindi provato a descrivere l'anomalia a $p \simeq 400$ mm come uno spostamento sistematico di una parte delle misure (dopo la discontinuità).

3.3 Correzione dello Shift Sistematico

Osservando più da vicino la zona di discontinuità (Figura 6), si è detotto che il tipo di andamento è quello atteso se, a un certo punto della misura, una parte dell'apparato è stata spostata accidentalmente (urto al banco ottico, scivolamento del supporto della lampadina, della lente o dello schermo), così

che le misure successive risultano affette da un offset sistematico rispetto alle precedenti.

Si è quindi sottratto uno shift δ a p e a q di tutte le misure con $x \geq 420$ mm, ripetendo il fit unico con le stesse funzioni, gli stessi errori e la stessa selezione dei punti. Poiché δ non è noto a priori, lo si è determinato tramite il χ^2 in funzione di δ: con lo stesso shift su p e q il minimo si trova a $\delta \simeq 3.8$ mm, con $\chi^2 = 7806$. Per comodità è stato usato $\delta = 4$ mm ($\chi^2 \simeq 4000$), contro 5000 senza correzione.

Per capire quale grandezza possa essersi spostata, lo shift è stato applicato separatamente a p e a q (Tabella 6).

Ipotesi	$\delta_{\min}$ [mm]	$\chi^2_{\min}$
Nessuna correzione	–	5474
p e q (stesso segno)	3.8	4206
solo p (lampadina)	6.1	9815
solo q (schermo)	8.6	6025
p e q (segno opposto)	χ^2 sempre crescente	

Tabella 6: Minimo del χ^2 del fit unico per le diverse ipotesi di shift.

L'ipotesi di uno shift di segno opposto su p e q porta a un peggioramento del χ^2. Esclusa la lente, l'anomalia deve essere imputabile allo spostamento della lampadina, dello schermo o a un trascinamento del sistema di riferimento sul banco ottico. Osservando la Tabella 6, notiamo che un errore limitato al solo schermo (solo q) minimizzerebbe il χ^2. Tuttavia, anche l'ipotesi di un trascinamento su p e q (stesso segno) riduce il χ^2 rispetto ai dati non corretti. Non potendo ricostruire l'accaduto, si è scelto di applicare una traslazione $\Delta p = \Delta q \approx -4$ mm ai dati successivi alla discontinuità.

La Tabella (7) confronta il fit unico con e senza lo shift $\delta = 4$ mm.

Par.	senza shift	$\delta = 4$ mm
A [mm]	-1.01 ± 0.22 [si]	9.35 ± 0.19 [no]
B [mm]	1.92 ± 0.16 [si]	2.87 ± 0.14 [si]
C [mm]	200.78 ± 0.10	196.85 ± 0.09
χ^2/ndf	14473.8/110	7824.1/110
μ	4.67 ± 0.25 [no]	0.43 ± 0.27 [si]
σ	2.00 ± 0.14 [no]	2.35 ± 0.25 [no]
m	$(-6.79 \pm 0.57) \times 10^{-4}$ [no]	$(-5.24 \pm 0.58) \times 10^{-4}$ [no]
q [mm]	0.465 ± 0.044 [no]	0.359 ± 0.044 [no]

Tabella 7: Fit unico senza e con lo shift.




Figura 8: Andamento dei residui in funzione di p dopo lo shift di 4 mm.

La correzione riduce il χ^2 del 46% ed elimina l'errore sistematico nei dati (μ compatibile con 0), ma il χ^2/ndf resta 71, σ rimane incompatibile con 1 e la retta dei residui continua a non essere compatibile con $m = q = 0$. Inoltre A passa da -1.0 mm a 9.3 mm e non è più compatibile con zero. Per cui la correzione attenua la discontinuità a spese di un offset dell'origine di p.
C'è da sottolineare infine che lo shift è stato eseguito per verificare la presenza di un possibile effetto sistematico, e non come una correzione da adottare per il risultato finale.

4 Conclusione

L'esperimento ha permesso di confermare qualitativamente la legge delle lenti sottili. In tutte le analisi condotte, infatti, la curva $q(p)$ segue il corretto andamento iperbolico (con q che varia da circa 230 mm ad oltre 1500 mm) e la distanza focale f (rappresentata dal parametro C) converge sempre a valori vicini ai 200 mm.
Tuttavia, da un punto di vista quantitativo, il modello ideale non descrive i dati in modo statisticamente perfetto: in tutte le configurazioni si ottiene un χ^2/ndf ≥ 20 (Tabella 8) e i parametri A, B e C mostrano fluttuazioni significative cambiando il tipo di analisi.

Analisi	χ^2/ndf	C [mm]	A [mm]	B [mm]
fit unico	131.6	200.78 ± 0.10	-1.01 ± 0.22	1.92 ± 0.16
fit unico, $\delta = 4$ mm	71.1	196.85 ± 0.09	9.35 ± 0.19	2.87 ± 0.14
separati, $p < 400$	21.5	213.59 ± 0.64	-15.3 ± 1.1	-43.5 ± 1.6
separati, $p > 400$	76.8	204.44 ± 0.20	-8.67 ± 0.55	-3.79 ± 0.29
separati, $\delta = 4$ mm, $p < 400$	24.5	216.28 ± 1.17	-19.2 ± 1.9	-51.2 ± 2.9
separati, $\delta = 4$ mm, $p > 400$	59.3	203.15 ± 0.19	-8.46 ± 0.55	-6.05 ± 0.28

Tabella 8: Riepilogo delle analisi.

L'analisi rivela che l'incertezza sulla distanza focale f è dominata dagli errori sistematici. L'errore puramente statistico restituito dai fit sull'intero set di dati è infatti irrisorio (inferiore a 0.1 mm), mentre i

valori stimati per C variano tra 196.9 e 216.3 mm a seconda del metodo utilizzato.
Le difficoltà riscontrate nei fit possono essere ricondotte diverse cause principali tra cui la sensibilità in prossimità del fuoco, ovvero quando la lente è vicina al fuoco, piccole variazioni di p generano enormi spostamenti dell'immagine q. Questo comporta che il χ^2 sia estremamente sensibile al minimo difetto sperimentale.
Un altra causa di errore è riconducibile allo spostamento accidentale dell'apparato: infatti come detto precedentemente, la discontinuità osservata tra $x = 420$ e 425 mm indica un urto o shift fatto all'apparato. Pur avendo applicato una correzione per risolvere il problema, l'incertezza su quale componente si sia esattamente spostato contribuisce all'errore finale.
Infine un ultima fonte di errore può essere attribuita ai limiti del modello che non tiene conto della distanza tra i piani della lente reale, non prevista dall'approssimazione ideale di "lente sottile".

5 Dati

Tabella 9: Valori di y, p, q e relative incertezze in funzione di x (tutte le grandezze in mm; valori a 2 cifre significative; x e p riportati come dati).

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
251	1.8×10^3	1.8×10^3	1.8×10^3	11	232.5	1.6×10^3	0.12	11
252	1.7×10^3	1.8×10^3	1.8×10^3	34	233.5	1.5×10^3	0.12	34
253	1.7×10^3	1.9×10^3	1.8×10^3	47	234.5	1.5×10^3	0.12	47
254	1.6×10^3	1.8×10^3	1.7×10^3	44	235.5	1.4×10^3	0.12	44
255	1.6×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	40	236.5	1.4×10^3	0.12	40
256	1.6×10^3	1.7×10^3	1.6×10^3	39	237.5	1.4×10^3	0.12	39
257	1.5×10^3	1.7×10^3	1.6×10^3	38	238.5	1.4×10^3	0.12	38
258	1.5×10^3	1.6×10^3	1.6×10^3	30	239.5	1.3×10^3	0.12	30
259	1.5×10^3	1.6×10^3	1.6×10^3	28	240.5	1.3×10^3	0.12	28
260	1.5×10^3	1.6×10^3	1.5×10^3	30	241.5	1.3×10^3	0.12	30
261	1.5×10^3	1.5×10^3	1.5×10^3	24	242.5	1.2×10^3	0.12	24
262	1.4×10^3	1.5×10^3	1.5×10^3	23	243.5	1.2×10^3	0.12	23
263	1.4×10^3	1.5×10^3	1.4×10^3	24	244.5	1.2×10^3	0.12	24
264	1.4×10^3	1.5×10^3	1.4×10^3	20	245.5	1.2×10^3	0.12	21
265	1.4×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	20	246.5	1.1×10^3	0.12	21
266	1.4×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	21	247.5	1.1×10^3	0.12	21
267	1.3×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	17	248.5	1.1×10^3	0.12	17
268	1.3×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	19	249.5	1.1×10^3	0.12	19
269	1.3×10^3	1.4×10^3	1.3×10^3	19	250.5	1.1×10^3	0.12	19
270	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	15	251.5	1.0×10^3	0.12	15
271	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	14	252.5	1.0×10^3	0.12	14
272	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	14	253.5	1.0×10^3	0.12	14
273	1.2×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	18	254.5	1.0×10^3	0.12	18
274	1.2×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	15	255.5	9.9×10^2	0.12	15
275	1.2×10^3	1.3×10^3	1.2×10^3	14	256.5	9.7×10^2	0.12	14
276	1.2×10^3	1.3×10^3	1.2×10^3	14	257.5	9.5×10^2	0.12	14
277	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	11	258.5	9.4×10^2	0.12	11
278	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	12	259.5	9.2×10^2	0.12	12
279	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	11	260.5	9.1×10^2	0.12	11
280	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	12	261.5	9.0×10^2	0.12	12
281	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	262.5	8.9×10^2	0.12	10
282	1.1×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	263.5	8.8×10^2	0.12	9.5
283	1.1×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	264.5	8.7×10^2	0.12	9.5
284	1.1×10^3	1.2×10^3	1.1×10^3	12	265.5	8.6×10^2	0.12	12
286	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	267.5	8.4×10^2	0.12	8.1
288	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	269.5	8.2×10^2	0.12	7.8
290	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	9.0	271.5	8.0×10^2	0.12	9.0
292	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	273.5	7.8×10^2	0.12	8.1
294	1.0×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	9.0	275.5	7.7×10^2	0.12	9.0
296	1.0×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	7.0	277.5	7.5×10^2	0.12	6.6
299	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	9.0	280.5	7.3×10^2	0.12	9.2
300	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	10	281.5	7.3×10^2	0.12	9.5
301	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	9.0	282.5	7.2×10^2	0.12	9.2
302	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	5.0	283.5	7.1×10^2	0.12	5.5
303	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	7.0	284.5	7.0×10^2	0.12	6.6
304	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	7.0	285.5	7.0×10^2	0.12	6.6
305	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	6.0	286.5	6.9×10^2	0.12	5.8
306	9.9×10^2	1.0×10^3	9.9×10^2	4.0	287.5	6.8×10^2	0.12	4.3
307	9.8×10^2	1.0×10^3	9.9×10^2	5.0	288.5	6.8×10^2	0.12	5.2
308	9.8×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	289.5	6.7×10^2	0.12	4.9
309	9.7×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	290.5	6.7×10^2	0.12	4.9
310	9.7×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	291.5	6.7×10^2	0.12	5.5
311	9.7×10^2	9.7×10^2	9.7×10^2	3.0	292.5	6.6×10^2	0.12	2.6
312	9.6×10^2	9.8×10^2	9.7×10^2	5.0	293.5	6.5×10^2	0.12	4.6
313	9.6×10^2	9.7×10^2	9.6×10^2	3.0	294.5	6.5×10^2	0.12	3.5
314	9.6×10^2	9.7×10^2	9.6×10^2	3.0	295.5	6.5×10^2	0.12	3.5
316	9.5×10^2	9.6×10^2	9.5×10^2	5.0	297.5	6.4×10^2	0.12	4.6
318	9.4×10^2	9.5×10^2	9.5×10^2	4.0	299.5	6.3×10^2	0.12	3.8
320	9.3×10^2	9.5×10^2	9.4×10^2	5.0	301.5	6.2×10^2	0.12	4.6
325	9.2×10^2	9.3×10^2	9.2×10^2	4.0	306.5	6.0×10^2	0.12	4.0
330	9.1×10^2	9.2×10^2	9.1×10^2	3.0	311.5	5.8×10^2	0.12	2.6
335	8.9×10^2	–	8.9×10^2	0.12	316.5	5.5×10^2	0.12	0.12

continua alla pagina successiva

Tabella 9 — continua dalla pagina precedente

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
340	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	321.5	5.3×10^{2}	0.12	0.12
345	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	326.5	5.2×10^{2}	0.12	0.12
350	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	331.5	5.1×10^{2}	0.12	0.12
355	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	336.5	5.0×10^{2}	0.12	0.12
360	8.5×10^{2}	–	8.5×10^{2}	0.12	341.5	4.9×10^{2}	0.12	0.12
365	8.5×10^{2}	–	8.5×10^{2}	0.12	346.5	4.8×10^{2}	0.12	0.12
370	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	351.5	4.7×10^{2}	0.12	0.12
375	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	356.5	4.6×10^{2}	0.12	0.12
380	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	361.5	4.5×10^{2}	0.12	0.12
385	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	366.5	4.5×10^{2}	0.12	0.12
390	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	371.5	4.4×10^{2}	0.12	0.12
395	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	376.5	4.3×10^{2}	0.12	0.12
400	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	381.5	4.2×10^{2}	0.12	0.12
405	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	386.5	4.1×10^{2}	0.12	0.12
410	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	391.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
415	8.1×10^{2}	–	8.1×10^{2}	0.12	396.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
420	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	401.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
425	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	406.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
430	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	411.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
435	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	416.5	3.9×10^{2}	0.12	0.12
440	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	421.5	3.9×10^{2}	0.12	0.12
445	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	426.5	3.8×10^{2}	0.12	0.12
450	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	431.5	3.8×10^{2}	0.12	0.12
460	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	441.5	3.7×10^{2}	0.12	0.12
470	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	451.5	3.7×10^{2}	0.12	0.12
480	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	461.5	3.6×10^{2}	0.12	0.12
490	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	471.5	3.4×10^{2}	0.12	0.12
500	8.5×10^{2}	–	8.5×10^{2}	0.12	481.5	3.5×10^{2}	0.12	0.12
510	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	491.5	3.4×10^{2}	0.12	0.12
520	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	501.5	3.4×10^{2}	0.12	0.12
530	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	511.5	3.3×10^{2}	0.12	0.12
540	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	521.5	3.3×10^{2}	0.12	0.12
550	8.8×10^{2}	–	8.8×10^{2}	0.12	531.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
560	8.9×10^{2}	–	8.9×10^{2}	0.12	541.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
570	8.9×10^{2}	–	8.9×10^{2}	0.12	551.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
580	9.0×10^{2}	–	9.0×10^{2}	0.12	561.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
590	9.1×10^{2}	–	9.1×10^{2}	0.12	571.5	3.1×10^{2}	0.12	0.12
600	9.1×10^{2}	–	9.1×10^{2}	0.12	581.5	3.1×10^{2}	0.12	0.12
620	9.3×10^{2}	–	9.3×10^{2}	0.12	601.5	3.0×10^{2}	0.12	0.12
640	9.4×10^{2}	–	9.4×10^{2}	0.12	621.5	3.0×10^{2}	0.12	0.12
660	9.6×10^{2}	–	9.6×10^{2}	0.12	641.5	3.0×10^{2}	0.12	0.12
680	9.7×10^{2}	–	9.7×10^{2}	0.12	661.5	2.9×10^{2}	0.12	0.12
700	9.9×10^{2}	–	9.9×10^{2}	0.12	681.5	2.9×10^{2}	0.12	0.12
750	1.0×10^{3}	–	1.0×10^{3}	0.12	731.5	2.8×10^{2}	0.12	0.12
800	1.1×10^{3}	–	1.1×10^{3}	0.12	781.5	2.7×10^{2}	0.12	0.12
850	1.1×10^{3}	–	1.1×10^{3}	0.12	831.5	2.7×10^{2}	0.12	0.12
900	1.2×10^{3}	–	1.2×10^{3}	0.12	881.5	2.6×10^{2}	0.12	0.12
1000	1.3×10^{3}	–	1.3×10^{3}	0.12	981.5	2.5×10^{2}	0.12	0.12
1100	1.3×10^{3}	–	1.3×10^{3}	0.12	1081.5	2.5×10^{2}	0.12	0.12
1200	1.4×10^{3}	–	1.4×10^{3}	0.12	1181.5	2.4×10^{2}	0.12	0.12
1300	1.5×10^{3}	–	1.5×10^{3}	0.12	1281.5	2.4×10^{2}	0.12	0.12
1400	1.6×10^{3}	–	1.6×10^{3}	0.12	1381.5	2.4×10^{2}	0.12	0.12
1500	1.7×10^{3}	–	1.7×10^{3}	0.12	1481.5	2.3×10^{2}	0.12	0.12
1650	1.9×10^{3}	–	1.9×10^{3}	0.12	1631.5	2.3×10^{2}	0.12	0.12

Nota. Un trattino (–) indica una cella vuota nei dati originali.