


Appunti di Statistica

MIROLO MANUELE / ALESSIO BRUSINI / MICHELE TEDESCHINI

a.a. 2025/26



"Se noi non fossimo ignoranti non ci sarebbe probabilità, ci potrebbero essere solo certezze. Ma la nostra ignoranza non può essere assoluta, altrimenti non ci sarebbe più probabilità. Così i problemi di probabilità possono essere classificati a seconda della maggiore o minore profondità della nostra ignoranza."

— ANDREA BRESSAN

(Sotto mentite spoglie di Henri Poincaré)

Premessa

Le sotto sezioni in Rosso sono quelle che riguardano il ripasso di Bressan, tutte le altre (in nero) sono quelle che riguardano il programma dell'anno attuale.

Indice

0	Contatti e informazioni	7
1	Introduzione / Ripasso di Bressan	8
1.1	Definizioni di probabilità	8
1.2	Definizione assiomatica di probabilità	8
1.3	Proprietà della misura di probabilità	9
1.3.1	Probabilità condizionata	9
1.3.2	Probabilità delle cause	9
1.4	Teorema di Bayes	9
1.5	Indipendenza	10
1.6	Cenni di calcolo combinatorio e fattoriale	10
2	Introduzione e Statistica	12
2.1	Rappresentazione grafica dei dati	12
2.1.1	Scatter Plot ed Errori	12
2.1.2	Istogramma	13
2.2	Grandezze Statistiche: Media e Varianza	13
2.2.1	Parte di Bressan: Valore di Aspettazione	13
2.2.2	Media Aritmetica	14
2.2.3	Parte di Bressan: Varianza e Deviazione Standard	14
2.2.4	Deviazione Standard e correzione di Bessel	15
2.3	Errore di sensibilità e Propagazione	16
2.3.1	Propagazione degli Errori	16
2.3.2	Parte di Bressan: Errore di sensibilità e distribuzione uniforme	17
2.3.3	Errore di Sensibilità	17
3	Metodo dei Minimi Quadrati	18
3.1	Il Principio	18

3.1.1	Parte di Bressan: Metodo dei Minimi Quadrati	18
3.2	Fit Lineare ($y = mx + q$)	19
3.2.1	Parte di Bressan: Fit di una retta (Regressione Lineare)	20
3.3	Caso Non Lineare e Linearizzazione	22
3.3.1	Parte di Bressan: Caso non lineare	22
4	Momenti e Distribuzioni	24
4.1	Momenti della funzione di distribuzione	24
4.2	Distribuzione uniforme discreta	25
4.3	Distribuzione uniforme continua	25
4.4	Funzioni Generatrici e Funzione Caratteristica	26
4.5	Distribuzione binomiale o di Bernoulli	28
5	Distribuzione di Poisson e Approssimazioni	31
5.1	Dalla Binomiale alla Poissoniana	32
5.1.1	Parte di Bressan: Distribuzione di Poisson	32
5.1.2	Confronto: Poisson vs Binomiale	34
5.2	Calcolo dei Momenti tramite la Funzione Generatrice dei Momenti	35
5.3	Relazione con la Binomiale e Somma di Variabili	37
5.3.1	Limite della Funzione Generatrice dei Momenti Binomiale	37
5.3.2	Confronto delle forme (Code della distribuzione)	37
5.3.3	Somma di Poissoniane Indipendenti	37
5.4	Rappresentazione grafica dei dati (Istogrammi)	43
6	La Distribuzione Normale (Gaussiana)	45
6.1	Definizione e Proprietà Fondamentali	45
6.1.1	Parte di Bressan: Distribuzione Normale	45
6.2	Definizione di distribuzione normale	47
6.3	Calcolo del Valore di Aspettazione e della Varianza	48
6.3.1	Parte di Bressan: Confronto istogramma/gaussiana	50
6.4	Variabili Aleatorie e Combinazioni Lineari	51
7	Teorema del Limite Centrale	53
7.1	Caso Particolare: Variabili I.I.D.	53

7.2	Dimostrazione (tramite Funzione Generatrice dei Momenti)	54
7.3	Implicazioni del Teorema nell'Analisi Dati	55
7.4	Generazione di Numeri Casuali Normali	56
7.5	La Trasformazione di Box-Muller	57
8	Distribuzione di Cauchy e Legge dei grandi numeri	60
8.1	Distribuzione di Cauchy come rapporto di due normali standard	60
8.2	Legge dei grandi numeri	61
8.3	Cenni di Distribuzione Esponenziale	65
9	Processi di Poisson, Esponenziale ed Erlang	67
9.1	Richiami di Variabili casuali e CDF/PDF	67
9.1.1	Parte di Bressan: Variabili casuali e funzione di ripartizione	67
9.1.2	Funzione di ripartizione	67
9.1.3	Densità di probabilità	68
9.2	Proprietà dell'Esponenziale	69
9.3	Distribuzione di Erlang	70
9.3.1	Distribuzione Gamma	71
10	Metodi Monte Carlo	71
10.1	Metodo Accept-Reject	72
10.2	Metodo della Funzione di Ripartizione (Inversione)	75
11	Variabili Casuali bidimensionali	77
11.1	Distribuzioni congiunte, marginali e condizionate	77
11.2	Momenti: Matrice delle Covarianze e Combinazioni Lineari	78
11.3	Coefficiente di correlazione	80
12	Distribuzione normale in più dimensioni (o multinormale)	83
12.1	Caso di variabili indipendenti	83
13	Distribuzione Multi-normale (Variabili dipendenti)	87
13.1	Interpretazione geometrica: L'ellisse	88
13.2	Distribuzioni Marginali e Condizionate per la Multinormale	89

14 Teoria della Stima dei Parametri	91
14.1 Proprietà degli Stimatori (Consistenza, Imparzialità)	91
14.2 La media aritmetica come stima ottimale	92
15 Stime, Propagazione e Likelihood	93
15.1 Stima della Varianza e Correzione di Bessel	93
15.2 Stima della Covarianza	94
15.3 Dimostrazione della Propagazione degli Errori	96
15.3.1 Caso Multivariato	96
15.4 Metodo della Massima Verosimiglianza (MLE), (Maximum Likelihood)	96
15.5 La Log-Likelihood	97
15.6 Esempio: Funzione Esponenziale	98
16 PDF Gaussiane e Limite di Cramér-Rao	100
16.1 Proprietà della Massima Verosimiglianza	100
16.1.1 Stima ML per la media e varianza Gaussiana	100
16.1.2 Invarianza per trasformazioni dei parametri	101
16.2 Efficienza e Disuguaglianza di Cramér-Rao	102
16.3 Dimostrazione della Disuguaglianza di Cramér-Rao	104
16.4 Approfondimento sulla disuguaglianza di Cramér-Rao	106
17 Rilevatore Geiger, Radioattività e Studio dei Dati	108
18 Varianza della stima e Disuguaglianza di Cramer-Rao	109
18.1 Stima di $\hat{\theta}$ e $Var(\hat{\theta})$ per $N \rightarrow \infty$	109
19 Likelihood di più parametri	111
20 Binned Maximum Likelihood	111
21 Extended Maximum Likelihood (EML)	112
21.1 Applicazione: Segnale e Fondo	113
22 Dal Metodo di Maximum Likelihood ai Minimi Quadrati	113
22.1 Caso del fit lineare $y = mx + q$	114
22.1.1 Notazione compatta	115

22.2 Errori associati alle stime	115
22.3 Estrapolazione e Covarianza	116
23 Caso $y = mx + q$ con errori σ_i differenti	116
24 Metodo dei minimi quadrati con istogrammi	117
25 Metodo dei minimi quadrati non lineare	117
26 Binned Chi Squared	118
27 Distribuzione del χ^2	120
27.1 Comportamento Asintotico e χ^2 ridotto	121
27.1.1 Caso ν grande ($\nu \gtrsim 30$)	121
27.1.2 Caso ν piccolo	122
28 Fit non lineari e Test di Ipotesi	128
28.1 Fit non lineare	128
28.1.1 Metodo di Gauss-Newton	128
28.2 Fit con errore su x	129
28.3 Test di Ipotesi	131
28.3.1 Significatività del test (α)	132
28.3.2 Potenza del test ($1 - \beta$)	132
29 da integrare dopo	134
29.0.1 Parte di Bressan: Proprietà generali e Propagazione degli Errori	134
29.1 Trasformazione di variabili casuali	135
29.2 Legge di propagazione degli errori	135
29.2.1 Generalizzazione a più variabili	136
29.3 Varianza della media e Compatibilità	136
29.4 Funzione di distribuzione congiunta	137
29.4.1 Stima dei parametri	137
29.5 Distribuzione di Maxwell-Boltzmann	139

0 Contatti e informazioni

- Mail: agata.trovato@units.it
- Ufficio: Edificio F, primo piano, Aula 114
- Ricevimento: Giovedì dalle 14:00 alle 1:00

1 Introduzione / Ripasso di Bressan

Lezione del 2025

La probabilità è la misura del grado della credenza che un certo evento avvenga.

L'oggetto della teoria è un certo *esperimento causale*, la cui esecuzione è detta *prova*, il risultato è indicato con ω , l'insieme di tutti gli ω possibili è detto *spazio campione* Ω . Un *Evento* A è un sottoinsieme di Ω , se $\omega \in A$ allora esso realizza l'Evento. Se esso è l'unico elemento costituente di A allora esso è l'*evento elementare*, altrimenti A è un *evento composto*. Altre nomenclature sono legate alla teoria insiemistica (per esempio due eventi A e B sono disgiunti se l'insieme A non interseca l'insieme B).

1.1 Definizioni di probabilità

Si possono dare due definizioni di probabilità:

CLASSICA : dato uno spazio **finito** Ω , la probabilità è il rapporto:

$$P(E) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$$

Questa funzione è utile quando i casi risultano essere **ugumente possibili**.

FREQUENTISTICA : emerge dal ragioanamento fondato sui risultati di un esperimento:

$$P(E) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n}{N}$$

dove n è il numero di volte che si verifica un evento, mentre N è le volte che viene ripetuto l'esperimento.

1.2 Definizione assiomatica di probabilità

Dato un evento $A \subseteq \Omega$ la misura di probabilità P è una funzione $P : \Omega \rightarrow \mathbf{R}$ le cui caratteristiche sono:

- $P(A) \geq 0$
- $P(\text{evento certo}) = 1$
- Se A e B sono eventi **disgiunti** (incompatibili), cioè $P(A \cap B) = 0$, allora $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, che nella forma generalizzata risulta essere:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

1.3 Proprietà della misura di probabilità

- Probabilità negazione: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- Estremi della misura di probabilità: $0 \leq P(A) \leq 1$
- Teorema delle probabilità totali (con $A \cap B \neq \emptyset$):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A - B) = P(B) - P(A \cap B)$$

- Probabilità in relazione d'inclusione (con $A \subseteq B$): $P(A) \leq P(B)$

1.3.1 Probabilità condizionata

La probabilità che si verifichi A se si verifica B :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Il **Teorema delle probabilità totale** mi enuncia che se ho n eventi e si ha che

$$P(M_i \cap M_j) = 0 \quad \forall i \neq j \quad \& \quad \bigcup_{i=1}^n M_i = \Omega$$

dove Ω è lo spazio campione; allora:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|M_i)P(M_i)$$

Mentre per l'indipendenza si ha $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

1.3.2 Probabilità delle cause

Ci chiediamo quale sia la probabilità che M_j sia la causa di un certo evento A .

1.4 Teorema di Bayes

Dato un certo set di ipotesi (M_i) e un certo evento A il teorema mi dice come la probabilità a "posteriori" $P(M_i|A)$ cambia dopo che l'evento A si è verificato.

Consideriamo un evento A e una classe completa di ipotesi (M_j):

$$\begin{cases} M_i \cap M_j = \emptyset \\ \bigcup_j M_j = \Omega \end{cases}$$

Utilizzando il teorema della probabilità condizionata e il fatto che $P(A \cap M_i) = P(M_i \cap A)$ posso ricavare la probabilità che una causa sia dovuta a un determinato evento

$$P(M_i|A) = \frac{P(A|M_i)P(M_i)}{P(A)} = \frac{P(A|M_i)P(M_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|M_j)P(M_j)}$$

Dove:

$P(M)$: probabilità a priori/margianale (non tiene conto di A)

$P(M | A)$: probabilità condizionata/a posteriori, nota A

$P(A | M)$: probabilit  condizionate di A, nota M

$P(A)$:   la probabilit  di A a priori, serve da costante di normalizzazione

1.5 Indipendenza

Si dicono due eventi indipendenti: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ e quindi $P(A|B) = P(A)$

Per esempio: nella misura del pendolo fermare il pendolo ad ogni misura rende le misure indipendenti fra di loro (una misura di un periodo sbagliato non influisce sulla misura successiva).

1.6 Cenni di calcolo combinatorio e fattoriale

Si chiama combinazione semplice quella in cui non importa l'ordine degli elementi e il numero di combinazioni $C_{n,r}$   dato da:

$$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Con la definizione di fattoriale:

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n = \prod_{i=0}^{n-1} (n-i)$$

Fattoriale di un numero negativo:

$$\begin{aligned} n! &= \prod_{i=0}^{n-1} (n-i) \\ (c)^n n! &= \prod_{i=0}^{n-1} c(n-i) \\ (-1)^n n! &= \prod_{i=0}^{n-1} -1(n-i) = (-n)! \end{aligned}$$

Fattoriale di un numero positivo:

$$x! = \Pi(x) = \int_0^\infty t^x e^{-t} dt$$

Che presenta la propriet :

$$\Pi(x+1) = (x+1)\Pi(x)$$

Sempre Eulero introdusse la funzione Gamma Γ , con uno spostamento di unit  nelle variabili rispetto a Π :

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$$

Difatti questa funzione è legata a Π da $\Pi(x) = \Gamma(x+1) = x!$ e vale che $z\Gamma(z) = \Gamma(z+1)$

Da questa funzione sono definite le combinazioni semplici del tipo:

$$\binom{z}{k} = \frac{\Gamma(z+1)}{k!\Gamma(z-k+1)}$$

Importanti relazioni tra le funzioni Gamma sono:

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)} \qquad \Gamma(z)\Gamma(-z) = -\frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

Da queste ricavo che $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ e $\Gamma(-\frac{1}{2}) = -\sqrt{\pi}$, l'ultima importante relazione è invece:

$$\Gamma(n + \frac{1}{2}) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$$

2 Introduzione e Statistica

Lezione del 6 Ottobre 2025

2.1 Rappresentazione grafica dei dati

Le nostre misure saranno del tipo $x_1, x_2, \dots, x_N$, il nostro obiettivo è quello di rappresentare questi dati per capire il fenomeno fisico che stiamo studiando.

Per quanto riguarda la parte grafica, la rappresentazione dipende dai dati a disposizione:

- **Istogramma:** Avendo molte misure di una sola grandezza, la rappresentazione tipica è l'istogramma. Per farlo si divide l'intervallo atteso delle misure in intervalli più piccoli detti *bin*, e si conta quante misure cadono in ogni intervallino.
- **Scatter Plot:** Avendo poche misure di due o più variabili correlate, la rappresentazione più utile è un plot a dispersione (punti (x, y) sul piano cartesiano).

2.1.1 Scatter Plot ed Errori

L'altra rappresentazione classica è lo scatter plot in cui plottiamo una grandezza rispetto all'altra e aggiungiamo per ogni punto gli errori di misura:


$$(x_i \pm \sigma_{x_i}, \quad y_i \pm \sigma_{y_i})$$

In questa rappresentazione è stato usato un numero per rappresentare una misura di x ed è stato associato ad esso una stima dell'errore fatto nella singola misura.

Gli errori da associare dipendono dalla situazione pratica:

- In alcuni casi si può fare un'analisi statistica ripetendo le misure molte volte.
- Nella maggior parte dei casi questo non si può fare (strumento non abbastanza sensibile o fenomeno non ripetibile). In tal caso si associa l'errore di sensibilità dello strumento.

2.1.2 Istogramma



2.2 Grandezze Statistiche: Media e Varianza

2.2.1 Parte di Bressan: Valore di Aspettazione

Le caratteristiche principali delle distribuzioni di probabilità sono descritte attraverso specifici parametri: gli *indici di posizione*, che indicano attorno a quali valori è centrata la distribuzione, e gli *indici di dispersione*, che ne quantificano la "larghezza" o variabilità. Tra gli indici di posizione, riveste particolare importanza il **valore di aspettazione**.

Data una variabile casuale $X \in [a, b]$ e la funzione di densità di probabilità $f_X(x)$ ad essa associata, è possibile definire il valore di aspettazione di una generica funzione $g(x)$ come:

$$E[g(x)] = \int_a^b g(x)f_X(x)dx \quad (\text{caso continuo})$$

oppure, per il caso discreto:

$$E[g(x)] = \sum_{i=1}^n g(x_i)p_i$$

Si tratta, quindi, di una media dei valori assunti da $g(x)$, pesata con la rispettiva densità di probabilità (o probabilità p_i).

Il valore di aspettazione gode di proprietà analoghe a quelle di un'applicazione lineare.

Per una variabile casuale continua, il **valore di aspettazione** di X stesso è dato da:

$$\mu_x = E[x] = \int_{\Omega} xf_X(x)dx$$

Il parametro μ_x è definito come *valore medio*. Un ragionamento analogo si applica alle variabili casuali discrete (sostituendo l'integrale con la sommatoria).

Poiché μ_x è una costante e ha la stessa dimensione fisica della variabile casuale, vale la proprietà:

$$E[\mu_x] = \mu_x$$

Esso rappresenta un "indice di posizione" fondamentale all'interno del dominio della variabile.

2.2.2 Media Aritmetica

Consideriamo il caso ottimistico in cui si riesce a misurare tante volte la stessa grandezza nelle stesse condizioni. In questo caso, se si vuole usare un solo numero per descrivere le misure, il migliore è senz'altro la **media aritmetica**:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (1)$$

2.2.3 Parte di Bressan: Varianza e Deviazione Standard

Oltre alla media, esistono altri indici di posizione:

Moda : il valore di x in corrispondenza del quale la funzione $f_X(x)$ assume il suo massimo;

Quantili : valori associati alla probabilità che la variabile casuale cada in determinati intervalli, definiti tramite la funzione di distribuzione cumulativa:

$$\alpha = F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Considerando la media campionaria $\bar{x}$ definita come $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$, per definizione la somma degli scarti dalla media deve essere nulla:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i) = 0$$

Per ottenere informazioni sulla dispersione dei dati, si definisce la **varianza** della variabile casuale come la media dei quadrati degli scarti:

$$var(x) = \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Sviluppando il quadrato all'interno della sommatoria, si ottiene un'espressione utile per i calcoli:

$$\begin{aligned} var(x) &= \frac{1}{N} \sum (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2) \\ &= \frac{1}{N} \sum x_i^2 - 2\bar{x} \frac{1}{N} \sum x_i + \frac{1}{N} \sum \bar{x}^2 \\ &= \overline{x^2} - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 \\ &= \overline{x^2} - \bar{x}^2 \end{aligned}$$

Ovvero: la varianza è uguale alla media dei quadrati meno il quadrato della media.

La **deviazione standard** è definita come $\sigma_x = \sqrt{var(x)}$. Tuttavia, data la limitatezza del campione nelle misure reali, si applica spesso la *correzione di Bessel*, definendo la deviazione standard campionaria come:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

2.2.4 Deviazione Standard e correzione di Bessel

La varianza ha però la scomodità di avere un'unità di misura al quadrato rispetto a x . Si preferisce quindi la **deviazione standard**:

$$\sigma_N = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

Osservazione 1 (Correzione di Bessel). La formula sopra è corretta se le misure rappresentano tutta la popolazione. Nella maggior parte dei casi x_i è solo un **campione**. Per tener conto del bias dovuto all'uso della media campionaria $\bar{x}$ invece della media vera μ , si usa $N - 1$ al denominatore:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (2)$$

Questa correzione diventa trascurabile per N grande, ma è fondamentale per piccoli set di dati.

Esempio (Python)

Di seguito mostriamo come calcolare media e deviazione standard (con e senza correzione) simulando delle misure gaussiane, simuliamo $N = 100$ misure con due strumenti diversi ($\sigma_1 = 1$ e $\sigma_2 = 0.2$).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Simulo N misure di una grandezza fisica (es. corrente)
N = 100
valore_simulato = 8.0 # Valore vero [mA]
# Caso 1: sigma = 1, Caso 2: sigma = 0.2
misure1 = np.random.normal(loc=valore_simulato, scale=1.0, size=N)
misure2 = np.random.normal(loc=valore_simulato, scale=0.2, size=N)

# 2. Calcolo Media
media1 = np.mean(misure1)
print(f"Media Caso 1: {media1:.4f} mA")

# 3. Calcolo Deviazione Standard (ddof=1 applica la correzione di Bessel N-1)
sigma1_corr = np.std(misure1, ddof=1)
print(f"Sigma Corretto (Bessel): {sigma1_corr:.4f}")

# 4. Istogramma
plt.hist(misure1, alpha=0.7, bins=30, edgecolor='black', label='Caso 1')
plt.hist(misure2, alpha=0.7, bins=30, edgecolor='black', label='Caso 2')
plt.xlabel('Misura, I [mA]')
plt.title('Istogramma delle misure ripetute')
plt.legend()
plt.show()
```

Listing 1: Calcolo di Media e Deviazione Standard




Figura 1: Istogramma comparativo delle due serie di misure simulate.

2.3 Errore di sensibilità e Propagazione

2.3.1 Propagazione degli Errori

Data una funzione $f(x, y)$ di variabili casuali indipendenti, la varianza si propaga come:

$$\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \sigma_y^2 \quad (3)$$

Esempio. Esempio numerico: Calcolo dello spazio percorso in un moto uniformemente accelerato

Dati: $v = 200 \pm 10 \text{ m/s}$, $a = 12 \pm 2 \text{ m/s}^2$, $t = 6 \text{ s}$ (errore trascurabile).

$$s = vt + \frac{1}{2}at^2 = (200 \cdot 6) + \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 6^2 = 1200 + 216 = 1416 \text{ m}$$

Errore associato σ_s :

$$\sigma_s^2 = \left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)^2 \sigma_v^2 + \left(\frac{\partial s}{\partial a} \right)^2 \sigma_a^2 = (t)^2 \sigma_v^2 + \left(\frac{1}{2}t^2 \right)^2 \sigma_a^2$$

$$\sigma_s = \sqrt{6^2 \cdot 10^2 + (18)^2 \cdot 2^2} = \sqrt{3600 + 1296} = \sqrt{4896} \approx 70 \text{ m}$$

Risultato: $s = 1416 \pm 70 \text{ m}$.

2.3.2 Parte di Bressan: Errore di sensibilità e distribuzione uniforme

Si definisce l'errore di sensibilità come la semiampiezza dell'intervallo di risoluzione: $\Delta x = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{N}$. Il risultato della misura sarà espresso come $x \pm \Delta x$.

L'interpretazione statistica assume che il "valore vero" della grandezza appartenga a un insieme continuo di possibili valori x , ognuno associato a una probabilità $P(x)$. Poiché nel caso continuo la probabilità di un singolo punto è nulla, si utilizza la *densità di probabilità*, tale che:

$$P(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} P(x) dx$$

La probabilità totale su tutto il dominio deve essere unitaria (condizione di normalizzazione).

Nel caso continuo, il valore di aspettazione μ e la varianza σ^2 sono definiti rispettivamente come il baricentro e il momento di inerzia della distribuzione: $\sigma^2 = \int_{X_{\min}}^{X_{\max}} (x - \mu)^2 P(x) dx$.

Se all'interno dell'intervallo di misura tutti i valori sono *equiprobabili*, $P(x)$ segue una **distribuzione uniforme**:

$$P(x) = \begin{cases} c, & x \in [X_{\min}, X_{\max}] \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Imponendo la condizione di normalizzazione ($\int P(x) dx = 1$), si ricavano i parametri della distribuzione:

- L'altezza della distribuzione è $c = \frac{1}{X_{\max} - X_{\min}}$.
- Ponendo per comodità l'origine al centro dell'intervallo (semiampiezza Δ), il valore medio è nullo: $\mu = \int_{-\Delta}^{+\Delta} x \frac{1}{2\Delta} dx = 0$.
- La deviazione standard risulta essere: $\sigma = \sqrt{\int_{-\Delta}^{+\Delta} (x - 0)^2 \frac{1}{2\Delta} dx} = \sqrt{\frac{\Delta^2}{3}} = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$.

2.3.3 Errore di Sensibilità

Quando non è possibile ripetere molte volte la misura, associamo alle misure l'errore dovuto alla sensibilità dello strumento. Questo errore si ottiene leggendo il minimo scarto della variabile consentito dallo strumento (risoluzione):

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$$

Questo è l'errore massimo $x \pm \Delta x$. Statisticamente, assumere che il valore vero si trovi in $[x_{\min}, x_{\max}]$ equivale ad assumere una **densità di probabilità uniforme** $P(x)$ di larghezza 2Δ . La densità deve essere normalizzata a 1:

$$\int_{-\Delta}^{\Delta} C dx = 1 \implies C(2\Delta) = 1 \implies C = \frac{1}{2\Delta}$$

Quindi:

$$P(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\Delta} & x \in [-\Delta, \Delta] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Per una distribuzione uniforme tra $[-\Delta, \Delta]$:

- Media: $\mu = 0$
- Varianza: $\sigma^2 = \int_{-\Delta}^{\Delta} x^2 \frac{1}{2\Delta} dx = \frac{\Delta^2}{3}$

Quindi, se si vuole convertire un errore massimo Δ in una deviazione standard σ :

$$\sigma = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} \quad (4)$$

3 Metodo dei Minimi Quadrati

3.1 Il Principio

L'obiettivo è dedurre informazioni fisiche dai dati (fit). Partiamo dalle ipotesi:

1. Ho effettuato misure (x_i, y_i) dove l'errore su x è trascurabile.
2. Per ogni x fisso, ho misurato y con incertezza σ_i .
3. Esiste una legge $y = f(x; p)$ (dove p sono i parametri).

Il metodo consiste nel minimizzare la somma degli scarti quadratici pesati, detta **Chi Quadro** χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N \left[\frac{y_i - f(x_i; p)}{\sigma_i} \right]^2 \quad (5)$$

Minimizzare significa porre le derivate rispetto ai parametri uguali a zero: $\frac{\partial \chi^2}{\partial p} = 0$.

3.1.1 Parte di Bressan: Metodo dei Minimi Quadrati

Un metodo fondamentale per stimare i parametri di un modello è quello dei **minimi quadrati**. Consideriamo un set di misure $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ e i corrispondenti valori osservati $\vec{y} = (y_1, \dots, y_n)$. Si assume che esista una relazione funzionale $f(x; \lambda)$ che lega le variabili, dove $\vec{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ sono i parametri ignoti da stimare.

Il principio dei minimi quadrati stabilisce che la miglior stima dei parametri è quella che minimizza la somma degli scarti quadratici pesati:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n w_i \left[y_i - f(x_i; \vec{\lambda}) \right]^2$$

Il peso w_i è legato all'incertezza della misura:

- Se tutte le misure hanno la stessa incertezza, il termine w_i può essere omesso (o posto uguale a 1).
- Se ogni misura ha un'incertezza diversa σ_i , allora $w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$. In questo caso la quantità minimizzata coincide con la variabile χ^2 (Chi-quadro).
- Se le variabili sono correlate, i pesi coinvolgeranno gli elementi della matrice di covarianza inversa.

Caso particolare: stima di una costante (Media Pesata) Se il modello è una costante $y = \lambda$ (cioè cerchiamo il miglior valore unico che rappresenti i dati), minimizzando il χ^2 si ottiene:

- Con errori uguali ($\sigma_i = \sigma$): Media aritmetica

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

- Con errori differenti (σ_i): Media pesata

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j^2}}$$

3.2 Fit Lineare ($y = mx + q$)

Nel caso di funzione lineare $f(x) = mx + q$ e $\sigma_i = \sigma$ costanti, risolvendo il sistema delle derivate parziali $\frac{\partial \chi^2}{\partial m} = 0$ e $\frac{\partial \chi^2}{\partial q} = 0$, si ottengono le stime analitiche:

Definiamo le somme:

$$S_x = \sum x_i, \quad S_y = \sum y_i, \quad S_{xx} = \sum x_i^2, \quad S_{xy} = \sum x_i y_i$$

$$D = NS_{xx} - (S_x)^2$$

Le stime dei parametri sono:

$$m = \frac{NS_{xy} - S_x S_y}{D}, \quad q = \frac{S_{xx} S_y - S_x S_{xy}}{D} \quad (6)$$

E gli errori associati (tramite propagazione):

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{N\sigma^2}{D}}, \quad \sigma_q = \sqrt{\frac{\sigma^2 S_{xx}}{D}} \quad (7)$$

Esempio (Fit Lineare)

```
# Dati simulati: Moto uniforme s = v*t + s0
t = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5]) # Tempo [s]
s = np.array([2, 17, 27, 37, 47, 63]) # Spazio [mm]
sigma_s = 2 # Incertezza [mm]
N = len(t)
```

```

# Calcolo Somme
Sx = np.sum(t); Sy = np.sum(s)
Sxx = np.sum(t**2); Sxy = np.sum(t * s)

# Calcolo Parametri
D = N * Sxx - Sx**2
m = (N * Sxy - Sx * Sy) / D
q = (Sxx * Sy - Sx * Sxy) / D

print(f"Velocita' (m): {m:.2f} mm/s")
print(f"Posizione init (q): {q:.2f} mm")

# Plot
plt.errorbar(t, s, yerr=sigma_s, fmt='o', label='Dati')
plt.plot(t, m*t + q, label='Fit Lineare')
plt.xlabel('Tempo [s]'); plt.ylabel('Spazio [mm]')
plt.legend(); plt.show()

```

Listing 2: Fit Lineare dei Minimi Quadrati




Figura 2: Fit Lineare

3.2.1 Parte di Bressan: Fit di una retta (Regressione Lineare)

Vogliamo determinare la retta che meglio descrive un set di dati $(x_i, y_i \pm \sigma_i)$. Utilizziamo la parametrizzazione $f(x) = mx + q$ (oppure $\theta_2 x + \theta_1$), dove i parametri da stimare sono la pendenza m e l'intercetta q . Per trovare il minimo, è necessario risolvere il sistema di equazioni ottenuto

annullando le derivate parziali del χ^2 :

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial m} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial \chi^2}{\partial q} = 0$$

Caso 1: Errori uguali o trascurabili

Se gli errori σ_i sono tutti uguali, la funzione da minimizzare è:

$$X^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - q - mx_i)^2$$

Introducendo i valori medi $\bar{x}, \bar{y}, \overline{x^2}, \overline{xy}$, le soluzioni per i parametri (stimatori) sono:

$$q = \hat{\theta}_1 = \frac{\bar{y} \cdot \overline{x^2} - \bar{x} \cdot \overline{xy}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}$$

$$m = \hat{\theta}_2 = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}$$

Gli errori sui parametri si ricavano dalla legge di propagazione della varianza (assumendo $\sigma_y = \sigma$ costante per tutti i punti):

$$\sigma_q^2 = \sigma^2 \frac{\overline{x^2}}{N(\overline{x^2} - \bar{x}^2)} \quad , \quad \sigma_m^2 = \sigma^2 \frac{1}{N(\overline{x^2} - \bar{x}^2)}$$

Nota: Il termine al denominatore ($\overline{x^2} - \bar{x}^2$) è la varianza dei valori x_i del campione.

Caso 2: Errori differenti (Fit pesato) Quando ogni misura ha un errore σ_i diverso, la probabilità di ottenere il set di misure osservato è data dal prodotto delle probabilità (Likelihood):

$$P(y_1, \dots, y_N) \propto \prod_{i=1}^N \exp\left(-\frac{(y_i - q - mx_i)^2}{2\sigma_i^2}\right) = \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \frac{(y_i - q - mx_i)^2}{\sigma_i^2}\right)$$

Massimizzare questa probabilità equivale a minimizzare l'esponente, ovvero il χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N \frac{(y_i - q - mx_i)^2}{\sigma_i^2}$$

Definiamo le seguenti somme pesate per semplificare la notazione:

$$S = \sum \frac{1}{\sigma_i^2}, \quad S_x = \sum \frac{x_i}{\sigma_i^2}, \quad S_y = \sum \frac{y_i}{\sigma_i^2}, \quad S_{xx} = \sum \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}, \quad S_{xy} = \sum \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}$$

Definiamo inoltre il determinante del sistema come $\Delta = S \cdot S_{xx} - S_x^2$. Le migliori stime per i parametri sono:

$$q = \frac{S_{xx} \cdot S_y - S_x \cdot S_{xy}}{\Delta} \quad , \quad m = \frac{S \cdot S_{xy} - S_x \cdot S_y}{\Delta}$$

Le varianze dei parametri, ottenute tramite la propagazione degli errori, sono:

$$\sigma_q^2 = \frac{S_{xx}}{\Delta} \quad , \quad \sigma_m^2 = \frac{S}{\Delta}$$

Il valore minimo del χ^2 può essere utilizzato per il *test delle ipotesi* (goodness of fit), per verificare se i dati sono compatibili con l'ipotesi lineare.

3.3 Caso Non Lineare e Linearizzazione

se $f(x; p)$ non è lineare spesso si cerca un'espressione linearizzata cambiando variabili.

Esempio: Caduta grave $h = \frac{1}{2}gt^2$ oppure la formula inversa per calcolare g dai tempi:

$$t = \sqrt{\frac{2}{g}}\sqrt{d} + t_0$$

Questa equazione è del tipo $Y = mX + q$ se poniamo:

$$Y = t, \quad X = \sqrt{d}, \quad m = \sqrt{\frac{2}{g}}, \quad q = t_0$$

Una volta calcolato $\hat{m}$ con i minimi quadrati, inverto la relazione per trovare g :

$$\hat{m}^2 = \frac{2}{g} \implies g = \frac{2}{\hat{m}^2}$$

Per l'errore, uso la propagazione:

$$\sigma_g = \left| \frac{\partial g}{\partial m} \right| \sigma_m = \left| -\frac{4}{m^3} \right| \sigma_m$$

Esempio Computazionale (Linearizzazione)

```
# Dati: Tempo t vs Spazio s
t = np.array([0.16, 0.40, 0.58, 0.72, 0.97])
s = np.array([0.20, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0])
rad_s = np.sqrt(s) # Variabile linearizzata X

# ... (Codice per calcolo m e q su t vs rad_s omissso per brevit ...)
# Supponiamo m sia stato calcolato:
m_calc = 0.45
sigma_m = 0.01

# Calcolo fisico
g = 2 / m_calc**2
sigma_g = (4 / m_calc**3) * sigma_m

print(f"g misurato: {g:.2f} +/- {sigma_g:.2f} m/s^2")
```

Listing 3: Linearizzazione per calcolo di g

3.3.1 Parte di Bressan: Caso non lineare

Se la relazione tra le grandezze non è lineare, spesso è possibile "linearizzare" il problema con un cambio di variabile.

Esempio. Consideriamo la legge del moto: $s = \frac{1}{2}gt^2$. Supponiamo di voler misurare g trascurando l'incertezza su s e considerando solo l'errore su t . Possiamo riscrivere l'equazione come:

$$t = \sqrt{\frac{2}{g}}\sqrt{s}$$

Ponendo $y = t$, $x = \sqrt{s}$ e il parametro $m = \sqrt{\frac{2}{g}}$, otteniamo una relazione lineare $y = mx$ (con intercetta nulla).

Una volta stimato m e la sua varianza σ_m^2 con il metodo dei minimi quadrati, ricaviamo g invertendo la relazione: $g = \frac{2}{m^2}$. L'errore su g si ottiene con la propagazione:

$$\sigma_g = \left| \frac{\partial g}{\partial m} \right| \sigma_m = \left| -\frac{4}{m^3} \right| \sigma_m$$

Questo esempio evidenzia l'importanza della scelta delle variabili dipendenti e indipendenti.

Nei casi in cui la linearizzazione non è possibile, si ricorre all'espansione di Taylor del modello attorno a valori iniziali dei parametri o a metodi numerici iterativi.

4 Momenti e Distribuzioni

Lezione del 23 Febbraio 2026

4.1 Momenti della funzione di distribuzione

Il valore di aspettazione e la varianza di una variabile casuale sono due particolari “momenti” della funzione densità di probabilità $f_X(x) \equiv f(x)$.

Possiamo distinguere tra momenti calcolati rispetto all’origine e momenti calcolati rispetto al valore di aspettazione (la media). In entrambi i casi, si tratta di valori di aspettazione (dunque quantità numeriche) delle potenze di x o di $x - \mu_x$. Nello specifico, definiamo:

Definizione: Momento algebrico di ordine k (o k -esimo momento algebrico): calcolato rispetto all’origine.

$$\mu_k = E[x^k] = \int_{\Omega} x^k f(x) dx$$

Osservazioni:

- Per $k = 0 \rightarrow \mu_0 = \int_{\Omega} f(x) dx = 1$ (Normalizzazione della funzione di probabilità).
- Per $k = 1 \rightarrow \mu_1$ rappresenta il valore di aspettazione o media (il baricentro della distribuzione).

Definizione: Momenti centrali di ordine k :


$$\bar{\mu}_k = E[(x - \mu)^k] = \int_{\Omega} (x - \mu)^k f(x) dx$$

Osservazione:

- Per $k = 0 \rightarrow \bar{\mu}_0 = \int_{\Omega} f(x) dx = 1$.
- Per $k = 1 \rightarrow \bar{\mu}_1 = 0$.
Dimostrazione: $\int_{\Omega} (x - \mu) f(x) dx = \int_{\Omega} x f(x) dx - \mu \int_{\Omega} f(x) dx = \mu - \mu \cdot 1 = 0$.
- Per $k = 2 \rightarrow \bar{\mu}_2 = \sigma^2$ (Varianza).
- Per $k = 3 \rightarrow \bar{\mu}_3$ è legato all’*indice di asimmetria* (o *skewness*). Esso indica quanto la distribuzione sia simmetrica rispetto alla media:


– per una distribuzione simmetrica (es. Gaussiana) $\bar{\mu}_3 = 0$;

Simmetrica ($\bar{\mu}_3 = 0$)




- per una distribuzione asimmetrica a destra (es. Maxwell-Boltzmann) $\bar{\mu}_3 > 0$;

Asimmetrica a destra ($\bar{\mu}_3 > 0$)



- per una distribuzione asimmetrica a sinistra $\bar{\mu}_3 < 0$

Asimmetrica a sinistra ($\bar{\mu}_3 < 0$)



- Per $k = 4 \rightarrow \bar{\mu}_4$ è legato all'*indice di curtosi* (o *kurtosis*). Questo parametro valuta il peso delle "code" della distribuzione, ovvero l'influenza dei valori estremi (*outliers*).

4.2 Distribuzione uniforme discreta

Consideriamo una variabile X che può assumere n valori discreti. Se tutti i valori sono equiprobabili, imponendo la condizione di normalizzazione si ottiene che la probabilità per ogni valore è $p = 1/n$. Di conseguenza, il valore medio è:

$$\mu_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

che corrisponde alla media aritmetica dei possibili valori (analogo al lancio di un dado). La varianza è data da:

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2$$

4.3 Distribuzione uniforme continua

Una variabile casuale continua definita nell'intervallo (a, b) possiede una distribuzione uniforme se la sua densità di probabilità è costante, ovvero $f_X(x) = \text{cost.}$ Affinché sia soddisfatta la condizione di normalizzazione (l'area sotto la curva deve essere 1), la funzione deve essere:

$$f_X(x) = \frac{1}{b - a}$$

Il valore medio si calcola come:

$$\mu_x = \int_a^b x f(x) dx = \frac{a + b}{2}$$

Per la varianza, sfruttando la proprietà $E[x^2] - E[x]^2$, si ottiene:

$$\sigma_x^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Nota: Collegamento con la trattazione degli errori.

Quando si passa dalla teoria degli errori massimi a quella statistica, il risultato di una misura viene espresso come $x \pm \Delta x$. Questo intervallo corrisponde a una distribuzione uniforme di larghezza $b - a = 2\Delta x$.

Sostituendo nella formula della varianza ricavata sopra ($\sigma_x^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$), otteniamo la deviazione standard:

$$\sigma_x = \frac{b-a}{2\sqrt{3}} \Rightarrow \Delta x = \sigma_x \sqrt{3}$$

È interessante calcolare la probabilità che il valore x cada all'interno dell'intervallo di una deviazione standard dalla media ($\mu_x \pm \sigma_x$). Tale probabilità risulta essere:

$$P(\mu_x - \sigma_x < x \leq \mu_x + \sigma_x) = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$$

Dimostrazione:

$$\int_{\mu_x - \sigma_x}^{\mu_x + \sigma_x} f(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_{\mu_x - \sigma_x}^{\mu_x + \sigma_x} dx = \frac{1}{b-a} (2\sigma_x) = \frac{2\sigma_x}{2\sigma_x \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

4.4 Funzioni Generatrici e Funzione Caratteristica

L'introduzione dei momenti risulta utile per diversi motivi. Un risultato fondamentale è il seguente: se due variabili casuali X e Y possiedono gli stessi momenti, allora le loro funzioni di distribuzione di probabilità (f_X e f_Y) sono identiche.

Definizione: Funzione generatrice dei momenti: La funzione generatrice dei momenti, indicata con $M_x(t)$, è definita come il valore atteso di e^{tx} . La sua espressione varia a seconda che la variabile casuale sia continua o discreta:

$$M_x(t) = E[e^{tx}] = \begin{cases} \int_{\Omega} e^{tx} f(x) dx & \text{caso continuo} \\ \sum_i p_i e^{tx_i} & \text{caso discreto} \end{cases}$$

Questa funzione è fondamentale perché permette di "generare" i momenti della distribuzione (come media, varianza, ecc.) attraverso l'operazione di derivazione. Calcolando la derivata m -esima rispetto a t e valutandola in $t = 0$, si ottiene il momento m -esimo semplice:

$$\left[\frac{\partial^m M_x}{\partial t^m} \right]_{t=0} = E[x^m] = \mu_m$$

Dimostrazione: Per dimostrare questa proprietà, sviluppiamo e^{tx} in serie di Maclaurin:

$$e^{tx} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tx)^k}{k!}$$

Sostituendo questo sviluppo nell'integrale della definizione (assumendo il caso continuo per generalità) e sfruttando la linearità dell'integrale, otteniamo:

$$M_x(t) = \int_{\Omega} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tx)^k}{k!} \right) f(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \int_{\Omega} x^k f(x) dx$$

Poiché l'integrale $\int_{\Omega} x^k f(x) dx$ corrisponde esattamente al momento k -esimo μ_k , possiamo scrivere:

$$M_x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \mu_k = \mu_0 + \mu_1 t + \frac{\mu_2 t^2}{2!} + \dots$$

Se calcoliamo la derivata prima rispetto a t :

$$\frac{\partial M_x}{\partial t} = \mu_1 + \frac{2\mu_2 t}{2!} + \dots = \mu_1 + \mu_2 t + \dots$$

Ponendo $t = 0$, tutti i termini con t si annullano, lasciando solo il coefficiente μ_1 :

$$\left[\frac{\partial M_x}{\partial t} \right]_{t=0} = \mu_1 = E[x]$$

Definizione: Funzione generatrice dei momenti centrali: Analogamente, è possibile definire la funzione che genera i momenti rispetto alla media μ (momenti centrali):

$$\bar{M}_x(t) = E[e^{t(x-\mu)}] = \begin{cases} \int_{\Omega} e^{t(x-\mu)} f(x) dx & \text{caso continuo} \\ \sum_i p_i e^{t(x-\mu_i)} & \text{caso discreto} \end{cases}$$

Anche in questo caso vale la proprietà delle derivate:

$$\left[\frac{\partial^m \bar{M}_x}{\partial t^m} \right]_{t=0} = E[(x - \mu)^m] = \bar{\mu}_m$$

Esiste una relazione diretta tra la funzione generatrice dei momenti semplici e quella dei momenti centrali. Sfruttando le proprietà dell'esponenziale e la linearità del valore atteso, si ha:

$$\bar{M}_x(t) = E[e^{t(x-\mu)}] = E[e^{tx} e^{-t\mu}] = e^{-t\mu} E[e^{tx}] = e^{-t\mu} M_x(t)$$

Infine se due variabili casuali X e Y possiedono la stessa funzione generatrice dei momenti ($M_x(t) = M_y(t)$) o la stessa funzione generatrice dei momenti centrali ($\bar{M}_x(t) = \bar{M}_y(t)$), allora le loro distribuzioni di probabilità (f_X e f_Y) sono identiche.

Definizione: Funzione caratteristica: Una variante importante è la funzione caratteristica, definita come:

$$\phi(x) = E[e^{itx}] = \int_{\Omega} e^{itx} f(x) dx$$

Questa corrisponde formalmente alla **Trasformata di Fourier** della densità di probabilità.

Consideriamo una variabile aleatoria $Z = X + Y$, somma di due variabili aleatorie **indipendenti** X e Y . La funzione generatrice dei momenti della somma è il prodotto delle singole funzioni generatrici:

$$M_Z(t) = E[e^{tZ}] = E[e^{t(X+Y)}] = E[e^{tX}e^{tY}]$$

Essendo X e Y indipendenti, il valore atteso del prodotto è il prodotto dei valori attesi:

$$M_Z(t) = E[e^{tX}]E[e^{tY}] = M_X(t)M_Y(t)$$

Questo è dovuto al fatto che $\Omega_X \cap \Omega_Y = \emptyset$, dunque vale che $f_{X+Y}(x) = f_X(x)f_Y(x)$

Approfondimento sulla funzione caratteristica

Quella che noi abbiamo visto come i momenti algebrici e centrali, in realtà sono solo due casi particolari di una famiglia più ampia di momenti, che possono essere generati da funzioni più generali. La funzione caratteristica è un esempio di funzione generatrice dei momenti che utilizza l'esponenziale complesso e^{itx} invece di e^{tx} .

La funzione caratteristica è la trasformata della mia p.d.f (probability density function); essa è ben definita valendo $f_X(x) \in L^2[\mathbb{R}]$

$$\phi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f_X(x) dx = E[e^{itx}]$$

In questo caso vale la stessa dimostrazione attraverso l'espansione dell'esponenziale per mostrare come da questa si possono ricavare i momenti, dove i momenti sono definiti come:

$$E[x^m] = \mu_m = \left[\frac{\partial^m \phi(t)}{\partial (it)^m} \right]_{t=0}$$

La funzione caratteristica è particolarmente utile perché, essendo la trasformata di Fourier della p.d.f., permette di ricavare la distribuzione di probabilità a partire dalla funzione caratteristica stessa tramite la trasformata inversa di Fourier:

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \phi(t) dt$$

Dunque due distribuzioni di probabilità che hanno gli stessi momenti (dunque la stessa funzione caratteristica), sono la stessa distribuzione di probabilità. Questo è dovuto al fatto che la $\mathcal{F}$ -trasformata in $L^2[\mathbb{R}]$ rappresenta una biezione tra due spazi.

4.5 Distribuzione binomiale o di Bernoulli

Questa parte è stata integrata con gli appunti di Bressan

La distribuzione binomiale descrive un fenomeno che può verificarsi solo con due modalità mutualmente esclusive: successo (con probabilità p) o insuccesso (con probabilità $q = 1 - p$).

Se ripetiamo l'esperimento n volte, la probabilità di ottenere esattamente k successi è data dalla funzione:

$$P(k; n, p) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$$

Casi particolari immediati:

- Probabilità di n successi (tutti): p^n
- Probabilità di 0 successi (nessuno): q^n
- Probabilità di 1 successo: npq^{n-1} (nota: il coefficiente binomiale $\binom{n}{1} = n$)
- Probabilità di $n - 1$ successi: $np^{n-1}q$

Esempio. Consideriamo 3 oggetti ($n = 3$) chiamati A, B, C . Vogliamo sceglierne 2 ($k = 2$). Le possibili combinazioni sono: AB, BC, AC . Calcolando con la formula del coefficiente binomiale otteniamo conferma:

$$\binom{3}{2} = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 1} = 3$$

Proprietà della distribuzione binomiale

- **Normalizzazione:** La somma di tutte le probabilità è 1. Questo deriva dallo sviluppo del binomio di Newton:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p+q)^n = (1)^n = 1$$

- **Calcolo diretto della media:** Possiamo derivare la media manipolando la sommatoria. Derivando l'identità $(p+q)^n$ rispetto a p :

$$p \frac{\partial}{\partial p} (p+q)^n = p \cdot n(p+q)^{n-1} \xrightarrow{p+q=1} np$$

Dall'altro lato della sommatoria:

$$p \frac{\partial}{\partial p} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k p^{-1} q^{n-k} \cdot p = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = E[k]$$

Uguagliando i risultati otteniamo il valore atteso: $E[k] = np$.

- **Varianza:** La varianza è data da $\sigma_x^2 = E[x^2] - E[x]^2 = npq$.

Funzione generatrice dei momenti della Binomiale

Calcoliamo il momento generatore per la binomiale:

$$M_k(t) = E[e^{tk}] = \sum_{k=0}^n e^{tk} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pe^t)^k q^{n-k}$$

Riconoscendo la forma del binomio di Newton $(a+b)^n$ con $a = pe^t$ e $b = q$, otteniamo:

$$M_k(t) = (pe^t + q)^n$$

Da qui possiamo ricalcolare i momenti derivando rispetto a t :

1. **Valore atteso (Media):** Calcoliamo la derivata prima:

$$M'_k(t) = n(pe^t + q)^{n-1} \cdot pe^t$$

Ponendo $t = 0$ (ricordando che $e^0 = 1$ e $p + q = 1$):

$$\mu = M'_k(0) = n(p+q)^{n-1}p = np$$

2. **Varianza:** Calcoliamo la derivata seconda (regola del prodotto):

$$M_k''(t) = n(n-1)(pe^t + q)^{n-2}(pe^t)^2 + n(pe^t + q)^{n-1}pe^t$$

Ponendo $t = 0$:

$$E[x^2] = M_k''(0) = n(n-1)p^2 + np$$

Ora calcoliamo la varianza usando $Var(x) = E[x^2] - E[x]^2$:

$$\sigma^2 = [n(n-1)p^2 + np] - (np)^2 = n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2 = np - np^2 = np(1-p) = npq$$

3. **Asimmetria (Terzo momento centrale):** Il terzo momento centrale è $\bar{\mu}_3 = npq(1-2p)$. Questo indice ci dice la forma della distribuzione:

- Se $\bar{\mu}_3 > 0$: distribuzione **asimmetrica positiva** (coda a destra).
- Se $\bar{\mu}_3 = 0$: distribuzione **simmetrica**.
- Se $\bar{\mu}_3 < 0$: distribuzione **asimmetrica negativa** (coda a sinistra).

Limiti della Binomiale: La distribuzione binomiale è estremamente importante in fisica perché, al limite per $n \rightarrow \infty$, approssima altre distribuzioni fondamentali:

- Tende alla **distribuzione di Gauss** se p rimane costante.
- Tende alla **distribuzione di Poisson** se il prodotto np rimane costante (ovvero se $p \rightarrow 0$ mentre $n \rightarrow \infty$).

Applicazione agli istogrammi: Consideriamo un istogramma dove n è il numero totale di eventi e ci focalizziamo su un particolare intervallo (bin) i . Il numero atteso di eventi in quell'intervallo è $E[n_i] = np_i$.

La varianza del numero di eventi nell'intervallo è data dalla binomiale:

$$\sigma_{n_i}^2 = np_i(1-p_i) = n_i(1-p_i) \simeq n_i \left(1 - \frac{n_i}{n}\right)$$

Se stimiamo la probabilità p_i tramite i dati misurati come $\hat{p}_i = n_i^{mis}/n$, nel caso in cui la probabilità sia molto piccola ($p \rightarrow 0$, regime di Poisson), il termine $(1-p_i) \approx 1$. Di conseguenza, l'errore standard (deviazione standard) sul conteggio di un bin è approssimabile con la radice quadrata del conteggio stesso:

$$\sigma_{n_i} \approx \sqrt{n_i^{mis}}$$

5 Distribuzione di Poisson e Approssimazioni

Lezione del 26 Febbraio 2026

Esempi Python: La Distribuzione Binomiale

In questo esercizio simuliamo il lancio di una moneta per applicare la distribuzione binomiale.

Problema: Lanciamo una moneta $n = 10$ volte. Qual è la probabilità di ottenere esattamente $k = 6$ teste?

Poiché una moneta può dare testa o croce, la probabilità di successo (testa) è $p = 0.5$. Utilizzeremo la distribuzione binomiale con i parametri:

- $n = 10$ (numero di lanci)
- $k = 6$ (numero di successi richiesti)
- $p = 0.5$ (probabilità singolo evento)

1. Calcolo Analitico e con Librerie

Possiamo calcolare la probabilità sia implementando la formula matematica, sia utilizzando la libreria `scipy`.

```
import math
from scipy.stats import binom

# Parametri del problema
k = 6
n = 10
p = 0.5

# METODO 1: Formula matematica
# P = coeff_binomiale * (p^k) * ((1 - p)^(n - k))
coeff_binomiale = math.comb(n, k)
P = coeff_binomiale * (p**k) * ((1 - p)**(n - k))

print(f"Probabilità (formula): {P}")

# METODO 2: Libreria Scipy
# Esiste una funzione dedicata per ottenere lo stesso risultato
P_scipy = binom.pmf(k, n, p)

print(f"Probabilità (scipy): {P_scipy}")
```

Listing 4: Calcolo probabilità Binomiale

Il risultato ottenuto è circa 0.205. Questo significa che, se ripetiamo molte volte l'esperimento dei 10 lanci, nel $\approx 20\%$ dei casi otterremo esattamente 6 teste.

2. Simulazione Monte Carlo

Possiamo verificare il risultato teorico simulando l'esperimento più volte. Prima simuliamo un singolo set di 10 lanci, poi ripetiamo l'esperimento 100 volte per contare la frequenza del risultato "6 teste".

```
import random

# --- Parte A: Singola simulazione di 10 lanci ---
testa = 0
croce = 0
for i in range(10):
    lancio = random.randint(0, 1) # 0 = Testa, 1 = Croce
    if lancio == 0:
        testa += 1
    else:
        croce += 1
print(f"Esito singolo: {testa} Teste e {croce} Croci")

# --- Parte B: Ripetiamo l'esperimento 100 volte ---
testa_l = [] # Lista per salvare i risultati di ogni esperimento

for i in range(100): # 100 esperimenti totali
    testa = 0 # Azzerare il contatore per il nuovo esperimento
    for j in range(10): # Ogni esperimento consiste in 10 lanci
        lancio = random.randint(0, 1)
        if lancio == 0:
            testa += 1
    # Fine dei 10 lanci, salvo il risultato
    testa_l.append(testa)

# Contiamo quante volte e' uscito esattamente 6
risultato = testa_l.count(6)
print(f"Su 100 esperimenti, ho ottenuto 6 teste {risultato} volte")
```

Listing 5: Simulazione dei lanci

5.1 Dalla Binomiale alla Poissoniana

5.1.1 Parte di Bressan: Distribuzione di Poisson

La distribuzione di Poisson è un caso limite fondamentale, spesso utilizzato in fisica nucleare, e serve per indicare la probabilità di osservare k eventi in un determinato intervallo di tempo t , basandosi su tre ipotesi principali:

- **Indipendenza:** la presenza o assenza di un evento non dipende da ciò che è accaduto prima del tempo t (processo senza memoria).
- **Proporzionalità:** la probabilità che accada un evento in un intervallo infinitesimo dt è proporzionale all'ampiezza dell'intervallo stesso.
- **Non simultaneità:** la probabilità di avere due eventi contemporaneamente in un intervallo infinitesimo è nulla.

Si tratta del caso limite della distribuzione binomiale in cui la probabilità di successo p è molto piccola e il numero di prove $n \rightarrow \infty$. La formula generale è:

$$P_k(t) = \frac{(\mu t)^k}{k!} e^{-\mu t}$$

dove μ rappresenta il tasso medio di eventi per unità di tempo.

Derivazione della formula

1. Probabilità di 0 eventi:

Consideriamo la probabilità di non avere eventi nell'intervallo $(0, t + dt)$. Questo richiede che non ci siano eventi fino a t e che non se ne verifichino nell'intervallo successivo dt :

$$P_0(t + dt) = P_0(t)(1 - \mu dt)$$

Qui abbiamo imposto che la probabilità di avere un evento in dt sia μdt (e quindi di non averne è $1 - \mu dt$, trascurando termini di ordine superiore). Riorganizzando i termini e passando al limite per $dt \rightarrow 0$:

$$\frac{P_0(t + dt) - P_0(t)}{dt} = -\mu P_0(t) \quad \Rightarrow \quad \frac{dP_0}{dt} = -\mu P_0(t)$$

Imponendo la condizione iniziale $P_0(0) = 1$, la soluzione è:

$$P_0(t) = e^{-\mu t}$$

2. Probabilità di k eventi:

La probabilità di avere 1 evento al tempo $t + dt$ è data dalla somma di due possibilità: avere 1 evento a t e nessuno in dt , oppure avere 0 eventi a t e uno in dt :

$$P_1(t + dt) = P_1(t)(1 - \mu dt) + P_0(t)(\mu dt)$$

Che porta all'equazione differenziale:

$$\frac{dP_1}{dt} = -\mu(P_1(t) - P_0(t))$$

Procedendo in maniera ricorsiva, si trova che la probabilità di avere m eventi varia secondo:

$$\frac{dP_m}{dt} = -\mu(P_m(t) - P_{m-1}(t))$$

La soluzione generale di questo sistema è:

$$P_k(t) = \frac{(\mu t)^k}{k!} e^{-\mu t} = \frac{m^k}{k!} e^{-m}$$

dove abbiamo posto $m = \mu t = E[k]$, che rappresenta il valore di aspettazione (il numero medio) di eventi nell'intervallo t .

Proprietà della distribuzione

La distribuzione di Poisson è correttamente normalizzata. Infatti, ricordando lo sviluppo di Taylor dell'esponenziale:

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_k = e^{-m} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{m^k}{k!} = e^{-m} \cdot e^m = 1$$

Il valore di aspettazione è:

$$E[k] = \sum_{k=0}^{\infty} k P_k = m$$

E la varianza coincide con la media:

$$\sigma^2 = E[k^2] - E[k]^2 = m$$

Si nota dunque che la distribuzione di Poisson non è altro che il limite per $n \rightarrow \infty$ della distribuzione di Bernoulli (Binomiale).

5.1.2 Confronto: Poisson vs Binomiale

La distribuzione **Binomiale** descrive casi in cui un risultato particolare si ottiene in un numero preciso e finito di tentativi (n).

La distribuzione di **Poisson**, invece, si usa per descrivere casi in cui si contano eventi rari in un continuo (tempo o spazio), dove non si ha un'idea precisa del numero di tentativi totali, né ha senso parlare di casi "sfavorevoli" nel senso classico.

Esempi:

- Il numero di fulmini durante un temporale: sarà un numero intero, ma non ha senso parlare di "non-fulmini" (non esiste un non-evento osservabile come nel caso "Testa o Croce").

In questi processi si vuole stimare la probabilità k di eventi, noto il numero medio λ (o μ) di eventi che generalmente si presentano. Il processo non ha memoria: un evento verificatosi non influenza la probabilità dei successivi.

Dimostrazione del limite

Matematicamente, la Poisson si ottiene dalla Binomiale attraverso i limiti:

$$n \rightarrow \infty \quad \text{e} \quad p \rightarrow 0$$

in modo tale che il loro prodotto $\lambda = np$ rimanga costante ($\lambda = \text{cost}$).

Supponiamo di attenderci λ eventi in un certo intervallo di tempo Δt . Dividiamo questo intervallo in n sotto-intervalli $\Delta t'$ molto piccoli ($n \rightarrow \infty$), talmente piccoli che la probabilità che due eventi cadano nello stesso sia trascurabile (al massimo un evento per intervallo). La probabilità che un evento si verifichi in un singolo $\Delta t'$ è:

$$p = \frac{\lambda}{n}$$

La probabilità di trovare k eventi negli n intervallini è data dalla distribuzione Binomiale con $p = \lambda/n$:

$$P\left(k; n, \frac{\lambda}{n}\right) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

Riorganizziamo i termini per calcolare il limite:

$$P\left(k; n, \frac{\lambda}{n}\right) = \underbrace{\frac{\lambda^k}{k!}}_{(A)} \cdot \underbrace{\frac{n!}{(n-k)! n^k}}_{(B)} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}}_{(C)}$$

1. Il termine fattoriale (A):

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1)$$

Ci sono esattamente k termini al numeratore. Per $n \rightarrow \infty$, possiamo trascurare le sottrazioni rispetto a n (es. $n-1 \approx n$). Quindi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)!} \approx \underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k \text{ volte}} = n^k$$

(Esempio con $k = 5$: $\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{1} \rightarrow n^5$). Di conseguenza, il rapporto tende a 1:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)! n^k} = \frac{n^k}{n^k} = 1$$

2. Il termine esponenziale (B): Scriviamo il termine $(1 - \frac{\lambda}{n})^{n-k}$ come prodotto di due fattori:

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

Per $n \rightarrow \infty$, il secondo fattore tende a $(1-0)^{-k} = 1$. Il primo fattore è un limite notevole dell'analisi matematica:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$$

Sostituendo i limiti calcolati ($n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np = \lambda$) nell'espressione della binomiale, otteniamo la forma chiusa della distribuzione. La probabilità di ottenere k eventi, dato un numero medio di eventi attesi λ , è:

$$\boxed{P(k; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad \text{con } 0 \leq k < \infty} \quad (8)$$

Condizioni di validità: Il modello è valido per eventi rari in un continuo, dove il numero di prove tende all'infinito. Un esempio classico è il **decadimento radioattivo**, in quanto il numero di decadimenti nucleari in un intervallo di tempo è discreto e casuale, ma con un tasso medio ben definito.

5.2 Calcolo dei Momenti tramite la Funzione Generatrice dei Momenti

Per calcolare valore atteso e varianza in modo elegante, utilizziamo la **Funzione Generatrice dei Momenti**, definita come il valore atteso di e^{tk} :

$$M_k(t) = E[e^{tk}] = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{tk} P(k; \lambda) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{tk} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Portiamo fuori dalla sommatoria i termini costanti rispetto a k (il termine $e^{-\lambda}$) e accorpriamo le potenze di k :

$$M_k(t) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(e^t \lambda)^k}{k!}$$

Riconosciamo nella sommatoria lo sviluppo in serie di Taylor dell'esponenziale $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, dove in questo caso l'argomento è $x = \lambda e^t$.

$$M_k(t) = e^{-\lambda} \cdot e^{(\lambda e^t)} = e^{\lambda e^t - \lambda}$$

Possiamo quindi scrivere la forma finale della Funzione Generatrice dei Momenti per la Poissoniana:

$$\boxed{M_k(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}} \quad (9)$$

Calcolo di Media e Varianza

Dalle proprietà della Funzione Generatrice dei Momenti sappiamo che la derivata prima valutata in $t = 0$ fornisce la media, mentre la derivata seconda fornisce il momento secondo.

1. Media (Valore Atteso): Deriviamo $M_k(t)$ rispetto a t :

$$\frac{\partial M_k}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{\lambda(e^t - 1)} \right) = e^{\lambda(e^t - 1)} \cdot \frac{\partial}{\partial t} (\lambda e^t - \lambda) = e^{\lambda(e^t - 1)} \cdot \lambda e^t$$

Valutiamo in $t = 0$:

$$E[k] = \left[\frac{\partial M_k}{\partial t} \right]_{t=0} = e^{\lambda(1-1)} \cdot \lambda \cdot 1 = 1 \cdot \lambda = \lambda$$

Risultato: $\mu = \lambda$. Questo conferma che il parametro λ rappresenta il numero medio di eventi.

2. Varianza: Per la varianza usiamo la relazione $\text{Var}(k) = E[k^2] - (E[k])^2$. Calcoliamo la derivata seconda (derivata del prodotto $f(t) \cdot g(t)$ dove f è l'esponenziale composto e g è λe^t):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 M_k}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\underbrace{e^{\lambda(e^t - 1)}}_{f(t)} \cdot \underbrace{\lambda e^t}_{g(t)} \right) \\ &= \underbrace{e^{\lambda(e^t - 1)} \lambda e^t}_{f'(t)} + \underbrace{e^{\lambda(e^t - 1)}}_{f(t)} \cdot \underbrace{\lambda e^t}_{g'(t)} \end{aligned}$$

Raccogliendo i termini:

$$\frac{\partial^2 M_k}{\partial t^2} = e^{\lambda(e^t - 1)} (\lambda^2 e^{2t} + \lambda e^t)$$

Valutando in $t = 0$:

$$E[k^2] = 1 \cdot (\lambda^2 + \lambda) = \lambda^2 + \lambda$$

Ora calcoliamo la varianza sottraendo il quadrato della media:

$$\text{Var}(k) = (\lambda^2 + \lambda) - (\lambda)^2 = \lambda$$

Conclusione: Per la distribuzione di Poisson, media e varianza coincidono.

$$\boxed{\mu = \lambda, \quad \sigma^2 = \lambda} \quad (10)$$

5.3 Relazione con la Binomiale e Somma di Variabili

5.3.1 Limite della Funzione Generatrice dei Momenti Binomiale

Si può dimostrare formalmente che la Funzione Generatrice della Binomiale tende a quella della Poissoniana. La Funzione Generatrice dei Momenti della Binomiale è $M_{bin}(t) = (pe^t + 1 - p)^n = [1 + p(e^t - 1)]^n$. Sostituendo $p = \lambda/n$:

$$M_{bin}(t) = \left[1 + \frac{\lambda(e^t - 1)}{n} \right]^n$$

Utilizzando il limite notevole $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{a}{n})^n = e^a$ con $a = \lambda(e^t - 1)$, otteniamo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_{bin}(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

Che è esattamente la Funzione Generatrice dei Momenti della Poissoniana derivata in precedenza.

5.3.2 Confronto delle forme (Code della distribuzione)

- **Varianza:** La varianza della Poissoniana è $\lambda = np$. La varianza della Binomiale è $np(1-p)$. Poiché $(1-p) < 1$, la varianza binomiale è sempre minore di quella Poissoniana equivalente.
- **Code:** La distribuzione binomiale è limitata superiormente ($k \leq n$). La Poissoniana non ha limite superiore ($0 \leq k < \infty$). Questo, unito alla varianza maggiore, implica che la Poissoniana ha **code più lunghe**: è relativamente più probabile osservare valori lontani dalla media rispetto a una binomiale, specialmente quando la media è piccola.

5.3.3 Somma di Poissoniane Indipendenti

Se abbiamo due processi Poissoniani indipendenti A e B con medie λ_a e λ_b , la variabile somma $k = k_a + k_b$ segue ancora una distribuzione di Poisson con media $\lambda_{tot} = \lambda_a + \lambda_b$.

Dimostrazione: La Funzione Generatrice dei Momenti della somma di variabili indipendenti è il prodotto delle Funzione Generatrice dei Momenti.

$$M_{tot}(t) = M_a(t) \cdot M_b(t) = e^{\lambda_a(e^t - 1)} \cdot e^{\lambda_b(e^t - 1)} = e^{(\lambda_a + \lambda_b)(e^t - 1)}$$

Questa forma corrisponde a una Poissoniana con parametro $\lambda_a + \lambda_b$. *Esempio fisico:* Un contatore Geiger che rileva radiazioni da due sorgenti diverse non distinguibili; il conteggio totale sarà ancora Poissoniano.

Esempi Python: Grafici e Confronti

Di seguito riportiamo il codice per visualizzare le distribuzioni e verificare numericamente le proprietà discusse.

1. Visualizzazione della Distribuzione Binomiale

Questo script mostra come varia la forma della distribuzione binomiale al variare di n (numero di prove) e p (probabilità).

```

import math
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np

def binomiale_manual(k, n, p):
    return math.comb(n, k) * (p**k) * ((1 - p)**(n - k))

# Creiamo una matrice di grafici 2x2 per vedere diversi n
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(8, 6))
axes = axes.flatten()

n_list = [5, 15, 30, 50]
p = 0.5

for ax, n in zip(axes, n_list):
    k_values = range(n + 1)
    P_binom = [binomiale_manual(k, n, p) for k in k_values]
    ax.bar(k_values, P_binom)

    # Linee per media e deviazione standard
    mu = n * p
    sigma = np.sqrt(n * p * (1 - p))


    ax.axvline(mu, linestyle="--", color="orange", label=f"$\mu$={mu:.1f}")
    y_lvl = max(P_binom)/2
    ax.plot([mu-sigma, mu+sigma], [y_lvl, y_lvl], color="red", label=f"$\sigma$={sigma:.1f}")

    ax.set_title(f"n={n}, p={p}")
    ax.legend()
    ax.grid(True)


plt.tight_layout()
plt.show()

```


Listing 6: Plot della Binomiale al variare di n e p



(a)



(b)



(c)

Figura 3: Distribuzioni Binomiale

2. Esercizio Poisson: La notte di San Lorenzo

Problema: Se ci si aspetta di osservare 15.7 stelle cadenti all'ora, qual è la probabilità di osservarne meno di 5 in 30 minuti?

```
from scipy.stats import binom, poisson
import math
import matplotlib.pyplot as plt

# --- PARTE 1: Calcolo Probabilita' ---
frequenza_h = 15.7
frequenza_30min = 15.7 / 2 # Il nostro lambda per 30 min

somma_prob = 0
print("Probabilita' di osservare k stelle in 30 min:")
for k in range(5): # k da 0 a 4
    prob = poisson.pmf(k, frequenza_30min)
    print(f"k={k}: {prob*100:.2f}%")
    somma_prob += prob

print(f"Probabilita' totale (< 5 stelle): {somma_prob*100:.2f}%")

# --- PARTE 2: Confronto Grafico Binomiale vs Poisson ---
# Mostriamo che per n grande e p piccolo le due coincidono

def confronto_binom_pois(p, n_list):
    fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(8, 6))
    axes = axes.flatten()

    for ax, n in zip(axes, n_list):
        l = n * p # Lambda fissato da n*p
        n = int(n)

        # Definiamo il range di k interessante (attorno alla media)
        sigma = math.sqrt(l)
        k_max = int(l + 4*sigma)
        k_values = range(k_max)


        # Calcolo con librerie (piu' stabile per n grandi)
        P_binom = binom.pmf(k_values, n, p)
        P_pois = poisson.pmf(k_values, l)

        ax.plot(k_values, P_pois, "o", label="Poisson")
        ax.plot(k_values, P_binom, "x", label="Binomiale", alpha=0.7)
        ax.set_title(f"n={n}, p={p},  $\lambda = {l:.1f}$ ")
        ax.legend()
        ax.grid(True)


    plt.tight_layout()
    plt.show()

# Eseguiamo il confronto al limite
# Caso limite: p molto piccolo, n molto grande
confronto_binom_pois(p=0.01, n_list=[100, 1000, 5000, 10000])
```


Listing 7: Calcolo Poisson e confronto con Binomiale




(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 4: Distribuzioni di Poisson e nel limite e confronto binomiale/poissoniana

5.4 Rappresentazione grafica dei dati (Istogrammi)

Consideriamo un esperimento volto a misurare una grandezza fisica continua X . Il modello teorico che descrive il fenomeno fornisce una densità di probabilità $P(x)$, tale che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} P(x) dx = 1 \quad (11)$$

Si effettuano N misure indipendenti di X , ottenendo un campione di dati $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$. Questi dati vengono rappresentati graficamente tramite un istogramma, suddividendo l'asse delle x in intervalli adiacenti chiamati *bin*. Considerando un generico bin i , definito nell'intervallo $[x_i, x_{i+1}]$, il numero di eventi M_i che cadono in tale intervallo è una variabile aleatoria discreta. La probabilità teorica che una singola misura cada nel bin i è data da:

$$P_i = \int_{x_i}^{x_{i+1}} P(x) dx \approx P\left(x_i + \frac{\Delta x}{2}\right) \Delta x \quad (12)$$

dove si assume che il bin sia sufficientemente stretto (Δx) da poter considerare $P(x)$ costante al suo interno, approssimandola con il valore nel punto centrale.

La variabile M_i segue una statistica binomiale, poiché per ogni singola misura si verificano due sole possibilità: il conteggio cade nel bin i (successo) oppure no (insuccesso). Il valore di aspettazione di M_i è $\langle M_i \rangle = NP_i$, mentre la varianza è $V_i = NP_i(1 - P_i)$. Al limite, per P_i piccolo e N grande, la distribuzione degli eventi tende a una Poissoniana. In questo caso, il valore di aspettazione è semplicemente M_i e la deviazione standard è stimata come $\sigma = \sqrt{M_i}$. Per questo motivo, quando si rappresenta un istogramma, si aggiungono spesso delle barre di errore verticali che rappresentano la deviazione standard $\sqrt{M_i}$.

È fondamentale sottolineare che l'istogramma non è una distribuzione di probabilità continua, ma una stima basata su un numero finito di eventi. Il fatto che la fluttuazione dei conteggi nei bin segua una statistica binomiale (o approssimativamente Poissoniana) riguarda il processo di misura e campionamento, ed è concettualmente distinto dalla forma funzionale $P(x)$ del processo fisico sottostante.

Se P_i fosse nota a priori, per un confronto visivo con l'istogramma si potrebbe graficare la curva teorica sopra i dati. Tuttavia, è necessario scalare opportunamente la funzione, poiché l'istogramma riporta il numero di conteggi $M_i \approx P(x_{\text{centro}})\Delta x N$.

Nota:

1. *L'approssimazione binomiale e Poissoniana per i conteggi nei bin è valida propriamente se N non è fissato a priori, ma è esso stesso una variabile aleatoria (ad esempio, se si acquisiscono conteggi per un intervallo di tempo fissato, il numero totale N di eventi varierà da esperimento a esperimento). Se invece N è fissato rigorosamente (si decide di acquisire esattamente un certo numero di eventi totali), la distribuzione congiunta dei conteggi nei vari bin segue una distribuzione **multinomiale**.*
2. *Qualunque confronto tra l'istogramma e la curva teorica $P(x)$ basato sulla sovrapposizione grafica è puramente qualitativo. Esistono metodi statistici quantitativi (test di bontà del fit) per valutare la compatibilità, che verranno trattati in seguito.*

Esempio. *Se abbiamo una generazione causale di numeri che segue una distribuzione uniforme: $U(0,1)$, allora avrò:*

$$P_i = \int_{x_i}^{x_{i+1}} 1 \, dx = \Delta x$$

poichè la distribuzione è fatta così

$$U(0,1) = \begin{cases} \text{cost.} & \text{se } x \in (0,1) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

poichè deve essere normalizzata deve essere cost. = 1

6 La Distribuzione Normale (Gaussiana)

Lezione del 02 Marzo 2026


6.1 Definizione e Proprietà Fondamentali

6.1.1 Parte di Bressan: Distribuzione Normale

Data una variabile casuale x , la funzione di densità di probabilità normale è definita come:

$$f(x) = N(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Quarck!



Questa funzione rispetta le proprietà fondamentali delle distribuzioni di probabilità:

- **Normalizzazione:**

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$$

- **Valore di aspettazione:** corrisponde a μ

$$E[x] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \mu$$

- **Varianza:** vale σ^2

$$\text{Var}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \sigma^2$$

Per centrare la distribuzione in 0, si applica la sostituzione $y = x - \mu$ (con $dy = dx$), ottenendo:

$$f(y; 0, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$$

Per standardizzarla (centrata in 0 e con varianza $\sigma^2 = 1$), si pone $y = \frac{x-\mu}{\sigma}$ (con $dy = \frac{dx}{\sigma}$), ottenendo la **distribuzione normale standard**:

$$f(y; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

È interessante notare che, per la distribuzione standard, la funzione di ripartizione $F(x)$ gode della proprietà di simmetria:

$$F(-x) = 1 - F(x)$$

Se vogliamo calcolare la probabilità che x cada in un intervallo $[a, b]$:

$$P(a \leq x \leq b) = P(x \leq b) - P(x \leq a) = F(b) - F(a)$$

Passando alla variabile standardizzata $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$:

$$P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = F\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - F\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Scegliendo intervalli simmetrici rispetto alla media, ovvero $a = \mu - n\sigma$ e $b = \mu + n\sigma$:

$$P(\mu - n\sigma \leq x \leq \mu + n\sigma) = F(n) - F(-n) = F(n) - [1 - F(n)] = 2F(n) - 1$$

Si può concludere che è molto improbabile (o "anormale") trovare valori molto distanti dalla media. Ad esempio, per $n = 3$, la probabilità di cadere all'interno dell'intervallo è circa 0.997 (o 99.7%).

Graficamente:

- Il picco della campana si trova in $x = \mu$.
- L'altezza del picco è $f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \approx \frac{0.399}{\sigma}$.
- Il valore a metà altezza (FWHM) corrisponde a una larghezza di $2\sqrt{2\ln(2)}\sigma \approx 2.355\sigma$.

Esempio di distribuzione di Gauss

Consideriamo un esempio basato sulla distribuzione binomiale per modellare gli errori di misura. Assumiamo le seguenti ipotesi:

- L'errore di misura è definito come $u = x - a$ (dove x è il valore misurato e a è il valore vero).
- L'errore totale è la somma di n contributi elementari (errori piccoli), ciascuno di valore ε .

Ogni contributo ε può essere positivo o negativo con probabilità 50/50 (analogia con il cammino casuale). Se indichiamo con k il numero di contributi positivi, allora $(n - k)$ saranno i contributi negativi. L'errore totale sarà:

$$u_k = k\varepsilon - (n - k)\varepsilon = (2k - n)\varepsilon$$

Il valore di aspettazione è $E[u_k] = 0$. Per il teorema del limite centrale, quando $n \rightarrow \infty$, la distribuzione di questi errori tende a una gaussiana centrata in 0.

Dimostrazione Euristica

Vogliamo giustificare euristicamente perché la distribuzione degli errori accidentali è gaussiana. Come visto sopra, se abbiamo k deviazioni positive su n totali, l'errore e la sua probabilità (data dalla binomiale) sono:

$$u_k = (2k - n)\varepsilon \quad P(k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Considerando due valori successivi k e $k + 1$, possiamo definire un valore medio per l'errore e l'incremento:

$$u^M \approx (2k - n + 1)\varepsilon \quad \Delta u = u_{k+1} - u_k = 2\varepsilon$$

Per $\Delta u \rightarrow 0$ (cioè ε molto piccolo e n grande), possiamo passare al continuo. La **densità di probabilità** $y(u)$ può essere approssimata considerando la variazione di probabilità. Definiamo la variazione relativa della probabilità:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx \frac{P(k+1) - P(k)}{P(k)}$$

Svolgendo i calcoli con i fattoriali, si trova che questa variazione è legata all'errore u da una relazione del tipo:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{u}{\sigma^2} du$$

dove $\sigma^2 \propto n\varepsilon^2$. Questa è un'equazione differenziale la cui soluzione è:

$$\ln y = -\frac{u^2}{2\sigma^2} + C \implies y(u) = Ae^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}$$

Imponendo la normalizzazione, si ottiene la forma gaussiana:

$$y(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}$$

Breve riassunto

- Definizione di variabile casuale discreta e continua.
- Definizione di funzione di ripartizione $F_x(x)$.
- Definizione di funzione di distribuzione (densità di probabilità).
- Valori di aspettazione come indici di posizione (media) e dispersione (varianza).
- Esempi di funzioni di distribuzione (Binomiale, Poisson, Gaussiana).

6.2 Definizione di distribuzione normale

La funzione di distribuzione di Gauss, o distribuzione normale, è descritta dalla seguente funzione (Gauss la utilizzò per descrivere gli errori di misura, notando che molti fenomeni naturali tendono a distribuirsi attorno a un valore medio):

$$P(x; \mu, \sigma) = N(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (13)$$

dove il simbolo N indica che si tratta di una distribuzione normale. Graficamente ha la forma di una campana simmetrica centrata in $x = \mu$. La larghezza della curva è determinata dal parametro σ , che rappresenta la deviazione standard della distribuzione (mentre μ rappresenta il valore atteso): se σ è grande, la distribuzione risulta molto allargata; viceversa, se σ è piccolo, la distribuzione è stretta. Variare μ equivale a traslare la distribuzione lungo l'asse x senza alterarne la forma, mentre variare σ modifica l'ampiezza della curva senza cambiarne il centro.

Nel caso specifico in cui $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$, si parla di **distribuzione normale standard**, indicata con $N(0, 1)$:

$$N(0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (14)$$

È importante notare che, attraverso il cambiamento di variabile $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, una qualsiasi gaussiana può essere ridotta alla forma normale standard in funzione di z :

$$P_z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \quad (15)$$

Da un punto di vista pratico, questa proprietà è molto utile per i calcoli: se x è una variabile con distribuzione $N(\mu, \sigma^2)$ e z ha una densità di probabilità $N(0, 1)$, possiamo passare da z a x utilizzando la formula di trasformazione:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (16)$$

Utilizzando la formula inversa, possiamo ricavare x noto z :

$$z\sigma = x - \mu \implies x = \mu + z\sigma \quad (17)$$

Nota: [Note sul Cambio di Variabile] Quando si effettua un cambio di variabile, la condizione di normalizzazione della probabilità deve essere preservata:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} P_z(z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} P_x(x) dx = 1$$

La relazione tra le densità di probabilità è data da:

$$P_z(z) = P_x[x(z)] \left| \frac{dx}{dz} \right|$$

Dato che $x(z) = \mu + z\sigma$, la derivata risulta $\frac{dx}{dz} = \sigma$. Sostituendo nella formula precedente si ottiene:

$$P_z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

che conferma il passaggio alla forma standard.

6.3 Calcolo del Valore di Aspettazione e della Varianza

Come per le altre distribuzioni, possiamo utilizzare la funzione generatrice dei momenti per calcolare il valore di aspettazione e la varianza. A differenza delle distribuzioni discrete viste in precedenza, notiamo che in questo caso x è una variabile continua.

Partiamo dalla funzione generatrice dei momenti centrali:

$$\bar{M}_x(t) = E[e^{t(x-\mu)}] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t(x-\mu)} P(x) dx \quad (18)$$

Sostituendo l'espressione di $P(x)$:

$$\bar{M}_x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t(x-\mu)} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[t(x-\mu) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right] dx \quad (19)$$

Per risolvere l'integrale, riscriviamo l'esponente completando il quadrato:

$$t(x-\mu) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} = -\frac{[(x-\mu) - \sigma^2 t]^2}{2\sigma^2} + \frac{\sigma^2 t^2}{2} \quad (20)$$

Infatti, svolgendo il quadrato al numeratore si verifica l'uguaglianza:

$$-\frac{[(x-\mu) - \sigma^2 t]^2}{2\sigma^2} = -\frac{(x-\mu)^2 - 2\sigma^2 t(x-\mu) + \sigma^4 t^2}{2\sigma^2} = -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} + t(x-\mu) - \frac{\sigma^2 t^2}{2} \quad (21)$$

Quindi, il termine aggiuntivo $-\frac{\sigma^2 t^2}{2}$ viene compensato aggiungendo $+\frac{\sigma^2 t^2}{2}$. L'integrale diventa:

$$\begin{aligned} \bar{M}_x(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-\frac{[(x-\mu) - \sigma^2 t]^2}{2\sigma^2} + \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right] dx \\ &= e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{[(x-\mu) - \sigma^2 t]^2}{2\sigma^2}} dx}_{=1} \end{aligned} \quad (22)$$

L'integrale evidenziato vale 1 poiché rappresenta l'area totale di una gaussiana con media $\mu' = \mu + \sigma^2 t$ e varianza σ^2 . Pertanto otteniamo:

$$\boxed{\bar{M}_x(t) = e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}}} \quad (23)$$

Da questo risultato possiamo ricavare la funzione generatrice dei momenti rispetto all'origine $M_x(t)$ usando la relazione $M_x(t) = E[e^{tx}] = E[e^{t(x-\mu)} e^{\mu t}] = e^{\mu t} \bar{M}_x(t)$:

$$M_x(t) = e^{\mu t} \bar{M}_x(t) \quad (24)$$

Nel caso particolare di una gaussiana centrata in zero ($\mu = 0$) con varianza unitaria ($\sigma^2 = 1$), si ha $\bar{M}_x(t) = M_x(t)$. Per una gaussiana generale si ottiene quindi:

$$\boxed{M_x(t) = \exp \left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right)} \quad (25)$$

Ora possiamo calcolare il valore di aspettazione derivando $M_x(t)$:

$$\frac{dM_x}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\exp \left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right) \right] = (\mu + \sigma^2 t) e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}} \quad (26)$$

Valutando la derivata in $t = 0$:

$$\left. \frac{dM_x}{dt} \right|_{t=0} = \mu = E[x] \quad (27)$$

Per calcolare la varianza è conveniente utilizzare la derivata seconda della funzione generatrice dei momenti centrali (o continuare a derivare M_x):

$$\left. \frac{d\bar{M}_x}{dt} \right|_{t=0} = 0 \quad \text{e} \quad \left. \frac{d^2\bar{M}_x}{dt^2} \right|_{t=0} = \sigma^2 \quad (28)$$

Se calcoliamo la derivata seconda di $M_x(t)$:

$$\frac{d^2 M_x}{dt^2} = [\sigma^2 + (\mu + \sigma^2 t)^2] e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}} \quad (29)$$

Tuttavia, usando la funzione generatrice dei momenti centrali $\bar{M}_x(t) = e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}}$, la derivata prima è $\sigma^2 t e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}}$ e la seconda:

$$\frac{d^2 \bar{M}_x}{dt^2} = (\sigma^2 + \sigma^4 t^2) e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}} \quad (30)$$

Per $t = 0$, l'esponenziale diventa 1, quindi:

$$\left. \frac{d^2 \bar{M}_x}{dt^2} \right|_{t=0} = \sigma^2 = \text{Var}(x) \quad (31)$$

Procedendo con le derivate successive si può osservare che tutti i momenti centrali di ordine dispari sono nulli ($\mu_3 = 0$, ecc.), il che conferma la simmetria della distribuzione.

In particolare, per la normale standard $N(0, 1)$, si ha:

$$M_x(t) = \bar{M}_x(t) = e^{\frac{t^2}{2}} \quad (32)$$

6.3.1 Parte di Bressan: Confronto istogramma/gaussiana

Date 100 misure che cadono in k intervalli di valore centrale x^k e larghezza Δx , ci chiediamo quale sia la funzione di distribuzione che mi definisca la probabilità che un certo dato cada in un certo intervallo (successo), questa è la **funzione di distribuzione binomiale**:

Sapendo che la probabilità per un intervallo k è: $P_k = \binom{n}{l} p^l (1-p)^{n-l}$, dove p è la probabilità di successo e l il numero di successi, so che $E[l] = np$ e $\sigma^2 = np(1-p)$.

Considerando ora una distribuzione di tipo Gaussiano la funzione che la descrive è la classica e la probabilità che un certo valore cada in un intervallo è:

$$P_k = \int_{x_i - \frac{\Delta x}{2}}^{x_i + \frac{\Delta x}{2}} f(x, \hat{\mu}, \sigma^2) dx \simeq f(\bar{x}_k) \Delta x.$$

da cui ottengo il numero di eventi atteso all'interno dell'intervallo n_k e per ogni intervallo ho un certo σ , per ognuno di questi intervalli posso fare un confronto per verificare la compatibilità

$$|n_k^s - n_k^m| \leq 3\sigma_k$$

dove m sta per eventi misurati ed s per eventi attesi, avremo quindi un grafico con un valore atteso di eventi con barra di errore di larghezza σ , dunque in un grafico mi aspetto che:

- il 68% deve toccare con le barre di errore il valore di aspettazione
- il 27% si trova a 2σ
- il 5% si trova a 3σ

La deviazione standard della binomiale è circa $\sqrt{n_k^m}$ se $n_{tot} \gg n_k^c$, che in realtà è un approssimazione che va bene quando $n_k^c > 5$

6.4 Variabili Aleatorie e Combinazioni Lineari

Si può dimostrare un importante teorema: una combinazione lineare di variabili casuali normali e statisticamente indipendenti è anch'essa distribuita secondo una legge normale. Per la dimostrazione utilizziamo la funzione generatrice dei momenti. Supponiamo di avere $X_1, X_2, \dots, X_M$ variabili aleatorie indipendenti, ognuna descritta da una gaussiana $N_i(\mu_i, \sigma_i^2)$. Una loro combinazione lineare può essere scritta come:

$$S = \sum_{i=1}^k a_i x_i \quad (33)$$

dove a_i sono i coefficienti scalari. Definendo $y_i = a_i x_i$, vogliamo dimostrare che S ha una densità di probabilità gaussiana. La funzione generatrice di momenti per ogni x_i è:

$$M_{x_i}(t) = \exp \left(\mu_i t + \frac{1}{2} \sigma_i^2 t^2 \right) \quad (34)$$

Sappiamo che per la somma di variabili indipendenti $z = \sum x_i$ vale la proprietà:

$$M_z(t) = \prod_i M_{x_i}(t) \quad (35)$$

Inoltre, per il prodotto di una variabile per una costante $y = ax$, vale:

$$M_y(t) = E[e^{ty}] = E[e^{tax}] = M_x(at) \quad (36)$$

Applicando queste proprietà alla nostra somma $S = \sum_i y_i$ (dove $y_i = a_i x_i$), otteniamo:

$$M_s(t) = \prod_i M_{y_i}(t) = \prod_i M_{x_i}(a_i t) \quad (37)$$

Sostituendo la forma funzionale della gaussiana:

$$M_s(t) = \prod_i \left[\exp \left(\mu_i(a_i t) + \frac{1}{2} \sigma_i^2 (a_i t)^2 \right) \right] \quad (38)$$

Utilizzando la proprietà degli esponenziali per cui il prodotto di esponenziali è l'esponenziale della somma degli esponenti:

$$M_s(t) = \exp \left[\left(\sum_i \mu_i a_i \right) t + \frac{1}{2} \left(\sum_i \sigma_i^2 a_i^2 \right) t^2 \right] \quad (39)$$

Il risultato mostra che la funzione generatrice di S ha la stessa forma funzionale di una gaussiana. Dunque, una variabile dipendente linearmente da altre variabili normali indipendenti avrà anch'essa distribuzione normale, con parametri:

$$\mu_s = \sum_i \mu_i a_i \quad (40)$$

$$\sigma_s^2 = \sum_i \sigma_i^2 a_i^2 \quad (41)$$

È importante notare che la gaussiana è l'unica distribuzione a varianza finita che gode di questa proprietà (stabilità rispetto alle combinazioni lineari). Ad esempio, per la distribuzione di Poisson, la somma di variabili indipendenti $y = \sum x_i$ è ancora una Poissoniana, ma la moltiplicazione per una costante non preserva la distribuzione. Se $y = ax$, la funzione generatrice diventa:

$$M_y(t) = M_x(at) = \exp[\lambda(e^{at} - 1)] \quad (42)$$

Questa espressione corrisponde a una Poissoniana solo se $a = 1$. Il motivo per cui il "trucco" funziona per la gaussiana risiede nel fatto che l'esponente della sua $M_x(t)$ è un polinomio di secondo grado in t : la sostituzione $t \rightarrow at$ mantiene il polinomio di secondo grado, preservando così la forma della distribuzione.

7 Teorema del Limite Centrale

Lezione del 05 Marzo 2026

Il Teorema del Limite Centrale è un risultato fondamentale della statistica. Esso giustifica l'utilizzo della distribuzione gaussiana (o normale) per descrivere i risultati di misurazioni fisiche, specialmente quando queste sono affette da molteplici cause di errore indipendenti.

Teorema. Consideriamo un insieme di n variabili aleatorie **indipendenti** $\{x_1, \dots, x_n\}$. Assumiamo che ciascuna variabile x_i abbia una densità di probabilità $P_i(x)$ e che il suo valore atteso (media) $E[x_i] = \mu_i$ e la sua varianza $\text{var}(x_i) = \sigma_i^2$ **esistano e siano finiti**.

Definiamo la variabile aleatoria S come la somma delle n variabili:

$$S = \sum_{i=1}^n x_i$$

Il valore atteso e la varianza di S sono dati da (proprietà dimostrabili per variabili indipendenti):

$$E[S] = \sum_{i=1}^n \mu_i \qquad \text{var}(S) = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$$

Il teorema afferma che, per $n \rightarrow \infty$, la distribuzione di S tende a una distribuzione normale:

$$S \stackrel{n \rightarrow \infty}{\sim} \mathcal{N}\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$$

Nella pratica, l'approssimazione è spesso già accettabile per $n \geq 10$.

È possibile riformulare il teorema utilizzando la variabile standardizzata. Applicando la trasformazione $z = \frac{\text{valore} - \text{media}}{\text{dev. std}}$, otteniamo:

$$Z_n = \frac{S - \sum_{i=1}^n \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}} \stackrel{n \rightarrow \infty}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

7.1 Caso Particolare: Variabili I.I.D.

Un caso molto comune è quello in cui le variabili x_i sono **indipendenti e identicamente distribuite** (I.I.D.). In questo scenario, le ipotesi si semplificano:

- Tutte le variabili hanno la stessa distribuzione: $P_i(x) = P(x)$;
- Stessa media: $\mu_i = \mu$;
- Stessa deviazione standard: $\sigma_i = \sigma$.

Di conseguenza, i parametri della somma S diventano:

- $E[S] = \sum_{i=1}^n \mu = n\mu$

- $\text{var}(S) = \sum_{i=1}^n \sigma^2 = n\sigma^2$

La variabile standardizzata assume quindi la forma:

$$Z_n = \frac{S - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} = \frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \quad (43)$$

Dividendo numeratore e denominatore per n , possiamo esprimere il risultato in termini della **media campionaria** $\bar{x} = \frac{S}{n} = \frac{\sum x_i}{n}$:

$$Z_n = \frac{\frac{S - n\mu}{n}}{\frac{\sigma\sqrt{n}}{n}} = \frac{\frac{S}{n} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad (44)$$

Questo implica che, per $n \rightarrow \infty$:

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (45)$$

Ovvero, la media campionaria $\bar{x}$ tende a distribuirsi secondo una normale con media μ e varianza ridotta:

$$\bar{x} \stackrel{n \rightarrow \infty}{\sim} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Per tornare alla variabile non standardizzata, invertiamo la relazione:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \implies \bar{x} = \mu + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

7.2 Dimostrazione (tramite Funzione Generatrice dei Momenti)

Dimostriamo il teorema nel caso I.I.D., ovvero proviamo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Per semplificare i calcoli, partiamo dalle variabili standardizzate delle singole x_i . Definiamo:

$$y_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

Analizziamo le proprietà di y_i :

- Valore atteso:

$$E[y_i] = E\left[\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right] = \frac{1}{\sigma}(E[x_i] - \mu) = \frac{1}{\sigma}(\mu - \mu) = 0$$

- Varianza:

$$\text{var}(y_i) = \text{var}\left(\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} \text{var}(x_i) = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$$

(Nota: abbiamo usato le proprietà $E[x - c] = E[x] - c$ e $\text{var}(a(x + c)) = a^2 E[(x + c)^2]$).

Definiamo ora la variabile somma standardizzata Z :

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{\sqrt{n}}$$

Si noti che questa espressione è equivalente a $\frac{S-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$.

Calcoliamo la **Funzione Generatrice dei Momenti** (MGF) di Z , indicata con $M_Z(t)$. Poiché le y_i sono indipendenti, la MGF della somma è il prodotto delle MGF. Inoltre, ricordando che $M_{aX}(t) = M_X(at)$, otteniamo:

$$M_Z(t) = \prod_{i=1}^n M_{y_i}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \quad (46)$$

Essendo le y_i identicamente distribuite, tutte le M_{y_i} sono uguali a una generica M_y :

$$M_Z(t) = \left[M_y\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \right]^n \quad (47)$$

Sviluppiamo $M_y(k) = E[e^{ky}]$ in serie di Taylor attorno a $k = 0$, ponendo $k = t/\sqrt{n}$:

$$e^{ky} = 1 + ky + \frac{k^2 y^2}{2} + \dots \implies e^{ty/\sqrt{n}} = 1 + \frac{ty}{\sqrt{n}} + \frac{t^2 y^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (48)$$

Passando ai valori attesi e ricordando che $E[y] = 0$ e $E[y^2] = \text{var}(y) + E[y]^2 = 1$:

$$E\left[e^{ty/\sqrt{n}}\right] = 1 + \frac{t}{\sqrt{n}} \underbrace{E[y]}_0 + \frac{t^2}{2n} \underbrace{E[y^2]}_1 + \dots \simeq 1 + \frac{t^2}{2n} \quad (49)$$

Sostituendo questo risultato nella formula di $M_Z(t)$:

$$M_Z(t) \simeq \left(1 + \frac{t^2}{2n}\right)^n \quad (50)$$

Calcoliamo il limite per $n \rightarrow \infty$ sfruttando il limite notevole $(1 + \frac{a}{n})^n \rightarrow e^a$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_Z(t) = e^{t^2/2} \quad (51)$$

La funzione $e^{t^2/2}$ è esattamente la funzione generatrice dei momenti della normale standard $\mathcal{N}(0,1)$. Per il teorema di unicità delle funzioni generatrici, concludiamo che Z converge in distribuzione alla normale standard.

7.3 Implicazioni del Teorema nell'Analisi Dati

Il teorema ha implicazioni cruciali: ci assicura che l'effetto cumulativo di molte piccole perturbazioni indipendenti produce una distribuzione gaussiana, indipendentemente dalla forma della distribuzione di partenza.

Nelle misure fisiche, se ripetiamo una misura n volte, la media aritmetica $\bar{x}$ tende a distribuirsi come $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$. Questo significa che l'incertezza associata alla *media* (deviazione standard della media) è:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (52)$$

dove σ è la deviazione standard della singola misura.

In un esperimento reale, non conosciamo il vero σ , ma lo stimiamo con la deviazione standard campionaria s :

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Il risultato finale di n misure ripetute viene quindi riportato come:

$$\text{Risultato} = \bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (53)$$

Questo intervallo ha un preciso significato probabilistico (intervalli di confidenza):

- $\bar{x} \pm 1\sigma_{\bar{x}}$ copre il 68.3% di probabilità;
- $\bar{x} \pm 2\sigma_{\bar{x}}$ copre il 95.5% di probabilità;
- $\bar{x} \pm 3\sigma_{\bar{x}}$ copre il 99.7% di probabilità.

7.4 Generazione di Numeri Casuali Normali

Una delle applicazioni informatiche del teorema è la generazione di numeri pseudo-casuali con distribuzione normale a partire da un generatore uniforme (disponibile in tutti i linguaggi di programmazione).

Consideriamo n variabili $\{u_1, \dots, u_n\}$ con distribuzione uniforme in $[0, 1]$. Per la distribuzione uniforme:

- Densità: $P(u) = 1$ per $u \in [0, 1]$, 0 altrimenti.
- Media: $E[u] = \int_0^1 u \, du = \frac{1}{2}$.
- Secondo momento: $E[u^2] = \int_0^1 u^2 \, du = \frac{1}{3}$.
- Varianza: $\text{var}(u) = E[u^2] - E[u]^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

Applicando il Teorema del Limite Centrale alla somma, la variabile standardizzata è:

$$Z = \frac{\sum u_i - nE[u]}{\sqrt{n\text{var}(u)}} = \frac{\sum u_i - n/2}{\sqrt{n/12}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (54)$$

Per semplificare il calcolo, si sceglie spesso $n = 12$. In questo caso il denominatore diventa $\sqrt{12/12} = 1$ e la formula si riduce a:

$$Z \approx \sum_{i=1}^{12} u_i - 6 \quad (55)$$

Quindi: si sommano 12 numeri uniformi e si sottrae 6. *Nota:* Questo metodo è veloce ma approssimato; le "code" della distribuzione (oltre 6σ) sono troncate, poiché la somma di variabili limitate è comunque limitata.

7.5 La Trasformazione di Box-Muller

Un metodo matematicamente esatto per generare numeri normali da numeri uniformi è la **trasformazione di Box-Muller**.

Questo metodo si basa sul cambiamento di variabili per le densità di probabilità. Se abbiamo variabili casuali x legate a variabili y da una trasformazione invertibile, la densità di probabilità congiunta si trasforma secondo:

$$P_y(y_1, \dots, y_n) = P_x(x_1, \dots, x_n) \cdot |J| \quad (56)$$

dove $|J|$ è il valore assoluto del determinante Jacobiano della trasformazione inversa (da y a x).

Siano x_1, x_2 due variabili indipendenti uniformi in $[0, 1]$. Definiamo due nuove variabili y_1, y_2 :

$$y_1 = \sqrt{-2 \ln x_1} \cos(2\pi x_2) \quad (57)$$

$$y_2 = \sqrt{-2 \ln x_1} \sin(2\pi x_2) \quad (58)$$

Per dimostrare che y_1 e y_2 sono gaussiane standard indipendenti, invertiamo il sistema per esprimere x in funzione di y :

- Dal rapporto $y_2/y_1 = \tan(2\pi x_2)$ otteniamo $x_2 = \frac{1}{2\pi} \arctan(y_2/y_1)$.
- Dalla somma dei quadrati $y_1^2 + y_2^2 = -2 \ln x_1$ otteniamo $x_1 = \exp \left[-\frac{1}{2}(y_1^2 + y_2^2) \right]$.

La densità congiunta delle variabili uniformi è $P_x(x_1, x_2) = 1$ (nel quadrato unitario). Calcoliamo lo Jacobiano $J = \det \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)}$:

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

Calcolo delle derivate parziali:

- $\frac{\partial x_1}{\partial y_1} = -y_1 e^{-\frac{1}{2}(y_1^2 + y_2^2)}$
- $\frac{\partial x_1}{\partial y_2} = -y_2 e^{-\frac{1}{2}(y_1^2 + y_2^2)}$
- $\frac{\partial x_2}{\partial y_1} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{1 + (y_2/y_1)^2} \left(-\frac{y_2}{y_1^2} \right) = -\frac{1}{2\pi} \frac{y_2}{y_1^2 + y_2^2}$
- $\frac{\partial x_2}{\partial y_2} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{1 + (y_2/y_1)^2} \left(\frac{1}{y_1} \right) = \frac{1}{2\pi} \frac{y_1}{y_1^2 + y_2^2}$

Calcolando il determinante:

$$\begin{aligned} J &= (-y_1 e^{-\dots}) \left(\frac{y_1}{2\pi(y_1^2 + y_2^2)} \right) - (-y_2 e^{-\dots}) \left(-\frac{y_2}{2\pi(y_1^2 + y_2^2)} \right) \\ &= -\frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(y_1^2 + y_2^2)} \left(\frac{y_1^2 + y_2^2}{y_1^2 + y_2^2} \right) \\ &= -\frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(y_1^2 + y_2^2)} \end{aligned}$$

Prendendo il valore assoluto per la densità di probabilità:

$$P_y(y_1, y_2) = 1 \cdot |J| = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{y_1^2 + y_2^2}{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y_1^2/2} \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y_2^2/2} \right) \quad (59)$$

Il risultato è il prodotto di due densità normali standard. Quindi y_1 e y_2 sono variabili $\mathcal{N}(0, 1)$ indipendenti.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

def gaussian_pdf(x, mu=0, sigma=1):
    return (1 / (sigma * np.sqrt(2 * np.pi))) * np.exp(-((x - mu) ** 2) / (2 * sigma ** 2))

# definisco una funzione che dato un array, costruisce l'istogramma e sovrappone una
# normale standard
def plot_histo_gauss(x, titolo):
    # Parametri richiesti
    # x: array di cui fare l'istogramma
    # titolo: stringa contenente il titolo dell'istogramma

    h, bins, _ = plt.hist(x, range=(-4,4), bins=80, alpha=0.6, label="istogramma")
    delta_x = bins[1] - bins[0]
    centri = (bins[:-1] + bins[1:]) / 2
    # aggiungo una barra di errore seguendo l'approssimazione di Poisson
    plt.errorbar(centri, h, np.sqrt(h), delta_x/2, c='tab:grey', lw=1, fmt='none', label="errore statistico")
    plt.plot(centri, gaussian_pdf(centri)*delta_x*len(x), label='normale standard')
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("Conteggi")
    plt.title(titolo)
    plt.legend()
    plt.show()

n = 12
m = 10000

# lista dove salvare i numeri generati
lista_gauss = []
for i in range (m):
    # genero n numeri random tra 0 e 1
    u = np.random.uniform(0, 1, n)

    # li sommo e sottraggo 6
    x = np.sum(u) - 6

    # aggiungo il numero ottenuto alla lista
    lista_gauss.append(x)

# ora faccio un istogramma degli elementi della lista e sovrappongo una normale
# standard
plot_histo_gauss(lista_gauss, "Generazione da teorema del limite centrale")
```

```
# -- Caso della formula di Box-Muller --

# genero m numeri random e ottengo da essi due array x1 e x2 contenenti rispettivamente
# la prima e la seconda meta' dell'array
x = np.random.uniform(0,1,m)
x1 = x[0:int(m/2)]
x2 = x[int(m/2):m]

print(f"elementi di x {len(x)}, elementi di x1 {len(x1)}, elementi di x2 {len(x2)}")
print(x1[-1],x2[0])

# uso la trasformazione di Box-Muller per ottenere valori distribuiti secondo una
# normale standard
y1 = np.sqrt(-2*np.log(x1))*np.cos(2*np.pi*x2)
y2 = np.sqrt(-2*np.log(x1))*np.sin(2*np.pi*x2)
y = np.concatenate((y1,y2))
print(f"elementi di y {len(y)}, elementi di y1 {len(y1)}, elementi di y2 {len(y2)}")

plot_histo_gauss(y, "Generazione da Box-Muller")
```

Listing 8: Generazione numeri casuali: Teorema del Limite Centrale e Box-Muller




Figura 5: A sinistra: generazione di una normale standard tramite il Teorema del Limite Centrale. A destra: generazione tramite il metodo di Box-Muller. Entrambi si sovrappongono perfettamente alla curva teorica.

8 Distribuzione di Cauchy e Legge dei grandi numeri

Lezione del 16 Marzo 2026

8.1 Distribuzione di Cauchy come rapporto di due normali standard

Supponiamo che x_1, x_2 sono due variabili aleatorie indipendenti normali standard. La loro densità di probabilità congiunta è

$$P_x(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} \exp \left[-(x_1^2 + x_2^2)/2 \right]$$

Quello che ci interessa è studiare la variabile

$$y_1 = \frac{x_1}{x_2}$$

Per comodità ci conviene introdurre la variabile $y_2 = x_2$, in modo che la trasformazione diventi:

$$\begin{cases} y_1 = x_1/x_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases} \quad \text{e viceversa} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

Così facendo lo jacobiano della trasformazione è semplicemente

$$\frac{\partial x_1}{\partial y_1} \frac{\partial x_2}{\partial y_2} - \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \frac{\partial x_2}{\partial y_1} = y_2 - y_1 \cdot 0 = y_2$$

Si ha quindi che

$$P_y(y_1, y_2) = \frac{1}{2\pi} \exp \left[-(x_1^2 + x_2^2)/2 \right] |y_2|$$

Ora scrivo l'esponente in termini di y_1 e y_2 e ho

$$-(x_1^2 + x_2^2)/2 = -\frac{(y_1 y_2)^2 + y_2^2}{2} = -\frac{y_2^2(y_1^2 + 1)}{2}$$

quindi sostituendo ho

$$P_y(y_1, y_2) = \frac{|y_2|}{2\pi} \exp \left[-\frac{y_2^2(y_1^2 + 1)}{2} \right]$$

Ora a me serve calcolare $P_y(y_1)$ e per farlo marginalizzo rispetto a y_2 cioè integro $P_y(y_1, y_2)$ rispetto a y_2

$$P_y(y_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|y_2|}{2\pi} \exp \left[-\frac{y_2^2(y_1^2 + 1)}{2} \right] dy_2$$

Essendo la funzione integranda pari in y_2 avremo

$$P_y(y_1) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{y_2}{2\pi} \exp \left[-\frac{y_2^2(y_1^2 + 1)}{2} \right] dy_2$$

L'integrale che resta è del tipo $\int_0^\infty x e^{-ax^2} dx$ con $a = \frac{y_1^2 + 1}{2}$. Questo integrale si può risolvere facendo il cambiamento di variabile $u = ax^2 \implies du = 2ax dx \implies x dx = \frac{1}{2a} du$

$$\int_0^\infty x e^{-ax^2} dx = \int_0^\infty \frac{1}{2a} du e^{-u} = \frac{1}{2a} \int_0^\infty e^{-u} du = \frac{1}{2a} [-e^{-u}]_0^\infty = \frac{1}{2a}$$

Sostituendo si ha quindi che

$$P_y(y_1) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + y_1^2}$$

La distribuzione di probabilità trovata è la funzione di Cauchy standard, il che dimostra che il rapporto fra due variabili normali segue la distribuzione di Cauchy.

Questa distribuzione, anche conosciuta come distribuzione di Breit-Wigner è molto usata in fisica delle particelle in cui la forma di solito è quella che si ottiene con un cambiamento di variabili del tipo $y_1 = \frac{x-x_0}{\Gamma} \implies x = \Gamma y_1 + x_0$

$$P_X(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-x_0}{\Gamma}\right)^2} \cdot \left| \frac{dy_1}{dx} \right| = \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma^2}{\Gamma^2 + (x-x_0)^2} \cdot \frac{1}{\Gamma} = \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma}{\Gamma^2 + (x-x_0)^2}$$

Di solito questa funzione viene usata perché è una buona approssimazione per descrivere la massa invariante delle risonanze in fisica delle particelle o le intensità delle righe spettrali di emissione o assorbimento negli atomi. Nella formula x_0 rappresenta la locazione delle risonanze e Γ ha a che fare con la sua larghezza.


La caratteristica di questa distribuzione è che, anche se è simmetrica rispetto a x_0 (oppure 0 nella formulazione di Cauchy) si vede che gli integrali

$$\int_{-\infty}^0 xP(x)dx \quad \text{e} \quad \int_0^{+\infty} xP(x)dx$$

sono individualmente divergenti, il primo fa $-\infty$ e il secondo $+\infty$ e quindi tecnicamente il valore di aspettazione non è definito.

Intuitivamente il problema è che la distribuzione di Cauchy ha code così alte che la media non riesce a stabilizzarsi a un valore preciso. Quando si calcola la media di n eventi, al crescere di n , si vede che all'inizio sembra che la media si stabilizzi a zero poi si iniziano a presentare dei salti che spostano la media. Questo perché visto che i valori nelle code della distribuzione non sono tanto rari, ne viene aggiunto uno alla somma con l'effetto di spostare la media.

Analogamente la varianza e tutti i momenti di ordine superiore sono divergenti.



8.2 Legge dei grandi numeri

La legge dei grandi numeri è un altro dei teoremi fondamentali della statistica che serve a capire perché ha senso usare la media aritmetica. In sostanza dice che se ripetiamo un esperimento molte volte, la media dei risultati ottenuti tende al valore di aspettazione della densità di probabilità alla base del fenomeno.

In realtà esistono varie formulazioni, quella descritta è la legge debole dei grandi numeri.

Per formularla in maniera più formale indichiamo con il simbolo $\text{Prob}(A)$ la probabilità che si

verifichi un certo evento A . Più precisamente se X è una variabile aleatoria con densità di probabilità $P(x)$ allora

$$\text{Prob}(X > a) = \int_a^{+\infty} P(x)dx$$

Nel caso discreto cioè se X non è reale e ad ogni x_i posso associare una certa p_i allora si avrà che

$$\text{Prob}(X > a) = \sum_{x_i > a}^{+\infty} p_i$$

che si può scrivere anche $\text{Prob}(X > a) = \sum_{x_i > a} p_i$.

Matematicamente il modo in cui si formula la legge è: date n variabili aleatorie $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ indipendenti e con la stessa densità di probabilità, quindi con lo stesso valore di aspettazione $E[X_i] = E[X] = \mu$ e varianza $\text{Var}(X_i) = \text{Var}(X) = \sigma^2$ che devono esistere finite, allora $\forall \varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Prob}(|\bar{x} - \mu| \geq \varepsilon) = 0$$

cioè la probabilità che la media aritmetica di n variabili differisca dal valore di aspettazione va a zero per n che tende a infinito.

Dimostrazione

La dimostrazione richiede vari passaggi e dimostrazioni intermedie. Per semplicità consideriamo il caso di variabili discrete (si può passare al caso continuo sostituendo le sommatorie con gli integrali) e parto da una probabilità simile a quella della tesi ma non esattamente uguale cioè

$$\text{Prob}(|X - \mu| \geq \varepsilon) = \sum_{|x_i - \mu| \geq \varepsilon} p_i$$

quindi in questo caso la sommatoria è estesa solo ai valori di X_i che soddisfano $|x_i - \mu| \geq \varepsilon$ dove $\mu = E[X]$.

Per arrivare a dire qualcosa su questa probabilità usiamo la definizione di varianza nel caso discreto

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_i p_i (x_i - \mu)^2$$

dove in questo caso la sommatoria è estesa a tutti i valori di i per cui x_i esiste (tipicamente $-\infty, +\infty$). Se consideriamo solo i valori di $x_i : |x_i - \mu| \geq \varepsilon$ allora avremo un sottoinsieme di tutti i valori possibili di x_i , quindi

$$\sigma^2 \geq \sum_{|x_i - \mu| \geq \varepsilon} p_i (x_i - \mu)^2 \geq \sum_{|x_i - \mu| \geq \varepsilon} p_i \varepsilon^2$$

dove l'ultimo passaggio viene dal fatto che dato che la sommatoria vale per $|x_i - \mu| \geq \varepsilon$ varrà in particolar quando vale $|x_i - \mu| = \varepsilon$ quindi se lo sostituisco dentro la sommatoria avrò in generale qualcosa di più piccolo.

Nella sommatoria che rimane ε^2 non dipende da i e quindi si può portare fuori:

$$\sigma^2 \geq \varepsilon^2 \sum_{|x_i - \mu| \geq \varepsilon} p_i$$

Qui posso sostituire la definizione iniziale

$$\sigma^2 \geq \varepsilon^2 \text{Prob}(|X - \mu| \geq \varepsilon)$$

E quindi invertendo ho

$$\text{Prob}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Questa disuguaglianza è nota come **disuguaglianza di Chebyshev** che si può trovare in letteratura anche nella forma che si ottiene da questa ponendo $\varepsilon = K\sigma$ cioè

$$\text{Prob}(|X - \mu| \geq K\sigma) \leq \frac{1}{K^2}$$

Useremo questa disuguaglianza per dimostrare la legge dei grandi numeri, ma prima vale la pena notare le sue implicazioni in generale. Senza aver fatto nessuna assunzione sulla densità di probabilità, questa disuguaglianza dà dei limiti superiori a quanto una qualunque variabile aleatoria X si possa allontanare da μ . Per esempio per $K = 2$ si ha che $\text{Prob}(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq \frac{1}{4} = 0.25$

cioè la probabilità che $|X - \mu| \geq 2\sigma$ non può superare il 25% o al contrario almeno nel 75% dei casi si ha $|X - \mu| < 2\sigma$. Ovviamente questo è un limite inferiore e vale per qualsiasi distribuzione. Abbiamo visto che nel caso della gaussiana vale in particolare $P(|X - \mu| < 2\sigma) \sim 95\%$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math

# Parametri della gaussiana
mu = 0
sigma = 1

# Funzione densità di probabilità (PDF) della gaussiana con normale come default
def gaussian_pdf(x, mu=0, sigma=1):
    return (1 / (sigma * math.sqrt(2 * math.pi))) * np.exp(-((x - mu) ** 2) / (2 *
sigma ** 2))

# Calcolo l'integrale con il metodo numerico dei rettangoli
def integra(a, b, n=200000):
    # a partire dall'intervallo [a,b] costruisco n rettangolini tutti larghi uguali con
    base:
    base = (b - a) / n
    somma = 0.0
    # ora sommo le altezze di tutti i rettangolini
    for k in range(n):
        x_mid = a + (k + 0.5) * base
        somma += gaussian_pdf(x_mid)
    # uso la formula base*altezza per calcolare la somma delle aree di tutti i
    rettangolini
    return base * somma

print("Integrazione numerica della gaussiana standard\n")

for sigma in [1, 2, 3]:
    area = integra(-sigma, sigma)
    print(f"La probabilità che x assuma valori compresi entro {sigma} deviazioni
standard è {area:.6f}")
    print(f"Viceversa la probabilità che x>{sigma}sigma è {1-area:.6f}\n")

# Metodo alternativo: estraggo numeri casuali con densità di probabilità gaussiana,
# creo un istogramma con questi numeri e poi sommo i contenuti dei bin
```

```

# estrazione dei numeri casuali
N = 300000
campioni = np.random.normal(0, 1, N)

# creo l'istogramma senza la parte grafica al momento
bins = np.linspace(-4, 4, 81) # larghezza bin = 0.1
conteggi, bordi = np.histogram(campioni, bins=bins)

bin_width = bordi[1] - bordi[0]
centri = (bordi[:-1] + bordi[1:]) / 2

# Creo una mappa dei colori per intervalli sigma che userò successivamente per il
# grafico
for sigma, colore in zip([1,2,3], ['green','orange','purple']):
    colors = []
    area = 0
    for c, h in zip(centri, conteggi):
        if abs(c) <= sigma:
            colors.append(colore)
            area += h
        else:
            colors.append('white')

    print(f"Area tra -{sigma} sigma e {sigma} sigma = {area/N:.6f}")

# Disegno istogramma usando delle barre colorate con la mappa di prima
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.bar(centri, conteggi, width=bin_width, color=colors, alpha=0.5, label = f"
Integrale = {area/N:.4f}")

# Gaussiana teorica moltiplicata per deltax e per N
x = np.linspace(-4,4,1000)
plt.plot(x, gaussian_pdf(x)*bin_width*np.sum(conteggi), 'r', linewidth=2, label="
Gaussiana teorica")

# Linea sigma
plt.axvline(sigma, linestyle='--', color=colore, label=f"$\pm$ {sigma} sigma")
plt.axvline(-sigma, linestyle='--', color=colore)

plt.title("Istogramma con colori per intervalli  $\pm n\sigma$ ")
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("Densità di probabilità")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.margins(x=0)
plt.show()

```

Listing 9: Calcolo probabilità e plot della Gaussiana (1, 2 e 3 deviazioni standard)

Torniamo ora al caso della media $\bar{x}$ e applicando la disuguaglianza di prima avremo

$$\text{Prob}(|\bar{x} - E[\bar{x}]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{x})}{\varepsilon^2}$$




Figura 6: Visualizzazione dell'area sottesa alla gaussiana standard nell'intervallo $\pm 2\sigma$. Come previsto dalla teoria, l'area copre circa il 95.4% dei casi, un limite ben più stringente del 75% garantito dalla disuguaglianza di Chebyshev.

dove $E[\bar{x}] = E\left[\frac{\sum_i x_i}{n}\right] = \frac{1}{n} \sum_i E[x_i] = \frac{1}{n} n\mu = \mu$

mentre $\text{Var}(\bar{x}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_i x_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_i \text{Var}(x_i) = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$
Sostituendo si ha quindi

$$\text{Prob}(|\bar{x} - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Al limite per $n \rightarrow \infty$, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ per cui questo dimostra che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Prob}(|\bar{x} - \mu| \geq \varepsilon) = 0$$

$$\star \quad \text{Prob}(|X - \mu| \geq K\sigma) = 1 - \text{Prob}(|X - \mu| < K\sigma) \leq \frac{1}{K^2}$$

$$\implies \text{Prob}(|X - \mu| < K\sigma) \geq 1 - \frac{1}{K^2}$$

8.3 Cenni di Distribuzione Esponenziale

$$P_{\text{exp}}(x; \tau) = \frac{1}{\tau} e^{-x/\tau} \quad 0 \leq x \leq +\infty$$

Il valore di aspettazione e la varianza si calcolano facilmente dalla funzione generatrice dei momenti

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E[e^{tx}] = \int_0^\infty e^{tx} \frac{1}{\tau} e^{-x/\tau} dx = \frac{1}{\tau} \int_0^\infty e^{(t-1/\tau)x} dx \\ &= \frac{1}{\tau} \frac{1}{t - 1/\tau} [e^{(t-1/\tau)x}]_0^\infty = \frac{1}{t\tau - 1} [0 - 1] = \frac{1}{1 - t\tau} \end{aligned}$$

Per calcolare il valore di aspettazione la derivo:

$$\begin{aligned} M'_X(t) &= \frac{-1}{(1 - t\tau)^2} (-\tau) = \frac{\tau}{(1 - t\tau)^2} \\ M'_X(0) &= \tau = E[X] \end{aligned}$$

Calcolo la derivata seconda ($D(x^{-2}) = -2x^{-3}$)

$$M_X''(t) = -\frac{2\tau}{(1-t\tau)^3}(-\tau) = \frac{2\tau^2}{(1-t\tau)^3}$$

$$M_X''(0) = 2\tau^2 = E[X^2]$$

Ora calcolo la varianza come

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 2\tau^2 - \tau^2 = \tau^2$$

9 Processi di Poisson, Esponenziale ed Erlang

Lezione del 19 Marzo 2026

La distribuzione esponenziale descrive il tempo che intercorre tra due eventi consecutivi in un processo di Poisson.

Ricaviamola dalla **Distribuzione di Poisson**. Se un fenomeno segue la **distribuzione di Poisson**, la probabilità di osservare k eventi, dato un numero medio di eventi attesi ν , è:

$$P(k; \nu) = \frac{e^{-\nu} \nu^k}{k!} \quad (60)$$

Se definiamo λ come il numero di eventi attesi per **unità di tempo**, allora il numero medio di eventi attesi in un intervallo t è λt . La probabilità di osservare k eventi nell'intervallo t diventa:

$$P(k; \lambda t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!} \quad (61)$$

Definiamo una nuova variabile casuale T come l'intervallo di tempo che intercorre tra due eventi successivi. Affinché il tempo di attesa T sia maggiore di un certo valore t ($T > t$), non deve verificarsi alcun evento nell'intervallo $[0, t]$.

Pertanto, la probabilità che $T > t$ coincide con la probabilità di osservare zero eventi nel periodo t :

$$\text{Prob}(T > t) = P(0; \lambda t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^0}{0!} = e^{-\lambda t} \quad (62)$$

9.1 Richiami di Variabili casuali e CDF/PDF

9.1.1 Parte di Bressan: Variabili casuali e funzione di ripartizione

Dato lo spazio di eventi elementare ω una *variabile casuale* è una funzione X tale che $X(\omega) = x$ dove $x \in \mathbb{R}$, dunque una funzione che mi prende un campione casuale dal mio spazio campionario e gli associa un numero (ex: valore, altezza, ...).

Essa può essere discreta (numerabile) oppure continua, se almeno idealmente posso considerare Ω continuo.

9.1.2 Funzione di ripartizione

Data una variabile casuale X , la funzione F che fa corrispondere a un valore x la probabilità cumulativa $P(X \geq x)$ viene detta funzione di ripartizione

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \quad F_X(x) = P(X \leq x)$$

La funzione di ripartizione è definita sia per le variabili casuali discrete che per le variabili casuali continue.

Proprietà delle funzioni di ripartizioni:

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$
2. nel caso che il dominio sia $\mathbf{R}$, allora $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$
3. È una funzione monotona crescente;
4. $P(x_1 < X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$ dunque la funzione di ripartizione consente di stabilire la probabilità che la variabile casuale semplice X assuma valori compresi in intervalli di tipo $(x_1, x_2]$ dove $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, con $x_1 < x_2$. A partire da questo posso calcolare anche le altre probabilità, ad esempio:

$$P(x_1 \leq X < x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1) + P(X = x_1) - P(X = x_2)$$

5. Nel caso di una variabile casuale discreta, la funzione di ripartizione è continua a destra:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0).$$

mentre a sinistra abbiamo una discontinuità di 1° specie (o salto):

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} F_X(x) \neq F_X(x_0)$$

Questo è dovuto al fatto che la probabilità di un evento elementare è diversa da zero, quindi la funzione di ripartizione ha un salto in corrispondenza di ogni valore che può assumere la variabile casuale discreta (pensa lancio dei dati dove cambia la probabilità)

In un intervallo posso avere una **Probabilità uniforme**, ossia eventi in cui la funzione di probabilità è costante (ex nel caso dei dadi la funz. di ripartizione è a gradini)

9.1.3 Densità di probabilità

Data la variabile casuale continua $X : \Omega \rightarrow \mathbf{R}$ che associa valori dallo spazio campionario all'intervallo (a, b) , con $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, la funzione di densità di probabilità (PDF) o funzione di distribuzione di probabilità è la funzione $f_X : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^+$ che ad ogni x associa il limite per $dx \rightarrow 0$, del rapporto tra la probabilità che la variabile casuale assuma valori nell'intervallo $(x, x + dx]$ e l'ampiezza dx , ovvero sia possiamo supporre la probabilità che un certo evento cada in un intervallo.

In simboli:


$$f_X : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^+ : x \mapsto \lim_{dx \rightarrow 0} \left[\frac{P(x < X \leq x + dx)}{dx} \right] = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{F_X(x + dx) - F_X(x)}{dx}$$

Ogni evento deve essere ricondotto all'unione, negazione o intersezione di intervalli del tipo $(-\infty, x]$

Attenzione a non confondere la funzione di densità con una probabilità. Essa mi determina la densità di probabilità che la variabile casuale sia nell'intervallo dx .

Definiamo la **Funzione di distribuzione cumulativa**:

$$F(x) = \int_{x_{min}}^x f_X(t) dt$$



Proprietà della funzione densità di probabilità

- non può essere mai negativa (altrimenti avremmo una probabilità negativa per qualche X)
- condizione di normalizzazione:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$$

dunque si deve avere che: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_X(x) = 0$

- la probabilità che una variabile casuale assuma un particolare valore dell'intervallo è $P(X = x) = 0$, infatti ad un singolo valore corrisponde un intervallo con ampiezza nulla; questo mi porta a poter escludere gli estremi

9.2 Proprietà dell'Esponenziale

La **funzione di ripartizione** (o distribuzione cumulativa $F_X(x)$) indica la probabilità che una variabile x' assuma un valore minore o uguale a x :

$$F_X(x) = \text{Prob}(x' \leq x) = \int_{-\infty}^x P_X(z) dz \quad (63)$$

Dalle proprietà della probabilità, segue la normalizzazione: $\int_{-\infty}^{+\infty} P_X(x) dx = 1$.

Per la variabile tempo T , la funzione di ripartizione è:

$$F_T(t) = \text{Prob}(T \leq t) = 1 - \text{Prob}(T > t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (64)$$

La **densità di probabilità** $P_T(t)$ si ottiene derivando la funzione di ripartizione:

$$P_T(t) = \frac{d}{dt} F_T(t) = \frac{d}{dt} (1 - e^{-\lambda t}) = \lambda e^{-\lambda t} \quad (65)$$

Questa è la densità di probabilità esponenziale. Indica che i tempi di attesa brevi sono più probabili, mentre quelli lunghi sono meno probabili.

Confronto tra PDF e CDF Esponenziale ($\lambda = 1$)




Figura 7: La PDF decresce partendo da λ , mentre la CDF satura asintoticamente a 1.

Proprietà di Assenza di Memoria

Una caratteristica fondamentale è l'**assenza di memoria**: il tempo che resta da aspettare affinché un evento si verifichi è indipendente da quanto abbiamo già aspettato. Usando la probabilità condizionata $\text{Prob}(A|M) = \frac{\text{Prob}(A \cap M)}{\text{Prob}(M)}$:

- s : tempo già aspettato.
- t : tempo addizionale da aspettare.
- $A \rightarrow T > s + t$
- $M \rightarrow T > s$

$$\text{Prob}(T > s + t \mid T > s) = \frac{\text{Prob}(T > s + t)}{\text{Prob}(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t) \quad (66)$$

Parametrizzazione con τ Spesso si scrive la distribuzione utilizzando $\tau = 1/\lambda$, dove τ rappresenta il **tempo medio** tra due eventi (mentre λ è la frequenza):

$$P_{exp}(x; \tau) = \frac{1}{\tau} e^{-x/\tau} \quad \text{per } 0 \leq x \leq +\infty \quad (67)$$

9.3 Distribuzione di Erlang

La distribuzione di Erlang è una generalizzazione della distribuzione esponenziale. Mentre l'esponenziale regola il tempo tra due eventi successivi ($k = 1$), la distribuzione di Erlang regola il tempo di attesa per il **k-esimo evento**.

Sia T_k il tempo di attesa fino al k -esimo evento.

- $P_1(t; \lambda) = \lambda e^{-\lambda t}$ (Esponenziale)
- Per P_2 , supponiamo che il primo evento avvenga a x ($0 < x < t$) e il secondo nel tempo restante $t - x$:

$$P_2(t; \lambda) = \int_0^t P_1(x; \lambda) P_1(t - x; \lambda) dx = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(t-x)} dx = \lambda^2 t e^{-\lambda t} \quad (68)$$

Procedendo per induzione per P_3 :

$$P_3(t; \lambda) = \int_0^t P_2(x; \lambda) P_1(t - x; \lambda) dx = \int_0^t \lambda^2 x e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(t-x)} dx = \frac{t^2}{2} \lambda^3 e^{-\lambda t} \quad (69)$$




Figura 8: Schema temporale per il calcolo della distribuzione di Erlang P_2 .

Continuando ricorsivamente, si ottiene la densità di probabilità di Erlang:

$$P_k(t; \lambda) = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \lambda^k e^{-\lambda t} \quad (70)$$

Momenti della distribuzione:

- Valore di aspettazione: $E[t] = \frac{k}{\lambda}$
- Varianza: $Var(t) = \frac{k}{\lambda^2}$

9.3.1 Distribuzione Gamma

Cosideriamo α e β due costati maggiori di zero, allora la *Gamma distribution* è definita come:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}} \quad (71)$$

con la condizione di $0 \leq x < \infty$.

Questa risulta normalizzata in base alla condizione sulla funzione gamma:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy$$

con la condizione di $\alpha > 0$; ricordiamo per correttezza la proprietà della funzione Gamma:

$$\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$$

Nel caso in cui $\alpha \in \mathbb{N}$, vado a ritrovare la *distribuzione di Erlang*(69); nel caso in cui si ha $\beta = 2$ e $\alpha = \frac{\nu}{2}$, con $\nu \in \mathbb{N}$, allora questa è la χ^2 *distribution*.

10 Metodi Monte Carlo

I metodi Monte Carlo sono algoritmi computazionali che sfruttano la generazione di numeri casuali per risolvere problemi matematici complessi. Questo campionamento casuale ha un certo numero di applicazioni, ma una delle più utili è che consente di calcolare in modo pratico integrali altrimenti impossibili.




Figura 9: Al variare del parametro α trovo diverse pdf, il fattore β rappresenta un riscalamento

Esempio Per calcolare l'area di una superficie irregolare:

1. Si lancia un numero N di chicchi di riso a caso su un foglio di area nota.
2. Si conta quanti chicchi cadono dentro l'area cercata (N_{in}).
3. Il rapporto N_{in}/N fornisce una stima dell'area, che diventa più accurata al crescere di N .

10.1 Metodo Accept-Reject

È un metodo generale per generare variabili continue secondo una distribuzione $f(x)$ non standard. Dati un intervallo $[x_{min}, x_{max}]$ e un valore massimo della funzione f_{max} :

1. Si genera x_i con distribuzione uniforme tra x_{min} e x_{max} : $x_i = x_{min} + r_1(x_{max} - x_{min})$.
2. Si genera y_i con distribuzione uniforme tra 0 e f_{max} .
3. Se $y_i < f(x_i)$, si **accetta** il valore x_i ; altrimenti lo si rifiuta.

L'efficienza η è il rapporto tra l'area sotto $f(x)$ e l'area del rettangolo:

$$\eta = \frac{1}{(x_{max} - x_{min})f_{max}} \int_{x_{min}}^{x_{max}} f(x) dx \quad (72)$$

Esempio: Algoritmo Hit-or-Miss in Python Il seguente script implementa il metodo Accept-Reject per campionare una distribuzione di probabilità legata allo scattering angolare (distribuzione di Cowen): $f(x) = \frac{3}{8}(1+x^2)$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def mia_funz(x):
    return 3/8*(1+x**2)
```



```

# Parametri del dominio e numero di punti
xmin, xmax = -1, 1
fmax = 3/4
N = 5000

accepted_x, accepted_y = [], []
rejected_x, rejected_y = [], []


# Ciclo Accept-Reject
while len(accepted_x) < N:
    x = np.random.uniform(xmin, xmax)
    y = np.random.uniform(0, fmax)

    if y <= mia_funz(x):
        accepted_x.append(x)
        accepted_y.append(y)
    else:
        rejected_x.append(x)
        rejected_y.append(y)

# Visualizzazione dei risultati
plt.figure(figsize=(8,6))
x_plot = np.linspace(xmin, xmax, 400)
plt.plot(x_plot, mia_funz(x_plot), label='f(x) teorica', lw=3)
plt.scatter(accepted_x, accepted_y, color='tab:green', s=4, label='Accettati')
plt.scatter(rejected_x, rejected_y, color='tab:red', s=4, label='Rifiutati')
plt.legend()
plt.show()

```

Listing 10: Implementazione del metodo Accept-Reject

Figura 10: Andamento della funzione teorica $f(x) = \frac{3}{8}(1 + x^2)$ nell'intervallo $[-1, 1]$.




Figura 11: Visualizzazione del metodo Hit-or-Miss: i punti in verde sono accettati perché cadono sotto la curva, quelli in rosso sono rifiutati.




Figura 12: Validazione del metodo: l'istogramma dei punti accettati segue fedelmente la curva teorica attesa (punti arancioni).

10.2 Metodo della Funzione di Ripartizione (Inversione)

Un metodo più efficiente dell'Accept-Reject si basa sull'inversione della CDF. Dato che $F(x) = \int_{-\infty}^x P(z) dz$ ha valori compresi tra 0 e 1, se generiamo un numero casuale $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$, allora:

$$x = F^{-1}(u) \quad (73)$$

Il valore x così ottenuto sarà distribuito secondo la $P(x)$ originale.

Esempio per la distribuzione esponenziale:

- $P(x) = \frac{1}{\tau} \exp\left(-\frac{x}{\tau}\right)$
- $F(x) = 1 - \exp\left(-\frac{x}{\tau}\right) = u$
- Invertendo: $x = -\tau \ln(1 - u)$

Esempio: Integrazione Numerica e CDF Questo script mostra come calcolare numericamente la funzione di ripartizione (CDF) partendo dalla densità di probabilità (PDF) e come visualizzare il legame tra le due.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math

# Funzione densita di probabilita (PDF) Gaussiana
def gaussian_pdf(x, mu=0, sigma=1):
    return (1 / (sigma * math.sqrt(2 * math.pi))) * np.exp(-((x - mu) ** 2) / (2 *
sigma ** 2))

# Integrazione numerica con il metodo dei rettangoli
def integra(a, b, n=200000):
    base = (b - a) / n
    somma = 0.0
    for k in range(n):
        x_mid = a + (k + 0.5) * base
        somma += gaussian_pdf(x_mid)
    return base * somma

# Esempio probabilita entro sigma
for s in [1, 2, 3]:
    area = integra(-s, s)
    print(f"Probabilita entro {s} sigma: {area:.6f}")

# Plot PDF e CDF per una distribuzione esponenziale
tau = 5
x_axis = np.arange(0, 30, 0.1)
func_exp = np.exp(-x_axis/tau)/tau
cum_exp = 1 - np.exp(-x_axis/tau)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
axes[0].plot(x_axis, func_exp, label='PDF Esponenziale')
axes[1].plot(x_axis, cum_exp, label='CDF Esponenziale', color='orange')
plt.show()
```

Listing 11: Integrazione numerica della Gaussiana e PDF/CDF Esponenziale




Figura 13: Densità di probabilità (sinistra) e Funzione di ripartizione (destra) per la distribuzione esponenziale generata dal codice Python.




Figura 14: Analisi della distribuzione normale: PDF (sinistra) e CDF (destra). Le linee tratteggiate indicano i valori corrispondenti a $\pm 1\sigma$.

11 Variabili Casuali bidimensionali

Lezione del 23/03/2026

11.1 Distribuzioni congiunte, marginali e condizionate

Abbiamo già accennato ad alcune proprietà delle distribuzioni di più variabili, adesso concentriamoci sul caso più semplice di distribuzione di più variabili, ovvero quando le variabili sono due. Supponiamo allora di avere una coppia di variabili aleatorie X e Y (caso di un esperimento in cui si misurano due quantità).

La **densità di probabilità congiunta** $P(x, y)$ indica la probabilità che una certa realizzazione X di x e una certa realizzazione Y di y abbiano valori, rispettivamente, in $(x, x + dx)$ e $(y, y + dy)$ per $dx \rightarrow 0$ e $dy \rightarrow 0$.

Come nel caso unidimensionale, si può usare $P(x, y)$ per definire altre funzioni, per esempio la **funzione di distribuzione congiunta**:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^y dv P(u, v) = \text{Prob}(X \leq x, Y \leq y) \quad (74)$$

che indica la probabilità di ottenere valori delle due variabili non superiori a quantità prefissate x, y . A partire dalla $F(x, y)$ si può scrivere la condizione di normalizzazione come $F(+\infty, +\infty) = 1$, cioè:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy P(x, y) = 1 \quad (75)$$

A partire da $P(x, y)$ si può calcolare la densità di probabilità per una delle due variabili *qualunque valore abbia l'altra*, cioè le funzioni di **distribuzioni marginali**:

$$P_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) dy \quad \text{e} \quad P_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) dx \quad (76)$$

Altre distribuzioni che si definiscono nel caso di più variabili sono le **funzioni di distribuzione condizionate**, che rappresentano la densità di probabilità dei valori di una variabile fissato il valore dell'altra, che indicheremo con $\prod(x|y)$ e $\prod(y|x)$. La cui espressione si può ricavare dal calcolo:

$$P(x, y) dx dy = P_X(x) dx \cdot \prod(y|x) dy = P_Y(y) dy \cdot \prod(x|y) dx \quad (77)$$

Si ha quindi:

$$\prod(y|x) = \frac{P(x, y)}{P_X(x)} \quad \text{e} \quad \prod(x|y) = \frac{P(x, y)}{P_Y(y)} \quad (78)$$

Nel caso in cui X e Y siano **indipendenti**, allora aver fissato il valore di una variabile non dovrebbe alterare la distribuzione dell'altra, cioè ci aspettiamo che sia:

$$\prod(x|y) = P_X(x) \quad \text{e} \quad \prod(y|x) = P_Y(y) \quad (79)$$

Se sostituiamo in una delle equazioni precedenti, per esempio in $\prod(y|x) = P(x, y)/P_X(x)$, abbiamo:

$$P_Y(y) = \frac{P(x, y)}{P_X(x)} \implies P(x, y) = P_X(x)P_Y(y) \quad (80)$$

11.2 Momenti: Matrice delle Covarianze e Combinazioni Lineari

Come nel caso unidimensionale si può calcolare il valore di aspettazione, però stavolta per generalizzare, considero una qualunque funzione di x e y , $f(x, y)$, e definisco il suo **valore di aspettazione** come:

$$\mathbb{E}[f(x, y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy f(x, y) P(x, y) \quad (81)$$

A partire da ciò posso definire i **momenti rispetto all'origine** come:

$$\mu_{mn} = \mathbb{E}[X^m Y^n] \quad (82)$$

per cui:

$$\begin{aligned} \mu_{00} &= \mathbb{E}[1] = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy P(x, y) = 1 \\ \mu_{10} &= \mathbb{E}[X] \\ \mu_{01} &= \mathbb{E}[Y] \end{aligned}$$

Analogamente è possibile definire i **momenti rispetto al valore di aspettazione** di X e Y (momenti centrali) come:

$$\bar{\mu}_{mn} = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^m (Y - \mathbb{E}[Y])^n] \quad (83)$$

dove i più notevoli sono:

$$\begin{aligned} \bar{\mu}_{20} &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \text{Var}(X) \\ \bar{\mu}_{02} &= \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y])^2] = \text{Var}(Y) \\ \bar{\mu}_{11} &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

Quest'ultima quantità si chiama **covarianza** ed è un parametro importante nel caso di più variabili perché *indica come sono correlate fra loro le variabili*. Infatti si può dimostrare che $\text{Cov}(X, Y) = 0$ se X e Y sono indipendenti l'una dall'altra.

Dimostrazione nel caso discreto

Per dimostrarlo è conveniente trovare un altro modo di scrivere la covarianza che si ricava più facilmente assumendo il caso discreto. Consideriamo il caso di 2 variabili discrete X e Y ; il valore di aspettazione di una determinata funzione è dato da:

$$\mathbb{E}[f(x, y)] = \sum_{i,j} P_{X,Y}(x_i, y_j) f(x_i, y_j)$$

dunque la covarianza è descrivibile da:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \text{caso discreto} \\ &= \sum_{i,j} P_{ij} (x_i - \mathbb{E}[X])(y_j - \mathbb{E}[Y]) = \quad (\text{svolgo il prodotto}) \\ &= \sum_{i,j} P_{ij} x_i y_j - \sum_{i,j} P_{ij} x_i \mathbb{E}[Y] - \sum_{i,j} P_{ij} y_j \mathbb{E}[X] + \sum_{i,j} P_{ij} \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] \end{aligned}$$

Riconosciamo i vari termini:

- $\sum_{i,j} P_{ij} x_i y_j = \text{valore di aspettazione del prodotto } XY = \mathbb{E}[XY]$
- $\sum_{i,j} P_{ij} x_i = \mathbb{E}[X]$
- $\sum_{i,j} P_{ij} y_j = \mathbb{E}[Y]$
- $\sum_{i,j} P_{ij} \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] \sum_{i,j} P_{ij} = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] \cdot 1 = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$

Quindi mettendo tutto insieme:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] - \mathbb{E}[Y] \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] \\ &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] \end{aligned} \quad (84)$$

Questa formula vale in generale, ma nel caso in cui le variabili siano indipendenti allora nella sommatoria il termine P_{ij} si può scrivere come prodotto di un termine che dipende solo da i (che indico con $P_{X,i}$) e un termine che dipende solo da j (che indico con $P_{Y,j}$), in analogia a $P(x, y) = P_X(x)P_Y(y)$. Quindi:

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{i,j} P_{ij} x_i y_j = \sum_{i,j} P_{X,i} x_i P_{Y,j} y_j = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$$

Di conseguenza, in questo caso, $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Matrice delle covarianze (e combinazioni lineari di variabili)

Quando si lavora con più variabili si costruisce di solito la matrice delle covarianze che serve a semplificare la notazione. Il tipico esempio che fa capire da dove salta fuori è il calcolo del valore di aspettazione e varianza per una nuova variabile ottenuta come combinazione lineare di altre variabili.

Il caso più semplice è quello di $Z = aX + bY$, dove a e b sono degli scalari e X e Y sono due variabili aleatorie che per semplicità supponiamo abbiano $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 0$. Il valore di aspettazione di Z vale:

$$\mathbb{E}[Z] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] = 0$$

La varianza di Z vale:

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= \mathbb{E}[(Z - \mathbb{E}[Z])^2] = \mathbb{E}[Z^2] = \mathbb{E}[(aX + bY)^2] = \\ &= \mathbb{E}[a^2 X^2] + \mathbb{E}[b^2 Y^2] + \mathbb{E}[2abXY] = \\ &= a^2 \mathbb{E}[X^2] + b^2 \mathbb{E}[Y^2] + 2ab \mathbb{E}[XY] \end{aligned}$$

il che si può scrivere in funzione delle varianze e della covarianza dato che $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 0$, cioè:

$$\boxed{\text{Var}(Z) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)} \quad (85)$$

Il risultato sulla varianza si può generalizzare al caso in cui $\mathbb{E}[X] \neq 0$ e $\mathbb{E}[Y] \neq 0$ perché basta fare il cambiamento di variabili $X' = X - \mathbb{E}[X]$ e $Y' = Y - \mathbb{E}[Y]$ che evidentemente hanno $\mathbb{E}[X'] = 0$ e $\mathbb{E}[Y'] = 0$. Inoltre:

$$\text{Var}(X') = \text{Var}(X - \mathbb{E}[X]) = \text{Var}(X)$$

(aggiungere o sottrarre una costante a una variabile non altera la varianza). Analogamente $\text{Var}(Y') = \text{Var}(Y)$, e infine si ha che:

$$\text{Cov}(X', Y') = \mathbb{E}[(X' - \mathbb{E}[X'])(Y' - \mathbb{E}[Y'])] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \text{Cov}(X, Y)$$

Quindi anche se le variabili non hanno valore di aspettazione nullo vale la stessa formula per $\text{Var}(Z)$.

Formulazione Matriciale

Risulta utile esprimere questo risultato sotto forma di moltiplicazioni di matrici (soprattutto quando si estende a più dimensioni) ed è a questo punto che si definisce la **matrice delle covarianze** (che è simmetrica) come:

$$V = \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(X, Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix} \quad (86)$$

Quindi V ha nella diagonale principale le varianze e nelle altre le covarianze. Si definisce poi la matrice dei coefficienti $A = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, la cui trasposta è $A^T = (a \ b)$, in modo che la formula di prima si può scrivere come:

$$\text{Var}(Z) = A^T V A \quad (87)$$

Nota: Ci si convince abbastanza facilmente del risultato se si fa il conto:

$$\begin{aligned} (a \ b) \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(X, Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} &= [a \text{Var}(X) + b \text{Cov}(X, Y) \quad a \text{Cov}(X, Y) + b \text{Var}(Y)] \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &= a^2 \text{Var}(X) + ab \text{Cov}(X, Y) + ab \text{Cov}(X, Y) + b^2 \text{Var}(Y) \end{aligned}$$

Si può poi ancora di più generalizzare al caso di N variabili aleatorie X_i come $Z = \sum_{i=1}^N a_i X_i$, e avremo ancora $\text{Var}(Z) = A^T V A$, dove stavolta la matrice delle covarianze ha elementi $V_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$. Essendo la diagonale:

$$V_{ii} = \text{Cov}(X_i, X_i) = \mathbb{E}[(X_i - \mathbb{E}[X_i])(X_i - \mathbb{E}[X_i])] = \mathbb{E}[(X_i - \mathbb{E}[X_i])^2] = \text{Var}(X_i)$$

Quindi V è qualcosa come:

$$V = \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_N) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_N, X_1) & \text{Cov}(X_N, X_2) & \cdots & \text{Var}(X_N) \end{pmatrix} \quad (88)$$

mentre la matrice $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}$. È chiaro che se le variabili X_i sono indipendenti allora V

assume una forma molto semplice in cui gli elementi non nulli sono solo nella diagonale.

11.3 Coefficiente di correlazione

Una ultima quantità che si introduce parlando del caso di due variabili casuali X e Y è il **coefficiente di correlazione lineare** (che indica la forza e la direzione della relazione lineare tra due variabili) definito come:

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (89)$$

È chiaro dalla definizione che ρ è **adimensionale** (mentre la covarianza non lo è!), che $\rho = 0$ se X e Y sono statisticamente indipendenti (visto che in tal caso $\text{Cov}(X, Y) = 0$), e si può

dimostrare che:

$$-1 \leq \rho \leq 1 \quad (90)$$

Dimostrazione: Esistono vari modi per dimostrarlo, una possibilità è definire la variabile $Z = \sigma_Y X - \sigma_X Y$ e calcolare $\text{Var}(Z)$ sfruttando la formula precedente:

$$\text{Var}(Z) = \sigma_Y^2 \text{Var}(X) + \sigma_X^2 \text{Var}(Y) - 2\sigma_X \sigma_Y \text{Cov}(X, Y)$$

ma $\text{Var}(X) = \sigma_X^2$ e $\text{Var}(Y) = \sigma_Y^2$, quindi:

$$\text{Var}(Z) = 2\sigma_X^2 \sigma_Y^2 - 2\sigma_X \sigma_Y \text{Cov}(X, Y)$$

Per come è definita sappiamo che $\text{Var}(Z) \geq 0$, quindi:

$$\begin{aligned} 2\sigma_X^2 \sigma_Y^2 - 2\sigma_X \sigma_Y \text{Cov}(X, Y) &\geq 0 \\ \implies \sigma_X^2 \sigma_Y^2 &\geq \sigma_X \sigma_Y \text{Cov}(X, Y) \\ \implies \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} &\leq 1 \implies \rho \leq 1 \end{aligned}$$

Viceversa se si definisce $Z = \sigma_Y X + \sigma_X Y$ e si fa lo stesso conto si trova $\rho \geq -1$.

Esempio. È istruttivo vedere quanto vale ρ nel caso di due variabili legate da una relazione lineare come $Y = mX + q$, cioè l'equazione della retta. In questo caso si può calcolare ρ partendo da:


- $\mathbb{E}[Y] = m\mathbb{E}[X] + q$
- $\text{Var}(Y) = m^2 \text{Var}(X)$
- $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X(mX + q)] = \mathbb{E}[mX^2 + qX] = m\mathbb{E}[X^2] + q\mathbb{E}[X]$
- $\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \\ &= m\mathbb{E}[X^2] + q\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X](m\mathbb{E}[X] + q) = \\ &= m\mathbb{E}[X^2] + q\mathbb{E}[X] - m\{\mathbb{E}[X]\}^2 - q\mathbb{E}[X] = \\ &= m(\mathbb{E}[X^2] - \{\mathbb{E}[X]\}^2) = m\text{Var}(X) \end{aligned}$

Premesso questo posso calcolare ρ come:

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} = \frac{m\text{Var}(X)}{\sqrt{m^2[\text{Var}(X)]^2}} = \frac{m}{|m|} = \pm 1 \quad (91)$$

Quindi ρ vale 1 con il segno del coefficiente angolare della retta. Questo mostra che man mano che la relazione tra X e Y approssima una relazione lineare il valore di $|\rho|$ si avvicina a 1.

Visualizzazione dei casi



Come in precedenza, quanto detto per due variabili si può facilmente estendere al caso di N variabili X_i , e in tal caso il coefficiente di correlazione si calcola comunque per una coppia delle N variabili:

$$\rho_{ij} = \frac{\text{Cov}(X_i, X_j)}{\sigma_i \sigma_j} \quad (92)$$

Si noti anche che da questo segue che $\text{Cov}(X_i, X_j) = \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$ e quindi la matrice delle covarianze si può anche scrivere come:

$$V_{ij} = \sigma_i \sigma_j \rho_{ij} \quad (93)$$

(Approfondimento facoltativo: Significato quantitativo di ρ) ¹

Finora abbiamo definito il coefficiente di correlazione e le sue proprietà teoriche. Tuttavia, in un caso reale, ci si trova sempre a lavorare con un **campione finito** di N coppie di misure (x_i, y_i) .

Supponiamo di calcolare il coefficiente di correlazione per i nostri dati misurati e di ottenere un valore, che chiameremo ρ_{oss} (correlazione *osservata*), per esempio $\rho_{oss} = 0,8$. La domanda sorge spontanea: *questo valore è sufficiente per affermare con certezza che le variabili sono correlate linearmente?*

Per rispondere, dobbiamo fare un ragionamento al contrario, basato sul calcolo delle probabilità. Supponiamo che le variabili X e Y siano in realtà **completamente non correlate** (ovvero, nel limite di infinite misure avremmo $\rho = 0$). Poiché abbiamo effettuato solo un numero finito N di misure, è quasi impossibile che il calcolo dia esattamente 0; per puro caso, i dati mostreranno sempre una qualche correlazione spuria.

Si definisce quindi la probabilità:

$$P_N(|\rho| \geq |\rho_{oss}|) \quad (94)$$

che rappresenta la probabilità che N misure di due variabili *non correlate* producano, per puro caso, un coefficiente di correlazione in valore assoluto grande almeno quanto quello osservato.

- Se questa probabilità è **alta**, il valore ρ_{oss} ottenuto potrebbe benissimo essere frutto del caso. Non abbiamo prove di una vera correlazione.
- Se questa probabilità è **bassa**, è estremamente improbabile che variabili scorrelate abbiano prodotto quel valore. Concludiamo quindi che le variabili sono quasi certamente correlate.

Per convenzione, si considera una correlazione:

- **Significativa**: se la probabilità è $\leq 5\%$
- **Altamente significativa**: se la probabilità è $\leq 1\%$

Il calcolo esatto di queste probabilità è complesso, ma i risultati per alcuni valori rappresentativi sono riportati nella tabella seguente:

¹Fonte: John R. Taylor, *Introduzione all'analisi degli errori - Lo studio delle incertezze nelle misure fisiche*, 3^a ed., Bologna, Zanichelli Editore SpA, 2023

Tabella 1: Probabilità percentuale $P_N(|\rho| \geq |\rho_{oss}|)$ che N misure di due variabili non correlate producano un coefficiente di correlazione $\geq |\rho_{oss}|$. Gli spazi vuoti indicano valori inferiori allo 0,05%.

	$ \rho_{oss} $										
N	0	0, 1	0, 2	0, 3	0, 4	0, 5	0, 6	0, 7	0, 8	0, 9	1
3	100	94	87	81	74	67	59	51	41	29	0
6	100	85	70	56	43	31	21	12	6	1	0
10	100	78	58	40	25	14	7	2	0,5		0
20	100	67	40	20	8	2	0,5	0,1			0
50	100	49	16	3	0,4						0

Esempio. *Facendo riferimento alla tabella, si può notare come il numero di dati N influenzi drasticamente la significatività di un risultato. Supponiamo di aver calcolato un coefficiente $\rho_{oss} = 0,7$:*

- *Con sole $N = 3$ misure, la probabilità che variabili totalmente scorrelate diano $|\rho| \geq 0,7$ per puro caso è del **51%**. Il risultato non dimostra assolutamente nulla.*
- *Con $N = 6$ misure, la probabilità scende al **12%**. La situazione migliora, ma non è ancora considerabile "significativa" (siamo sopra la soglia del 5%).*
- *Con $N = 20$ misure, la probabilità crolla allo **0,1%**. In questo caso l'evidenza è fortissima ("altamente significativa"): possiamo escludere quasi con certezza che le variabili non siano correlate.*

In sintesi, un coefficiente di correlazione non ha significato pratico se non viene contestualizzato rispetto al numero di misurazioni effettuate.

12 Distribuzione normale in più dimensioni (o multinormale)

12.1 Caso di variabili indipendenti

La distribuzione gaussiana che abbiamo visto in una dimensione si può estendere al caso di due o più dimensioni partendo dal caso più semplice in cui le variabili sono indipendenti. Supponiamo quindi che X abbia densità di probabilità:

$$P_X(x) = \frac{1}{\sigma_X \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(x - \mu_X)^2}{2\sigma_X^2} \right] \quad (95)$$

e analogamente Y ha densità di probabilità:

$$P_Y(y) = \frac{1}{\sigma_Y \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(y - \mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2} \right] \quad (96)$$

Essendo indipendenti, la densità di probabilità congiunta sarà:

$$\begin{aligned} P(x, y) &= P_X(x)P_Y(y) \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \exp\left[-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}\right] \cdot \exp\left[-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}\right] \end{aligned}$$

Essendo $e^a e^b = e^{a+b}$ posso riscrivere come:

$$P(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \cdot \exp\left\{-\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}\right]\right\} \quad (97)$$

Se si definisce la quantità:

$$Q^2 = \frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} \quad (98)$$

allora si può riscrivere la probabilità come:

$$P(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \cdot \exp\left(-\frac{Q^2}{2}\right) \quad (99)$$

La definizione di Q^2 è utile perché le intersezioni di $P(x, y)$ con piani paralleli al piano XY sono definite proprio dall'equazione $Q^2 = \text{costante}$. Questo si capisce facilmente perché occorre fare l'intersezione con il piano $Z = K$, quindi servono valori di X e Y tali che $P(x, y) = K$, ma l'unica dipendenza da X e Y è contenuta in Q , per il resto si tratta di costanti:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \exp\left(-\frac{Q^2}{2}\right) &= K \\ \exp\left(-\frac{Q^2}{2}\right) &= K 2\pi\sigma_X\sigma_Y \\ -\frac{Q^2}{2} &= \ln(2\pi\sigma_X\sigma_Y K) \\ Q^2 &= -2 \ln(2\pi\sigma_X\sigma_Y K) = C \end{aligned}$$

Scrivendo esplicitamente si ha:

$$\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} = C \quad (100)$$

che è l'equazione di un'ellisse centrata in (μ_X, μ_Y) .

Essendo Q^2 dato dalla somma di quadrati di variabili normali, si può dimostrare che la sua distribuzione di probabilità è una distribuzione notevole che si chiama **distribuzione del chi quadro**, indicata con χ^2 , che vedremo meglio più avanti. Per ora quello che è utile sapere è che si può calcolare, per ogni valore di C , la probabilità che il generico punto (X, Y) cada dentro l'ellisse $Q^2 \leq C$.

Per esempio, per $C = 1$ (il che equivale al caso in cui l'ellisse ha come semiassi σ_X e σ_Y) si vede che tale probabilità è **0.39**.





Figura 15: Rappresentazione 3D della densità di probabilità congiunta. La linea rossa rappresenta l'intersezione con il piano $z = K$, la cui proiezione sul piano XY è un'ellisse di equazione $Q^2 = C$. Per provare il grafico interattivo: https://colab.research.google.com/drive/1mZmU06E-0UsUTA-w0U_cUEBHEPlPrn5u?usp=sharing



Si noti che se io considerassi il rettangolo che circoscrive l'ellisse, mi aspetterei ²:

$$\begin{aligned}\text{Prob}\left(\mu_X - \sigma_X \leq X \leq \mu_X + \sigma_X \ \& \ \mu_Y - \sigma_Y \leq Y \leq \mu_Y + \sigma_Y\right) = \\ = 0.68 \cdot 0.68 = 0.46\end{aligned}$$

In maniera analoga è facile graficamente intuire che forma avranno le **densità di probabilità condizionate** $\prod(x|y)$ e $\prod(y|x)$: nel caso di variabili indipendenti saranno ancora delle gaussiane e rappresentano le intersezioni con i piani del tipo $X = \text{costante}$ e $Y = \text{costante}$.

²Ricordando che integrando la gaussiana entro un sigma ottengo una probabilità del 68%

13 Distribuzione Multi-normale (Variabili dipendenti)

Lezione del 26 Marzo 2026

Richiamo al caso di variabili indipendenti

Abbiamo visto che per due variabili indipendenti con distribuzione normale si trova:

$$P(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \cdot \exp\left(-\frac{Q^2}{2}\right) \quad (101)$$

essendo la forma quadratica Q^2 definita come:

$$Q^2 = \frac{(x - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y - \mu_y)^2}{\sigma_y^2} \quad (102)$$

Per estendere il discorso al caso di variabili *correlate*, è utile esprimere Q^2 sotto forma di prodotto di matrici usando la **matrice delle covarianze** V , che per due variabili indipendenti ha la forma diagonale:

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_x^2 & 0 \\ 0 & \sigma_y^2 \end{pmatrix} \quad (103)$$

Se si indicano i vettori colonna:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \vec{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_x \\ \mu_y \end{pmatrix}$$

allora si vede che la rappresentazione compatta di Q^2 è:

$$Q^2 = (\vec{x} - \vec{\mu})^T V^{-1} (\vec{x} - \vec{\mu}) \quad (104)$$

Questo si può verificare facilmente ricavando innanzitutto quanto vale V^{-1} . Ricordiamo che per una generica matrice 2×2 del tipo $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, la sua inversa è $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Nel nostro caso, $\det V = \sigma_x^2 \sigma_y^2$, quindi:

$$V^{-1} = \frac{1}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} \begin{pmatrix} \sigma_y^2 & 0 \\ 0 & \sigma_x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_x^{-2} & 0 \\ 0 & \sigma_y^{-2} \end{pmatrix} \quad (105)$$

Sostituendo si ottiene esattamente l'espressione nota di Q^2 :

$$\begin{aligned} (\vec{x} - \vec{\mu})^T V^{-1} (\vec{x} - \vec{\mu}) &= (x - \mu_x \quad y - \mu_y) \begin{pmatrix} \sigma_x^{-2} & 0 \\ 0 & \sigma_y^{-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - \mu_x \\ y - \mu_y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{x - \mu_x}{\sigma_x^2} & \frac{y - \mu_y}{\sigma_y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - \mu_x \\ y - \mu_y \end{pmatrix} \\ &= \frac{(x - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y - \mu_y)^2}{\sigma_y^2} = Q^2 \end{aligned}$$

Generalizzazione a n dimensioni

Mettendo tutto insieme ed estendendo al caso di n dimensioni (e usando $\det V$ al posto di $\sigma_x^2 \sigma_y^2$), si ottiene l'espressione generale:

$$P(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\det V|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{\mu})^T V^{-1} (\vec{x} - \vec{\mu}) \right] \quad (106)$$

Il caso binormale correlato

Scritta così, l'espressione vale *anche nel caso in cui le variabili non siano indipendenti*. Ritornando al caso particolare di 2 variabili, la matrice V assume la forma:

$$V = \begin{pmatrix} \text{var}(x) & \text{cov}(x, y) \\ \text{cov}(x, y) & \text{var}(y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_x^2 & \rho \sigma_x \sigma_y \\ \rho \sigma_x \sigma_y & \sigma_y^2 \end{pmatrix} \quad (107)$$

Il suo determinante è:

$$\det V = \sigma_x^2 \sigma_y^2 - \rho^2 \sigma_x^2 \sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sigma_y^2 (1 - \rho^2) \quad (108)$$

Per calcolare Q^2 bisogna calcolare V^{-1} , che in questo caso vale:

$$V^{-1} = \frac{1}{\sigma_x^2 \sigma_y^2 (1 - \rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_y^2 & -\rho \sigma_x \sigma_y \\ -\rho \sigma_x \sigma_y & \sigma_x^2 \end{pmatrix} \quad (109)$$

Svolgendo tutti i calcoli matriciali, si trova la forma quadratica espansa:

$$Q^2 = \frac{1}{1 - \rho^2} \left[\frac{(x - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} - 2\rho \frac{(x - \mu_x)(y - \mu_y)}{\sigma_x \sigma_y} + \frac{(y - \mu_y)^2}{\sigma_y^2} \right] \quad (110)$$

E la gaussiana in 2D diventa:

$$P(x, y) = \frac{1}{2\pi \sigma_x \sigma_y \sqrt{1 - \rho^2}} \exp \left(-\frac{Q^2}{2} \right) \quad (111)$$

13.1 Interpretazione geometrica: L'ellisse

La cosa interessante è che ponendo $Q^2 = c$ si ottiene ancora un'ellisse, ma stavolta è *inclinata*, cioè non ha gli assi paralleli agli assi cartesiani x ed y .

Data la geometria del problema, dalla forma dell'ellisse si potrebbe riuscire a ricavare ρ . Infatti:

- La retta $x = \mu_x$ interseca l'ellisse nei punti di coordinate $y = \mu_y \pm \sigma_y \sqrt{1 - \rho^2}$.
- La retta $y = \mu_y$ interseca l'ellisse nei punti di coordinate $x = \mu_x \pm \sigma_x \sqrt{1 - \rho^2}$.

Invece, le rette di equazione $x = \mu_x \pm \sigma_x$ (parallele all'asse y) sono tangenti all'ellisse, e i punti di intersezione/tangenza hanno coordinate $y = \mu_y \pm \sigma_y \rho$. Analogamente, le rette $y = \mu_y \pm \sigma_y$ sono tangenti all'ellisse nei punti di coordinate $x = \mu_x \pm \sigma_x \rho$.

Nota: Anche in questo caso, la probabilità che una misurazione (x, y) cada dentro l'ellisse $Q^2 \leq 1$ è approssimativamente 0.39.




Figura 16: Rappresentazione geometrica dell'ellisse di equazione $Q^2 = c$. Si notano le intersezioni con gli assi passanti per il centro e i punti di tangenza con il box $\mu \pm \sigma$, che permettono di ricavare visivamente il coefficiente di correlazione ρ .

13.2 Distribuzioni Marginali e Condizionate per la Multinormale

Per definizione, le distribuzioni marginali sono date da:

$$P_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) dy \quad \text{e} \quad P_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) dx \quad (112)$$

Nel caso in cui x e y siano **indipendenti**, per una binormale è ovvio che $P_x(x)$ e $P_y(y)$ rappresentano le singole gaussiane. Infatti:

$$P_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_x(x) P_y(y) dy = P_x(x) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} P_y(y) dy}_{=1} = P_x(x)$$

Quindi $P_x(x) = \mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x^2)$ e $P_y(y) = \mathcal{N}(\mu_y, \sigma_y^2)$.

Se x e y **non sono indipendenti**, si arriva allo stesso risultato ma con più passaggi. La sostanza del calcolo si basa sul fatto che Q^2 dipende dai quadrati dei termini $(x - \mu_x)^2$ e $(y - \mu_y)^2$; con un po' di passaggi algebrici si riescono ad ottenere due gaussiane.

Distribuzioni Condizionate

È più istruttivo calcolare con più dettaglio le **distribuzioni condizionate**. Si vede che anche queste sono gaussiane, ma con μ e σ alterati da ρ . Dalla definizione sappiamo che:

$$\pi(x|y) = \frac{P(x, y)}{P_y(y)} = \frac{F \exp[-Q^2/2]}{F_1 \exp[-Q_1^2/2]} \quad (113)$$

dove abbiamo scritto schematicamente le probabilità come prodotto di un fattore di normalizzazione (F e F_1) per degli esponenziali, ponendo $Q_1^2 = \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2}$.

Il calcolo più facile da fare è il rapporto dei coefficienti:

$$\frac{F}{F_1} = \frac{\frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x\sqrt{1-\rho^2}} \quad (114)$$

Da questo si nota che per avere la forma di una gaussiana normalizzata, la nuova deviazione standard deve essere:

$$\sigma_{x|y} = \sigma_x\sqrt{1-\rho^2} \quad (115)$$

(Si noti che per $\rho = 0$ si ritrova $\sigma_{x|y} = \sigma_x$).

Calcolo della media condizionata

Per ricavare come varia μ bisogna calcolare come varia l'esponente. Per semplificare la notazione utilizziamo il cambiamento di variabili: $u = x - \mu_x$ e $v = y - \mu_y$.

Con questa scelta, il rapporto tra i due esponenziali è dipendente da:

$$Q^2 - Q_1^2 = \frac{1}{1-\rho^2} \left(\frac{u^2}{\sigma_x^2} + \frac{v^2}{\sigma_y^2} - 2\rho \frac{uv}{\sigma_x\sigma_y} \right) - \frac{v^2}{\sigma_y^2}$$

Separiamo i termini che dipendono da x (cioè u) e quelli che dipendono solo da y (cioè v):

$$Q^2 - Q_1^2 = \frac{1}{1-\rho^2} \left(\frac{u^2}{\sigma_x^2} - 2\rho \frac{uv}{\sigma_x\sigma_y} \right) - \left[\frac{1}{1-\rho^2} - 1 \right] \frac{v^2}{\sigma_y^2}$$

Riscriviamo il termine in parentesi quadra come un quadrato di binomio mettendo in evidenza $\frac{1}{\sigma_x^2}$:

$$\frac{1}{\sigma_x^2} (u^2 - 2\rho \frac{\sigma_x}{\sigma_y} uv) = \frac{1}{\sigma_x^2} \left[\left(u - \rho \frac{\sigma_x}{\sigma_y} v \right)^2 - \rho^2 \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2} v^2 \right]$$

Sostituendo nell'espressione precedente e semplificando i termini in v^2 :

$$\begin{aligned} Q^2 - Q_1^2 &= \frac{1}{1-\rho^2} \left[\frac{1}{\sigma_x^2} \left(u - \rho \frac{\sigma_x}{\sigma_y} v \right)^2 - \rho^2 \frac{v^2}{\sigma_y^2} + \rho^2 \frac{v^2}{\sigma_y^2} \right] \\ &= \frac{1}{(1-\rho^2)\sigma_x^2} \left(u - \rho \frac{\sigma_x}{\sigma_y} v \right)^2 \end{aligned}$$

Tornando alle variabili originarie x e y :

$$Q^2 - Q_1^2 = \frac{1}{(1-\rho^2)\sigma_x^2} \left\{ (x - \mu_x) - \rho \frac{\sigma_x}{\sigma_y} (y - \mu_y) \right\}^2 \quad (116)$$

Da qui si evince che l'espressione di $\pi(x|y)$ è ancora una gaussiana con deviazione standard $\sigma_{x|y} = \sigma_x\sqrt{1-\rho^2}$ (come visto prima) e con valore atteso:

$$\mu_{x|y} = \mu_x + \rho \frac{\sigma_x}{\sigma_y} (y - \mu_y) \quad (117)$$

Anche in questo caso, se $\rho = 0$ si ha $\mu_{x|y} = \mu_x$, mentre se $\rho \neq 0$, il valore atteso è spostato rispetto al valore μ_x originale in base al valore di y .

14 Teoria della Stima dei Parametri

Finora abbiamo parlato molto di distribuzioni teoriche, ma il problema che ci si trova spesso ad affrontare è trovare un modo di risalire ai **parametri della distribuzione della popolazione**, dato un insieme di misure di un campione.

Detto in maniera più formale, supponiamo che la densità di probabilità $P(x; \theta)$ di una variabile casuale x dipenda da un parametro θ , il cui **valore vero** θ_v ci sia ignoto (per esempio, se P è una gaussiana, avremo due parametri: μ e σ).

Avendo a disposizione N misure x_i della grandezza x , vogliamo trovare una funzione:

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_N)$$

che, a partire da esse, ci permetta di ricavare il valore di θ_v . Le funzioni $\hat{\theta}$ di questo tipo si chiamano **stime** (o stimatori).

Ovviamente si possono immaginare molte stime possibili, ma si cerca di preferire quelle che hanno tre proprietà fondamentali: **consistenza**, **imparzialità** ed **efficienza**.

14.1 Proprietà degli Stimatori (Consistenza, Imparzialità)

Consistenza

Definizione: Stimatore Consistente: Una stima si dice *consistente* quando tende al valore vero del parametro al tendere all'infinito del numero di campioni, cioè se:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \hat{\theta} = \theta_v$$

Per esempio, la legge dei grandi numeri ci garantisce che $\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{x} = \mu$. Quindi la media aritmetica è una stima consistente del valore di aspettazione della distribuzione teorica che regola la popolazione.

Imparzialità (Non distorsione)

Definizione: Stimatore Imparziale Una stima si dice *imparziale* (o non distorta, in inglese *unbiased*) se il suo valore di aspettazione è uguale al valore vero, cioè:

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta_v$$

Si noti che, essendo $\hat{\theta}$ una funzione di variabili casuali, è essa stessa una variabile casuale, e quindi per questo si può parlare del suo valore atteso $\mathbb{E}[\hat{\theta}]$.

Più in generale si otterranno risultati del tipo:

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta_v + b(\theta_v) \quad (118)$$

dove la funzione b è solitamente dell'ordine di $1/N$ o inferiore.

Per esempio, nel caso della **media aritmetica** $\bar{x}$, si può facilmente verificare che soddisfa questa proprietà:

$$\mathbb{E}[\bar{x}] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i\right] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E}[x_i] \quad (119)$$

Se tutte le x_i seguono la stessa $P(x)$ (cioè sono misure della stessa grandezza fisica), allora i valori attesi delle singole x_i sono tutti uguali: $\mathbb{E}[x_i] = \mathbb{E}[x]$. Sostituendo si ottiene:

$$\mathbb{E}[\bar{x}] = \frac{1}{N} \cdot N \cdot \mathbb{E}[x] = \mathbb{E}[x] = \mu$$

Quindi la media aritmetica è una stima non distorta del valore atteso della popolazione.

Efficienza

Definizione: Efficienza La proprietà dell'efficienza della stima ha a che fare con la dispersione della stima attorno al suo valore di aspettazione, misurata dalla **varianza**. In altre parole, una stima è *più efficiente* di un'altra se la sua *varianza è più piccola*.

Se la varianza è più piccola, il suo valore è più prossimo a $\mathbb{E}[\hat{\theta}]$, che coincide con θ_v se la stima è imparziale.

La scelta della migliore stima da usare non è sempre banale e richiede lo studio del singolo caso. Per esempio, l'efficienza di una stima può dipendere dal particolare problema considerato, oppure confrontando due stime si può trovare che la più efficiente è anche *distorta*; in tal caso bisogna decidere (in base al problema) se è più accettabile la distorsione o la bassa efficienza.

Per esempio si può dimostrare che sia la media che la mediana diano un risultato consistente e imparziale per quanto riguarda la posizione di una popolazione di variabili normali con varianza nota. La media però presenta una minore varianza rispetto alla mediana, dunque è da preferirsi per quanto riguarda l'efficienza.

14.2 La media aritmetica come stima ottimale

Consideriamo lo stimatore della media aritmetica: $\hat{\mu} = \bar{x}$. Abbiamo già notato che la media è una buona stima di μ perché è **consistente** e **imparziale**.

Inoltre, dal Teorema del Limite Centrale, sappiamo che la sua varianza è:

$$\text{var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{N}$$

dove σ è la deviazione standard della popolazione. In generale si vede che questa stima è la **più efficiente**, o almeno lo è per le densità di probabilità gaussiane.

15 Stime, Propagazione e Likelihood

Lezione del 30 Marzo 2026

15.1 Stima della Varianza e Correzione di Bessel

Si è visto nelle prime lezioni che il modo più naturale per misurare la dispersione rispetto alla media del campione è lo scarto quadratico medio, che indichiamo qui per comodità come s^2 :

$$s^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \quad (120)$$

Si può quindi pensare che questa sia una buona stima della varianza della popolazione. Tuttavia si vede abbastanza facilmente che **questa stima è distorta**. Infatti, preso un qualsiasi valore di x che indico con $\tilde{x}$, posso calcolare la quantità:

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \tilde{x})^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [(x_i - \bar{x}) + (\bar{x} - \tilde{x})]^2 \\ &= \frac{1}{N} \left[\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 + \underbrace{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - \tilde{x})^2}_{\text{non dipende da } i} + 2 \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(\bar{x} - \tilde{x}) \right] \end{aligned}$$

Analizzando l'ultimo termine, notiamo che $(\bar{x} - \tilde{x})$ si può tirare fuori dalla sommatoria, e rimane $\sum_i (x_i - \bar{x}) = \sum_i x_i - N\bar{x} = N\bar{x} - N\bar{x} = 0$. Il termine misto si annulla. L'espressione si riduce quindi a:

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \tilde{x})^2 &= \frac{1}{N} \left[\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 + N(\bar{x} - \tilde{x})^2 \right] \\ &= s^2 + (\bar{x} - \tilde{x})^2 \end{aligned}$$

Invertendo il risultato si ricava che s^2 si può scrivere come:

$$s^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \tilde{x})^2 - (\bar{x} - \tilde{x})^2 \quad (121)$$

Questo vale per un qualunque $\tilde{x}$ e quindi in particolare per il valore vero della media, cioè il valore di aspettazione μ :

$$s^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 - (\bar{x} - \mu)^2 \quad (122)$$

Se si calcola il valore di aspettazione di s^2 ho:

$$\mathbb{E}[s^2] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E}[(x_i - \mu)^2] - \mathbb{E}[(\bar{x} - \mu)^2] \quad (123)$$

Se le x_i hanno tutte la stessa densità di probabilità, allora $\mathbb{E}[(x_i - \mu)^2] = \mathbb{E}[(x - \mu)^2] = \text{Var}(x)$. Viceversa, essendo $\mathbb{E}[\bar{x}] = \mu$, allora il termine $\mathbb{E}[(\bar{x} - \mu)^2] = \mathbb{E}[(\bar{x} - \mathbb{E}[\bar{x}])^2] = \text{Var}(\bar{x}) = \frac{\text{Var}(x)}{N}$.

Sostituendo si ha quindi:

$$\mathbb{E}[s^2] = \frac{1}{N}N\text{Var}(x) - \frac{\text{Var}(x)}{N} = \frac{N-1}{N}\text{Var}(x) \quad (124)$$

In sostanza s^2 è una **stima distorta** della varianza e tende ad essere più piccola della varianza di un fattore $(N-1)/N$. Riflettendoci, si capisce che il risultato deriva dal fatto che nel caso ideale si vorrebbe conoscere μ e calcolare gli scarti rispetto a μ , invece che rispetto a $\bar{x}$, e da questo segue che $\mathbb{E}[s^2] < \text{Var}(x)$.

Correzione di Bessel Avendo però quantificato la relazione tra $\mathbb{E}[s^2]$ e la varianza vera, si può correggere il nostro calcolo definendo una nuova stima della varianza:

$$\sigma_m^2 = \frac{N}{N-1}s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \quad (125)$$

Questa espressione prende il nome di *correzione di Bessel* e fornisce uno stimatore non distorto per la varianza.

Nota: si usa il pedice m per ricordare che questa è la stima della varianza a partire dalle misure.

15.2 Stima della Covarianza

Abbiamo visto che, date due variabili aleatorie x e y , la loro covarianza si calcola come:

$$\text{cov}(x, y) = \mathbb{E}[(x - \mathbb{E}[x])(y - \mathbb{E}[y])] \quad (126)$$

e nel caso in cui $x = y \implies \text{cov}(x, x) = \text{Var}(x)$.

Allora è abbastanza naturale utilizzare come stima della covarianza la quantità $\frac{1}{N} \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$. Però, di nuovo, per la discussione fatta sulla varianza, questa stima è distorta. Quindi, per analogia, una stima migliore (imparziale) è:

$$\text{côv}(x, y) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \quad (127)$$

Note sull'esercitazione: Errori Sistemati

In questa esercitazione simuleremo il caso di due misure indipendenti che diventano correlate quando c'è un errore sistematico.

Per considerare un esempio semplice, simuleremo le misure di due lunghezze il cui valore vero è $L1_v$ e $L2_v$, aggiungendo degli errori casuali gaussiani:

$$\begin{aligned} L1 &= L1_v + e_1 \\ L2 &= L2_v + e_2 \end{aligned}$$

dove $e_1 \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ e $e_2 \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ sono i due errori con la stessa σ . Essendo $L1_v$ e $L2_v$ delle costanti, questo equivale a simulare $L1 \sim \mathcal{N}(L1_v, \sigma^2)$ e $L2 \sim \mathcal{N}(L2_v, \sigma^2)$.

Ora introduciamo un **errore sistematico**, per esempio una deformazione dello strumento dovuta alla temperatura esterna. Questo vuol dire che le due misure vengono alterate nello stesso modo, per esempio di un valore S . Le misure saranno in questo caso:

$$\begin{aligned} L1_s &= L1 + S \\ L2_s &= L2 + S \end{aligned}$$

e supponiamo che $S \sim \mathcal{N}(0, \sigma_S^2)$.

Se facciamo N misure e simuliamo anche N errori di tipo S , ogni coppia di misure $L1[i]$ e $L2[i]$ sarà affetta dallo *stesso* errore $S[i]$ (ma in generale per un altro indice j l'errore $S[j]$ sarà diverso). Possiamo studiare la binormale ottenuta da $(L1_s, L2_s)$ e notare che $\text{cov}(L1_s, L2_s) \neq 0$, perché l'aggiunta di S ha creato una correlazione tra le due variabili.

Il valore di questa covarianza ci dà un'informazione su S . Per vederlo usiamo una notazione semplificata $x_s = x + S$ e $y_s = y + S$:

$$\begin{aligned} \text{cov}(x_s, y_s) &= \mathbb{E}[x_s y_s] - \mathbb{E}[x_s] \mathbb{E}[y_s] \\ &= \mathbb{E}[(x + S)(y + S)] - \mathbb{E}[x + S] \mathbb{E}[y + S] \\ &= \mathbb{E}[xy] + \mathbb{E}[xS] + \mathbb{E}[Sy] + \mathbb{E}[S^2] - \mathbb{E}[x] \mathbb{E}[y] - \mathbb{E}[x] \mathbb{E}[S] - \mathbb{E}[y] \mathbb{E}[S] - \mathbb{E}[S]^2 \\ &= \text{cov}(x, y) + \text{cov}(x, S) + \text{cov}(y, S) + \text{cov}(S, S) \\ &= \text{Var}(S) \end{aligned}$$

L'ultimo passaggio dipende dal fatto che le coppie (x, y) , (x, S) e (y, S) sono indipendenti (covarianza nulla). Nel nostro caso avremo quindi che:

$$\text{cov}(L1_s, L2_s) = \text{Var}(S) \quad (128)$$

Dato che il valore di S cambia in ogni misura, non è facile risalire al valore del singolo S e qui l'unico modo per eliminarlo è calcolare la differenza tra le due lunghezze:

$$L1_s - L2_s = L1 + S - (L2 + S) = L1 - L2$$

In questo caso serve un riferimento esterno per stimare l'errore sistematico. Per esempio, prima di misurare le lunghezze incognite, facciamo la stessa procedura con due lunghezze *note*. In tal caso, una stima di S può venire dalla media delle misure:

$$m = \frac{L1_s + L2_s}{2} = \frac{L1_v + e_1 + S + L2_v + e_2 + S}{2} = \frac{L1_v + L2_v}{2} + \frac{e_1 + e_2}{2} + S$$

Quindi $\hat{S}$ si può stimare togliendo da m la media delle misure vere che conosco:

$$\hat{S} = \frac{L1_s + L2_s}{2} - \frac{L1_v + L2_v}{2} = S + \frac{e_1 + e_2}{2} \quad (129)$$

Si ottiene quindi una sovrastima di S (spesso per gli errori sistematici si ha una sovrastima).

15.3 Dimostrazione della Propagazione degli Errori

Per completare il discorso sugli errori vediamo velocemente da dove viene la formula di propagazione degli errori. Se abbiamo una variabile $y = ax + b$, abbiamo visto dalle proprietà della varianza che:

$$\text{Var}(y) = \text{Var}(ax + b) = \text{Var}(ax) = a^2 \text{Var}(x)$$

Se ora supponiamo di avere una generica funzione $f(x)$ che sviluppiamo con la tipica formula di Taylor attorno a x_0 , e tronchiamo lo sviluppo al primo ordine, avremo:

$$f(x) \simeq f(x_0) + (x - x_0) \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} \quad (130)$$

Applicando ora le formule precedenti (notando che $f(x_0) \rightarrow b$ e $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} \rightarrow a$), abbiamo:

$$\text{Var}(f) \approx \left(\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} \right)^2 \text{Var}(x) \quad (131)$$

La formula ha senso per errori piccoli e la derivata va calcolata in x_0 , che di solito si assume essere il valore misurato.

15.3.1 Caso Multivariato

Nel caso di più variabili si procede in modo analogo. Per esempio nel caso di due variabili:

$$f(x, y) \simeq f(x_0, y_0) + (x - x_0) \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_0} + (y - y_0) \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{y=y_0}$$

Di nuovo la varianza si può calcolare in analogia al caso lineare $z = ax + by$, per cui abbiamo visto che:

$$\text{Var}(z) = a^2 \text{Var}(x) + b^2 \text{Var}(y) + 2ab \text{cov}(x, y)$$

L'espressione precedente è più del tipo $z' = ax + by + c$, ma $\text{Var}(z') = \text{Var}(z)$. Quindi possiamo ricavare la varianza di f per analogia:

$$\text{Var}(f) = \left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_0, y_0} \right)^2 \text{Var}(x) + \left(\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{x_0, y_0} \right)^2 \text{Var}(y) + 2 \left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_0, y_0} \right) \left(\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{x_0, y_0} \right) \text{cov}(x, y) \quad (132)$$

che, nel caso in cui le variabili siano indipendenti (covarianza nulla), si riduce alla formula che si conosce.

Nel caso più generale in cui f sia funzione di n variabili $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, allora:

$$\text{Var}(f) = \sum_{i=1}^n \left(\left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{x_0} \right)^2 \text{Var}(x_i) + 2 \sum_{i < j} \left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{x_0} \left. \frac{\partial f}{\partial x_j} \right|_{x_0} \text{cov}(x_i, x_j) \quad (133)$$

15.4 Metodo della Massima Verosimiglianza (MLE), (Maximum Likelihood)

Supponiamo di avere N misure $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ di una certa grandezza fisica x . Queste misure sono delle variabili aleatorie descritte da una certa densità di probabilità P che dipende da un certo parametro θ il cui **valore vero** θ_v è **incognito**, cioè per ognuna ho $P(x_i; \theta_v)$.

Se si mette insieme, la densità congiunta è $\prod_i P(x_i; \theta_v)$ (se le x_i sono indipendenti). Se ora si prova a "ribaltare" il problema e assumo che, fissate le x_i (quindi avendo fissato un set di misure), si voglia ricavare θ_v , allora si può riscrivere la produttoria di prima come una funzione di θ :

Definizione: Funzione di Likelihood

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \dots, x_N; \theta) = \prod_{i=1}^N P(x_i; \theta) \quad (134)$$

Questa quantità si chiama *Likelihood* e indica la probabilità che il *particolare set di misure* $x_1, x_2, \dots, x_N$ sia prodotto da un dato θ (quindi fisso le x e la mia variabile incognita è θ).

Il metodo della massima verosimiglianza consiste nell'adottare come stima del parametro θ quel valore $\hat{\theta}$ che **rende massima la funzione di Likelihood**, cioè tale che:

$$\frac{d\mathcal{L}}{d\theta} = 0 \quad (135)$$




Figura 17: Rappresentazione grafica della funzione di Likelihood $\mathcal{L}(\theta)$. Il metodo della massima verosimiglianza individua il valore stimato $\hat{\theta}$ in corrispondenza del picco della curva, dove la derivata prima si annulla.

Questo certe volte consente di ottenere un'equazione che si può risolvere analiticamente per ottenere $\hat{\theta}$, a volte invece bisogna ricorrere a soluzioni numeriche.

15.5 La Log-Likelihood

Spesso risulta scomodo lavorare con $\mathcal{L}$ e si preferisce utilizzare il suo logaritmo, di solito in base e . Essendo $\ln(\mathcal{L})$ una funzione monotona crescente con il suo argomento, il massimo di $\ln(\mathcal{L})$ si trova per i valori dei parametri che rendono massima la $\mathcal{L}$. Quindi di solito il problema diventa trovare i valori di θ per cui:

$$\frac{d(\ln \mathcal{L})}{d\theta} = 0 \quad (136)$$

15.6 Esempio: Funzione Esponenziale

Un esempio semplice di applicazione del metodo del Maximum Likelihood è il caso di un processo la cui densità di probabilità è data da:

$$P(t; \tau) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \quad (137)$$

e abbiamo visto che questo regola i tempi di attesa tra due eventi consecutivi, se gli eventi seguono la statistica di Poisson, cioè eventi casuali con media fissa. Per esempio i decadimenti radioattivi sono un esempio di questo tipo di fenomeno.

Supponiamo quindi di aver accumulato N misure dei tempi t_i e vogliamo usarle per trovare $\hat{\tau}$ usando il metodo di ML. Dobbiamo innanzitutto trovare $\mathcal{L}$ che per definizione è data da:

$$\mathcal{L}(t_1, t_2, \dots, t_N; \tau) = \prod_{i=1}^N P(t_i; \tau) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\tau} e^{-t_i/\tau} \quad (138)$$

Come detto, qui è comodo prendere il logaritmo così i prodotti diventano somme:

$$\begin{aligned} \ln \mathcal{L}(x_1, \dots, x_N; \tau) &= \ln \left(\prod_{i=1}^N \frac{1}{\tau} e^{-t_i/\tau} \right) \\ &= \sum_{i=1}^N \ln \left(\frac{1}{\tau} e^{-t_i/\tau} \right) \\ &= \sum_{i=1}^N \left(-\ln \tau - \frac{t_i}{\tau} \right) \\ &= -N \ln \tau - \sum_{i=1}^N \frac{t_i}{\tau} \end{aligned}$$

Di questa dobbiamo trovare il massimo derivando rispetto a τ :

$$\begin{aligned} \frac{d \ln \mathcal{L}}{d\tau} &= \frac{d}{d\tau} \left(-N \ln \tau - \sum_i \frac{t_i}{\tau} \right) \\ &= -N \frac{1}{\tau} - \sum_i t_i \left(-\frac{1}{\tau^2} \right) \\ &= -\frac{N}{\tau} + \frac{\sum_i t_i}{\tau^2} \end{aligned}$$

La stima di τ , $\hat{\tau}$, sarà data dai valori che soddisfano:

$$-\frac{N}{\hat{\tau}} + \sum_i \frac{t_i}{\hat{\tau}^2} = 0 \quad (139)$$

Raccogliamo a fattore comune:

$$\underbrace{\frac{N}{\hat{\tau}^2}}_{\text{sempre } > 0} \left(-\hat{\tau} + \frac{1}{N} \sum_i t_i \right) = 0 \quad (140)$$

Affinché l'espressione sia nulla, deve annullarsi il termine in parentesi:

$$-\hat{\tau} + \frac{1}{N} \sum_i t_i = 0 \implies \hat{\tau} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i \quad (141)$$

Quindi la stima del valore atteso medio τ è data semplicemente dalla media aritmetica dei t_i .

16 PDF Gaussian e Limite di Cramér-Rao

Lezione del 02 Aprile 2026

16.1 Proprietà della Massima Verosimiglianza

Chiarimenti sulla stima ML

Si era visto che il procedimento standard consiste nel trovare lo stimatore $\hat{\theta}$ per cui si annulla la derivata della funzione di verosimiglianza (Likelihood):

$$\hat{\theta} : \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \quad (142)$$

In teoria bisognerebbe anche controllare che:

$$\left. \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta^2} \right|_{\hat{\theta}} < 0 \quad (143)$$

per essere certi che si tratti di un massimo e non di un minimo o di un flesso. Di solito questo non si fa perché la $\mathcal{L}$ è spesso concava e ha sempre $\mathcal{L}'' < 0$ (o perlomeno questo è vero per i modelli più comuni), oppure perché è complicato da calcolare. Nei libri di solito si trova scritto: se $\mathcal{L}' = 0$ ha più soluzioni, si sceglie quella che massimizza $\mathcal{L}$, piuttosto che controllare $\mathcal{L}''$.

16.1.1 Stima ML per la media e varianza Gaussian

Un altro tipico esempio di uso del metodo Maximum Likelihood (ML) restituisce il valore noto della media. Supponiamo di avere N misure $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ di una certa quantità x e supponiamo che tutte le misure abbiano lo stesso valore atteso μ incognito, e ognuna una deviazione standard σ_i nota, cioè:

$$P(x_i; \mu, \sigma_i) = \frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma_i^2} \right] \quad (144)$$

La funzione di verosimiglianza è:

$$\mathcal{L}(x_i; \mu) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2}} \prod_i \frac{1}{\sigma_i} \exp \left[-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma_i^2} \right] \quad (145)$$

Passando al logaritmo naturale (Log-Likelihood):

$$\ln \mathcal{L}(x_i; \mu) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi) + \sum_i \ln \left(\frac{1}{\sigma_i} \right) - \sum_i \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma_i^2} \quad (146)$$

Ora calcoliamo la derivata rispetto a μ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \mu} &= \frac{\partial}{\partial \mu} \left[-\sum_i \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma_i^2} \right] \\ &= -\sum_i \frac{1}{2\sigma_i^2} \left[\frac{\partial}{\partial \mu} (x_i - \mu)^2 \right] \\ &= -\sum_i \frac{1}{2\sigma_i^2} [-2(x_i - \mu)] = \sum_i \frac{x_i - \mu}{\sigma_i^2} \end{aligned}$$

Da qui il massimo si trova ponendo a zero la derivata, quindi $\hat{\mu}$ è il valore per cui:

$$\sum_i \frac{x_i - \hat{\mu}}{\sigma_i^2} = 0 \implies \sum_i \frac{x_i}{\sigma_i^2} - \sum_i \frac{\hat{\mu}}{\sigma_i^2} = 0 \implies \sum_i \frac{x_i}{\sigma_i^2} = \hat{\mu} \sum_i \frac{1}{\sigma_i^2} \quad (147)$$

Da cui ricaviamo:

$$\boxed{\hat{\mu} = \frac{\sum_i (x_i / \sigma_i^2)}{\sum_i (1 / \sigma_i^2)}} \quad (148)$$

Il risultato ottenuto è quindi la **media pesata** in cui ogni x_i è pesato con $1/\sigma_i^2$.

Con un procedimento analogo si ricava che se le σ_i sono **tutte uguali** ($\sigma_i = \sigma$), allora si possono portare fuori dalla sommatoria:

$$\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \mu} = 0 \implies \frac{1}{\sigma^2} \sum_i (x_i - \hat{\mu}) = 0 \implies \sum_i (x_i - \hat{\mu}) = 0 \implies \sum_i x_i - N\hat{\mu} = 0 \quad (149)$$

$$\boxed{\hat{\mu} = \frac{1}{N} \sum_i x_i} \quad (150)$$

che è la normale media aritmetica.

Se ora supponiamo che le σ siano tutte uguali ma **incognite**, allora per ricavare la stima di σ dovremo risolvere $\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \sigma} = 0$. Calcoliamo prima la derivata parziale:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \sigma} &= \frac{\partial}{\partial \sigma} \left[-\frac{N}{2} \ln(2\pi) + \sum_i \ln \left(\frac{1}{\sigma} \right) - \sum_i \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial \sigma} \left[-N \ln(\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_i (x_i - \mu)^2 \right] \\ &= -\frac{N}{\sigma} - \frac{(-2)}{2\sigma^3} \sum_i (x_i - \mu)^2 = -\frac{N}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_i (x_i - \mu)^2 \end{aligned}$$

Si deve trovare $\hat{\sigma}$ tale che:

$$-\frac{N}{\hat{\sigma}} + \frac{1}{\hat{\sigma}^3} \sum_i (x_i - \mu)^2 = 0 \implies \frac{1}{\hat{\sigma}^3} \sum_i (x_i - \mu)^2 = \frac{N}{\hat{\sigma}} \quad (151)$$

$$\boxed{\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N} \sum_i (x_i - \mu)^2} \quad (152)$$

Come si può notare, questa è una stima *biased* (distorta) della varianza. È importante ricordare, tuttavia, che asintoticamente (per $N \rightarrow \infty$) questa stima converge, coincidendo con quella non distorta. La presenza di un bias su campioni di dimensione finita è una problematica tipica delle stime di σ ottenute con il metodo della Massima Verosimiglianza.

16.1.2 Invarianza per trasformazioni dei parametri

Un grande vantaggio del metodo ML, in compenso, è che si può dimostrare che tali stime sono *invarianti per trasformazione dei parametri*. Questo significa che, se si ha a disposizione lo stimatore $\hat{\theta}$ per un certo parametro θ , e si applica una trasformazione $f(\theta)$, è equivalente ricercare lo stimatore della funzione calcolando semplicemente la funzione dello stimatore:

$$\widehat{f(\theta)} = f(\hat{\theta}) \quad (153)$$

Per esempio, nel calcolo precedente saremmo arrivati allo stesso risultato se invece di calcolare $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \sigma}$ avessimo calcolato $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \sigma^2}$.

Questa è una proprietà molto comoda, che in generale non si applica a tutte le stime. Da questa proprietà deriva spesso il fatto che la stima di ML può risultare distorta: la stima di $f(\theta)$ è legata alla stima di θ dalla derivata $df/d\theta$, cioè ³:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f} \frac{df}{d\theta} \quad (154)$$

L'aggiunta di questo $df/d\theta$ fa sì che se una stima $\hat{\theta}$ non è distorta, l'altra $f(\hat{\theta})$ potrebbe esserlo.

16.2 Efficienza e Disuguaglianza di Cramér-Rao

Una volta ottenuta la stima $\hat{\theta}$ di un parametro, è fondamentale quantificare l'incertezza statistica ad essa associata, la quale è rappresentata dalla varianza:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbb{E} \left[(\hat{\theta} - \mathbb{E}[\hat{\theta}])^2 \right] \quad (155)$$

In molti casi si conosce già questa quantità per via analitica. Infatti, qualora lo stimatore coincida con la media campionaria⁴ ($\hat{\mu} = \bar{x}$), si ottiene direttamente che:

$$\text{Var}(\hat{\mu}) = \frac{\sigma^2}{N} \quad (156)$$

Un'alternativa, qualora il calcolo analitico risulti complesso (ad esempio supponendo di aver stimato un parametro $\hat{\tau}$ ma di non riuscire a calcolarne la varianza), è ricorrere a simulazioni **Monte Carlo**. Si procede in questo modo: si esegue la simulazione della stima di τ per M volte indipendenti e si riportano i risultati in un istogramma. Per il Teorema del Limite Centrale, queste stime avranno una distribuzione normale; ricavando la varianza empirica σ^2 da tale distribuzione, la si può considerare come un'ottima approssimazione numerica della $\text{Var}(\hat{\tau})$.

Oltre a questi approcci, si può sfruttare la **disuguaglianza di Cramér-Rao**. Questo importante teorema fornisce un *limite inferiore* (lower bound) teorico alla varianza di una stima, indipendentemente dal metodo con cui essa è stata calcolata (anche se differisce dal ML):

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{-\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta^2} \right]} \quad (157)$$

Per applicare questa disuguaglianza bisogna fare attenzione a un requisito fondamentale: è richiesto che $\hat{\theta}$ sia una stima *unbiased* (non distorta), cioè che il suo valore atteso coincida col parametro vero, $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta_{\text{vero}}$.

Essendo questo un limite inferiore assoluto, quando si riesce a ottenere uno stimatore la cui varianza soddisfa l'uguaglianza, si può affermare con certezza che la stima effettuata è **efficiente** (ha la minima varianza possibile).

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{\mathbb{E} \left[\left(\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \right)^2 \right]} \quad (158)$$

³in generale questo avviene quando f non è lineare, infatti dalla *disuguaglianza di Jensen*: $\mathbb{E}[f(\theta)] \neq f(\mathbb{E}[\theta])$

⁴Basti vedere, ad esempio, il caso del parametro τ della distribuzione esponenziale studiato precedentemente.

che, come si può vedere, si scrive in maniera equivalente come:

$$\boxed{\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{\mathbb{E}\left[-\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta^2}\right]}} \quad (159)$$

Se $\hat{\theta}$ è *biased*, cioè ha una distorsione b , allora nel numeratore di queste formule si aggiunge un ulteriore termine che dipende dall'entità del bias, e precisamente vale:

$$\left(1 + \frac{\partial b}{\partial \theta}\right)^2 \quad (160)$$

Consideriamo per il momento il caso più semplice senza bias, anche perché in tutti i casi che abbiamo visto il bias si elimina per $N \rightarrow \infty$.

In generale, quando la disuguaglianza vale con il **segno uguale**, allora la stima si può dire **efficiente** (nel senso che è la più efficiente dato che ha la varianza minima possibile).

Esempio 1: Efficienza della media Gaussiana Nel caso di una distribuzione gaussiana, la media aritmetica è una stima efficiente di μ perché si può vedere facilmente che la disuguaglianza vale col segno di uguale. Infatti abbiamo appena visto che se x_i seguono distribuzioni gaussiane con la stessa μ e la stessa σ , allora:

$$\ln \mathcal{L}(x_i; \mu) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi) + \sum_i \ln\left(\frac{1}{\sigma}\right) - \sum_i \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \quad (161)$$

$$\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_i (x_i - \mu) = \frac{1}{\sigma^2} \left[\left(\sum_i x_i \right) - N\mu \right] \quad (162)$$

Se ora calcoliamo la derivata seconda avremo:

$$\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \mu^2} = -\frac{N}{\sigma^2} \quad (163)$$

Dato che questo non dipende più da x , allora il suo valore di aspettazione è il valore ottenuto, cioè:

$$\mathbb{E}\left[\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \mu^2}\right] = \mathbb{E}\left[-\frac{N}{\sigma^2}\right] = -\frac{N}{\sigma^2} \quad (164)$$

Da cui invertendo si ricava che per la disuguaglianza di Cramér-Rao dovremmo avere:

$$\text{Var}(\hat{\mu}) \geq \frac{\sigma^2}{N} \quad (165)$$

Però da altre considerazioni avevamo ricavato che $\text{Var}(\hat{\mu}) = \frac{\text{Var}(x)}{N} = \frac{\sigma^2}{N}$. Quindi in questo caso la disuguaglianza vale col segno di "=" ed è una **stima efficiente**.

Esempio 2: Efficienza del parametro Esponenziale Un altro esempio analogo è quello dell'esponenziale decrescente. In quel caso se per il singolo t_i avevamo:

$$P(t_i; \tau) = \frac{1}{\tau} e^{-t_i/\tau} \quad (166)$$

avevamo trovato che:

$$\ln \mathcal{L} = -N \ln \tau - \sum_i \frac{t_i}{\tau} \quad (167)$$

e

$$\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \tau} = -\frac{N}{\tau} + \sum_i \frac{t_i}{\tau^2} \quad (168)$$

Per cui la derivata seconda è:

$$\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \tau^2} = \frac{N}{\tau^2} - 2 \frac{\sum_i t_i}{\tau^3} = \frac{N}{\tau^2} \left(1 - 2 \frac{\hat{\tau}}{\tau} \right) \quad (169)$$

Avendo usato $\hat{\tau} = \frac{1}{N} \sum_i t_i$. Essendo $\hat{\tau} = \bar{t}$ allora $\mathbb{E}[\hat{\tau}] = \mathbb{E}[\bar{t}] = \tau$, per cui:

$$\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \tau^2} \right] = \mathbb{E} \left[\frac{N}{\tau^2} \left(1 - 2 \frac{\hat{\tau}}{\tau} \right) \right] = \frac{N}{\tau^2} \left(1 - 2 \frac{\tau}{\tau} \right) = -\frac{N}{\tau^2} \quad (170)$$

Di nuovo, sostituendo nella disuguaglianza avremo:

$$\text{Var}(\hat{\tau}) \geq \frac{\tau^2}{N} \quad (171)$$

e avendo visto prima che $\text{Var}(\hat{\tau}) = \frac{\tau^2}{N}$, di nuovo questa è una stima efficiente.

Nota: si è visto che in generale $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta_{\text{vero}}$, ma qui l'approccio è: θ_{vero} è fissato ma io non lo conosco. Quindi uso θ invece di θ_{vero} e considero come cambia $\mathbb{E}[\hat{\theta}]$ al variare di θ , e per semplificare uso $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$. (In generale dovrei scrivere $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = f(\theta)$ e fare il conto da lì).

16.3 Dimostrazione della Disuguaglianza di Cramér-Rao

La dimostrazione della disuguaglianza procede attraverso vari passaggi.

Parte 1: Condizione di stima non distorta

Parto dalla definizione di stima *unbiased*, cioè $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$, che scritto esplicitamente è:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx_1 \int_{-\infty}^{+\infty} dx_2 \dots \int_{-\infty}^{+\infty} dx_N \hat{\theta} \mathcal{L}(x_1, x_2, \dots, x_N; \theta) = \theta \quad (172)$$

Per semplificare uso la seguente notazione compatta:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\theta} \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} = \theta \quad (173)$$

(Per semplicità sto supponendo che gli estremi di integrazione siano $-\infty, +\infty$, ma in realtà il conto torna purché gli estremi di integrazione **non dipendano da θ**).

Ora calcolo la derivata rispetto a θ di ambo i membri dell'equazione precedente. Visto che $\hat{\theta}$ dipende solo dalle x_i , la derivata ha effetto solo su $\mathcal{L}$ e quindi ho:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\theta} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} d\vec{x} = \frac{\partial \theta}{\partial \theta} = 1} \quad (174)$$

Ora scriviamo la derivata sfruttando il fatto che:

$$\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} = \frac{1}{\mathcal{L}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \mathcal{L} \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \quad (175)$$

e sostituendo ho:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\theta} \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} = 1} \quad (1)$$

Parte 2: Condizione di normalizzazione

Questa volta partiamo dalla condizione di normalizzazione di $\mathcal{L}$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} = 1 \quad (176)$$

Manipoliamo come prima questa equazione calcolando la derivata rispetto a θ :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} d\vec{x} = \frac{\partial(1)}{\partial \theta} = 0 \quad (177)$$

e poi introduciamo la derivata del logaritmo:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} = 0} \quad (2)$$

e si noti che la (2) equivale a dire che $\mathbb{E}\left[\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta}\right] = 0$.

Parte 3: Applicazione della Disuguaglianza di Schwarz

Ora moltiplichiamo la (2) per θ e lo sottraiamo alla (1), cioè calcoliamo $(1) - \theta \cdot (2)$ e avremo:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\theta} \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} - \int_{-\infty}^{+\infty} \theta \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} = 1 - 0 \quad (178)$$

e scrivendo tutto come un unico integrale ho:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} (\hat{\theta} - \theta) \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} = 1} \quad (3)$$

A questo punto si usa la **disuguaglianza di Schwarz**:

$$\left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) dx \right) \geq \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \quad (179)$$

estendendola al nostro caso con N dimensioni e usando come:

$$f(\vec{x}) = (\hat{\theta} - \theta) \sqrt{\mathcal{L}(\vec{x}; \theta)}$$

$$g(\vec{x}) = \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \sqrt{\mathcal{L}(\vec{x}; \theta)}$$

in modo che $f(\vec{x})g(\vec{x})$ dà proprio la funzione integranda della (3) e se quindi sostituisco nella disuguaglianza di Schwarz avrò $1^2 = 1$ al secondo membro, e la disuguaglianza diventa:

$$\underbrace{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} (\hat{\theta} - \theta)^2 \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} \right)}_{\mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \mathbb{E}[\hat{\theta}])^2] = \text{Var}(\hat{\theta})} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \right)^2 \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} \right)}_{\mathbb{E}\left[\left(\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta}\right)^2\right]} \geq 1 \quad (180)$$

Sostituendo ho quindi:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \cdot \mathbb{E}\left[\left(\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta}\right)^2\right] \geq 1 \implies \text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{\mathbb{E}\left[\left(\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta}\right)^2\right]} \quad (181)$$

che è proprio una delle formulazioni della disuguaglianza di Cramér-Rao. La quantità al denominatore si chiama spesso **Informazione** seguendo una denominazione introdotta da Fisher e viene indicata con $I(\theta)$.

Parte 4: Formulazione alternativa della derivata seconda

Per ottenere l'altra formulazione della disuguaglianza si può partire dalla (2) e facendo di nuovo la derivata rispetto a θ si ottiene (ricordando che $D[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta^2} \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) + \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} \right] d\vec{x} = 0 \quad (182)$$

e da qui, sfruttando di nuovo il fatto che $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \mathcal{L} \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta}$, si ha:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta^2} \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} = - \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \right)^2 \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} \quad (183)$$

che equivale alla relazione tra i valori di aspettazione:

$$\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta^2} \right] = - \mathbb{E} \left[\left(\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \right)^2 \right] \quad (4)$$

e quindi sostituendo si passa alla formulazione:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{-\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta^2} \right]} \quad (184)$$

Si noti che il primo passaggio della dimostrazione sfrutta il fatto che la stima **non è deformata** (unbiased); se lo fosse, bisognerebbe sostituire $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta + b(\theta)$ e questo darebbe al numeratore un termine:

$$\left(1 + \frac{\partial b}{\partial \theta} \right)^2 \quad (185)$$

16.4 Approfondimento sulla disuguaglianza di Cramér-Rao

Consideriamo la funzione $\mathcal{L}(\vec{x}; \theta) \in (C)^2$ e lo stimatore t di una funzione $\tau(\theta)$. Possiamo definire il suo valore di aspettazione come:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx_1 \int_{-\infty}^{+\infty} dx_2 \dots \int_{-\infty}^{+\infty} dx_N t(\vec{x}) \mathcal{L}(x_1, x_2, \dots, x_N; \theta) = \tau(\theta) + b(\theta) \quad (186)$$

con il significato della (118). Con l'assunzione che il range di $\vec{x}$ sia indipendente da θ , allora ottengo il risultato:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t(\vec{x}) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} d\vec{x} = \frac{\partial \tau(\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial b(\theta)}{\partial \theta} \quad (187)$$

Eseguendo calcoli simili a quelli sopra (3) si va ad ottenere:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (t - \tau(\theta)) \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \mathcal{L}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} = \frac{\partial \tau(\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial b(\theta)}{\partial \theta} \quad (188)$$

che attraverso la disuguaglianza di Schwarz mi porta ad ottenere:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{\left(\frac{\partial \tau}{\partial \theta} + \frac{\partial b}{\partial \theta} \right)^2}{\mathbb{E} \left[\left(\frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \theta} \right)^2 \right]} \quad (189)$$

Nel caso in cui si ha $\tau(\theta) = \theta$ e $b = 0$, riottengo la formula (181). Condizione necessaria e sufficiente per avere un'uguaglianza al posto della disuguaglianza di Schwarz è la seguente:

$$\frac{\partial \ln(\mathcal{L})}{\partial \theta} = A(\theta)(t - \tau(\theta) - b(\theta)) \quad (190)$$

In questo caso vado ad ottenere una soluzione del tipo:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{\left(\frac{\partial \tau}{\partial \theta} + \frac{\partial b}{\partial \theta}\right)^2}{A(\theta)} \quad (191)$$

Definizione: Efficienza di uno stimatore

L'efficienza di uno stimatore è dato dal rapporto tra la MVB e la varianza dello stimatore:

$$\text{efficienza}(t) = \frac{\text{MVB}}{\text{Var}}$$

17 Rilevatore Geiger, Radioattività e Studio dei Dati

Lezione del 09 Aprile 2026

Note su radioattività ambientale

In generale, tutti i nuclei atomici tendono a raggiungere una condizione di stabilità e, per farlo, si frantumano dando luogo al *decadimento radioattivo*. Le tipologie più comuni di decadimento sono:

- α : emissione di 2 protoni + 2 neutroni;
- β : emissione di un elettrone o un positrone;
- γ : radiazione elettromagnetica ad alta energia.

Anche in assenza di sorgenti artificiali, il suolo, l'aria e i materiali che ci circondano possono contenere nuclei instabili. Siamo quindi circondati da un campo di radiazioni, che genera la cosiddetta *radioattività naturale*.

Abbiamo già visto che questo è l'esempio tipico di fenomeni descritti dalla **statistica di Poisson**, i cui tempi di attesa tra un evento e l'altro hanno un andamento esponenziale decrescente, mentre i tempi di attesa per la rilevazione di K eventi seguono l'andamento dato dalla *distribuzione di Erlang*.

Strumentazione per l'acquisizione

I dati delle prossime esercitazioni deriveranno dall'analisi di acquisizioni provenienti da un contatore Geiger. Esso serve ad analizzare i *decadimenti gamma*, la cui distribuzione è, come detto, data da una Poissoniana.

Per il loro rilevamento si è usato un tubo Geiger, che è un cilindro di metallo con all'interno un gas a bassa pressione. Quando una particella ionizzante attraversa il tubo, ionizza il gas e genera una scarica elettrica che viene rilevata da un circuito elettronico. Il segnale così rilevato viene poi convertito in digitale attraverso un Arduino, il quale, tramite l'accensione e lo spegnimento del circuito, misura la differenza di tempo fra due eventi. L'Arduino lavora a 48 GHz.

Esercitazione 4

1. Utilizziamo i dati forniti e grafichiamo l'istogramma dei tempi d'attesa;
2. Utilizziamo il metodo di Maximum Likelihood (ML) per calcolare analiticamente la stima di τ ($\hat{\tau} = \bar{t}$) e la sua varianza ($\sigma_{\hat{\tau}} = \sqrt{\frac{\bar{t}}{n}}$, dove n è il numero di misure);
3. Verifichiamo col metodo grafico (spiegato di seguito) se otteniamo valori compatibili. Ricordiamo che, plottando la distribuzione, dobbiamo graficare entro $\approx 2/3 \sigma_{\hat{\tau}}$, altrimenti non riusciremo a visualizzare bene la regione del massimo;
4. Attuiamo una stima Monte-Carlo per ricavare $\sigma_{\hat{\tau}}$:

- (a) simulo n (uguale a quello dei dati) eventi con distribuzione $\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}$ ponendo $\tau = \hat{\tau}$;
- (b) ripeto per m volte in modo da avere m stime di $\hat{\tau}$;
- (c) costruisco un grafico con le m stime, mi aspetto una gaussiana centrata in $\hat{\tau}$ e con deviazione standard data da $\sqrt{\sum_i \frac{(\hat{\tau}_i - \hat{\tau})^2}{n}}$, e dovrei trovare che quest'ultimo valore è compatibile con i $\sigma_{\hat{\tau}}$ trovati in precedenza.

18 Varianza della stima e Disuguaglianza di Cramer-Rao

Abbiamo visto che la disuguaglianza di Cramer-Rao ci dice che, in generale, per la varianza di uno stimatore $\hat{\theta}$ vale:

$$Var(\hat{\theta}) \geq \frac{-1}{\mathbb{E}\left[\frac{d^2 \ln \mathcal{L}}{d\theta^2}\right]} = \frac{1}{\mathbb{E}\left[\left(\frac{d \ln \mathcal{L}}{d\theta}\right)^2\right]} \quad (192)$$

Una cosa che si può notare è che, data la definizione della funzione di Likelihood per variabili indipendenti:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \dots, x_N; \theta) = \prod_{i=1}^N P(x_i; \theta) \implies \ln \mathcal{L}(x_1, \dots, x_N; \theta) = \sum_{i=1}^N \ln P(x_i; \theta) \quad (193)$$

Se gli x_i vengono tutti dalla stessa popolazione, allora sono descritti dalla stessa densità di probabilità $P(x; \theta)$, per cui:

$$\frac{d^2 \ln \mathcal{L}}{d\theta^2} = \frac{d^2}{d\theta^2} \sum_i \ln P(x_i; \theta) = \sum_i \frac{d^2}{d\theta^2} \ln P(x_i; \theta)$$

e quindi, per il valore di aspettazione:

$$\mathbb{E}\left[\frac{d^2 \ln \mathcal{L}}{d\theta^2}\right] = \sum_i \mathbb{E}\left[\frac{d^2}{d\theta^2} \ln P(x_i; \theta)\right] = N \cdot \mathbb{E}\left[\frac{d^2}{d\theta^2} \ln P(x; \theta)\right]$$

visto che tutte le funzioni $P(x_i; \theta)$ sono uguali. Ne segue quindi che **la varianza minima è inversamente proporzionale alla dimensione del campione** ($1/N$).

18.1 Stima di $\hat{\theta}$ e $Var(\hat{\theta})$ per $N \rightarrow \infty$

Al limite per $N \rightarrow \infty$ si può vedere che l'uguaglianza regge e si ha:

$$Var(\hat{\theta}) = \frac{-1}{\frac{d^2 \ln \mathcal{L}}{d\theta^2} \Big|_{\theta=\theta_0}} = \frac{-1}{\mathbb{E}\left[\frac{d^2 \ln \mathcal{L}}{d\theta^2}\right]}$$

Visto che la stima migliore del valore vero θ_0 è data da $\hat{\theta}$, nei casi in cui il valore di aspettazione di $\mathcal{L}$ non è facilmente calcolabile, si approssima e si indica con $\hat{\sigma}_{\hat{\theta}}^2$:

$$Var(\hat{\theta}) \approx \frac{-1}{\frac{d^2 \ln \mathcal{L}}{d\theta^2} \Big|_{\theta=\hat{\theta}}} \implies \widehat{Var}(\hat{\theta}) = \hat{\sigma}_{\hat{\theta}}^2 \quad (194)$$

Questo si può usare per derivare un **metodo grafico** per stimare la $Var(\hat{\theta})$ sviluppando in serie di Taylor $\ln \mathcal{L}$ intorno a $\hat{\theta}$ (ometto la notazione vettoriale $\vec{x}$ per semplicità):

$$\ln \mathcal{L}(\theta) = \ln \mathcal{L}(\hat{\theta}) + \frac{d \ln \mathcal{L}}{d\theta} \Big|_{\theta=\hat{\theta}} (\theta - \hat{\theta}) + \frac{1}{2!} \frac{d^2 \ln \mathcal{L}}{d\theta^2} \Big|_{\theta=\hat{\theta}} (\theta - \hat{\theta})^2 + \dots$$

Per definizione di $\hat{\theta}$, $\ln \mathcal{L}(\hat{\theta}) = \ln \mathcal{L}_{max}$, mentre **la derivata prima calcolata in $\hat{\theta}$ deve essere nulla** (punto di massimo). Troncando al secondo ordine rimane:

$$\ln \mathcal{L}(\theta) \simeq \ln \mathcal{L}_{max} + \frac{1}{2} \frac{d^2 \ln \mathcal{L}}{d\theta^2} \Big|_{\theta=\hat{\theta}} (\theta - \hat{\theta})^2$$

Sfruttando l'approssimazione per la varianza vista prima, si ha:

$$\ln \mathcal{L}(\theta) \simeq \ln \mathcal{L}_{max} - \frac{1}{2} \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{Var(\hat{\theta})} \quad (195)$$

Quindi (sempre per $N \rightarrow \infty$) la $\ln \mathcal{L}$ ha un andamento parabolico nell'intorno del massimo. In particolare, è una parabola il cui massimo si ha in corrispondenza di $\hat{\theta}$ e il cui asse è parallelo all'asse delle ordinate.

In particolare, ponendo dei valori di θ chiamati $\tilde{\theta}$ tali che:

$$\frac{(\tilde{\theta} - \hat{\theta})^2}{Var(\hat{\theta})} = 1 \implies (\tilde{\theta} - \hat{\theta})^2 = Var(\hat{\theta}) \implies \tilde{\theta} = \hat{\theta} \pm \sigma_{\hat{\theta}} \quad (196)$$

Sostituendo questo risultato nello sviluppo di Taylor, troviamo la caratteristica fondamentale del metodo grafico:

$$\ln \mathcal{L}(\tilde{\theta}) = \ln \mathcal{L}_{max} - \frac{1}{2} \quad (197)$$

Se graficamente si riesce a costruire la funzione $\ln \mathcal{L}(\theta)$ e a determinarne il massimo ($\hat{\theta}$), andando a cercare le intersezioni della parabola con la retta orizzontale posta a $\ln \mathcal{L}_{max} - 1/2$, si riesce a stimare graficamente anche l'errore $\sigma_{\hat{\theta}}$.




Figura 18: Metodo grafico per determinare la stima e l'errore.

Approfondimento dal Rotondi sull'equazione 196

Consideriamo l'espansione di Taylor eseguita in precedenza. Poiché sappiamo che la funzione ML è invariante sotto riparametrizzazioni di θ , cerchiamo una funzione $\nu(\theta)$ tale che la sua varianza sia $\frac{1}{Var(\hat{\nu})} = 1$. Possiamo allora riformulare l'espansione di Taylor come:

$$2 [\ln \mathcal{L}(\hat{\nu}) - \ln \mathcal{L}(\nu)] \approx (\hat{\nu} - \nu)^2$$

Poiché per N grande $\hat{\nu} \sim \mathcal{N}(\nu, 1)$, allora ho l'intervallo di confidenza del 68.3% (1σ) per l'intervallo $\hat{\nu} \pm 1$. Risolvendo per la likelihood otteniamo proprio la condizione usata nel grafico:

$$\ln \mathcal{L}(\hat{\nu}) - \ln \mathcal{L}(\nu) = 0.5 \implies \ln \mathcal{L}(\nu) = \ln \mathcal{L}_{max} - \frac{1}{2}$$

19 Likelihood di più parametri

Nel caso in cui, invece di avere un solo parametro θ , si debba determinare la stima di m parametri $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$, tutto quello che abbiamo visto sin qui semplicemente si generalizza. Per ottenere le stime dei parametri si risolve il sistema di m equazioni del tipo:

$$\frac{\partial \ln \mathcal{L}(x_1, x_2, \dots, x_N; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)}{\partial \theta_i} = 0 \quad \text{per } i = 1, 2, \dots, m \quad (198)$$

(si usa N per le misure x_i e m per i parametri θ_i).

Stavolta al limite per $N \rightarrow \infty$ la funzione di Likelihood tende ad una Gaussiana multi-dimensionale e si introduce quindi la **matrice delle covarianze**, estendendo la formula per stimare la varianza in questo modo:

$$\hat{V}^{-1} = cov^{-1}(\hat{\theta}_i, \hat{\theta}_j) = -\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right] \approx - \left[\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \Big|_{\vec{\theta}=\hat{\vec{\theta}}} \right] \quad (199)$$

Stavolta la $\ln \mathcal{L}$ è più difficile da disegnare, ma per esempio nel caso di $m = 2$, la superficie di livello $\ln \mathcal{L}(\theta_1, \theta_2) = \ln \mathcal{L}_{max} - \frac{1}{2}$ restituisce un'**ellisse** centrata in $\ln \mathcal{L}_{max}$ che ci permette di determinare σ_{θ_1} e σ_{θ_2} graficamente tramite la proiezione delle tangenti all'ellisse sugli assi.




Figura 19: Determinazione grafica degli errori nel caso a 2 parametri ($m = 2$).

20 Binned Maximum Likelihood

Una variante del metodo ML comunemente usata nel caso in cui il nostro set di dati è molto ampio, e risulta complicato calcolare la somma di tutti i $\ln P(x_i; \theta)$, è il metodo **Binned**.

In questo caso si assume di avere molte misure x_i della stessa grandezza fisica che seguono la stessa legge di distribuzione $P(x; \theta)$. L'idea è di formare un **istogramma** con le nostre x_i . Se

l'istogramma ha m bin e indichiamo con $n_1, n_2, \dots, n_m$ i conteggi degli m bin, abbiamo visto che il valore di aspettazione dei conteggi nel bin i -esimo è dato in generale da:

$$\mathbb{E}[n_i] = \nu_i(\theta) = N \int_{x_i - \Delta x/2}^{x_i + \Delta x/2} P(x; \theta) dx \approx N \cdot P(x_i; \theta) \Delta x \quad (200)$$

che stavolta dipende direttamente da θ .

Si può quindi pensare alla misura come a un vettore degli m conteggi n_i (invece che degli N dati puntuali x_i). La pdf congiunta di questi conteggi, cioè la $\mathcal{L}$, è data dalla **distribuzione multinomiale**.

Nota sulla Multinomiale: La multinomiale è un'estensione della binomiale. Nella binomiale ho 2 risultati possibili (successo/insuccesso) con probabilità p e q , e stimo la probabilità di avere K successi in N estrazioni. Nella multinomiale ho m risultati diversi possibili ognuno con la sua probabilità p_i e stimo la probabilità di ottenere n_1 eventi di tipo 1, n_2 di tipo 2, ecc... dal totale di N estrazioni.

Tornando al Binned ML, nel nostro caso le probabilità dei singoli bin sono date da $p_i = \nu_i(\theta)/N$, e quindi la Likelihood diventa:

$$\mathcal{L}(n_1, \dots, n_m; \theta) = \frac{N!}{n_1! n_2! \dots n_m!} \prod_{i=1}^m p_i^{n_i} = \frac{N!}{n_1! n_2! \dots n_m!} \prod_{i=1}^m \left(\frac{\nu_i(\theta)}{N} \right)^{n_i} \quad (201)$$

Passando al logaritmo e prendendo solo i termini che dipendono da θ , otteniamo:

$$\ln \mathcal{L}(n_1, \dots, n_m; \theta) = \sum_{i=1}^m n_i \ln \left(\frac{\nu_i(\theta)}{N} \right) + \text{cost} \quad (202)$$

dove i termini costanti non dipendono da θ e quindi non influenzano la ricerca del massimo. Si procede quindi massimizzando numericamente questa likelihood per trovare $\hat{\theta}$ e con i metodi grafici si può stimare $\sigma_{\hat{\theta}}$.

21 Extended Maximum Likelihood (EML)

Il metodo ML classico permette di stimare i parametri θ e si concentra sulla *forma* della distribuzione. Il metodo EML estende questa stima considerando **anche il numero di eventi come una incognita**.

Questo ha senso in esperimenti in cui si prendono dati per un certo periodo di tempo fissato, in cui si osservano N eventi. Il valore di N sarà solo una stima del numero medio ν di eventi attesi per il processo considerato. Per cui si può moltiplicare la $\mathcal{L}$ vista prima per la probabilità (Poissoniana) di ottenere N eventi in un processo aleatorio per cui la media di eventi attesi è ν :

$$\mathcal{L}^E(x_1, \dots, x_N; \theta, \nu) = \left(e^{-\nu} \frac{\nu^N}{N!} \right) \cdot \prod_{i=1}^N P(x_i; \theta) \quad (203)$$

La likelihood, quindi, ora dipende da **due parametri** ν e θ . Passando ai logaritmi e ignorando i termini che dipendono solo da N (che fungono da costante per la massimizzazione):

$$\ln \mathcal{L}^E = \sum_{i=1}^N \ln P(x_i; \theta) - \nu + N \ln \nu + \text{cost} \quad (204)$$

Scrivendo $N \ln \nu = \sum_{i=1}^N \ln \nu$ e includendolo nel termine della sommatoria, si ha:

$$\ln \mathcal{L}^E(x_1, \dots, x_N; \theta, \nu) = \sum_{i=1}^N \ln [\nu P(x_i; \theta)] - \nu + \text{cost} \quad (205)$$

Quando si massimizza $\ln \mathcal{L}^E$ bisogna ora trattarla come nel caso bidimensionale e la presenza di ν influirà sulla stima di θ se c'è una correlazione tra ν e θ .

Nel caso in cui ν e θ siano **indipendenti**, derivando l'equazione (204) rispetto a ν ottengo:

$$\frac{\partial \ln \mathcal{L}^E}{\partial \nu} = 0 \implies -1 + \frac{N}{\nu} = 0 \implies \hat{\nu} = N \quad (206)$$

e la stima $\hat{\theta}$ è esattamente la stessa di quella che si otterrebbe con il metodo ML standard.

21.1 Applicazione: Segnale e Fondo

L'utilità del metodo EML traspare pienamente quando i dati hanno **due componenti: segnale e fondo**. Si vogliono stimare i parametri fisici θ_s (del segnale) e θ_b (del fondo) oltre che il numero di eventi attesi di segnale (ν_s) e di fondo (ν_b). In questo caso la funzione di densità di probabilità totale diventa una mistura pesata, e la Extended Likelihood dipende da 4 parametri trovando numericamente il massimo di qualcosa del tipo:

$$\ln \mathcal{L}^E(\nu_s, \nu_b, \theta_s, \theta_b) = -(\nu_s + \nu_b) + \sum_{i=1}^N \ln \left(\nu_s P_s(x_i; \theta_s) + \nu_b P_b(x_i; \theta_b) \right) \quad (207)$$

essendo P_s e P_b le densità di probabilità normalizzate del segnale e del fondo.

22 Dal Metodo di Maximum Likelihood ai Minimi Quadrati

Supponiamo che i nostri dati consistano in un set di coppie di valori (x_i, y_i) in cui supponiamo che le x_i siano note con esattezza (senza errore), mentre le y_i vengano misurate con una certa incertezza σ_i . Supponiamo inoltre che le y_i siano in teoria descritte da una certa funzione f delle x_i , che dipende da un certo parametro θ da stimare: $f(x_i; \theta) = y_i$.

Per il teorema del limite centrale possiamo assumere che le misurazioni y_i abbiano distribuzione gaussiana centrata sul valore vero $f(x_i; \theta)$:

$$P(y_i; \theta) = \frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{[y_i - f(x_i; \theta)]^2}{2\sigma_i^2} \right\} \quad (208)$$

Se si usa il metodo di Maximum Likelihood (ML), costruendo la funzione $\mathcal{L}(\vec{y}; \theta) = \prod_i P(y_i; \theta)$ e passandone al logaritmo, si ottiene:

$$\ln \mathcal{L}(\vec{y}; \theta) = -\sum_{i=1}^N \ln(\sigma_i \sqrt{2\pi}) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \frac{[y_i - f(x_i; \theta)]^2}{\sigma_i^2} \quad (209)$$

In questa espressione, il parametro θ entra solo nel secondo addendo. Per cui, trovare il $\hat{\theta}$ che massimizza $\ln \mathcal{L}$ equivale a trovare il $\hat{\theta}$ che **minimizza** la sommatoria finale, indicata abitualmente con χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N \left[\frac{y_i - f(x_i; \theta)}{\sigma_i} \right]^2 \quad (210)$$

Per trovare il θ che minimizza il χ^2 si procede ponendo la derivata prima pari a zero (non serve la derivata seconda perché, essendo una somma di quadrati, il χ^2 ha la forma di una parabola rivolta verso l'alto nell'intorno del minimo):

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial \theta} = 0 \implies \sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_i^2} \frac{\partial f(x_i; \theta)}{\partial \theta} [y_i - f(x_i; \theta)] = 0 \quad (211)$$

Se la funzione f dipende da m parametri $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$, si dovrà risolvere un sistema di m equazioni del tipo:

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial \theta_k} = 0 \quad \text{per } k = 1, 2, \dots, m \quad (212)$$

Una cosa importante da notare è che, in generale, ci si aspetta che la differenza tra il valore misurato y_i e la stima teorica $f(x_i; \theta)$ sia dovuta all'errore sperimentale ϵ_i . Ovvero $y_i = f(x_i; \theta) + \epsilon_i$, con $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$. Da ciò deriva che la quantità residua normalizzata:

$$\frac{y_i - f(x_i; \theta)}{\sigma_i} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (213)$$

22.1 Caso del fit lineare $y = mx + q$

Il caso più comune trattato con il metodo dei minimi quadrati è quello in cui si assume che **tutte le y_i abbiano lo stesso errore σ** (cosa verosimile se si tratta di misurazioni della stessa grandezza fatte con lo stesso strumento) e siano legate alle x_i dalla relazione lineare $y = mx + q$.

I parametri da determinare sono la pendenza m e l'intercetta q . Essendo σ costante, il suo valore può essere portato fuori dalla sommatoria e non influenza la posizione del minimo. Dobbiamo minimizzare la quantità:

$$\sum_{i=1}^N (y_i - mx_i - q)^2 \quad (214)$$

Risolviamo il sistema derivando rispetto ai due parametri:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial m} \sum_i (y_i - mx_i - q)^2 = 0 \\ \frac{\partial}{\partial q} \sum_i (y_i - mx_i - q)^2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \sum_i 2(-x_i)(y_i - mx_i - q) = 0 & (1) \\ \sum_i 2(-1)(y_i - mx_i - q) = 0 & (2) \end{cases} \quad (215)$$

Ignorando i fattori costanti (-2), lavoriamo sull'equazione (2). Sfruttando la proprietà distributiva della sommatoria:

$$\sum_i y_i - m \sum_i x_i - \sum_i q = 0 \implies \sum_i y_i - m \sum_i x_i - Nq = 0$$

Dividendo per N , e introducendo le notazioni delle medie ($\bar{y} = \frac{\sum y_i}{N}$ e $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$):

$$\hat{q} = \bar{y} - \hat{m}\bar{x} \quad (216)$$

Sostituendo questo risultato nell'equazione (1) (che divisa per N diventa $\overline{xy} - m\overline{x^2} - q\bar{x} = 0$):

$$\begin{aligned} \overline{xy} - m\overline{x^2} - (\bar{y} - m\bar{x})\bar{x} &= 0 \\ \overline{xy} - m\overline{x^2} - \bar{y}\bar{x} + m(\bar{x})^2 &= 0 \implies m(\overline{x^2} - \bar{x}^2) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y} \end{aligned}$$

Da cui si ottiene la stima per m :

$$\hat{m} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} \quad (217)$$

E ri-sostituendo nella (216) si ottiene la forma esplicita per $\hat{q}$:

$$\hat{q} = \bar{y} - \left[\frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} \right] \bar{x} = \frac{\bar{y}\overline{x^2} - \overline{xy}\bar{x}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} \quad (218)$$

22.1.1 Notazione compatta

L'uso delle medie rende la notazione compatta da scrivere, ma per i calcoli al computer risulta scomoda per le troppe divisioni per N . Si è soliti definire le somme:

$$S_x = \sum_i x_i, \quad S_y = \sum_i y_i, \quad S_{xx} = \sum_i x_i^2, \quad S_{xy} = \sum_i x_i y_i$$

E il denominatore comune $D = NS_{xx} - (S_x)^2$. Le stime si riscrivono come:

$$\begin{cases} \hat{m} = \frac{NS_{xy} - S_x S_y}{D} \\ \hat{q} = \frac{S_y S_{xx} - S_x S_{xy}}{D} \end{cases} \quad (219)$$

Nota: $\hat{m}$ e $\hat{q}$ non dipendono da σ . Quindi le stime dei parametri si possono calcolare anche se non si conosce a priori l'errore sperimentale, purché si assuma che sia lo stesso per tutti i punti.

22.2 Errori associati alle stime

Per calcolare gli errori su $\hat{m}$ e $\hat{q}$ applichiamo la legge di propagazione degli errori. Poiché le uniche variabili aleatorie con errore sono le y_i , la varianza su una generica funzione $f(y_1 \dots y_N)$

è: $\sigma_f^2 = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial y_i} \right)^2 \sigma_{y_i}^2$.

Riscriviamo $\hat{m}$ mettendo in evidenza y_i :

$$\hat{m} = \frac{\sum_i \frac{x_i y_i}{N} - \bar{x} \sum_i \frac{y_i}{N}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} = \sum_{i=1}^N \underbrace{\left[\frac{x_i - \bar{x}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} \frac{1}{N} \right]}_{\text{costante rispetto a } y_i} y_i$$

Calcoliamo ora la varianza, ricordando che l'errore $\sigma_{y_i} = \sigma$ è costante:

$$\sigma_{\hat{m}}^2 = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \hat{m}}{\partial y_i} \right)^2 \sigma^2 = \sum_{i=1}^N \left[\frac{x_i - \bar{x}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} \frac{1}{N} \right]^2 \sigma^2 \quad (220)$$

Ricordando la definizione di varianza campionaria $\frac{1}{N} \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$, e semplificando i termini, si ottiene:

$$\sigma_{\hat{m}}^2 = \frac{\sigma^2}{N[\overline{x^2} - (\bar{x})^2]} = \frac{N\sigma^2}{D} \quad (221)$$

Con una procedura analoga per l'intercetta si ottiene:

$$\sigma_{\hat{q}}^2 = \frac{\sigma^2 S_{xx}}{D} \quad (222)$$

22.3 Estrapolazione e Covarianza

Una volta trovata la retta di best fit $y = \hat{m}x + \hat{q}$, potremmo voler calcolare il valore previsto y e il suo errore associato per una nuova coordinata x . Le variabili aleatorie in questa equazione sono i parametri stimati $\hat{m}$ e $\hat{q}$ (la x è uno scalare da noi fissato). Per la propagazione degli errori su una somma $z = a\tilde{x} + b\tilde{y}$:

$$Var(y) = x^2 Var(\hat{m}) + Var(\hat{q}) + 2x \cdot cov(\hat{m}, \hat{q}) \quad (223)$$

Per fare questo calcolo ci serve il termine di covarianza. Usando la definizione di $\hat{q} = \bar{y} - \hat{m}\bar{x}$:

$$cov(\hat{m}, \hat{q}) = cov(\hat{m}, \bar{y} - \hat{m}\bar{x}) = \underbrace{cov(\hat{m}, \bar{y})}_{=0} - \bar{x} \cdot cov(\hat{m}, \hat{m}) = -\bar{x} \cdot \sigma_{\hat{m}}^2 \quad (224)$$

Esplicitando si ottiene:

$$cov(\hat{m}, \hat{q}) = -\frac{\bar{x}\sigma^2}{N[x^2 - (\bar{x})^2]} \quad (225)$$

Trucco della traslazione: La cosa interessante di questa formula è che se $\bar{x} = 0$, la covarianza si annulla ($cov(\hat{m}, \hat{q}) = 0$), rendendo la formula della varianza su y molto più semplice. Per questo motivo, in alcuni casi è conveniente operare una traslazione, definendo $x' = x - \bar{x}$ (che ha per costruzione media nulla) ed eseguendo un nuovo fit $y = mx' + q'$. La pendenza della retta non cambia, ma cambia l'intercetta. Con le nuove coordinate si avrà semplicemente: $Var(y) = (x')^2 Var(\hat{m}) + Var(\hat{q}')$.

23 Caso $y = mx + q$ con errori σ_i differenti

Se gli errori σ_i non sono tutti uguali, la quantità da minimizzare non può espellere il σ_i dalla sommatoria:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(y_i - mx_i - q)^2}{\sigma_i^2} \quad (226)$$

Rifacendo la procedura precedente, si trovano formule del tutto simili, eccetto per il fatto che tutte le medie diventano **medie pesate** con peso $w_i = 1/\sigma_i^2$, e la normalizzazione non è più N ma la somma dei pesi. Definiamo:

$$W_x = \sum_i \frac{x_i}{\sigma_i^2}, \quad W_y = \sum_i \frac{y_i}{\sigma_i^2}, \quad W_{xx} = \sum_i \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}, \quad W_{xy} = \sum_i \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}, \quad W = \sum_i \frac{1}{\sigma_i^2} \quad (227)$$

Il nuovo denominatore diventa $D_W = W \cdot W_{xx} - (W_x)^2$. Le nuove stime e i relativi errori sono:

$$\begin{cases} \hat{m} = \frac{W \cdot W_{xy} - W_x W_y}{D_W} \\ \hat{q} = \frac{W_y W_{xx} - W_x W_{xy}}{D_W} \end{cases} \quad \text{ed i rispettivi errori:} \quad \begin{cases} \sigma_{\hat{m}}^2 = \frac{W}{D_W} \\ \sigma_{\hat{q}}^2 = \frac{W_{xx}}{D_W} \end{cases} \quad (228)$$

In questo caso, **le stime di m e q dipendono dai σ_i** . Pertanto, se non conosco gli errori non posso calcolare il fit in maniera matematicamente rigorosa per i pesi sbilanciati.

24 Metodo dei minimi quadrati con istogrammi

Il metodo dei minimi quadrati si può applicare anche nel caso in cui abbiamo dati raccolti sotto forma di **istogramma** (misure di 1 sola grandezza). In tal caso, utilizziamo l'indice j per indicare i bin dell'istogramma ($j = 1, \dots, m$ bin) rispetto all'indice i usato prima per gli N dati. Sostituiamo:

- $y_i \longrightarrow m_j$ (conteggi effettivi nel bin j -esimo)
- $f(x_i; \theta) \longrightarrow \mathbb{E}[m_j] = \nu_j(\theta)$ (valore di aspettazione nel bin j -esimo)

Se immaginiamo di dividere l'asse x in bin di uguale larghezza Δx , centrati in $\tilde{x}_j$:

$$\mathbb{E}[m_j] = \nu_j(\theta) = N \int_{\tilde{x}_j - \frac{\Delta x}{2}}^{\tilde{x}_j + \frac{\Delta x}{2}} P(x; \theta) dx \approx N \cdot P(\tilde{x}_j; \theta) \Delta x \quad (229)$$

Il nostro χ^2 vale quindi:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^m \frac{[m_j - \nu_j(\theta)]^2}{\sigma_j^2} \quad (230)$$

Manca solo da definire σ_j^2 . Assumendo che i conteggi in ogni bin seguano una statistica **Poissoniana**, il valore atteso coincide con la varianza: $\sigma_j^2 \simeq \nu_j(\theta)$ (Metodo del χ^2 di *Pearson*).

$$\chi_{\text{Pearson}}^2 = \sum_{j=1}^m \frac{[m_j - \nu_j(\theta)]^2}{\nu_j(\theta)} \quad (231)$$

Molto spesso, per semplificare i conti, si usa l'approssimazione che la varianza del bin sia circa uguale ai conteggi misurati nel bin stesso, cioè $\sigma_j^2 \simeq m_j$ (Metodo del χ^2 di *Neyman*):

$$\chi_{\text{Neyman}}^2 = \sum_{j=1}^m \frac{[m_j - \nu_j(\theta)]^2}{m_j} \quad (232)$$

Questa ultima formula **funziona bene solo se i bin hanno molti conteggi** e se m_j non discosta molto da $\nu_j(\theta)$. In ogni caso bisogna prestare molta attenzione ai bin per cui $m_j = 0$ oppure $\nu_j(\theta) = 0$ (bisogna eventualmente escluderli dal calcolo per evitare divisioni per zero).

25 Metodo dei minimi quadrati non lineare

Nel caso in cui il modello non riesca a essere ricondotto ad una forma lineare per cui si hanno soluzioni esatte esplicite, si usano **procedure iterative numeriche**. Si parte da un valore iniziale θ_0 , si calcola il χ^2 , e si procede iterativamente aggiornando i parametri ($\theta_1 = \theta_0 + \Delta\theta$) seguendo il gradiente fino a quando non si trova il minimo di χ^2 .

Nella pratica esistono molti modi matematici e librerie per fare ciò, applicando metodi numerici più o meno sofisticati. Qualunque sia il metodo usato, **la scelta del valore iniziale θ_0 da cui partire è di solito fondamentale** per evitare di finire intrappolati in minimi locali.

Vale la pena visualizzare preliminarmente la funzione teorica (con il θ_0 scelto) sovrapposta ai dati sperimentali, per operare un "sanity check" del punto di partenza. Nel campo dell'analisi dati, in Python, tutto questo si fa usando librerie già scritte: ad esempio si può usare la funzione `curve_fit` contenuta nel modulo `scipy.optimize`.

26 Binned Chi Squared

Lezione del 27 Aprile 2026

Stima dell'errore nel caso Binned χ^2

Abbiamo visto che è possibile applicare il metodo dei minimi quadrati direttamente agli istogrammi. Nel caso del metodo *Binned Chi Squared*, la funzione da minimizzare è:

$$\chi^2(\theta) = \sum_{j=1}^m \frac{[m_j - \nu_j(\theta)]^2}{m_j} \quad (233)$$

dove m_j è il contenuto dei bin dell'istogramma e $\nu_j(\theta)$ è il valore di aspettazione di ogni bin dell'istogramma, approssimabile come $\nu_j(\theta) \simeq NP(x_j; \theta)\Delta x$.

Per trovare la stima $\hat{\theta}$ si procede trovando numericamente il minimo di χ^2 . Ma come si fa a trovare l'errore $\sigma_{\hat{\theta}}$? Il procedimento è analogo al metodo grafico visto nel caso della Maximum Likelihood (ML), poiché in fondo il χ^2 deriva da $\ln \mathcal{L}$.

Infatti, se i nostri dati sono coppie (x_i, y_i) e si conosce la funzione che lega le grandezze (cioè $y = f(x; \theta)$), assumendo che le y_i siano distribuite secondo gaussiane con errori σ_i , si arriva a scrivere la likelihood come:

$$\ln \mathcal{L}(\vec{y}; \theta) = -\frac{1}{2} \sum_i \frac{[y_i - f(x_i; \theta)]^2}{\sigma_i^2} + \text{cost} = -\frac{1}{2} \chi^2(\theta) + \text{cost} \quad (234)$$

Da cui otteniamo la relazione fondamentale:

$$\chi^2(\theta) = -2 \ln \mathcal{L}(\theta) + \text{cost}' \quad (235)$$

Questo ci è utile perché avevamo visto che per la varianza vale:

$$\text{var}(\hat{\theta}) \approx \frac{-1}{\left. \frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=\hat{\theta}}} \quad (236)$$

Derivando la (235) rispetto a θ , otteniamo:

$$\frac{\partial^2 \chi^2}{\partial \theta^2} = -2 \frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta^2} \implies \frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \theta^2} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial \theta^2} \quad (237)$$

Sostituendo, ricaviamo la stima della varianza in funzione del χ^2 :

$$\sigma_{\hat{\theta}}^2 = \text{var}(\hat{\theta}) \approx \frac{2}{\left. \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=\hat{\theta}}} \quad (238)$$

Metodo Grafico per la determinazione dell'errore

Possiamo sviluppare $\chi^2(\theta)$ in serie di Taylor attorno al minimo $\hat{\theta}$:

$$\chi^2(\theta) = \chi^2(\hat{\theta}) + \left. \frac{\partial \chi^2}{\partial \theta} \right|_{\theta=\hat{\theta}} (\theta - \hat{\theta}) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=\hat{\theta}} (\theta - \hat{\theta})^2 + \dots \quad (239)$$

Essendo $\hat{\theta}$ un minimo, la derivata prima si annulla e poniamo $\chi^2(\hat{\theta}) = \chi_{\min}^2$. Sostituendo la derivata seconda con la varianza ricavata in precedenza:

$$\chi^2(\theta) \simeq \chi_{\min}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{\text{var}(\hat{\theta})} \right) (\theta - \hat{\theta})^2 = \chi_{\min}^2 + \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\text{var}(\hat{\theta})} \quad (240)$$

Definendo $\tilde{\theta}$ i valori tali per cui $\frac{(\tilde{\theta} - \hat{\theta})^2}{\text{var}(\hat{\theta})} = 1$, ovvero $\tilde{\theta} = \hat{\theta} \pm \sigma_{\hat{\theta}}$, avremo graficamente che:

$$\chi^2(\tilde{\theta}) = \chi_{\min}^2 + 1 \quad (241)$$

Quindi $\sigma_{\hat{\theta}}$ si ricava cercando le intersezioni della parabola locale con il valore del minimo +1.

Nota: Dalla definizione, cerchiamo il modello teorico che si discosta meno dalle misurazioni. Se il modello descrive bene i dati ci aspettiamo che il numeratore del χ^2 sia dell'ordine dell'errore al quadrato al denominatore. Un valore di χ^2 "troppo grande" indica problemi nel modello o nei dati, mentre un valore "troppo piccolo" (cioè varianza dei dati molto minore dell'errore stimato) può significare che stiamo sovrastimando gli errori.

Approfondimento dal Cowan di (241)

Per un modello lineare: $f = A\theta$, posso utilizzare la definizione di χ^2 e ricavare:

$$\chi^2(\theta) = (\mathbf{y} - A\theta)^T V^{-1} (\mathbf{y} - A\theta)$$

Volendo trovare $\hat{\theta}$ risolvo:

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial \theta} = -2A^T V^{-1} (\mathbf{y} - A\theta) \implies \hat{\theta} = (A^T V^{-1} A)^{-1} A^T V^{-1} \mathbf{y} = B\mathbf{y}$$

Utilizzando la propagazione degli errori:

$$\text{cov}(\theta_i, \theta_j) = U = B V B^T = (A^T V^{-1} A)^{-1}$$

dove si è utilizzato quanto trovato sopra per calcolare $B V B^T$.

Espandendo χ^2 rispetto a θ otteniamo:

$$\begin{aligned} \chi^2(\theta) &= \chi^2(\hat{\theta}) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left[\frac{\partial^2 \chi^2}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right]_{\theta=\hat{\theta}} (\theta_i - \hat{\theta}_i)(\theta_j - \hat{\theta}_j) = \\ &= \chi^2(\hat{\theta}) + \frac{1}{2} 2(A^T V^{-1} A)_{ij} (\theta_i - \hat{\theta}_i)(\theta_j - \hat{\theta}_j) = \chi^2(\hat{\theta}) + \frac{1}{2} 2(U)_{ij} (\theta_i - \hat{\theta}_i)(\theta_j - \hat{\theta}_j) \\ &= \chi^2(\hat{\theta}) + (\theta - \hat{\theta})^T U^{-1} (\theta - \hat{\theta}) \end{aligned}$$

Per definizione statistica, il contorno di confidenza a **una deviazione standard** (1σ) per una distribuzione gaussiana multivariata è il luogo dei punti dove:

$$(\theta - \hat{\theta})^T U^{-1} (\theta - \hat{\theta}) = 1$$

Sostituendo questo valore nell'espansione:

$$\chi^2(\theta) = \chi^2(\hat{\theta}) + 1 = \chi_{\min}^2 + 1 \quad (242)$$

27 Distribuzione del χ^2

Per avere un riferimento quantitativo con cui confrontare il risultato della minimizzazione, bisogna conoscere la distribuzione di probabilità $P(\chi^2)$. Seguiamo un ragionamento intuitivo. Se $y_i = f(x_i) + \varepsilon_i$, con errore di misura $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$, allora la variabile standardizzata:

$$u_i = \frac{y_i - f(x_i)}{\sigma_i} \sim \mathcal{N}(0, 1) \implies P_u(u_i) \propto e^{-u_i^2/2} \quad (243)$$

Nel χ^2 i termini appaiono al quadrato, definendo $z_i = u_i^2$. Con il cambio di variabile:

$$P_z(z_i) = P_u(u_i) \left| \frac{du_i}{dz_i} \right| = P_u(\sqrt{z_i}) \frac{1}{2\sqrt{z_i}} \propto \frac{1}{\sqrt{z_i}} e^{-z_i/2} \quad (244)$$

Per le proprietà degli esponenziali, la somma produce un termine del tipo $\prod_i e^{-z_i/2} = e^{-\sum z_i/2} = e^{-\chi^2/2}$. Tenendo conto di tutti i fattori e della normalizzazione, la distribuzione esatta è:

$$P(\chi^2; \nu) = \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} (\chi^2)^{\nu/2-1} e^{-\chi^2/2} \quad (245)$$

Dove $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-y} dy$ è la funzione Gamma di Eulero, e ν è il **numero di gradi di libertà** (ndf).

Il parametro ν corrisponde al numero di elementi indipendenti della sommatoria:

$$\nu = N - \text{numero di parametri} - \text{numero di vincoli} \quad (246)$$

Esempio. Nel caso del Binned χ^2 , abbiamo il vincolo $\sum_{i=1}^m h_i = N$ (la normalizzazione che lega le altezze dei bin) ed un parametro stimato θ . Per cui i gradi di libertà sono $\nu = m - 1 - 1 = m - 2$.

Valore atteso e varianza della distribuzione sono:

$$\mathbb{E}[\chi^2] = \nu \quad \text{e} \quad \text{var}(\chi^2) = 2\nu \quad (247)$$




Figura 20: Distribuzione χ^2 per diversi gradi di libertà (ν). Si nota come all'aumentare di ν la distribuzione si sposti verso destra.

27.1 Comportamento Asintotico e χ^2 ridotto

Questo ci dà un riferimento importante: il valore atteso del minimo del χ^2 è $\approx \nu$. Si definisce quindi il χ^2 **ridotto**:

$$\chi_{\text{rid}}^2 = \frac{\chi^2}{\nu} \quad (248)$$

che in teoria dovrebbe essere ≈ 1 .

27.1.1 Caso ν grande ($\nu \gtrsim 30$)

Il controllo sul χ^2 ridotto ha senso quando ν è grande. Per il Teorema del Limite Centrale, la distribuzione tende a una Normale:

$$P(\chi^2; \nu) \xrightarrow{\nu \gg 1} \mathcal{N}(\nu, 2\nu) \quad (249)$$




Figura 21: Zoom per grandi valori di ν . Si apprezza l'ottima approssimazione a curva Gaussiana.

Per la variabile ridotta $y = \chi^2/\nu$:

$$P_y(y) = P_{\chi^2}(\nu y) \cdot \nu = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\nu}} e^{-\frac{(\nu y - \nu)^2}{2(2\nu)}} \cdot \nu = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2/\nu}} e^{-\frac{(y-1)^2}{2(2/\nu)}} \quad (250)$$

Quindi $\chi^2/\nu \sim \mathcal{N}(1, \frac{2}{\nu})$. È una gaussiana centrata in 1, tanto più stretta quanto maggiore è ν .




Figura 22: Distribuzione del χ^2 ridotto. Per $\nu = 50$ si nota la perfetta sovrapposizione con la normale $\mathcal{N}(1, 2/\nu)$.

27.1.2 Caso ν piccolo

Per ν piccoli la distribuzione del χ^2 è fortemente asimmetrica con lunghe code a destra. Qui la probabilità di fluttuazioni grandi è molto alta, e usare la regola $\chi^2/\nu \approx 1$ non è più un criterio affidabile (grande dispersione).




Figura 23: Asimmetria della distribuzione per piccoli gradi di libertà.

Per ν piccoli, si preferisce usare la variabile causale $z = \sqrt{2\chi^2}$. Calcoliamo la sua distribuzione

tramite $x = z^2/2 \implies dx/dz = z$:

$$P_z(z) = P_x\left(\frac{z^2}{2}\right) \cdot z \quad (251)$$

Si dimostra che questa variabile si può ben approssimare (anche per ν piccoli) come:

$$\sqrt{2\chi^2} \sim \mathcal{N}(\sqrt{2\nu-1}, 1) \quad (252)$$




Figura 24: Distribuzione della variabile ausiliaria $\sqrt{2\chi^2}$ che approssima una gaussiana di varianza 1 anche per bassi ν .

Esercitazione 5

L'esercitazione pratica si compone di diverse parti applicative.

Parte 1: Distribuzioni di Erlang e Poisson

Utilizziamo i dati dell'esercitazione precedente:

1. **Erlang ($k = 2$):** Sommiamo i tempi tra eventi consecutivi a coppie (tempo tra evento i ed $i + 2$) e costruiamo un istogramma. Aggiungiamo gli errori ($\sqrt{m_i}$) e facciamo il fit con la distribuzione di Erlang per ricavare la stima di τ .
2. **Stima di λ :** Considerando $\lambda = 1/\tau$, utilizziamo i metodi di Maximum Likelihood e Minimi Quadrati per stimarlo. Si calcoli il χ^2_{ridotto} controllando che sia prossimo a 1.

Nota: La sommatoria nel χ^2 va fatta solo sui bin non nulli ($m_i > 0$). Solo questi vengono contati nel calcolo dei gradi di libertà ν .

3. **Poisson:** Contiamo il numero di eventi in prefissati intervalli Δt (consigliato $\Delta t = 30$ s). Si tracci l'istogramma dei conteggi e si sovrapponga la distribuzione di Poisson teorica (per sovrapporla correttamente ai dati occorre utilizzare come parametro $\mu = \lambda \Delta t$).

Parte 2: Decadimento Radioattivo e Fit Lineare

Vogliamo eseguire un fit pesato con i conteggi di un contatore Geiger. Se λ è la probabilità di decadimento per unità di tempo, e $N(t)$ è il numero di nuclei non decaduti, la variazione di N nel tempo dt è:

$$dN = -\lambda N(t)dt \implies \frac{dN}{N} = -\lambda dt \quad (253)$$

Integrando tra 0 e t (dove a $t = 0$ i nuclei sono N_0):

$$\ln N = -\lambda t + \text{cost} \implies N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (254)$$

Il contatore Geiger misura i decadimenti per unità di tempo (il tasso di conteggio):

$$m(t) \propto -\frac{dN}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = m_0 e^{-t/\tau} \quad (255)$$

Per usare il metodo dei minimi quadrati lineari, passiamo ai logaritmi:

$$\ln m(t) = \ln m_0 - \frac{t}{\tau} \quad (256)$$

Che è l'equazione di una retta $y = ax + b$ dove:

- $y_i = \ln m(t_i)$
- $x_i = t_i$
- $a = -1/\tau$
- $b = \ln m_0$

Sapendo che i conteggi seguono una statistica di Poisson, l'errore sul singolo conteggio è $\sigma_{m_i} = \sqrt{m_i}$. Poiché abbiamo applicato una trasformazione logaritmica ($y = \ln m$), dobbiamo usare la **propagazione degli errori** per trovare σ_{y_i} :

$$\sigma_{y_i}^2 = \left(\frac{\partial \ln m}{\partial m} \right)^2 \sigma_{m_i}^2 = \left(\frac{1}{m_i} \right)^2 m_i = \frac{1}{m_i} \implies \sigma_{y_i} = \frac{1}{\sqrt{m_i}} \quad (257)$$

Faremo un fit lineare pesato utilizzando pesi $w_i = 1/\sigma_{y_i}^2 = m_i$.

Nota: Questo metodo funziona bene se m_i è abbastanza grande (dell'ordine delle decine), perché la Poissoniana si può approssimare a una Gaussiana. Il logaritmo inoltre amplifica enormemente le differenze per piccoli valori (mentre $\ln 10 \sim \ln 11$, tra $\ln 1$ e $\ln 2$ c'è molta differenza). Le asimmetrie naturali della Poissoniana a bassi conteggi verrebbero amplificate dalla distorsione del logaritmo, invalidando i presupposti dei minimi quadrati gaussiani.

Codice Python: Generazione Distribuzioni χ^2

Di seguito il codice Python utilizzato per esplorare la forma analitica della distribuzione del χ^2 , i suoi limiti per grandi gradi di libertà ($\nu \geq 30$) e la linearizzazione per ν piccolo tramite la variabile ausiliaria $\sqrt{2\chi^2}$.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Distribuzione del chi quadro"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import chi2, norm

# 1. Valori di gradi di liberta (generale)
ndf_values = [2, 5, 10, 30, 50]
x = np.linspace(0, 100, 1000)

plt.figure(figsize=(10, 6))
for ndf in ndf_values:
    y = chi2.pdf(x, df=ndf)
    plt.plot(x, y, label=f'$\chi^2$ (n={ndf})')

# Sovrapposizione gaussiana per n grande
ndf_large = 50
mean = ndf_large
std = np.sqrt(2 * ndf_large)
gauss = norm.pdf(x, loc=mean, scale=std)
plt.plot(x, gauss, 'k--', linewidth=2, label=f'Gaussiana (n={ndf_large})')

plt.title('Distribuzione $\chi^2$ per diversi gradi di liberta')
plt.xlabel('$\chi^2$')
plt.ylabel('Densita di probabilita')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

# 2. Zoom per grandi valori di gradi di liberta
ndf_values = [30, 50]
plt.figure(figsize=(10, 6))
for ndf in ndf_values:
    y = chi2.pdf(x, df=ndf)
    plt.plot(x, y, label=f'$\chi^2$ (n={ndf})')
    mean = ndf
    std = np.sqrt(2 * ndf)
    gauss = norm.pdf(x, loc=mean, scale=std)
    plt.plot(x, gauss, '--', linewidth=2, label=f'Gaussiana (n={ndf})')

plt.title('Distribuzione $\chi^2$ per grandi gradi di liberta')
plt.xlabel('$\chi^2$')
plt.ylabel('Densita di probabilita')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```

# 3. Zoom per piccoli valori di gradi di liberta
ndf_values = [5, 10]
x_small = np.linspace(0, 30, 300)
plt.figure(figsize=(10, 6))
for ndf in ndf_values:
    y = chi2.pdf(x_small, df=ndf)
    plt.plot(x_small, y, label=f'$\chi^2$ (n={ndf})')
    mean = ndf
    std = np.sqrt(2 * ndf)
    gauss = norm.pdf(x_small, loc=mean, scale=std)
    plt.plot(x_small, gauss, '--', linewidth=2, label=f'Gaussiana (n={ndf})')

plt.title('Distribuzione $\chi^2$ per piccoli gradi di liberta')
plt.xlabel('$\chi^2$')
plt.ylabel('Densita di probabilita')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

# 4. Forma del chi quadro ridotto
ndf_values = [2, 5, 10, 30, 50]
plt.figure(figsize=(10, 6))
x_red = np.linspace(0, 3, 1000)

for ndf in ndf_values:
    y = chi2.pdf(x_red * ndf, df=ndf) * ndf # cambio variabile P(y)=P(x)*dx/dy
    plt.plot(x_red, y, label=f'$\chi^2$ ridotto (n={ndf})')

# Gaussiana di riferimento N(1, 2/n)
ndf_large = 50
mean = 1
std = np.sqrt(2 / ndf_large)
gauss = norm.pdf(x_red, loc=mean, scale=std)
plt.plot(x_red, gauss, ls='--', label=f'Gaussiana N(1, 2/n) (n={ndf_large})')

plt.title('Distribuzione $\chi^2$ ridotto per diversi gradi di liberta')
plt.xlabel('$\chi^2 / n$')
plt.ylabel('Densita di probabilita')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

# 5. Plot della variabile ausiliaria radice di 2 * chi quadro
ndf_values = [5, 10]
x_aux = np.linspace(0, 10, 100)
plt.figure(figsize=(10, 6))

for ndf in ndf_values:
    y = chi2.pdf(x_aux**2 / 2, df=ndf) * x_aux # cambio variabile
    plt.plot(x_aux, y, label=f'$\sqrt{2\chi^2}$ (n={ndf})')

    mean = np.sqrt(2 * ndf - 1)
    std = 1
    gauss = norm.pdf(x_aux, loc=mean, scale=std)

```

```
plt.plot(x_aux, gauss, '--', linewidth=2, label=f'Gaussiana N( $\sqrt{2n-1}$ ), 1) (n={ndf})')

plt.title('Distribuzione di  $\sqrt{2\chi^2}$  per piccoli gradi di libert ')
plt.xlabel('  $\sqrt{2\chi^2}$  ')
plt.ylabel('Densita di probabilit ')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Listing 12: Script per l'analisi della distribuzione del χ^2

28 Fit non lineari e Test di Ipotesi

Lezione del 04/05/2026

28.1 Fit non lineare

28.1.1 Metodo di Gauss-Newton

Il metodo di Gauss-Newton è utilizzato per risolvere problemi di minimizzazione del χ^2 quando la funzione di fit $f(x, \theta)$ non è lineare rispetto ai parametri θ . Consideriamo un set di misurazioni fisiche date da variabili nella forma (x_i, y_i) , tali per cui vale la relazione teorica $y_i = f(x_i, \theta)$. Si procede definendo l' i -esimo residuo come:

$$r_i(\theta) = y_i - f(x_i, \theta) \quad (258)$$

Considerando le coordinate (x_i, y_i) fissate dai dati, il problema da risolvere è trovare il minimo della somma dei residui pesati (il χ^2):

$$\chi^2 = S(\theta) = \sum_i \frac{r_i^2(\theta)}{\sigma_{y_i}^2} = \sum_i w_i r_i^2(\theta)$$

dove si è indicato il peso $w_i = \frac{1}{\sigma_{y_i}^2}$.

Per minimizzare $S(\theta)$, si cerca di rendere il problema lineare nel parametro θ . Per farlo, si linearizzano i residui attorno a un valore iniziale θ sviluppando in **serie di Taylor troncata al primo ordine**:

$$r_i(\theta + \Delta\theta) \simeq r_i(\theta) + \frac{dr_i}{d\theta} \Delta\theta$$

Dalla definizione di $r_i(\theta)$ è chiaro che $\frac{dr_i}{d\theta} = -\frac{\partial f(x_i, \theta)}{\partial \theta}$. Per semplicità di scrittura, indichiamo:

$$A_i = \frac{\partial f(x_i, \theta)}{\partial \theta} \implies r_i(\theta + \Delta\theta) \simeq r_i(\theta) - A_i \Delta\theta \quad (259)$$

Supponiamo ora di partire da un *guess* (stima) iniziale sul parametro θ che indichiamo con $\theta^{(0)}$. Avremo che:

$$r_i(\theta^{(0)} + \Delta\theta) \simeq r_i^{(0)} - A_i \Delta\theta \quad (260)$$

dove $r_i^{(0)} = y_i - f(x_i, \theta^{(0)})$. Sostituiamo questa espressione linearizzata all'interno della formula di S :

$$S^{(0)}(\Delta\theta) = \sum_i w_i \left[r_i^{(0)} - A_i \Delta\theta \right]^2 \quad (261)$$

Questa equazione ora è semplice. Per trovare il minimo si annulla la derivata rispetto a $\Delta\theta$:

$$\frac{dS^{(0)}}{d\Delta\theta} = 0 \implies \sum_i w_i \cdot 2 \left[r_i^{(0)} - A_i \Delta\theta \right] (-A_i) = 0$$

Risolvendo rispetto a $\Delta\theta$ otteniamo l'aggiornamento per il parametro:

$$\Delta\theta = \frac{\sum_i w_i A_i r_i^{(0)}}{\sum_i w_i A_i^2} = \frac{\sum_i w_i A_i [y_i - f(x_i, \theta^{(0)})]}{\sum_i w_i A_i^2} \quad (262)$$

Trovato $\Delta\theta$, si calcola il nuovo valore $\theta^{(1)} = \theta^{(0)} + \Delta\theta$ e si reitera tutto il procedimento, calcolando un nuovo $\Delta\theta$ e continuando finché l'incremento diventa trascurabile ($\Delta\theta \simeq 0$) e il χ^2 si stabilizza ($S^{(k+1)} \simeq S^{(k)}$). Da notare che per la convergenza è **fondamentale partire da valori ragionevoli** per il guess iniziale $\theta^{(0)}$.

28.2 Fit con errore su x

Nel caso in cui il fit sia complicato dal fatto che non si possono ignorare gli errori sulle x (perché, ad esempio, le incertezze su x e y sono simili, o la funzione non è facilmente invertibile per scambiare semplicemente i ruoli di x e y), esistono metodi per continuare a utilizzare la minimizzazione del χ^2 . Vedremo in particolare due approcci:

- **Effective Variance** (Varianza Efficace)
- **Orthogonal Distance Regression** (ODR)

Effective Variance (Varianza Efficace)

In questo metodo l'errore su x viene "proiettato" e incluso nell'errore su y tramite la derivata prima della funzione f . Supponiamo che le misure siano distribuite normalmente: $x_i \sim \mathcal{N}(\hat{x}_i, \sigma_{x_i}^2)$ e $y_i \sim \mathcal{N}(\hat{y}_i, \sigma_{y_i}^2)$, con $\hat{y}_i = f(\hat{x}_i)$. La quantità $y - f(x)$ si può riscrivere aggiungendo e sottraendo il valore vero $\hat{y} = f(\hat{x})$:

$$y - f(x) = (y - \hat{y}) + (f(\hat{x}) - f(x))$$

Possiamo sviluppare in serie di Taylor $f(x)$ attorno al valore vero $\hat{x}$:

$$f(x) \simeq f(\hat{x}) + (x - \hat{x})f'(\hat{x}) \implies f(\hat{x}) - f(x) \simeq (\hat{x} - x)f'(\hat{x})$$

Sostituendo, otteniamo: $y - f(x) \simeq (y - \hat{y}) + (\hat{x} - x)f'(\hat{x})$. Calcoliamo ora la varianza di questa quantità, considerando che gli errori su x e y sono statisticamente indipendenti ($\text{Cov}(x, y) = 0$):

$$\begin{aligned} \text{var}(y - f(x)) &= \text{var}(y - \hat{y}) + (\hat{x} - x)f'(\hat{x}) \\ &= \text{var}(y - \hat{y}) + \text{var}((\hat{x} - x))[f'(\hat{x})]^2 \\ &= \sigma_y^2 + \sigma_x^2[f'(\hat{x})]^2 \simeq \sigma_y^2 + \sigma_x^2[f'(x)]^2 \end{aligned}$$

(nell'ultimo passaggio approssimiamo $f'(\hat{x})$ con la derivata valutata nel punto misurato, assumendo σ_x piccolo). Abbiamo così definito la **varianza efficace**:

$$\sigma_{\text{eff}}^2 = \sigma_y^2 + \sigma_x^2[f'(x)]^2 \quad (263)$$

La nuova formula del χ^2 da minimizzare diviene quindi:


$$\chi^2 = S(\theta) = \sum_i \frac{[y_i - f(x_i, \theta)]^2}{\sigma_{y_i}^2 + \sigma_{x_i}^2[f'(x_i, \theta)]^2} \quad (264)$$

Nota 1: Se $\sigma_{x_i} = 0$, la formula torna ad essere l'espressione classica del χ^2 .

Nota 2: E' importante notare un fatto: nella formula di χ^2 inserisco al numeratore i residui *osservati*, mentre al denominatore inserisco la varianza della "variabile aleatoria residuo". Ivi si evidenzia la natura "fisica" del χ^2 , il quale viene utilizzato per rapportare la discrepanza osservata con quella attesa. Utilizzando la variabile Z , con gaussiana centrata in 0 e deviazione standard 1: ogni addendo della somma è una variabile Z^2 con valore atteso $E[Z^2] = 1$. Di conseguenza, il χ^2 restituisce, se il modello è corretto, 1 per ogni termine della sommatoria. Il confronto $\chi^2 \approx NDF$ diventa quindi il criterio per stabilire se gli scarti osservati siano semplici fluttuazioni statistiche (1σ in media per punto) o segnali di un'inadeguatezza del modello. Vengono utilizzati gli NDF poichè i parametri sono stati stimati con gli stessi dati presi per stimare χ^2 , perdendo così, per ogni parametro un grado di libertà.

Orthogonal Distance Regression (ODR)

Un altro modo di affrontare il problema è cercare di minimizzare le **distanze ortogonali** dei punti sperimentali dalla curva teorica di fit, invece che minimizzare la sola distanza verticale come si fa nel χ^2 standard.



Se indichiamo con $(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i)$ il punto sulla curva più vicino rispetto alle misurazioni (x_i, y_i) , la distanza quadratica pesata da minimizzare diviene:

$$D_i^2(\tilde{x}_i) = W_{x_i}(x_i - \tilde{x}_i)^2 + W_{y_i}[y_i - f(\tilde{x}_i)]^2 \quad (265)$$

dove i pesi sono inversamente proporzionali alle varianze: $W_{x_i} = 1/\sigma_{x_i}^2$ e $W_{y_i} = 1/\sigma_{y_i}^2$. La quantità totale da minimizzare è quindi $\chi^2 = \sum D_i^2$. Questo metodo è implementato in Python tramite librerie come `scipy.odr`.

Dal punto di vista pratico, i software online minimizzano le correzioni da apportare, che indichiamo con δx_i per le x_i e con ϵ_i per le y_i . Il vincolo imposto alla curva è:

$$y_i + \epsilon_i = f(x_i + \delta x_i, \theta) \implies \epsilon_i = -y_i + f(x_i + \delta x_i, \theta)$$

E la quantità da minimizzare assume la forma:

$$S = \sum_i \left(\frac{\delta x_i^2}{\sigma_{x_i}^2} + \frac{\epsilon_i^2}{\sigma_{y_i}^2} \right) \quad (266)$$

Per applicare la minimizzazione riutilizziamo il **metodo di Gauss-Newton**. Sviluppiamo in serie di Taylor la funzione f in **due variabili** (i residui e le dipendenze da θ e x):

$$f(x_i + \delta x_i, \theta + \Delta\theta) \simeq f(x_i, \theta) + \frac{\partial f}{\partial \theta} \Delta\theta + \frac{\partial f}{\partial x} \delta x_i$$

Se indichiamo come prima $r_i^{(0)} = y_i - f(x_i, \theta^{(0)})$ e definiamo le derivate valutate all'iterazione:

$$A_i = \frac{\partial f}{\partial \theta} \quad \text{e} \quad B_i = \frac{\partial f}{\partial x}$$

l'espressione al primo passaggio (per $\theta = \theta^{(0)}$) diventa per l'errore ϵ_i :

$$\epsilon_i \simeq -y_i + f(x_i, \theta^{(0)}) + A_i \Delta\theta + B_i \delta x_i = -r_i^{(0)} + A_i \Delta\theta + B_i \delta x_i$$

Elevando al quadrato ϵ_i all'interno della funzione somma da minimizzare si ha:

$$S^{(0)}(\Delta\theta, \delta x_i) = \sum_i \left[\frac{\delta x_i^2}{\sigma_{x_i}^2} + \frac{(-r_i^{(0)} + A_i \Delta\theta + B_i \delta x_i)^2}{\sigma_{y_i}^2} \right] \quad (267)$$

Per togliere la dipendenza da δx_i poniamo a zero la sua derivata parziale $\frac{\partial S^{(0)}}{\partial \delta x_i} = 0$ ⁵:

$$\frac{2\delta x_i}{\sigma_{x_i}^2} + \frac{2B_i}{\sigma_{y_i}^2}(-r_i^{(0)} + A_i\Delta\theta + B_i\delta x_i) = 0$$

Risolvendo per δx_i si trova analiticamente:

$$\delta x_i = \frac{B_i\sigma_{x_i}^2}{\sigma_{y_i}^2 + B_i^2\sigma_{x_i}^2}(r_i^{(0)} - A_i\Delta\theta)$$

Sostituendo questo δx_i all'interno di $S^{(0)}$ otteniamo una forma sorprendentemente nota:

$$S^{(0)}(\Delta\theta) = \sum_i \frac{(r_i^{(0)} - A_i\Delta\theta)^2}{\sigma_{y_i}^2 + B_i^2\sigma_{x_i}^2} \quad (268)$$

Si nota immediatamente che il denominatore non è nient'altro che la **Varianza Efficace** trovata precedentemente ($\sigma_{\text{eff},i}^2 = \sigma_{y_i}^2 + B_i^2\sigma_{x_i}^2$). Minimizzando infine questa espressione rispetto a $\Delta\theta$ per trovare l'aggiornamento dei parametri:

$$\Delta\theta = \frac{\sum_i W_{\text{eff},i} A_i r_i^{(0)}}{\sum_i W_{\text{eff},i} A_i^2} \quad \text{con} \quad W_{\text{eff},i} = \frac{1}{\sigma_{\text{eff},i}^2} \quad (269)$$

La formula finale all'interno di ogni iterazione è **identica** a quella del fit in cui si minimizza verticalmente, a patto di sostituire σ_{y_i} con $\sigma_{\text{eff},i}$.

28.3 Test di Ipotesi

In molti casi, l'informazione che vogliamo dedurre dai dati non è una stima numerica di un parametro, bensì la risposta a una precisa domanda (Es: "*Il segnale segue un andamento lineare?*"). La branca della statistica che formalizza queste domande sotto forma di test numerici per decidere se accettare o rifiutare una teoria è detta **Test di Ipotesi**.

Il primo passaggio è formulare le ipotesi. Si definiscono generalmente:

- **L'ipotesi nulla** (H_0): è l'ipotesi di "nessun effetto" o l'ipotesi base. Di norma è quello che si cerca di testare o confutare (ad esempio, l'ipotesi che i dati contengano solo rumore di fondo).
- **L'ipotesi alternativa** (H_1): è l'ipotesi contrapposta ad H_0 (ad esempio, l'ipotesi che ci sia il segnale fisico che stiamo cercando).

Quando scegliamo se accettare o rigettare un'ipotesi, possiamo incorrere in due tipi di **errori**:

1. **Errore di Tipo I (Falso positivo)**: Rigettare l'ipotesi H_0 quando in realtà essa era corretta.
2. **Errore di Tipo II (Falso negativo)**: Accettare l'ipotesi H_0 quando in realtà era sbagliata (cioè era vera l'alternativa H_1).

Per quantificare matematicamente questi errori si utilizzano la **Significatività** e la **Potenza** del test.


⁵facendo questo passaggio troviamo la minima distanza orizzontale per ogni spostamento verticale (dovuto a variazioni θ), minimizzeremo poi la distanza verticale (per variazioni di θ), trovando infine che il parametro θ stimato minimizzerà la distanza verticale e orizzontale, e, di conseguenza la distanza ortogonale

28.3.1 Significatività del test (α)

A partire dai dati costruiamo una *variabile di test* t . Questa variabile avrà una certa densità di probabilità $P_0(t)$ supponendo che sia vera l'ipotesi nulla H_0 . Il metodo stabilisce una **soglia** t_s (soglia critica). Se il nostro valore misurato t è maggiore di t_s , **rigettiamo** H_0 in quanto troppo incompatibile con la distribuzione attesa. La regione $t > t_s$ prende il nome di *regione critica*.

L'integrale della $P_0(t)$ nella regione critica ci fornisce il **livello di significatività** del test (indicato con α), che stima la probabilità di commettere un Errore di Tipo I:

$$\alpha = \int_{t_s}^{\infty} P_0(t) dt \quad (270)$$



Definire α significa accettare che, anche se il modello fosse perfetto, nel $100\alpha\%$ degli esperimenti osserveremo per puro caso una discrepanza tale da portarci a rigettare l'ipotesi.


28.3.2 Potenza del test ($1 - \beta$)

Mentre nel calcolo di α si teneva conto solo della distribuzione H_0 , per valutare gli **Errori di Tipo II** si deve assumere di conoscere la densità di probabilità $P_1(t)$ nel caso in cui sia vera l'ipotesi alternativa H_1 . Integrando $P_1(t)$ nella regione in cui il test ci direbbe di accettare H_0 (cioè da $-\infty$ a t_s), troviamo la probabilità β che il nostro dato possa soddisfare anche l'ipotesi alternativa:

$$\beta = \int_{-\infty}^{t_s} P_1(t) dt \quad (271)$$

La **Potenza del test** è definita come l'abilità del test di riconoscere correttamente l'ipotesi H_1 scartando H_0 , e vale:

$$\text{Potenza} = 1 - \beta$$



L'ideale, ovviamente, sarebbe avere sia α che β molto piccoli. Questo si verifica unicamente quando le due curve di distribuzione P_0 e P_1 sono ben distanti e separate.

Nella pratica, essendo parzialmente sovrapposte, vi deve sempre essere un **compromesso**. Modificando la soglia critica t_s è inevitabile che, per diminuire α , si debba automaticamente causare un aumento di β (e viceversa). La decisione su dove piazzare la soglia è dunque dettata da quale tipo di errore siamo più propensi ad accettare nel nostro esperimento fisico.

29 da integrare dopo

29.0.1 Parte di Bressan: Proprietà generali e Propagazione degli Errori

In questa sezione richiamiamo alcuni concetti generali sulle funzioni di distribuzione a più variabili e sulla propagazione degli errori, utili per il prosieguo.

Funzione di distribuzione per variabili casuali n-dimensionali

Se la funzione di densità di probabilità $f(\vec{x})$ dipende da n variabili, indicate con il vettore $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, il **valore di aspettazione** è dato da:

$$\mathbb{E}[\vec{x}] = \int \vec{x} f(\vec{x}) d\vec{x} \quad (272)$$

Per un singolo valore x_i si ha:

$$\mathbb{E}[x_i] = \int x_i f(\vec{x}) d\vec{x} \quad (273)$$

Si definisce allora il generico elemento ij della **matrice della covarianza** V come:

$$V_{ij} = \mathbb{E}[(x_i - \mu_i)(x_j - \mu_j)] = \int (x_i - \mu_i)(x_j - \mu_j) f(\vec{x}) d\vec{x} \quad (274)$$

da cui deduciamo che:

- Gli elementi sulla diagonale ($i = j$) sono le varianze: $V_{ii} = \sigma_i^2$
- Gli elementi fuori dalla diagonale ($i \neq j$) rappresentano le covarianze tra le diverse variabili.

È utile definire il **coefficiente di correlazione**:

$$\rho(x_i, x_j) = \frac{\text{Cov}(x_i, x_j)}{\sigma_i \sigma_j} \quad (275)$$

Indipendenza e funzione marginale

La funzione di distribuzione congiunta rappresenta la probabilità che le n variabili casuali cadano contemporaneamente all'interno di certi intervalli. Essa gode delle stesse proprietà della funzione di distribuzione usuale.

È possibile definire la **funzione di distribuzione marginale** per una singola variabile x_i , ottenuta integrando la funzione congiunta su tutti i domini delle restanti variabili x_j (con $j \neq i$).

Si ha così una definizione rigorosa per variabili **indipendenti**:

- La distribuzione congiunta fattorizza: $f(\vec{x}) = f_1(x_1)f_2(x_2) \cdots f_n(x_n)$
- I valori di aspettazione si separano: $\mathbb{E}[x_i x_j] = \mathbb{E}[x_i] \mathbb{E}[x_j]$
- Di conseguenza: $\text{Cov}(x_i, x_j) = 0$ e $\rho(x_i, x_j) = 0$.

A livello campionario (misurazioni sperimentali), la covarianza tra due variabili X e Y si stima come:

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \quad (276)$$

La distribuzione normale multivariata

Se le variabili sono *indipendenti*, la funzione di distribuzione di Gauss per la singola variabile è:

$$f(x_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} \exp \left[-\frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2} \right] \quad (277)$$

La distribuzione congiunta diventa quindi il prodotto delle singole marginali:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \prod_{i=1}^n \sigma_i} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2} \right] \quad (278)$$

29.1 Trasformazione di variabili casuali

Data una variabile casuale $Y = y(X)$ dipendente da un'altra variabile casuale X , vogliamo ricavare la densità di probabilità $g(y)$ conoscendo $f(x)$.

Nel caso di **corrispondenza biunivoca** (es. $y = ax + b$), la conservazione della probabilità impone che $f(x)dx = g(y)dy$. Se esiste la funzione inversa $x = x(y)$, la determinazione di $g(y)$ si riduce ad una trasformazione di variabile:

$$g(y) = f(x(y)) \left| \frac{dx(y)}{dy} \right| \quad (279)$$

Nel caso di funzioni **non biunivoche**, cioè in cui esistono m rami invertibili per cui $y = y(x_i)$ (es. $y = ax^2$), allora si "sommano le diverse componenti biunivoche":

$$g(y) = \sum_{i=1}^m f(x_i(y)) \left| \frac{dx_i(y)}{dy} \right| \quad (280)$$

29.2 Legge di propagazione degli errori

Se risulta difficile calcolare analiticamente $g(y)$, ci si accontenta di calcolare il **valore di aspettazione** e la **varianza** della nuova variabile:

$$\begin{aligned} \mu_y &= \mathbb{E}[y] = \int y g(y) dy = \int y(x) f(x) dx \\ \sigma_y^2 &= \mathbb{E}[(y - \mu_y)^2] = \int (y(x) - \mu_y)^2 f(x) dx \end{aligned}$$

Se l'andamento è **lineare** ($y(x) = ax + b$), si ha banalmente:

$$\mathbb{E}[y(x)] = a\mathbb{E}[x] + b \quad \implies \quad \sigma_y^2 = \mathbb{E}[y^2] - \mu_y^2 = a^2 \sigma_x^2 \quad (281)$$

Se $y(x)$ **non è lineare**, si utilizza lo sviluppo di Taylor centrato in μ_x . Troncando lo sviluppo per il valore di aspettazione al secondo ordine:

$$\begin{aligned}\mu_y = \mathbb{E}[y] &= \mathbb{E} \left[y(\mu_x) + \frac{dy}{dx} \Big|_{\mu_x} (x - \mu_x) + \frac{1}{2} \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{\mu_x} (x - \mu_x)^2 + \dots \right] \\ &= y(\mu_x) + \frac{dy}{dx} \Big|_{\mu_x} \mathbb{E}[x - \mu_x] + \frac{1}{2} \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{\mu_x} \mathbb{E}[(x - \mu_x)^2] + \dots \\ &\approx y(\mu_x) + \frac{1}{2} \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{\mu_x} \sigma_x^2\end{aligned}$$

(Il termine del primo ordine scompare perché $\mathbb{E}[x - \mu_x] = \mu_x - \mu_x = 0$).

Per la varianza, approssimando al primo ordine, otteniamo la nota **legge di propagazione della varianza**:

$$\begin{aligned}\sigma_y^2 = \mathbb{E}[(y - \mu_y)^2] &\approx \mathbb{E} \left[\left(y(\mu_x) + \frac{dy}{dx} \Big|_{\mu_x} (x - \mu_x) - y(\mu_x) \right)^2 \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\left(\frac{dy}{dx} \Big|_{\mu_x} \right)^2 (x - \mu_x)^2 \right] = \left(\frac{dy}{dx} \Big|_{\mu_x} \right)^2 \sigma_x^2\end{aligned}$$

29.2.1 Generalizzazione a più variabili

Per funzioni a più variabili $y(x_1, \dots, x_n)$, lo sviluppo in serie di Taylor nell'intorno del punto medio $\vec{\mu}_x$ genera termini con le derivate parziali. La varianza finale, assumendo variabili *indipendenti* (per cui i termini incrociati $\text{Cov}(x_i, x_j) = 0$), risulta essere:

$$\sigma_y^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \Big|_{\vec{\mu}_x} \right)^2 \sigma_{x_i}^2 \quad (282)$$

Nota: Ricordiamo inoltre un caso notevole: se la funzione è un **prodotto** del tipo $y = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$, applicando la formula precedente si ottiene la relazione per la propagazione dell'errore relativo:

$$\frac{\sigma_y^2}{y^2} = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \left(\frac{\sigma_{x_i}}{x_i} \right)^2 \quad (283)$$

da cui si può dedurre rapidamente quali incertezze sono dominanti e quali trascurabili.

29.3 Varianza della media e Compatibilità

Vediamo il caso di una variabile che è la media di n misure indipendenti:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (284)$$

Applicando la propagazione degli errori, la varianza della media è:

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \bar{x}}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_{x_i}^2 \quad (285)$$

Essendo che questa derivata vale sempre $1/n$, se assumiamo che tutte le misure provengano dalla stessa distribuzione (e abbiano quindi la stessa varianza $\sigma_i^2 = \sigma^2$), si ottiene il celebre risultato dell'**errore della media**:

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n} \implies \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (286)$$

Compatibilità tra due misure. Se ho compiuto 2 misure e mi chiedo se esse siano **compatibili**, costruisco una nuova variabile casuale come $y = x_1 - x_2$ (differenza fra le misure). Supponiamo $\sigma_1 \neq \sigma_2$ e $\mathbb{E}[x_1] = \mathbb{E}[x_2] = \mu$.

Il valore atteso della differenza è:

$$\mathbb{E}[y] = \mathbb{E}[x_1 - x_2] = 0 \quad (287)$$

Mentre la varianza della differenza (sempre per la propagazione degli errori) è:

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{\partial y}{\partial x_1} \right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x_2} \right)^2 \sigma_2^2 = (1)^2 \sigma_1^2 + (-1)^2 \sigma_2^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 \quad (288)$$

La funzione di distribuzione gaussiana associata a y sarà:

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} \exp \left[-\frac{y^2}{2\sigma_y^2} \right] \quad (289)$$

Si ha statistica **compatibilità** (entro 3 deviazioni standard) quando:

$$|x_1 - x_2| \leq 3\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \quad (290)$$

29.4 Funzione di distribuzione congiunta

Da un set di misure indipendenti posso costruire la "funzione di distribuzione congiunta" (prodotto fra le funzioni gaussiane delle n variabili):

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \prod_{i=1}^N \sigma_i} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}} \text{ per } \mu \text{ e } \sigma = \text{cost.} \rightarrow \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sigma^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$P(x_1^m - \Delta x \leq x_1 \leq x_1^m + \Delta x, \dots, x_n^m - \Delta x \leq x_n \leq x_n^m + \Delta x) = \frac{(\Delta x)^n}{(2\pi)^{n/2} \sigma^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i^m - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

29.4.1 Stima dei parametri

Posso ottenere una stima dei parametri della funzione di distribuzione, voglio che sia a minima varianza (rispetto ai dati sperimentali che ho raccolto) e che il valore sia centrato nel valore vero, posso usare:

- **Metodo della massima verosimiglianza** (o Likelihood)
- **Metodo dei minimi quadrati**, meno preciso rispetto al primo

Dato un set di misure ho che la funzione di distribuzione cumulativa (o congiunta) $f(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_n)$ dove λ_i sono i parametri da stimare. Voglio trovare i valori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ che minimizzano il valore di $\mathfrak{L} = f(x_1^m, \dots, x_n^m, \lambda_1, \dots, \lambda_n)$, dove x_i^m sono i valori misurati.

Questo perchè voglio massimizzare la probabilità di trovare i miei valori misurati all'interno di $x_i \pm \Delta x$

In realtà però si punta a massimizzare il logaritmo di $\mathfrak{L}$, per esempio per delle misure con distribuzione gaussiana

$$\ln(\mathfrak{L}) = \ln \frac{1}{2\pi\sigma^n} - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2}{2\sigma_x^2}$$

Le equazioni di Likelihood sono:

$$\frac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \mu} = 0 \quad \frac{\partial^2 \mathfrak{L}}{\partial \sigma^2} < 0$$

Da cui si ottengono:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad e \quad \sigma^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{n}$$

ma facendo qualche calcolo

$$(x - \mu)^2 = (x - \bar{x} + \bar{x} - \mu)^2 = (x - \bar{x})^2 + 2(\bar{x} - \mu)(x - \bar{x}) + (\bar{x} - \mu)^2$$

da cui:

$$E[(x - \mu)^2] = E[(x - \bar{x})^2] + E[2(\bar{x} - \mu)(x - \bar{x})] + E[(\bar{x} - \mu)^2]$$

$$\sigma^2 = E[(x - \bar{x})^2] + \frac{\sigma^2}{n}$$

e raccogliendo

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Supponiamo di avere più misure con σ differenti, in questo caso allora la misura x_1 avrà una funzione di distribuzione gaussiana e la distribuzione congiunta sarà una produttoria di queste funzioni. In questo caso la funzione di distribuzione manterrà la sommatoria anche per i σ_i :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sigma_x^n} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_x)^2}{2\sigma_{x_i}^2}}$$

Utilizzando le equazioni di Likelihood si ottengono:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^m}{\sigma_i^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j^2}}$$

Ovvero una media pesata delle misure per le loro varianze dal termine, in cui la sommatoria del fattore di peso è uguale a 1, le misure più precise hanno peso maggiore.

$$\sigma_\mu = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2}}$$

29.5 Distribuzione di Maxwell-Boltzmann

Si considera un gas con peso molare $M = N_A m$ in equilibrio termodinamico a temperatura T . La costante dei gas è $R = N_A k \approx 8.31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

La velocità quadratica media delle molecole del gas è legata alla temperatura dalla relazione:

$$v_{\text{qm}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Tuttavia, le singole molecole hanno velocità che si discostano da questo valore medio.

Maxwell nel 1859 derivò la distribuzione di probabilità delle velocità $f(v)$:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT} \right)^{3/2} v^2 \exp \left[-\frac{Mv^2}{2RT} \right] = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp \left[-\frac{mv^2}{2kT} \right]$$

All'aumentare della temperatura, il picco della distribuzione (velocità più probabile) si sposta verso valori più elevati.

Le curve sono normalizzate in modo che l'integrale della probabilità sia sempre uguale a 1.

La distribuzione fu ottenuta da Maxwell attraverso un ragionamento particolarmente ingegnoso:

- introduciamo prima alcune definizioni:

$$\rho(\vec{r}) = \frac{dm}{dV} \quad \text{densità del gas,}$$

$$\eta(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{m} \quad \text{densità di particelle,}$$

$$dn = \eta(\vec{r}) dV \quad \text{numero di particelle in } dV.$$

Introduciamo una densità di particelle nello spazio delle velocità, in modo analogo a quello tridimensionale:

$$dn(\vec{v}) = \eta(\vec{v}) d^3v$$

- introduciamo ora la funzione di distribuzione normalizzata della velocità $f(\vec{v})$:

$$f(\vec{v}) = \frac{\eta(\vec{v})}{n_T}$$

- se la distribuzione della velocità è isotropa, allora la funzione di distribuzione dipende solo dal modulo e non solo dal verso;
- Il numero di particelle dn comprese nell'elemento $d\vec{v} = d^3v$ dello spazio delle velocità vale:

$$dn(v) = n_T p(K) dv_x dv_y dv_z$$

che in coordinate e angoli polari si può scrivere:

$$dn(v) = n_T p(K) v^2 dv d\Omega = n_T p(K) v^2 dv \sin \theta d\theta d\phi$$

- dato che ho dei valori che non dipendono dagli angoli posso trovare che:

$$dn(v) + c = 4\pi n_T p(K) v^2 dv$$

Nota: Ricordiamo la definizione di angolo solido:

Vogliamo sapere quante molecole hanno il vettore velocità compreso fra $\vec{v}$ e $\vec{v} + d\vec{v}$. Passiamo alle coordinate polari sferiche (r, θ, ψ) , l'area A identificata dal vettore $\vec{v}$ sarà l'intersezione della superficie sferica di due cerchi la cui latitudine differisce per $d\theta$ e due la cui longitudine differisce per $d\psi$. Di conseguenza si ha:

$$dA = (rd\theta)(r \sin(\theta)d\psi)$$

L'angolo solido sarà definito da:

$$d\omega = \frac{dA}{r^2} = \sin(\theta)d\theta d\psi$$

Il numero di particelle con velocità $\vec{v} + d\vec{v}$ sarà: $dn(v) \frac{d\omega}{4\pi}$ essendo 4π l'angolo solido massimo. Questa espressione ci dice che non c'è una direzione preferenziale per le velocità.

Se consideriamo inoltre che le molecole possono scontrarsi fra di loro prima di colpire l'area A , dobbiamo limitarci a considerare un cilindro di lunghezza $v d\tau$ dove τ è talmente piccolo che non avvengono urti fra le molecole, esso vale $dV = v d\tau \cos(\theta) dA$.

Il numero di molecole che urterà l'area dA sarà $dn(v) \frac{d\omega}{4\pi} \frac{dV}{v}$.

- da cui ricaviamo che la distribuzione delle particelle nello spazio è:

$$p(\vec{r}) = \frac{\eta(\vec{r})}{n_T}$$

- La probabilità che l'urto accada è

$$P = Cp(K_1)p(K_2)$$

ovvero è proporzionale alla probabilità di avere le due particelle con K_1 e K_2 e dopo K'_1 e K'_2

Posso ora considerare due particelle che hanno energia cinetica iniziale

$$P = Cp(K'_1)p(K'_2)$$

e, e che dopo urto abbiamo K_1 e K_2 .

Il processo può essere visto da ambo le parti, $C = C'$

- il gas è essendo in equilibrio termodinamico deve essere che l'energie cinetiche si equivalgono e si conservano, dunque:

$$P = p(K_1)p(K_2)P = p(K'_1)p(K'_2) = p(K_1 + x)p(K_2 - x)$$

dove x rappresenta un incremento ($\pm$) dell'energia

- dunque l'unica funzione che soddisfi questi requisiti è:

$$p(K) = Ae^{-\beta \frac{mv^2}{2}}$$

dove β (> 0) è una costante che mi serve per rendere il mio esponente adimensionale. Quindi:

$$dn(v) + c = 4\pi n_T Ae^{-\beta \frac{mv^2}{2}} v^2 dv$$

Nota:

le costanti A e β sono da determinare, per la prima integriamo da 0 a ∞ (tutte le velocità), arriviamo a $A = \left(\frac{\frac{1}{2}m\beta}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}}$ quindi per β utilizziamo la definizione della media quadratica di tutte le velocità

$$\langle v^2 \rangle = \frac{1}{N} \int_0^\infty v^2 dn(v).$$

Sostituendo l'espressione di $dn(v)$, si ha

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi A^3 \int_0^\infty v^4 \exp[-\beta(\frac{1}{2}mv^2)] dv$$

Il cui valore è: $\frac{3}{m\beta}$

Dalle supposizioni abbiamo che l'unica energia è quella cinetica, dal teorema di equipartizione dell'energia, essendoci 3 gradi di libertà:

$$\frac{1}{2}m\langle w^2 \rangle = \frac{3}{2}k\theta \rightarrow \frac{1}{2}m\frac{3}{m\beta} = \frac{3}{2}k\theta,$$

cioè

$$\beta = \frac{1}{k\theta}.$$

- imponendo le condizioni di contorno, ovvero $\int_V dn_v = n_T$ e $\int_V K dn_v = \frac{3}{2}n_T KT$ ottengo che:

$$p(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left[-\frac{mv^2}{2kT}\right] dv$$

- la funzione presenta un massimo in $v_M = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \rightarrow kT = \frac{1}{2}mv_M^2$, la velocità più probabile!!
- Usando la funzione di distribuzione di Maxwell-Boltzmann, posso ricavare la velocità media (in modulo) delle molecole:

$$\mu_v = E[v] = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{v_M^3} \int_0^\infty v^3 \exp\left[-\frac{v^2}{v_M^2}\right] dv = \frac{2}{\sqrt{\pi}} v_M = \sqrt{\frac{8kT}{m}}$$

Mentre la velocità quadratica media introdotta in precedenza vale:

$$v_{qm} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 p(v) dv} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

Costante di normalizzazione	Probabilità di occupazione del livello energetico	Spazio delle fasi
-----------------------------	---	-------------------

$$p(v)dv = \left\{4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\right\} \left\{\exp\left[-\frac{mv^2}{2kT}\right]\right\} \{v^2 dv\}$$

Essa mi garantisce:

- La costante di normalizzazione assicura che l'integrale della $p(v)$ esteso a tutte le velocità possibili sia uguale a 1.
- La statistica di Boltzmann tiene conto della probabilità di occupazione di uno stato avente una data energia in funzione della temperatura del sistema.
- Infine lo spazio delle fasi tiene conto della molteplicità del livello energetico, vale a dire in quanti “modi” è possibile ottenere una configurazione che abbia la stessa energia. Nel nostro caso questo corrisponde al volume di una corteccia di sfera di raggio interno v e spessore dv . A tutti i punti di questo volume corrisponde la medesima energia $K = \frac{mv^2}{2}$.