Genuine Multipartite Entanglement Analysis — Molecular System

MOLECULE

Benzene (Benzene)
Basis set   : external-CI
Charge   : 0
Multiplicity : 1
Total e-   : 6
n-body order : 1

GROUND STATE ENERGIES

E0 (Ha) : nan
E1 (Ha) : nan
Gap (Ha) : nan
HF (Ha) : nan

CONVEX-ROOF METHODS

Methods run   : gcg
Restarts   : 20

C_LB : coherence witness bound
C_gcg: Conjugate Gradient(Alg. A)
C_UB : eigendecomposition bound

ACTIVE SPACE CAS(6,6)

Frozen core orbs : 0
Frozen e-   : 0
Active e-   : 6
Active orbs   : 6
Spin-orbitals   : 12
Hilbert dim   : 400

SPIN PROPERTIES

<S2>   : 0.000000
S   : 0.0000
<Sz>   : 0.000000
Multiplicity : 1
Spin state   : Singlet (S=0)

GME CRITERIA

C_GME = sqrt(2 * min_A (1 - Tr(rho_A^2)))

Convex roof (mixed):
  C_GME(rho) = min Sum p_i C_GME(|psi_i>)

Bounds ordering:
  C_LB <= C_GME <= C_UB

DOUBLE OCCUPANCY

<D> total : 0.777858
<D> / site : 0.129643


THIS PDF


Body order : 1
Clusters   : 6


Date: 2026-07-29 11:23


Summary — 1-Body RDMs (Benzene, CAS(6,6))


Orbitals	Purity	Entropy	C_GME (pure)	C_LB	C_gcg	C_UB	State
0	0.500000	0.693147	—	—	—	—	MIXED
1	0.500000	0.693147	—	—	—	—	WEAKLY MIXED
2	0.500000	0.693147	—	—	—	—	MIXED
3	0.500000	0.693147	—	—	—	—	WEAKLY MIXED
4	0.500000	0.693147	—	—	—	—	WEAKLY MIXED
5	0.500000	0.693147	—	—	—	—	WEAKLY MIXED



1-Body RDM (Sites 0) — same matrix in all three views
(1) Re(ρ) — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.500
0
0
0.500
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(2) Re(ρ) — S_z-ordered (original values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(3) |ρ| — S_z-ordered (absolute values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)


1-Body RDM (Sites 1) — same matrix in all three views
(1) Re(ρ) — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.500
0
0
0.500
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(2) Re(ρ) — S_z-ordered (original values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(3) |ρ| — S_z-ordered (absolute values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)


1-Body RDM (Sites 2) — same matrix in all three views
(1) Re(ρ) — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.500
0
0
0.500
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(2) Re(ρ) — S_z-ordered (original values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(3) |ρ| — S_z-ordered (absolute values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)


1-Body RDM (Sites 3) — same matrix in all three views
(1) Re(ρ) — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.500
0
0
0.500
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(2) Re(ρ) — S_z-ordered (original values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(3) |ρ| — S_z-ordered (absolute values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)


1-Body RDM (Sites 4) — same matrix in all three views
(1) Re(ρ) — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.500
0
0
0.500
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(2) Re(ρ) — S_z-ordered (original values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(3) |ρ| — S_z-ordered (absolute values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)


1-Body RDM (Sites 5) — same matrix in all three views
(1) Re(ρ) — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.500
0
0
0.500
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(2) Re(ρ) — S_z-ordered (original values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
(3) |ρ| — S_z-ordered (absolute values)
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.500
0
0
0.500
|↑⟩ S_z=+0.5
|↓⟩ S_z=-0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)