Genuine Multipartite Entanglement Analysis — Molecular System

MOLECULE

Benzene (C6H6)
Basis set   : cc-pVDZ
Charge   : 0
Multiplicity : 1
Total e-   : 42
n-body order : 1

GROUND STATE ENERGIES

E0 (Ha) : -230.75355805
E1 (Ha) : -230.57826157
Gap (Ha) : 0.17529648
HF (Ha) : -230.71878874

CONVEX-ROOF METHODS

Methods run   : gcg
Restarts   : 8

C_LB : coherence witness bound
C_expo: unitary opt (exp map)
C_stf : Stiefel manifold (Alg. B)
C_UB : eigendecomposition bound

ACTIVE SPACE CAS(6,6)

Frozen core orbs : 18
Frozen e-   : 36
Active e-   : 6
Active orbs   : 6
Spin-orbitals   : 12
Hilbert dim   : 400

SPIN PROPERTIES

<S2>   : 0.000000
S   : 0.0000
<Sz>   : 0.000000
Multiplicity : 1
Spin state   : Singlet (S=0)

GME CRITERIA

C_GME = sqrt(2 * min_A (1 - Tr(rho_A^2)))

Convex roof (mixed):
  C_GME(rho) = min Sum p_i C_GME(|psi_i>)

Bounds ordering:
  C_LB <= C_GME <= C_UB

DOUBLE OCCUPANCY

<D> total : 1.503200
<D> / site : 0.250533


THIS PDF


Body order : 1
Clusters   : 6


Date: 2026-07-12 19:37


Summary — 1-Body RDMs (Benzene, CAS(6,6))


Orbitals	Purity	Entropy	C_GME (pure)	C_LB	C_gcg	C_UB	State
0	0.500000	0.693147	—	—	—	—	MIXED
1	0.500000	0.693147	—	—	—	—	MIXED
2	0.500000	0.693147	—	—	—	—	MIXED
3	0.500000	0.693147	—	—	—	—	MIXED
4	0.500000	0.693147	—	—	—	—	MIXED
5	0.500000	0.693147	—	—	—	—	MIXED



1-Body RDM (Sites 0)
Real part — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
|↑⟩
|↓⟩
|ρ| — S_z-ordered (block-diagonal)
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
|ρ|
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)


1-Body RDM (Sites 1)
Real part — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
|↑⟩
|↓⟩
|ρ| — S_z-ordered (block-diagonal)
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
|ρ|
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)


1-Body RDM (Sites 2)
Real part — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
|↑⟩
|↓⟩
|ρ| — S_z-ordered (block-diagonal)
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
|ρ|
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)


1-Body RDM (Sites 3)
Real part — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
|↑⟩
|↓⟩
|ρ| — S_z-ordered (block-diagonal)
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
|ρ|
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)


1-Body RDM (Sites 4)
Real part — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
|↑⟩
|↓⟩
|ρ| — S_z-ordered (block-diagonal)
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
|ρ|
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)


1-Body RDM (Sites 5)
Real part — index order
|↑⟩
|↓⟩
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
|↑⟩
|↓⟩
|ρ| — S_z-ordered (block-diagonal)
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
|ρ|
|↑⟩ (S_z+0.5)
|↓⟩ (S_z-0.5)
Trace=1.000000 Purity=0.500000 Entropy=0.693147 (Im(ρ)<1e-6) | max |coherence between different S_z| = 0.0e+00 (⇒ S_z conserved)