

Завдання 4 з предмету Спецкурс для ОМ-3

Коломієць Микола

5 червня 2023 р.

Зміст

1	Завдання 1	2
2	Завдання 2	3
3	Завдання 3	5
4	Завдання 4	6
5	Завдання 5	7
6	Завдання 6	8
7	Завдання 7	9
8	Завдання 8	10
9	Завдання 9	11
10	Завдання 10	12

Завдання 1

Завдання

Покажіть, що лема 1 з лекції 7 справедлива для строго опуклих лінійних нормованих просторів.

Лема

Нехай H — строго опуклий лінійний нормований простір, $C \subseteq H$ — опукла замкнена множина, $T : C \rightarrow H$ — нерозтягуючий оператор. Тоді множина $F(T)$ опукла та замкнена.

Розв'язання:

Завдання 2

Завдання

Нехай C непорожня підмножина гільбертового простору H ,
 $T_1, T_2, \dots, T_m: C \rightarrow H$ - нерозтягуючі оператори, причому

$$\bigcap_{n=1}^m F(T_n) \neq \emptyset$$

.

Доведіть, що для довільного набору $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ додатніх чисел з
 $\sum_{n=1}^m \lambda_n = 1$ оператор

$$Tx = \sum_{n=1}^m \lambda_n T_n x \quad (x \in C)$$

є нерозтягуючим та $F(T) = \bigcap_{n=1}^m F(T_n)$.

Розв'язання:

Нехай $x \in \bigcap_{n=1}^m F(T_n) \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, n < m, T_n x = x$ тоді

$$Tx = \sum_{n=1}^m \lambda_n T_n x = \sum_{n=1}^m \lambda_n x = x \overbrace{\sum_{n=1}^m \lambda_n}^1 = x$$

Отже $x \in F(T)$ тобто $F(T) \supseteq \bigcap_{n=1}^m F(T_n)$

Нехай $x \in F(T)$, $Tx = x$ і нехай від супротивного $\exists m_1 : T_k x \neq x, k \in m_1$

Тоді

$$Tx = \sum_{n=1}^m \lambda_n T_n x = x \sum_{n=1}^{m-|m_1|} \lambda_n + \sum_{k \in m_1} \lambda_k T_k x = x \sum_{n=1}^m \lambda_n$$

$$\sum_{k \in m_1} \lambda_k (T_k x - x) = 0 \Rightarrow T_k x = x \text{ протиріччя}$$

Отже $\forall x \in F(T), \forall n \leq m, T_n x = x$

Отже $F(T) = \bigcap_{n=1}^m F(T_n)$

Доведено!

Завдання 3

Завдання

Нехай C непорожня підмножина гільбертового простору

$H, T_1, T_2, \dots, T_m : C \rightarrow H$ — строго квазінерозтягуючі оператори, причому

$$\bigcap_{n=1}^m F(T_n) \neq \emptyset$$

Доведіть, що оператор $Tx = T_1 T_2 \dots T_m x$ ($x \in C$)

є строго квазінерозтягуючим та $F(T) = \bigcap_{n=1}^m F(T_n)$.

Розв'язання:

Нехай $x \in \bigcap_{n=1}^m F(T_n)$ тоді за визначенням $\forall k \in \mathbb{N}, k \leq m : T_k x = x$

Тоді $Tx = T_1 T_2 \dots T_{m-1} T_m = T_1 T_2 \dots T_{m-1} x = \dots = x \Rightarrow x \in F(T)$

$$\text{Отже } F(T) \supseteq \bigcap_{n=1}^m F(T_n)$$

Завдання 4

Завдання

Нехай C — непорожня опукла замкнена підмножина гільбертового простору H , $T : C \rightarrow H$ — нерозтягуючий оператор з $F(T) \neq \emptyset$. Припустимо, що послідовність точок $x_n \in C$ має властивості:

1. $\forall p \in F(T) \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - p\| \in \mathbb{R};$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - Tx_n\| = 0.$

Доведіть, що послідовність (x_n) слабо збігається до точки з $F(T)$.

Розв'язання:

Завдання 5

Завдання

Нехай H - гільбертовий простір, $T : H \rightarrow H$ - твердо нерозтягуючий оператор із $F(T) \neq \emptyset$. Розглянемо метод простої ітерації:

$$\begin{cases} x_0 \in H \\ x_{n+1} = Tx_n \end{cases}$$

Доведіть, що послідовність x_n слабо збігається до деякої точки з $F(T)$

Розв'язання:

Завдання 6

Завдання

Нехай H - гільбертовий простір, $C \subseteq H$ – непорожня опукла замкнена множина, $T : C \rightarrow C$ - нерозтягуючий оператор, $F(T) \neq \emptyset, y \in C$. Покажіть, що для довільного $t \in (0, 1)$ існує єдиний елемент $x_t \in C$, такий, що

$$x_t = T(ty + (1 - t)x_t).$$

Доведіть, що при $t \rightarrow 0$ крива $t \mapsto x_t$ сильно збігається до точки \bar{x} , такої, що $\bar{x} = P_{F(T)}y$.

Розв'язання:

Завдання 7

Завдання

Нехай H - гільбертовий простір, $C \subseteq H$ – непорожня опукла замкнена множина, $T : C \rightarrow C$ - нерозтягуючий оператор з $F(T) \neq \emptyset$, $f : C \rightarrow C$ – стискаючий оператор. Для заданого $x_0 \in C$ генеруємо послідовність елементів $x_n \in C$ за допомогою ітераційної схеми:

$$x_{n+1} = \alpha_n f(x_n) + (1 - \alpha_n) T x_n$$

де послідовність чисел $\alpha_n \in (0, 1)$ задовольняє умови:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$
2. $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n = +\infty$
3. $\sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_{n+1} - \alpha_n| < +\infty$

Доведіть, що згенерована послідовність (x_n) сильно збігається до точки $z \in F(T)$, такої, що $z = P_{F(T)} f(z)$.

Розв'язання:

Завдання 8

Завдання

Нехай оператор $T : H \rightarrow H$ – нерозтягуючий, оператор $A : H \rightarrow H$ – ліпшицевий та сильно монотонний ⁴ із сталими $L > 0, l > 0$, відповідно.

Оператор $T_\alpha : H \rightarrow H$ задано рівністю

$$T_\alpha x = Tx - \alpha ATx, \quad \alpha \in [0, +\infty).$$

Доведіть, що для довільного $\mu \in (0, \frac{2l}{L^2})$ маємо

$$\|T_\alpha x - T_\alpha y\| \leq \left(1 - \frac{\tau}{\mu}\alpha\right) \|x - y\| \quad \forall x \in H \forall y \in H$$

де $\alpha \in [0, \mu], \tau = 1 - \sqrt{1 - 2l\mu + L^2\mu^2} \in (0, 1]$.

Розв'язання:

Завдання 9

Завдання

Нехай оператор $T : H \rightarrow H$ – нерозтягуючий, оператор $A : H \rightarrow H$ – ліпшицевий та сильно монотонний. Розглянемо ітераційну схему:

$$\begin{cases} y_n = Tx_n \\ x_{n+1} = y_n - \alpha_n Ay_n \end{cases}$$

де послідовність чисел $\alpha_n \in (0, 1)$ задовольняє умови:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$
2. $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n = +\infty$
3. $\sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_{n+1} - \alpha_n| < +\infty$

Доведіть, що породжена послідовність (x_n) сильно збігається до єдиного розв'язку варіаційної нерівності:

$$\text{знайти } x \in C : (Ax, y - x) \geq 0 \quad \forall y \in F(T).$$

Розв'язання:

Завдання 10

Завдання

Нехай A, B - непорожні опуклі компакти з банахових просторів X, Y , відповідно. Функція $L : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ — неперервна на $A \times B$ та опукла по x на A (для всіх $y \in B$), угнута по y на B (для всіх $x \in A$). Доведіть, що існує сідлова точка функції L на $A \times B$, тобто, існує $(x_0, y_0) \in A \times B$

$$L(x_0, y) \leq L(x_0, y_0) \leq L(x, y_0) \quad \forall x \in A \forall y \in B$$

Розв'язання:

Функція опукла по x це означає, що є точка мінімуму на A . Функція угнута по y тобто є точка максимуму на B . З цього очевидно, що існує сідлова точка.