

Groupes et Anneaux II — Cours

Ivan Lejeune

22 janvier 2025

Table des matières

Chapitre 1 — qqch	2
1 Exemples importants de groupes.	2
2 Action de groupe	2

Chapitre 1 — qqch

1 Exemples importants de groupes

- (i) L'ensemble A^\times des éléments inversibles d'un anneau A est un groupe pour la multiplication. Si $A = \mathbb{K}$ est un corps, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble

$$\mu_n(\mathbb{K}) = \{z \in \mathbb{K} \mid z^n = 1\}$$

est un groupe pour la multiplication.

Remarque. On a $\mu_n \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ via l'isomorphisme de groupes

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\rightarrow \mu_n \\ \bar{k} &\mapsto e^{2i\pi k/n} \end{aligned}$$

- (ii) Le groupe général linéaire de degré n de \mathbb{K} $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices carrées inversibles de taille n à coefficients dans \mathbb{K} , est un groupe pour la multiplication des matrices.

Remarque. Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, c'est-à-dire un $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec p premier, alors $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)|$ est fini. Pour le calculer, considérons $X \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$. On a

$$X = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 & \cdots & X_n \end{pmatrix}$$

avec $X_i \in \mathbb{F}_p^n$. On a $X_1 \neq 0$, donc on a $p^n - 1$ choix pour X_1 .

Ensuite, on a $X_2 \notin \mathbb{F}_p X_1 = \mathrm{Vect}_{\mathbb{F}_p}(X_1)$, donc on a $p^n - p$ choix pour X_2 .

En général, on a $p^n - p^{i-1}$ choix pour X_i .

On a donc

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)| = (p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{n-1}) = \prod_{k=0}^{n-1} (p^n - p^k)$$

- (iii) Considérons les éléments suivants :

- $n > 1$ un entier naturel,
- $R \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ la rotation d'angle $\frac{2\pi}{n}$ dans le plan (dans le sens anti-horaire),
- $S \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ la réflexion par rapport à l'axe des abscisses.

Si on identifie \mathbb{R}^2 à \mathbb{C} , alors pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$R(z) = e^{\frac{2i\pi}{n}} z \quad \text{et} \quad S(z) = \bar{z}$$

et alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$SR^k S = R^{-k}$$

Alors, le groupe

$$\mathcal{D}_n = \{\mathrm{Id}, R, \dots, R^{n-1}, S, SR, \dots, SR^{n-1}\}$$

est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, c'est le groupe diédral à $2n$ éléments.

2 Action de groupe

Soit G un groupe et X un ensemble.

Définition 2.1. Une **action** de G sur X est une application

$$\alpha : G \times X \rightarrow X$$

telle que si $g \cdot x := \alpha(g, x)$ alors

- (i) on a $e \cdot x = x$ pour tout $x \in X$,
- (ii) on a $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$ pour tout $g, h \in G$ et $x \in X$.

Notations

On notera $G \curvearrowright X$ pour signifier que G agit sur X . Un G -ensemble est un ensemble muni de l'action de G .

On notera aussi \mathfrak{S}_X le groupe des permutations de X .

Définition 2.2. Une **représentation** de G dans X est un morphisme de groupes $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}_X$.

Notation. On notera alors

$$\rho_g := \rho(g), \quad \forall g \in G$$

Exercice. Si $\alpha : G \times X \rightarrow X$ est une action alors $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}_X$ qui pour tout $g \in G$ sur

$$\rho(g) : \begin{array}{c} X \rightarrow X \\ x \mapsto g \cdot x \end{array}$$

Réciproquement, si $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}_X$ est une représentation alors $\alpha : G \times X \rightarrow X$ définie par

$$\alpha(g, x) := \rho_g(x), \quad \forall g \in G, \forall x \in X$$

est une action

Exemple. On considère $\mathfrak{S}_n \curvearrowright \{1, \dots, n\}$ car $\sigma \cdot k = \sigma(k)$

On considère $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \curvearrowright \mathbb{K}^n$ car $A \cdot x = Ax$

On considère $\mathcal{D}_n \curvearrowright \mu_n$ car $\zeta^n = 1 \implies g(\zeta)^n = 1$

En effet il suffit de vérifier pour les générateurs R et S .

Soit $H < G$ (sous-groupe de G). On a

1. L'action par translation à gauche :

$$H \curvearrowright G \quad \text{par} \quad \rho^L : H \rightarrow \mathfrak{S}_G$$

$$\text{avec } \rho_h^L(g) = hg$$

2. L'action par translation à droite :

$$H \curvearrowright G \quad \text{par} \quad \rho^R : H \rightarrow \mathfrak{S}_G$$

$$\text{avec } \rho_h^R(g) = gh^{-1}$$

Remarque. Attention en général $h \cdot g = gh$ ne définit pas une action de H sur G .

Définition 2.3. Soient X, Y des G -ensembles. On dit que

$$f : X \rightarrow Y$$

est **G -équivariante** si

$$f(g \cdot x) = g \cdot f(x), \quad \forall g \in G, \forall x \in X$$

Exercice. On considère G un groupe et H un sous-groupe de G . On note G^L (respectivement G^R) l'ensemble G muni de l'action de H par translation à gauche (respectivement à droite). Montrer que

$$\begin{array}{c} _^{-1} : G^L \rightarrow G^R \\ g \mapsto g^{-1} \end{array}$$

est une bijection H -équivariante.

Définition 2.4.

- (i) Avec $G \curvearrowright \Gamma$, Γ groupe, on dit que G agit par homomorphismes si

$$g \cdot (\gamma_1 \gamma_2) = (g \cdot \gamma_1)(g \cdot \gamma_2), \quad \forall g \in G, \forall \gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma$$

Cela arrive si et seulement si

$$\rho : G \rightarrow \text{Aut}(\Gamma) < \mathfrak{S}_\Gamma$$

ou si et seulement si ρ_g est un morphisme de groupes pour tout $g \in G$.

- (ii) Avec $G \curvearrowright V$, V espace vectoriel sur \mathbb{K} , on dit que l'action est linéaire si

$$g \cdot (\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 (g \cdot v_1) + \lambda_2 (g \cdot v_2), \quad \forall g \in G, \forall v_1, v_2 \in V, \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$$

Cela arrive si et seulement si

$$\rho : G \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{K}}(V) < \mathfrak{S}_V$$

ou si et seulement si ρ_g est une application linéaire pour tout $g \in G$.

Exemple.

1. Avec $H < G$, l'action de H par translation à gauche sur G est une action par homomorphismes si et seulement si $H = \{e\}$.

En effet, si $H = \{e\}$, alors l'action est triviale. Réciproquement, si l'action est par homomorphismes, on a

$$\begin{aligned} h \cdot (gg') &= (h \cdot g)(h \cdot g') \\ &\equiv hgg' = hghg' \\ &\equiv e = h \end{aligned}$$

pour tout $g, g' \in G$, donc $H = \{e\}$.

2. L'action de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ sur \mathbb{K}^n est linéaire.

3. L'action par conjugaison :

Si $H < G$ alors $H \curvearrowright G$ par $\rho^C : H \rightarrow \text{Aut}(G) < \mathfrak{S}_G$ et $\rho_h^C(g) = hgh^{-1}$.

Il s'agit d'une action par homomorphismes.

Théorème. Si G est un groupe d'ordre n , alors il est isomorphe à un sous-groupe de \mathfrak{S}_n .

Démonstration. On sait que G agit sur lui même par translation à gauche $\rho^L : G \rightarrow \mathfrak{S}_G \simeq \mathfrak{S}_n$.
Donc

$$g \in \text{Ker}(\rho^L) \implies \rho_g^L(e) = g \cdot e = e \implies g = e$$

Donc ρ^L est injectif et

$$\rho^L : G \rightarrow \rho^L(G) < \mathfrak{S}_G$$

est un isomorphisme de groupes. □

Exemple. μ_n est isomorphe au sous-groupe de \mathfrak{S}_n engendré par $(1\ 2\ \dots\ n)$.

$$\zeta_n = e^{2i\pi/n}, \quad \mu_n = \{\zeta^1, \dots, \zeta^n\} \simeq \{1, 2, \dots, n\}$$

et

$$\begin{aligned} \rho^L : \mu_n &\rightarrow \mathfrak{S}_{\mu_n} \simeq \mathfrak{S}_n \\ \zeta_n^k &\mapsto (1\ 2\ \dots\ n)^k \end{aligned}$$

Définition 2.5. On prend $G \curvearrowright X$.

1. On dit que $Y \subset X$ est stable par G si

$$G \cdot Y = Y$$
$$\{g \cdot y \mid g \in G, y \in Y\} = Y$$

2. L'orbite de $x \in X$ est

$$\text{orb}(x) = G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$$

qui est stable par G .

3. Le stabilisateur de $x \in X$ est

$$\text{st}(x) = G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

qui est un sous-groupe de G .

4. On dit que $x \in X$ est un point fixe de $g \in G$ si

$$g \cdot x = x$$

c'est à dire si $g \in \text{st}(x)$. L'ensemble des points fixes de g est noté

$$X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$$

De plus, $x \in X$ est un point fixe de G si et seulement si

$$x \in X^g, \quad \forall g \in G$$

c'est à dire si et seulement si $G_x = G$. L'ensemble des points fixes de G est noté

$$X^G = \{x \in X \mid g \cdot x = x, \quad \forall g \in G\}$$

5. L'action est transitive si il existe $x \in X$ tel que $\text{orb}(x) = G \cdot x = X$.