

HAX501X – Groupes et anneaux 1
Feuilles de TD

Clément Dupont
Université de Montpellier
2024-2025



1 Rappels d'arithmétique des entiers

1. Résoudre les exercices du chapitre 1 du poly.

2. Résoudre, pour $x \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 7 \pmod{12} \end{cases}$$

3. **Congruences.** Résoudre, pour $x \in \mathbb{Z}$:

$$12x \equiv 9 \pmod{21} \quad \text{puis} \quad 12x \equiv 11 \pmod{21}.$$

4. **Relations de Bézout.** Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \wedge b = 1$, et soit $au + bv = 1$ une relation de Bézout, avec $u, v \in \mathbb{Z}$.

1) Soit $k \in \mathbb{Z}$ et posons $u' = u - kb$ et $v' = v + ka$. Montrer qu'on a la relation de Bézout : $au' + bv' = 1$.

2) Montrer que toutes les relations de Bézout pour a, b sont de cette forme.

Exercices supplémentaires, et approfondissement

5. **Inversibilité modulo un entier.** Est-ce que 18 est inversible modulo 49 ? Si oui, en calculer un inverse. Mêmes questions avec 42 modulo 135.


6. **Cubes.** Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux, tels que le produit ab est un cube (c'est-à-dire s'écrit n^3 pour un $n \in \mathbb{N}$). Montrer que a et b sont tous les deux des cubes.

7. **Racine.** Soit $n \in \mathbb{N}$ qui n'est pas le carré d'un entier. Montrer que \sqrt{n} est irrationnel.

8. **Coefficients binomiaux.** Soit un entier $n \geq 2$. Montrer que si n divise tous les coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$ avec $0 < k < n$ alors n est premier.

9. **Le petit théorème de Fermat pour les enfants.**

Soit un entier $n \in \mathbb{N}^*$. On considère n petits disques répartis uniformément sur un cercle comme sur la figure suivante (avec $n = 9$). On considère un entier $a \in \mathbb{N}$ et on imagine qu'on dispose de a couleurs différentes. Un *coloriage* est une façon d'assigner une des a couleurs à chaque disque.



- 1) Combien y a-t-il de coloriage différents ?
- 2) Soit C un coloriage. On obtient d'autres coloriage en faisant tourner C d'un angle multiple de $2\pi/n$. Soit k le nombre de coloriage *différents* qu'on obtient ainsi. Montrer que k est un diviseur de n . Combien y a-t-il de coloriage pour lesquels $k = 1$?
- 3) Supposons maintenant que $n = p$ est un nombre premier. Dédurre des questions précédentes que p divise $a^p - a$.

10. Des congruences (contrôle continu 2023-24).

- 1) Déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 3^n par 5.
- 2) Pour quels entiers naturels n a-t-on à la fois $n \equiv 2 \pmod{5}$ et $3^n \equiv 2 \pmod{5}$? Justifier.
- 3) Déterminer l'ensemble des entiers naturels n qui vérifient :

$$3^n \equiv n \pmod{5}.$$

11. Triplets pythagoriciens. Un *triplet pythagoricien* est un triplet (a, b, c) d'entiers naturels non nuls qui vérifient l'équation :

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Dit autrement, par le théorème de Pythagore, a, b, c sont les longueurs des côtés d'un triangle rectangle. Le triplet pythagoricien le plus connu est $(3, 4, 5)$.

- 1) Soit (a, b, c) un triplet pythagoricien, et $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que (ka, kb, kc) est aussi un triplet pythagoricien.

Dans tout l'exercice on dira qu'un triplet pythagoricien (a, b, c) est **primitif** s'il n'existe aucun entier $k \geq 2$ qui divise à la fois a , b , et c (ou dit autrement, si $a \wedge b \wedge c = 1$).

Les 3 parties de l'exercice sont indépendantes.

Partie 1. La formule d'Euclide.

Soient deux entiers m, n avec $m > n \geq 1$. On pose

$$(*) \quad a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2.$$

- 2) Montrer que (a, b, c) est un triplet pythagoricien.
- 3) On suppose que m et n sont de parités différentes (c'est-à-dire que l'un est pair et l'autre impair) et premiers entre eux.
 - a) Déterminer la parité de a , de b , de c .
 - b) Montrer qu'il n'existe aucun nombre premier p qui divise à la fois a et c .
 - c) En déduire que (a, b, c) est un triplet pythagoricien primitif.

Partie 2. Intermède.

- 4) Soient deux entiers $x, y \in \mathbb{N}^*$ tels que $x \wedge y = 1$ et tels que le produit xy est le carré d'un entier. Montrer que x et y sont des carrés d'entiers.

Partie 3. Classification des triplets pythagoriciens.

Soit (a, b, c) un triplet pythagoricien primitif.

- 5) Montrer que $a \wedge c = 1$.
- 6) Pour un entier k , quels sont les restes possibles pour k^2 dans la division euclidienne par 4? On justifiera.
- 7) Dédurre de la question précédente que a et b sont de parités différentes (c'est-à-dire que l'un est pair et l'autre impair), puis que c est impair.
- 8) Quitte à échanger les rôles joués par a et b on peut donc supposer que a est impair et que b est pair, ce qu'on fait maintenant. Montrer que $(c - a) \wedge (c + a) = 2$.
- 9) Montrer que le produit de $\frac{c+a}{2}$ et $\frac{c-a}{2}$ est un carré, et déduire de la question 4) qu'il existe des entiers m, n avec $m > n \geq 1$ tels que (a, b, c) est de la forme (*).
- 10) Parmi les triangles rectangles dont les 3 côtés sont de longueurs entières, déterminer tous ceux qui ont un côté de longueur 17.

2 Étude de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

1. **En cercle.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note

$$\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$$

l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité. Montrer que l'application

$$f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{U}_n, k \mapsto e^{\frac{2i\pi k}{n}}$$

passse au quotient par la relation de congruence modulo n et induit une application

$$g : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{U}_n, \bar{k} \mapsto e^{\frac{2i\pi k}{n}}.$$

Montrer que g est bijective.

2. **Inversibles.** Faire la liste des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}$ et calculer leurs inverses. Même chose avec $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$.

3. **Puissance.** On se place dans $\mathbb{Z}/41\mathbb{Z}$. Calculer $\bar{2}^{2024}$.

4. **Sous-groupes.** Quels sous-groupes de $\mathbb{Z}/1000\mathbb{Z}$ contiennent $\bar{120}$?

5. **Théorème de Wilson.** Le but de cet exercice est de démontrer le théorème de Wilson¹ : pour un entier $n \geq 2$, on a l'équivalence :

$$n \text{ est premier} \iff (n-1)! \equiv -1 \pmod{n}.$$

1) Soit un nombre premier p .

a) Quels éléments $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \setminus \{\bar{0}\}$ sont égaux à leur inverse?

b) En calculant le produit de tous les éléments de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \setminus \{\bar{0}\}$, montrer qu'on a

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

2) Soit un nombre n composé. Montrer que $(n-1)!$ n'est pas congru à -1 modulo n . En déduire le théorème de Wilson.

6. **Une formule de Gauss.** Soit un entier $n \in \mathbb{N}^*$. On veut montrer qu'on a :

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

1) Vérifier cette formule pour $n = 12$.

2) Soit d un diviseur de n . On note $e = \frac{n}{d}$. Montrer qu'il y a $\varphi(e)$ entiers $a \in \{1, \dots, n\}$ tels que $a \wedge n = d$.

3) Conclure.

1. Nommé en l'honneur du mathématicien anglais John Wilson (1741-1793), même si le théorème était connu bien avant lui, notamment par le mathématicien arabe Alhazen qui vécut autour de l'an mil.

Exercices supplémentaires, et approfondissement

7. Équations.

- 1) Résoudre dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ l'équation $\overline{7}x + \overline{5} = \overline{1}$.
- 2) Résoudre dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 - \overline{6}x + \overline{10} = \overline{0}$.

8. Un exercice de baccalauréat (filière C, académie de Paris, juin 1978).

Dans l'anneau $\mathbb{Z}/91\mathbb{Z}$ (dont les éléments sont notés $\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{90}$),

- 1) discuter, suivant la valeur du paramètre $a \in \mathbb{Z}/91\mathbb{Z}$, l'équation

$$ax = \overline{0},$$

- 2) résoudre l'équation

$$x^2 + \overline{2}x - \overline{3} = \overline{0}.$$

9. Fonction de Möbius.

On définit la fonction de Möbius² $\mu : \mathbb{N}^* \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ par la formule :

$$\mu(n) = \begin{cases} (-1)^r & \text{si } n \text{ est le produit de } r \text{ nombres premiers distincts;} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a $\mu(1) = 1$ par convention (car 1 est égal au produit de 0 nombre premier).

- 1) Calculer $\mu(n)$ pour $n \in \{1, \dots, 12\}$.
- 2) Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ tels que $m \wedge n = 1$. Montrer que $\mu(mn) = \mu(m)\mu(n)$.
- 3) Montrer qu'on a, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- 4) En déduire la formule d'*inversion de Möbius* : pour deux fonctions $f, g : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ on a l'équivalence :

$$\left(\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) = \sum_{d|n} g(d) \right) \iff \left(\forall n \in \mathbb{N}^*, g(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d) \right).$$

- 5) En déduire grâce à un exercice précédent une formule pour l'indicatrice d'Euler en termes de la fonction de Möbius :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) d.$$

10. Comment “rendre une application injective”. Soit une application $f : E \rightarrow F$.

On définit une relation \sim sur E par :

$$x \sim x' \iff f(x) = f(x').$$

- 1) Montrer qu'il s'agit d'une relation d'équivalence.

2. Nommée en l'honneur du mathématicien allemand Ferdinand Möbius (1790-1868) qui l'introduisit.

- 2) Montrer que f passe au quotient par cette relation d'équivalence et que l'application induite $g : E / \sim \rightarrow F$ est injective.

(Moralité : on peut “rendre une application injective” en remplaçant l'ensemble de départ par un quotient. Vous pourrez remarquer une analogie avec un fait que vous connaissez : on peut “rendre une application surjective” en remplaçant l'ensemble d'arrivée par un sous-ensemble. Plus précisément, si $f : E \rightarrow F$ est une application, alors elle induit une application surjective $g : E \rightarrow f(E)$.)

3 Introduction à la théorie des groupes

1. Groupes ? Ces choses-là sont-elles des groupes ?

- ▷ $(2\mathbb{Z}, +)$.
- ▷ $(2\mathbb{Z}, \times)$.
- ▷ L'ensemble des fonctions de $[0, 1]$ dans \mathbb{R} , muni de l'addition des fonctions.
- ▷ L'ensemble des fonctions continues de $[0, 1]$ dans \mathbb{R} , muni de l'addition des fonctions.
- ▷ L'ensemble des matrices $n \times n$ inversibles et à coefficients entiers, muni du produit.
- ▷ L'ensemble des parties d'un ensemble fixé E , muni de l'union des parties.
- ▷ L'ensemble des permutations $\sigma \in \mathfrak{S}_6$ telles que $\sigma^2 = \text{id}$, muni de la composition.

2. Tarte à la crème. Soit G un groupe tel que tout $x \in G$ vérifie $x^2 = e$. Démontrer que G est abélien.

3. Petits groupes. Déterminer toutes les tables de multiplication possibles pour des groupes d'ordre ≤ 5 . (On se gardera d'utiliser le théorème de Lagrange.)

- ▷ Vous devez trouver (au nom des éléments près) un seul groupe d'ordre 1, un seul d'ordre 2, un seul d'ordre 3, deux d'ordre 4, et un seul d'ordre 5.
- ▷ Remarquer que tous ces groupes sont abéliens.

4. Sous-groupes. Lister tous les sous-groupes du groupe symétrique \mathfrak{S}_3 .

5. 24 heures chrono (contrôle continu 2023-24)

- 1) Montrer que le groupe $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ a autant de générateurs que de sous-groupes. Faire la liste des générateurs. Faire la liste des sous-groupes, en décrivant chaque sous-groupe de la manière la plus explicite possible.
- 2) Montrer que le groupe $(\mathbb{Z}/24\mathbb{Z})^\times$ peut être engendré par 3 de ses éléments.
- 3) Lister les sous-groupes d'ordre 2 du groupe $(\mathbb{Z}/24\mathbb{Z})^\times$.
- 4) Donner un exemple de sous-groupe d'ordre 4 du groupe $(\mathbb{Z}/24\mathbb{Z})^\times$. (Bonus : lister tous les sous-groupes d'ordre 4.)

6. Union de sous-groupes (contrôle continu 2023-24).

- 1) Soit G un groupe et H, K deux sous-groupes de G . Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe de G si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.
- 2) Donner un exemple de groupe G et de trois sous-groupes H, K, L qui sont tous les trois différents de G et tels que $G = H \cup K \cup L$.

7. Morphismes de groupes ? Ces choses-là sont-elles des morphismes de groupes ?

- ▷ $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^*, n \mapsto 2^n$.
- ▷ $g : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*, z \mapsto z^3$.
- ▷ $h : \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \bar{k} \mapsto k$.
- ▷ $i : \text{GL}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, A \mapsto \text{tr}(A)$.
- ▷ $j : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \bar{k} \mapsto \tilde{k}$.
- ▷ $k : \mathfrak{S}_4 \rightarrow \mathfrak{S}_4, \sigma \mapsto \sigma(1\ 2)$.
- ▷ $l : \mathfrak{S}_4 \rightarrow \mathfrak{S}_4, \sigma \mapsto (1\ 2)\sigma(1\ 2)$.

8. Transformations affines (contrôle continu 2023-24).

- 1) Pour (a, b) et (a', b') deux éléments de $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, on définit

$$(a, b) \# (a', b') = (aa', b + ab').$$

- a) Montrer que $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, muni de la loi de composition interne $\#$, est un groupe.
b) Ce groupe est-il abélien ? On justifiera.
- 2) Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ on considère l'application

$$f_{a,b} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto ax + b.$$

On remarque (on ne demande pas de justification) que c'est une application bijective. On rappelle la notation $\text{Bij}(E)$ pour le groupe des permutations d'un ensemble E .

- a) Montrer que l'application

$$\Phi : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \longrightarrow \text{Bij}(\mathbb{R}), \quad (a, b) \mapsto f_{a,b}$$

est un morphisme de groupes, où la structure de groupe de $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ est celle de la question précédente.

- b) Montrer que ce morphisme de groupes est injectif.

9. Retour sur le petit théorème de Fermat, et le théorème d'Euler.

- 1) Soit p un nombre premier. En appliquant le théorème de Lagrange dans le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, redémontrer le petit théorème de Fermat.
- 2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{Z}$ tel que $x \wedge n = 1$ on a :

$$x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

(On appelle ce résultat le *théorème d'Euler*. Quel est le rapport avec le petit théorème de Fermat ?)

10. Centre. Soit G un groupe. On définit le *centre*³ de G :

$$Z(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G, xy = yx\}.$$

- 1) Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe abélien de G , et que G est abélien si et seulement si $Z(G) = G$.
- 2) Montrer que $Z(\mathfrak{S}_n)$ est le groupe trivial pour tout $n \geq 3$.
- 3) On considère un sous-groupe $H \subset G$. Montrer que $Z(H)$ et $Z(G) \cap H$ sont reliés par une inclusion. Montrer grâce à un contre-exemple que l'inclusion réciproque est fautive en général.
- 4) (Bonus) Déterminer le centre du groupe $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ pour $n \geq 1$, et montrer qu'il est isomorphe au groupe \mathbb{R}^* .

11. Morphismes de groupes.

- 1) Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes, avec G et G' finis. Pour $x \in G$, montrer que l'ordre de $f(x)$ divise $|G|$ et $|G'|$.

3. La notation Z vient de l'allemand *Zentrum*.

- 2) En déduire qu'il n'existe pas de morphisme de groupes non trivial d'un groupe d'ordre m vers un groupe d'ordre n si $m \wedge n = 1$.

12. Générateurs du groupe symétrique.

- 1) Soit un k -cycle $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$ et une permutation σ dans \mathfrak{S}_n . Montrer qu'on a l'égalité :

$$\sigma(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)\sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \ \sigma(i_2) \ \dots \ \sigma(i_k)).$$

- 2) En déduire que \mathfrak{S}_n est engendré par la transposition $(1 \ 2)$ et le n -cycle $(1 \ 2 \ \dots \ n)$.

13. Réflexions. Soient deux réflexions $s_1, s_2 \in O_2(\mathbb{R})$. Démontrer que

$$s_1 s_2 = s_2 s_1 \iff s_1 = \pm s_2.$$

14. Centre du groupe diédral. Déterminer le centre du groupe diédral D_n , pour $n \in \mathbb{N}^*$.

15. Autour du groupe produit (examen 2023-24). Pour un groupe G et deux sous-groupes H, K de G , on considère les conditions suivantes.

- (i) Pour tout $x \in G$, il existe $y \in H$ et $z \in K$ tels que $x = yz$.
- (ii) $H \cap K = \{e\}$.
- (iii) Les éléments de H et K commutent entre eux : $\forall y \in H, \forall z \in K, yz = zy$.

Les quatre questions sont indépendantes.

- 1) Soit $G = (\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^\times$, soit H le sous-groupe engendré par $\overline{3}$, et K le sous-groupe engendré par $\overline{10}$. Lister les éléments de H et K , et démontrer que H et K vérifient les conditions (i), (ii), (iii).
- 2) Soient G_1, G_2 deux groupes, et soit $G = G_1 \times G_2$ leur produit. On note e_1 et e_2 les éléments neutres respectifs de G_1 et G_2 . Montrer que les ensembles $H = G_1 \times \{e_2\}$ et $K = \{e_1\} \times G_2$ sont deux sous-groupes de G qui vérifient les conditions (i), (ii), (iii).
- 3) Soit G un groupe et H, K deux sous-groupes qui vérifient les conditions (i), (ii), (iii).
 - a) Démontrer que pour un élément $x \in G$, l'écriture $x = yz$ avec $y \in H$ et $z \in K$ est unique.
 - b) Démontrer qu'il existe un isomorphisme entre le groupe produit $H \times K$ et G .
- 4) On pose $G = D_4$, le groupe diédral à 8 éléments. Trouver deux sous-groupes H, K de G , différents de $\{e\}$ et G , pour lesquels (i) et (ii) sont vrais mais pas (iii). On justifiera soigneusement ces faits.

Exercices supplémentaires, et approfondissement

16. Finitude. Soit G un groupe. Montrer que G est fini si et seulement s'il a un nombre fini de sous-groupes.

17. Différence symétrique. Soit E un ensemble. Pour des parties A, B de E on définit leur *différence symétrique*

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

- 1) Démontrer que $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe abélien.
- 2) Démontrer qu'il est isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^E$.

18. Générateurs du groupe alterné.

- 1) Démontrer qu'un produit de deux transpositions dans le groupe symétrique \mathfrak{S}_n peut s'écrire comme un produit de 3-cycles.
- 2) En déduire que le groupe alterné \mathfrak{A}_n est engendré par les 3-cycles.
- 3) Montrer que \mathfrak{A}_n est engendré par les 3-cycles de la forme $(1 \ i \ j)$ avec $2 \leq i < j \leq n$.
- 4) Montrer que \mathfrak{A}_n est engendré par les 3-cycles de la forme $(1 \ 2 \ i)$ avec $3 \leq i \leq n$.

19. Groupe d'ordre pair. Soit G un groupe fini d'ordre pair. Montrer que G contient un élément d'ordre 2. (*Indication : considérer la partition de G dont les blocs sont les ensembles $\{x, x^{-1}\}$.*)

20. Sur l'ordre. Soit G un groupe, soient $a, b \in G$ tels que ab est d'ordre fini n . Montrer que ba est aussi d'ordre n .

21. Sur les axiomes des groupes (contrôle continu 2023-24). Les deux questions de cet exercice sont indépendantes. Dans la première question on montre qu'on peut simplifier l'axiomatique des groupes en demandant seulement l'existence d'un "neutre à gauche" et d'"inverses à gauche". Dans la deuxième question on voit que ça ne fonctionne pas si l'on mélange gauche et droite.

- 1) Soit G un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$ qui vérifie les axiomes :
 - (i) Associativité : pour tous $x, y, z \in G$, $(x * y) * z = x * (y * z)$.
 - (ii) Neutre à gauche : il existe un élément $e \in G$ tel que pour tout $x \in G$, $e * x = x$.
 - (iii) Inverses à gauche : pour tout $x \in G$, il existe $x^{-1} \in G$ tel que $x^{-1} * x = e$.
 - a) Soit $y \in G$ tel que $y * y = y$. Montrer que $y = e$.
 - b) En utilisant la question précédente, montrer que pour tout $x \in G$ on a $x * x^{-1} = e$.
 - c) En déduire que pour tout $x \in G$ on a $x * e = x$.
- 2) Soit G un ensemble non vide dont on note e un des éléments. On définit une loi de composition interne $*$ sur G par la formule : $x * y = y$.
 - a) Montrer que cette loi vérifie les axiomes (i) et (ii) ci-dessus ainsi que l'axiome :
 - (iv) Inverses à droite : pour tout $x \in G$, il existe $x^{-1} \in G$ tel que $x * x^{-1} = e$.
 - b) Montrer que si G a au moins deux éléments alors $(G, *)$ n'est pas un groupe.

22. Groupe diédral et groupe symétrique. Montrer que D_n est isomorphe à un sous-groupe de \mathfrak{S}_n , pour $n \geq 3$.

23. Sous-groupes finis de $O_2(\mathbb{R})$ (examen 2023-24). On rappelle la notation $O_2(\mathbb{R})$ pour le groupe des automorphismes orthogonaux de \mathbb{R}^2 , dont les éléments sont les rotations r_θ , pour $\theta \in \mathbb{R}$, et les réflexions s_Δ , pour Δ une droite vectorielle de \mathbb{R}^2 . Les rotations forment le sous-groupe $SO_2(\mathbb{R})$. Le but de cet exercice est de classer les sous-groupes *finis* de $O_2(\mathbb{R})$.

Plus précisément, on va montrer que les sous-groupes finis de $O_2(\mathbb{R})$ sont les groupes cycliques C_n et les *conjugués* (définis ci-dessous) des groupes diédraux D_n .

Partie 1 : questions préliminaires sur les sous-groupes

- 1) Soit G un groupe et G' un sous-groupe de G . Pour H un autre sous-groupe de G , montrer que l'intersection $H \cap G'$ est un sous-groupe de G' .
- 2) Soit G un groupe et H un sous-groupe de G . Soit un élément $x \in G$. On note

$$xHx^{-1} = \{xhx^{-1}, h \in H\},$$

qu'on appelle le *conjugué* de H par x .

- a) Montrer que xHx^{-1} est un sous-groupe de G .
- b) Montrer que les groupes H et xHx^{-1} sont isomorphes.

Partie 2 : sous-groupes finis de $\text{SO}_2(\mathbb{R})$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on note C_n l'ensemble des $f \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$ qui vérifient $f^n = \text{id}_{\mathbb{R}^2}$.

- 3) Montrer que C_n est un sous-groupe cyclique de $\text{SO}_2(\mathbb{R})$ et en donner un générateur.
- 4) Soit H un sous-groupe fini de $\text{SO}_2(\mathbb{R})$. On note $n = |H|$ et on écrit $H = \{f_1, \dots, f_n\}$.
 - a) Justifier que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, f_i est d'ordre fini dans H .
 - b) Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on note k_i l'ordre de f_i dans H et on pose $N = k_1 \cdots k_n$. Montrer que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ on a $f_i^N = \text{id}_{\mathbb{R}^2}$.
 - c) En conclure que $H \subset C_N$, puis que $H = C_n$.

Partie 3 : sous-groupes finis de $\text{O}_2(\mathbb{R})$

Pour la fin de l'exercice, soit H un sous-groupe fini de $\text{O}_2(\mathbb{R})$.

- 5) Grâce aux questions 1) et 4)c), montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $H \cap \text{SO}_2(\mathbb{R}) = C_n$.
- 6) On suppose maintenant que H n'est pas inclus dans $\text{SO}_2(\mathbb{R})$, c'est-à-dire que H contient une réflexion s_Δ , pour Δ une droite vectorielle de \mathbb{R}^2 . On note θ l'angle orienté entre l'axe des abscisses et la droite Δ . Le but de cette question est de montrer l'égalité :

$$H \stackrel{?}{=} r_\theta D_n r_\theta^{-1}.$$

On rappelle la notation $D_n \subset \text{O}_2(\mathbb{R})$ pour le groupe diédral à $2n$ éléments. Il est engendré par la rotation d'angle $2\pi/n$, qu'on note r , et la réflexion le long de l'axe des abscisses, qu'on note s .

- a) On note $H' = r_\theta^{-1} H r_\theta$. En calculant $r_\theta^{-1} r r_\theta$ et $r_\theta^{-1} s_\Delta r_\theta$, montrer que $r \in H'$ et $s \in H'$.
- b) En conclure que $D_n \subset H'$.
- c) Montrer que $H' \subset D_n$. (*Indication : pour un élément $f \in H'$, faire une disjonction de cas selon $\det(f)$, et dans les deux cas se ramener à la question 5).*)
- d) En conclure que $H = r_\theta D_n r_\theta^{-1}$.

4 Introduction à la théorie des anneaux et des corps

1. **Un corps exotique.** On définit sur l'ensemble \mathbb{R}^2 une addition $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$ et une multiplication $(x, y)(x', y') = (xx' - yy', xy' + x'y)$. Montrer que \mathbb{R}^2 muni de ces deux lois est un corps.
2. **Un corps.** Pouvez-vous construire un corps K qui contient \mathbb{C} comme sous-corps et tel qu'il existe un $\alpha \in K \setminus \mathbb{C}$ avec $\alpha^2 = i$?
3. **Entiers de Gauss.** On définit l'ensemble des *entiers de Gauss* :

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} .$$

- 1) Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de \mathbb{C} . Est-il commutatif ? Est-il intègre ? Est-ce un corps ?
- 2) Pour $z = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ on pose $N(z) = |z|^2 = a^2 + b^2$, qu'on appelle la *norme*. Montrer qu'on a pour $z, z' \in \mathbb{Z}[i]$: $N(zz') = N(z)N(z')$.
- 3) Montrer que $z \in \mathbb{Z}[i]$ est inversible si et seulement si $N(z) = 1$. Identifier le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}[i]$.
- 4) Soient $m, n \in \mathbb{N}$. Montrer que si m et n peuvent être écrits comme somme de deux carrés, alors leur produit mn aussi.
- 5) Soit maintenant l'ensemble des *rationnels de Gauss* :

$$\mathbb{Q}(i) = \{a + bi \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} .$$

Montrer qu'il s'agit d'un sous-corps de \mathbb{C} .

4. **Nilpotents.** Soit A un anneau commutatif. On dit qu'un élément $x \in A$ est *nilpotent* s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x^n = 0$.
 - 1) Donner un exemple d'un anneau commutatif A et d'un élément nilpotent $x \in A$ *non nul*.
 - 2) Montrer que si x est nilpotent et que y est n'importe quel élément de A alors xy est nilpotent.
 - 3) Montrer que l'ensemble des éléments nilpotents de A est un sous-groupe de A . Est-ce un sous-anneau ?
 - 4) Montrer que si x est nilpotent alors $1 - x$ est inversible.
 - 5) Soient $u, x \in A$ tel que u est inversible et x est nilpotent. Montrer que $u + x$ est inversible.
5. **Anneaux intègres finis.** Soit A un anneau intègre *fini*. Montrer que A est un corps.
6. **L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.** On définit :

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} .$$

- 1) Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un sous-anneau de \mathbb{R} .
- 2) Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ n'est pas isomorphe à l'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$.
- 3) Montrer que le groupe $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times$ est infini.

- 7. Inversibles de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.** Soit p un nombre premier. Le but de cet exercice est de démontrer le résultat suivant :

Le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique.

On démontre en fait un résultat plus général : pour un corps K et un sous-groupe fini $G \subset K^*$, G est cyclique. L'application au résultat ci-dessus est le cas $K = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $G = K^*$.

Soit donc K un corps, G un sous-groupe fini de K^* , et notons $n = |G|$.

- 1) Soit $d \in \mathbb{N}^*$ un diviseur de n .
 - a) Montrer qu'il existe au plus d éléments $x \in G$ qui vérifient $x^d = 1$.
 - b) Supposons qu'il existe un élément $g \in G$ d'ordre d . On note $\langle g \rangle$ le sous-groupe de G engendré par g . Montrer que $\langle g \rangle$ est égal à l'ensemble des éléments $x \in G$ qui vérifient $x^d = 1$.
 - c) En déduire que s'il existe un élément d'ordre d dans G alors il y a exactement $\varphi(d)$ éléments d'ordre d dans G .
- 2) Pour $d \in \mathbb{N}^*$ qui divise n on note X_d l'ensemble des éléments d'ordre d dans G . Montrer qu'on a une partition

$$G = \bigsqcup_{d|n} X_d.$$

En utilisant la formule de Gauss $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ (vue plus tôt dans le semestre), en déduire qu'il existe un élément d'ordre d dans G pour tout diviseur d de n . En déduire que G est cyclique.

- 3) Déterminer un générateur de $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$.

- 8. Idéaux et inversibles.** Soit A un anneau commutatif.

- 1) Soit I un idéal de A . Montrer que $I = A$ si et seulement si $1 \in I$.
- 2) Soit I un idéal de A . Montrer que $I = A$ si et seulement si I contient un inversible de A .
- 3) Soit $a \in A$. Montrer que $(a) = A$ si et seulement si a est inversible dans A .
- 4) Supposons que $A \neq \{0\}$. Montrer que A est un corps si et seulement si les seuls idéaux de A sont $\{0\}$ et A .

- 9. Idéaux de $\mathbb{Z}[X]$.** On travaille dans l'anneau $\mathbb{Z}[X]$.

- 1) Montrer que l'idéal $(2, X)$ n'est pas principal.
- 2) Soit I l'ensemble des polynômes $f \in \mathbb{Z}[X]$ tels que $f(1)$ et $f(-1)$ sont pairs. Montrer que I est un idéal de $\mathbb{Z}[X]$ et donner des générateurs de I .

- 10. Entiers de Gauss, bis.** On se place dans l'anneau des entiers de Gauss

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi, a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

On note $|z|$ le module d'un nombre complexe z . On rappelle la *norme* $N(z) = z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$ pour $z = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$. On a montré qu'on a $N(zz') = N(z)N(z')$ et

$$z \in \mathbb{Z}[i]^\times \iff N(z) = 1 \iff z \in \{1, -1, i, -i\}.$$

- 1) Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer qu'il existe $z' \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $|z - z'| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$. (Un dessin pourra être utile!)

- 2) En déduire que $\mathbb{Z}[i]$ est un anneau euclidien pour la jauge euclidienne $\nu(z) = N(z)$. Calculer une division euclidienne de $17 + 4i$ par $1 - i$.
 - 3) Montrer que pour $z \in \mathbb{Z}[i]$, si $N(z)$ est premier alors z est irréductible.
 - 4) Calculer le PGCD de $11 + 7i$ et $18 - i$.
- 11. Théorème des deux carrés de Fermat.** Le but de cet exercice est de montrer le *théorème des deux carrés* de Fermat : un nombre premier impair p peut s'écrire comme somme de deux carrés de nombres entiers si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$.
- 1) Vérifier que ce théorème est vrai pour les nombres premiers ≤ 19 .
 - 2) Montrer qu'un nombre impair qui est une somme de deux carrés est nécessairement congru à 1 modulo 4.
 - 3) Soit p un nombre premier congru à 1 modulo 4, on écrit $p = 4n + 1$. On pose $x = (2n)!$.
 - a) Montrer que $x^2 \equiv (p-1)! \pmod{p}$.
 - b) En utilisant le théorème de Wilson (feuille de TD 2), en déduire que p divise $x^2 + 1$ dans \mathbb{Z} .
 - c) En utilisant le lemme d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$, en déduire que p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.
 - d) En utilisant la norme N , déduire que p peut s'écrire comme somme de deux carrés de nombres entiers.
- 12. Polynômes à coefficients entiers.**
- 1) Soit p un nombre premier. Soit $f \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire, et notons $\bar{f} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ sa réduction modulo p . Montrer que si \bar{f} est irréductible alors f l'est aussi.
 - 2) Montrer que les polynômes $X^3 + 27X^2 + 5X + 97$ et $X^4 + 6X^2 + 7$ sont irréductibles dans $\mathbb{Z}[X]$.

Exercices supplémentaires, et approfondissement

- 13. $1 - ab$ et $1 - ba$.** Soit A un anneau et $a, b \in A$. Montrer que
- $$1 - ab \in A^\times \iff 1 - ba \in A^\times.$$
- 14. Polynômes irréductibles.** Soit K un corps. Montrer qu'il y a une infinité de polynômes irréductibles à coefficients dans K .
- 15. Idéaux de $K[X, Y]$.** Soit K un corps.
- 1) Montrer que l'idéal (X, Y) de $K[X, Y]$ n'est pas principal.
 - 2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier. Trouver un idéal de $K[X, Y]$ qui peut être engendré par n éléments mais pas par $n - 1$ éléments.
- 16. Critère d'Eisenstein.**
- 1) Soit $n \geq 1$, montrer que le polynôme $f_n = X^n + 2$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$. (Indication : réduire modulo 2).

2) Soit p un nombre premier. Montrer que le polynôme

$$\Phi_p = 1 + X + X^2 + \dots + X^{p-1}$$

est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$. (Indication : appliquer la stratégie de la question précédente à $\Phi_p(X+1)$.)

17. Pas de Bézout ? On a vu en cours qu'il y a une notion de PGCD dans $\mathbb{Z}[X]$ puisque $\mathbb{Z}[X]$ est un anneau factoriel. Montrer que l'analogie du théorème de Bézout est faux dans cet anneau. De même dans $K[X, Y]$ avec K un corps.

18. Inversibles de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ (contrôle continu 2023-24). On définit :

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

On rappelle (vu en TD) que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un sous-anneau de \mathbb{R} .

- 1) Montrer que l'application $\varphi : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ défini par $\varphi(a, b) = a + b\sqrt{2}$ est un isomorphisme de groupes.
- 2) Montrer que les anneaux \mathbb{Z}^2 et $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ ne sont pas isomorphes.
- 3) a) Pour un élément $x = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, on définit son *conjugé* $c(x) = a - b\sqrt{2}$. Montrer qu'on a la formule, pour $x, x' \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$: $c(xx') = c(x)c(x')$.
b) Pour un élément $x = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, on définit sa *norme* $N(x) = a^2 - 2b^2$. Montrer qu'on a les formules :

$$\forall x \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}], N(x) = x c(x)$$

$$\forall x, x' \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}], N(xx') = N(x)N(x').$$

- 4) Montrer qu'un élément $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est inversible si et seulement si $N(x) \in \{-1, 1\}$.

Le but de la suite de l'exercice est de montrer l'égalité :

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times = \{\varepsilon(1 + \sqrt{2})^n, \varepsilon \in \{-1, 1\}, n \in \mathbb{Z}\}.$$

- 5) Démontrer l'inclusion \supset .
- 6) Soit un élément $a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times$ qui vérifie : $1 \leq a + b\sqrt{2} < 1 + \sqrt{2}$.
a) Montrer qu'on a l'inégalité : $-1 \leq a - b\sqrt{2} \leq 1$.
b) En déduire qu'on a nécessairement $a = 1$ puis $b = 0$.
- 7) Déduire de la question précédente que tout inversible de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ qui est ≥ 1 est de la forme $(1 + \sqrt{2})^n$ pour un $n \in \mathbb{N}$.
- 8) En déduire l'égalité annoncée.

19. Sous-anneaux de \mathbb{Z}^2 (examen 2023-24). On se place dans l'anneau \mathbb{Z}^2 . Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on définit

$$A_n = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid x \equiv y \pmod{n}\}.$$

- 1) Montrer que A_n est un sous-anneau de \mathbb{Z}^2 .
- 2) Soit A un sous-anneau de \mathbb{Z}^2 . On veut montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $A = A_n$.
a) Montrer que pour $k \in \mathbb{Z}$ on a : $(k, k) \in A$.
b) Montrer que pour $k \in \mathbb{Z}$ on a : $(k, 0) \in A \iff (0, k) \in A$.

- c) On suppose qu'il n'existe pas d'élément de A de la forme $(0, y)$ avec $y \neq 0$. Montrer que $A = A_0$. (Avant cela il est conseillé de réfléchir quelques instants à ce qu'est le sous-anneau A_0 .)
- d) On suppose qu'il existe un élément de A de la forme $(0, y)$ avec $y \neq 0$. Soit n le plus petit entier ≥ 1 tel que $(0, n) \in A$. Montrer que $A = A_n$.

20. Quelques idéaux de $\mathbb{Z}[i]$ (examen 2023-24). On note

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

- 1) Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de \mathbb{C} .
- 2) Soit I l'ensemble des $a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ tels que a et b ont la même parité.
 - a) Montrer que I est un idéal de $\mathbb{Z}[i]$.
 - b) Montrer que $I = (1 + i)$.
- 3) Montrer que l'idéal $(3 + i, 5 + i)$ est égal à I .

21. Un anneau intègre qui n'est pas factoriel (examen 2023-24). On définit

$$\mathbb{Z}[i\sqrt{3}] = \{a + bi\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Pour gagner du temps, on admettra que $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ est un sous-anneau de \mathbb{C} . (Vous pouvez aussi le vérifier rapidement au brouillon.)

- 1) Pour un élément $z = a + bi\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ on définit sa *norme*

$$N(z) = z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + 3b^2.$$

- a) Montrer que pour tous $z, z' \in \mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ on a $N(zz') = N(z)N(z')$.
- b) Montrer qu'un $z \in \mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ est inversible si et seulement si $N(z) = 1$. Décrire le groupe $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]^\times$.
- 2) Dresser les listes des éléments de norme 2 et de norme 4 dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$.
- 3) Montrer que tous les éléments de norme 4 sont irréductibles dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$.
- 4) En déduire que $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ n'est pas un anneau factoriel. (*Indication : multiplier entre eux les éléments de norme 4.*)
- 5) (Question bonus) On a vu en TD que $\mathbb{Z}[i]$ est un anneau euclidien (et donc principal, donc factoriel). Si l'on essaye de copier la preuve de ce fait dans le cas de $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?