

# HAI722I — DM

Ivan Lejeune

8 octobre 2025

## Table des matières

1	Partie théorique . . . . .	2
2	Partie pratique. . . . .	3

## Instructions

Ce devoir est à rendre avant le 12 décembre 2025 à 12h, soit par mail à l'adresse : rodolphe.giroudeau@lirmm.fr, soit en déposant votre devoir durant le cours

## 1 Partie théorique

**Exercice 1 Algorithmes pour la programmation linéaire.** Considérons la formulation suivante :

$$P_\beta = \begin{cases} \max z = 5x_1 + 2x_2 \\ 6x_1 + x_2 \geq 6 \\ 4x_1 + 4x_2 \geq 12 \\ x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2\} \end{cases}$$

1. Résoudre le problème  $P_\beta$  par la méthode du big  $M$ .
2. Résoudre le problème  $P_\beta$  par la méthode à deux phases.
3. **Difficile :**
  - (a) Résoudre le problème  $P_\beta$  par la méthode dual-simplexe.
  - (b) Soit le programme linéaire  $P_\theta$

$$P_\theta = \begin{cases} \max z = x_1 + 3x_2 \\ x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1 - 2x_2 \geq 5 \\ -2x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2\} \end{cases}$$

Résoudre le problème  $P_\theta$  par la méthode dual-simplexe.

### Solution.

1. Commençons par poser le problème sous forme standard :

$$P_\beta = \begin{cases} \max z = 5x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 - M \cdot (y_1 + y_2 + y_3) \\ 6x_1 + x_2 - x_3 + y_1 = 6 \\ 4x_1 + 4x_2 - x_4 + y_2 = 12 \\ x_1 + 2x_2 - x_5 + y_3 = 4 \\ x_i \geq 0, y_j \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, 5\}, \forall j \in \{1, 2, 3\}. \end{cases}$$

Ensuite on construit notre tableau du simplexe :

$c$			5	2	0	0	0	$-M$	$-M$	$-M$
$c^J$	variables de base		$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_5$	$y_1$	$y_2$	$y_3$
$-M$	$x_1^1 = y_1$	6	6	1	-1	0	0	1	0	0
$-M$	$x_2^1 = y_2$	12	4	4	0	-1	0	0	1	0
$-M$	$x_2^1 = y_3$	4	1	2	0	0	-1	0	0	1
	$z(x)$	$-22M$	$-11M - 5$	$-7M - 2$	$M$	$M$	$M$	0	0	0

**Exercice 2 Dualité.** Considérez le programme linéaire le plus général envisageable donné ci-

dessous :

$$\begin{cases} \min z = c_1 x_1 + c_2 x_2 \\ A_{11} x_1 + A_{12} x_2 \leq b_1 \\ A_{21} x_1 + A_{22} x_2 = b_2 \\ x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2\} \end{cases}$$

où  $A$  est une matrice  $(m_1 + m_2) \times (n_1 + n_2)$  et  $c, x \in \mathbb{R}^{n_1+n_2}$  et  $b \in \mathbb{R}^{m_1+m_2}$ .  
Caractériser le dual.

**Solution.**

**Exercice 3 Ensemble convexe.** Soit  $C_1$  et  $C_2$  deux convexes de  $\mathbb{R}^{m+n}$ . Montrer que l'ensemble

$$C = \{(x, y_1 + y_2) \mid x \in \mathbb{R}^m, y_1 \in \mathbb{R}^n, y_2 \in \mathbb{R}^n, (x, y_1) \in C_1, (x, y_2) \in C_2\}$$

est également convexe.

**Solution.**

**Exercice 4 Modélisation et dualité.** Considérons un problème d'affectation avec  $m$  jobs et  $n$  travailleurs ( $n \geq m$ ). Chaque job doit être affecté à exactement un travailleur. Soit  $p_{ij}$  le rendement obtenu si on affecte le job  $i$  au travailleur  $j$ , où  $i \in \{1, \dots, m\}$  et  $j \in \{1, \dots, n\}$ . On cherche une affectation qui maximise le rendement total.

1. Donner le programme linéaire.
2. Donner la formulation du dual de ce problème.

**Solution.**

**Exercice 5 Programmation linéaire : Farkas.** Considérons le programme linéaire suivant, qui dépend de  $\varepsilon \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{cases} \min z = 4x_1 - 2x_2 \\ x_2 \leq 3 \\ \varepsilon x_1 + (2 - \varepsilon)x_2 \leq 4 \\ x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2\} \end{cases}$$

1. Montrer que le problème est réalisable  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}$ .
2. Pour quelles valeurs de  $\varepsilon$  la valeur optimale est-elle non bornée ?

**Solution.**

**Exercice 6 Résolution numérique.** Résoudre le programme linéaire suivant par la méthode Primal-Dual :


$$\text{Primal} = \begin{cases} \min z(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 8x_4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 3 \\ -x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 1 \\ x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4\} \end{cases}$$

**Solution.**

## 2 Partie pratique

 Exercice 7.

 Solution.

 Exercice 8.

 Solution.

 Exercice 9.

 Solution.