



## 1 Structures mathématiques

**Exercice 1 Objectif.** Identifier les propriétés d'un groupe (neutre, inverses, commutativité) à partir d'une table d'opérations symbolique.

Soit  $G = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$  un ensemble muni d'une loi de composition interne  $*$ . La table de l'opération est donnée ci-dessous (où l'entrée à la ligne  $i$  et la colonne  $j$  correspond à  $i * j$ ) :

$*$	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$
$\alpha$	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$
$\beta$	$\beta$	$\alpha$	$\delta$	$\gamma$
$\gamma$	$\gamma$	$\delta$	$\alpha$	$\beta$
$\delta$	$\delta$	$\gamma$	$\beta$	$\alpha$

1. **Identification de l'élément neutre** : Quel est l'élément neutre  $e$  de ce groupe ? Justifiez votre réponse en observant les lignes et colonnes du tableau.
2. **Recherche d'inverses** : Pour chaque élément  $x$  de  $G$ , trouver son inverse  $x^{-1}$  (l'unique élément tel que  $x * x^{-1} = e$ ). Que remarquez-vous sur l'inverse de  $\gamma$  ?
3. **Commutativité** : Le groupe  $(G, *)$  est-il abélien (commutatif) ?
4. **Résolution d'équation** : A l'aide de la table, résoudre l'équation suivante d'inconnue  $x$  :

$$\gamma * x = \delta$$

**Solution.**

1. La seule ligne (et colonne) qui ne modifie aucun élément est celle de  $\alpha$  donc  $e = \alpha$ .
2. On a

$$\begin{cases} \alpha^{-1} &= \alpha \\ \beta^{-1} &= \beta \\ \gamma^{-1} &= \gamma \\ \delta^{-1} &= \delta \end{cases}$$

On remarque que  $\gamma$  est son propre inverse.

3. On a bien  $\forall x, y \in G, x * y = y * x$  car le tableau est symétrique par rapport à la diagonale. Donc  $(G, *)$  est abélien.
4. On cherche dans le tableau l'élément  $x$  tel que  $\gamma * x = \delta$ . On trouve  $x = \beta$ .

**Exercice 2.**

On se place dans l'anneau  $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ . On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le produit  $A \cdot B$  puis le produit  $B \cdot A$ .
2. L'anneau  $M_2(\mathbb{R})$  est-il commutatif ?
3. Calculer  $A^2$ .
4. Pourquoi cela empêche-t-il  $M_2(\mathbb{R})$  d'être un anneau intègre même s'il ne contient que des coefficients réels ?

**Solution.**

1. On a

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} B \cdot A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. L'anneau  $M_2(\mathbb{R})$  n'est pas commutatif parce qu'on a trouvé deux éléments ( $A$  et  $B$ ) de  $M_2(\mathbb{R})$  tels que  $A \cdot B \neq B \cdot A$ .

3. On a

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. On vient de trouver deux éléments de  $M_2(\mathbb{R})$  ( $A$ ) non nuls tels que  $A \cdot A = 0$ . Alors l'anneau  $M_2(\mathbb{R})$  n'est pas intègre.

### Exercice 3.

On travaille dans l'anneau de polynômes  $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})[x]$ . Les coefficients sont calculés modulo 6. Soient  $P(x) = 2x^2 + 3$  et  $Q(x) = 3x + 1$

1. **Anomalie du degré**

- (a) Quels sont les degrés de  $P$  et  $Q$  ?
- (b) Calculer le produit  $P(x) \cdot Q(x)$  en réduisant les coefficients modulo 6.
- (c) Quel est le degré du polynôme résultant ? La propriété  $\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  est-elle vérifiée ? Expliquez pourquoi.

2. **Echec de la division euclidienne standard.** On considère les polynômes  $F(x) = x^2 + 1$  et  $G(x) = 2x$ . Essayez de poser la division euclidienne de  $F$  par  $G$ .

*Indice :* Pour éliminer le terme en  $x^2$ , vous devez multiplier  $2x$  par un coefficient  $k$  tel que  $2 \cdot k = 1 \pmod{6}$ . Un tel entier existe-t-il dans  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  ? Conclure.

### Solution.

1. Sur les degrés :

- (a)  $P$  est de degré 2 et  $Q$  de degré 1.
- (b) On a

$$\begin{aligned} P \cdot Q &= (2x^2 + 3) \cdot (3x + 1) \pmod{6} \\ &= 6x^3 + 2x^2 + 9x + 3 \pmod{6} \\ &= 2x^2 + 3x + 3 \pmod{6} \end{aligned}$$

- (c) Le degré du polynôme résultant est 2. La propriété  $\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  n'est pas vérifiée car l'anneau n'est pas intègre (par exemple  $2 \cdot 3 = 0 \pmod{6}$ ).

2. 2 ne possède pas d'inverse dans  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  car  $2 \wedge 6 = 2$ . On ne peut donc pas poser la division euclidienne de  $F$  par  $G$  ici.

## 2 Arithmétique des polynomes

### 2.1 Multiplication et addition naïve

#### Exercice 4.

Coder dans Sagemath les opérations d'addition et de multiplication de deux polynomes qui sont donnés par la liste de leurs coefficients. Le premier élément de la liste correspondra à l'élément constant du polynome. Vous testerez vos fonctions sur des polynomes aléatoires de degrés dans  $\{10, 100, 1000\}$  avec les domaines de coefficients suivants :  $\mathbb{GF}(17), \mathbb{Z}, \mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$ . A chaque fois vous prendrez soin de faire des opérations impliquant aussi bien des polynomes de degrés identiques que des polynomes de degrés différents. Vous devrez comparer les résultats de vos calculs avec celui fait par les opérations natives d'addition et de multiplication de polynomes dans Sage.

**Solution.** On utilise le code suivant :

```
def poly_add(A, B, R):
    n = max(len(A), len(B))
    res = [R(0)] * n
    for i in range(n):
        a = A[i] if i < len(A) else 0
        b = B[i] if i < len(B) else 0
        res[i] += a + b
    res = normalise(res, R)
    return res
```

Code 1 – Fonction d'addition de polynomes

### 2.2 Multiplication de Karatsuba

#### Exercice 5.

Nous revenons ici sur l'analyse de la complexité de l'algorithme de Karatsuba pour des polynomes de  $A[X]$  avec  $A$  un anneau quelconque.

1. Donner le nombre exact de multiplications dans  $A$  qu'effectue au total l'algorithme de Karatsuba pour multiplier deux polynomes de taille  $n$  à coefficients dans  $A$ .
2. Calculer le nombre d'additions dans  $A$  effectuées au premier niveau récursif par l'algorithme de Karatsuba.
3. Utiliser l'analyse de complexité de Karatsuba pour déduire une borne sur la complexité exacte en nombre d'opérations dans  $A$  (on ne souhaite plus avoir de constante  $c$  dans l'analyse).
4. Déduire, par l'utilisation de sage, une taille de polynome à partir de laquelle il serait intéressant d'utiliser l'algorithme de Karatsuba plutôt que l'algorithme naïf de multiplication de polynomes.

**Solution.**

#### Exercice 6.

Calculer les produits des polynomes dans  $\mathbb{Z}[X]$  suivants en utilisant l'algorithme de Karatsuba :

1.  $P = 3X + 4$  et  $Q = 2X + 3$ .
2.  $P = X + 3$  et  $Q = 3X + 2$ .
3.  $P = X^3 + 2X^2 + 1$  et  $Q = 2X^3 + X + 2$ .

**Solution.**

**Exercice 7.**

Dans un premier temps, vous allez coder l'algorithme de multiplication de polynomes de Karatsuba en faisant l'hypothèse que les polynomes d'entrée sont de taille  $2^k$  pour un entier  $k \geq 0$  quelconque. Votre fonction prendra en paramètre la liste des coefficients des deux polynomes à multiplier. Ces listes devront obligatoirement faire la meme taille. Dans un deuxieme temps, vous proposerez une amélioration du code qui permettra de prendre en parametre des polynomes de taille quelconque.

**Solution.**

## 2.3 Evaluation et Interpolation

**Exercice 8 title.**

**Solution.**

## 2.4 Racines de l'unité et FFT

**Exercice 9 title.**

**Solution.**

**Exercice 10 title.**

**Solution.**

**Exercice 11 title.**

**Solution.**

**Exercice 12 title.**

**Solution.**

**Exercice 13 title.**

**Solution.**

**Exercice 14 title.**

**Solution.**

## 2.5 Division euclidienne

**Exercice 15 title.**

**Solution.**

**Exercice 16 title.**

Solution.

Exercice 17 title.

Solution.

Exercice 18 title.

Solution.

Exercice 19 title.

Solution.

Exercice 20 title.

Solution.

Exercice 21 title.

Solution.

Exercice 22 title.

Solution.

## 2.6 Produit de matrices

Exercice 23 title.

Solution.

## 2.7 Algèbre linéaire rapide : réduction au produit de matrices

Exercice 24 title.

Solution.

Exercice 25 title.

Solution.

Exercice 26 title.

Solution.

Exercice 27 title.

Solution.

Exercice 28 title.

Solution.

Exercice 29 title.

Solution.