

# Introduction to Sphere - Valued Sobolev Maps

Ivan De Biasi

## Indice

<b>1</b>	<b>Prerequisiti</b>	<b>2</b>
1.1	Distribuzioni . . . . .	2
1.2	Spazi di Sobolev $W^{1,p}$ . . . . .	2
1.3	Funzioni $BV$ . . . . .	4
1.4	Funzioni $VMO$ . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Funzioni a valori nelle sfere</b>	<b>5</b>
2.1	Lifting . . . . .	5
2.2	Vortex map . . . . .	7
2.3	Norme e problemi variazionali legati a $Ju$ . . . . .	7
2.4	Approssimazioni con mappe (più) lisce . . . . .	9

# 1 Prerequisiti

## 1.1 Distribuzioni

Notazione: Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato  
 $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $\{u_n\} \subseteq \mathcal{D}(\Omega)$  e  $u \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$u_n \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} u \quad \text{se} \quad \begin{cases} \exists K \subset \Omega \text{ compatto} : \forall n \quad \text{supp } u_n \subseteq K \\ \forall \alpha \quad D^\alpha u_n \xrightarrow{\text{unif.}} D^\alpha u \end{cases}$$

**Definizione:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato

$\mathcal{D}'(\Omega) = \{T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R} \mid T \text{ lin e cont.}\}$  spazio delle distribuzioni su  $\Omega$

Notazione:  $\langle T, u \rangle = T(u)$

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $\{T_n\} \subseteq \mathcal{D}'(\Omega)$  e  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$

$$T_n \xrightarrow{*} T \quad \text{se} \quad \forall u \in \mathcal{D}(\Omega) \quad \langle T_n, u \rangle \longrightarrow \langle T, u \rangle$$

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $\{T_n\} \subseteq \mathcal{D}'(\Omega)$

$$\forall u \in \mathcal{D}(\Omega) \quad \sup_n \langle T_n, u \rangle < +\infty \implies \exists \begin{cases} \{T_{n_k}\} \subseteq \{T_n\} \\ T \in \mathcal{D}'(\Omega) \end{cases} : T_{n_k} \xrightarrow{*} T$$

*Dimostrazione. ...*

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $f \in L_{loc}^1(\Omega)$

$$T_f : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R} : \langle T_f, u \rangle = \int_{\Omega} f(x)u(x)dx$$

Proprietà:  $T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$

- $\frac{\partial T}{\partial x_j} : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R} : \left\langle \frac{\partial T}{\partial x_j}, u \right\rangle = \left\langle T, \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\rangle$  derivata  $j$ -esima di  $T$
- $\nabla T, \text{div } T, \dots$

Proprietà:  $\forall j \quad \frac{\partial T}{\partial x_j}, \nabla T, \text{div } T, \dots \in \mathcal{D}'(\Omega)$

**Teorema:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato

$$\frac{\partial}{\partial x_j} : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega) \text{ lineare e continuo}$$

*Dimostrazione. ...*

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  e  $\rho \in \mathcal{D}(\Omega)$

- $\tilde{\rho} = \rho \circ \cdot_{-1}$
- $T * \rho : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R} : \langle T * \rho, u \rangle = \langle T, \tilde{\rho}u \rangle$

Proprietà:  $T * \rho \in \mathcal{D}'(\Omega)$

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  e  $\rho \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$\forall j \quad \frac{\partial}{\partial x_j}(T * \rho) = \frac{\partial T}{\partial x_j} * \rho = T * \frac{\partial \rho}{\partial x_j}$$

*Dimostrazione. ...*

## 1.2 Spazi di Sobolev $W^{1,p}$

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  e  $p \in [1, +\infty]$

$$W^{1,p}(\Omega) = \left\{ u \in L^p(\Omega) \mid \exists g \in L^p(\Omega, \mathbb{R}^N) : \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \quad \int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = - \int_{\Omega} g_i \varphi \right\}$$

Notazione:  $g_i = \frac{\partial u}{\partial x_i}$ ,  $g = \nabla u$

Proprietà:  $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\Omega)} = \|\cdot\|_{L^p(\Omega)} + \|\nabla \cdot\|_{L^p(\Omega)}$  norma su  $W^{1,p}(\Omega)$  :  $(W^{1,p}(\Omega), \|\cdot\|_{W^{1,p}(\Omega)})$  spazio di Banach

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $p \in [1, +\infty]$ ,  $\{u_n\} \subseteq W^{1,p}(\Omega)$  e  $u \in W^{1,p}(\Omega)$

$$\begin{aligned} \bullet u_n &\xrightarrow{W^{1,p}(\Omega)} u & \text{se} & \quad u_n, \nabla u_n \xrightarrow{L^p(\Omega)} u, \nabla u \\ \bullet u_n &\xrightarrow{W^{1,p}(\Omega)} u & \text{se} & \quad u_n, \nabla u_n \xrightarrow{L^p(\Omega)} u, \nabla u \end{aligned}$$

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $\{u_n\} \subseteq W^{1,p}(\Omega)$  :  $\exists C > 0$  :  $\forall n \quad \|u_n\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq C$

$$\begin{aligned} \bullet p \in (1, +\infty) &\implies \exists \{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}, u \in W^{1,p}(\Omega) : u_{n_k}, \nabla u_{n_k} \xrightarrow{L^p(\Omega)} u, \nabla u \\ \bullet p = +\infty &\implies \exists \{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}, u \in W^{1,p}(\Omega) : u_{n_k}, \nabla u_{n_k} \xrightarrow{*} u, \nabla u \end{aligned}$$

*Dimostrazione. ...*

**Corollario:**  $p \in (1, +\infty) \implies u_{n_k} \xrightarrow{L^p(\Omega)} u$

*Dimostrazione. ...*

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato

$$\forall p \in [1, +\infty] \quad W^{1,p}(\Omega) = \overline{C^\infty(\overline{\Omega})}^{\|\cdot\|_{W^{1,p}(\Omega)}}$$

*Dimostrazione. ...*

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $p \in [1, +\infty]$

$$\begin{aligned} \bullet p \in [1, N) &\implies \exists p^* = \frac{pN}{N-p} : \begin{cases} W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega) \\ \forall q < p^* \quad W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega) \end{cases} \\ \bullet p = N &\implies \forall q < +\infty \quad W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega) \\ \bullet p > N &\implies \exists \alpha_p = \frac{p-N}{p} : \begin{cases} W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\alpha_p}(\Omega) \\ \forall \beta < \alpha_p \quad W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\beta}(\Omega) \end{cases} \end{aligned}$$

*Dimostrazione. ...*

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $p \in [1, +\infty]$  e  $u \in W^{1,p}(\Omega)$

$$\forall F \in C^1(\mathbb{R}) \cap Lip(\mathbb{R}) \quad F \circ u \in W^{1,p}(\Omega) : \nabla(F \circ u) = F'(u) \nabla u$$

*Dimostrazione. ...*

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $p \in [1, +\infty]$

$$\forall u, v \in W^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega) \quad uv \in W^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega) : \nabla(uv) = v \nabla u + u \nabla v$$

*Dimostrazione. ...*

**Lemma:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $p \in [1, +\infty]$  e  $\psi \in L^p_{loc}(\Omega)$

$$D\psi \in L^p(\Omega) \implies \psi \in W^{1,p}(\Omega)$$

*Dimostrazione.*

...to do...

□

**Lemma** [ $L^p$  Poincarè]: Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $p \in [1, +\infty]$  e  $F \in L^p(\Omega, \mathbb{R}^N)$

$$\forall i, j \quad \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \stackrel{\mathcal{D}'(\Omega)}{=} \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \iff \exists \varphi \in W^{1,p}(\Omega) : F = \nabla \varphi$$

*Dimostrazione.*

...to do...

□

### 1.3 Funzioni BV

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato

$$BV(\Omega) = \left\{ u \in L^1(\Omega) \mid \exists \mu \in \mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R}^N) : \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \quad \int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = \int_{\Omega} \varphi d\mu_i \right\}$$

Notazione:  $\mu = Du$

Proprietà:  $\|\cdot\|_{BV(\Omega)} = \|\cdot\|_{L^1(\Omega)} + \|D \cdot\|_{\mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R}^N)}$  norma su  $BV(\Omega) : (BV(\Omega), \|\cdot\|_{BV(\Omega)})$  spazio di Banach

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato

$$\forall u \in BV(\Omega) \quad \exists \{u_n\} \subset C^\infty(\overline{\Omega}) : \begin{cases} u_n \xrightarrow{L^1(\Omega)} u & Du_n \xrightarrow{\mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R}^N)} Du \\ \|Du_n\|_{\mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R}^N)} \longrightarrow \|Du\|_{\mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R}^N)} \end{cases}$$

*Dimostrazione.* ...

**Teorema:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato

$BV(\Omega)$  immerge come  $W^{1,1}(\Omega)$

*Dimostrazione.* ...

**Definizione:**  $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^N$   $k$ -rettificabile se  $\exists \left\{ \begin{array}{l} \Sigma_0 \subseteq \mathbb{R}^N : \mathcal{H}^k(\Sigma_0) = 0 \\ \{M_i \subseteq \mathbb{R}^N\} C^1 \text{ } k\text{-sottovarietà} \end{array} \right. : \Sigma \subseteq \Sigma_0 \cup \bigcup_i M_i$

**Teorema:** Dato  $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^N$   $k$ -rettificabile

- $\mathcal{H}^k$ -q.o.  $\exists T_x \Sigma$
- $\mathcal{H}^k$ -q.o.  $\exists \Sigma_{x,r} = \frac{\Sigma - x}{r} : \forall R > 0 \quad \mathcal{H}^k \lfloor_{\Sigma_{x,r}} \xrightarrow{\mathcal{M}(B_R^N)} \mathcal{H}^k \lfloor_{T_x \Sigma}$

*Dimostrazione.* ...

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- $x \in \Omega$  p.to di Lebesgue per  $f$  se  $\exists C \in \mathbb{R} : \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{B_r(x)} |f(y) - C| dy = 0$
- $S_f = \{x \in \Omega \mid x \text{ non p.to di Lebesgue per } f\}$

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $u \in BV(\Omega)$

- $S_u$   $(N-1)$ -rettificabile
- $\exists \begin{cases} D^{\text{ac}} u = \nabla u \mathcal{L}^N \\ D^J u = (u^+ - u^-) \nu_u \mathcal{H}^{N-1} \lfloor_{S_u} \\ D^C u \ll \mathcal{H}^{N-1} \end{cases} : \begin{cases} D u = D^{\text{ac}} u + D^J u + D^C u \\ D^J u \perp \mathcal{L}^N \end{cases}$

*Dimostrazione.* ...

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $u \in BV(\Omega)$  e  $F \in C^1(\mathbb{R}) \cap Lip(\mathbb{R})$

$$F \circ u \in BV(\Omega) : \begin{cases} D^{\text{ac}}(F \circ u) = F'(u) D^{\text{ac}} u & D^C(F \circ u) = F'(u) D^C u \\ D^J(F \circ u) = (F(u^+) - F(u^-)) \nu_u \mathcal{H}^{N-1} \lfloor_{S_u} = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-} D^J u \end{cases}$$

*Dimostrazione.* ...

**Lemma:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $p \in [1, +\infty]$  e  $\psi \in L_{loc}^p(\Omega)$

$$D \psi \in \mathcal{M}(\Omega) \implies \psi \in BV(\Omega)$$

*Dimostrazione.*

...to do...

□

**Lemma** [BV Poincarè]: Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $p \in [1, +\infty]$  e  $F \in \mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R}^N)$

$$\forall i, j \quad \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \stackrel{\mathcal{D}'(\Omega)}{=} \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \iff \exists \varphi \in BV(\Omega) : F = D\varphi$$

*Dimostrazione.*

Analoga a  $L^p$  Poincarè.

□

## 1.4 Funzioni $VMO$

**Definizione:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato

$$VMO(\Omega) = \left\{ u \in L^1(\Omega) \mid \int_{B_\varepsilon(x)} \int_{B_\varepsilon(x)} |u(y) - u(z)| dy dz \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0, \text{ unif in } \Omega} 0 \right\}$$

**Lemma:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $M$  varietà chiusa,  $u \in VMO(\Omega, M)$  e  $\{\rho_\varepsilon\}$  famiglia di mollificatori standard

$$d(u * \rho_\varepsilon, M) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0, \text{ unif in } \Omega} 0$$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

## 2 Funzioni a valori nelle sfere

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $p \in [1, +\infty]$  e  $m \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \bullet W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^m) &= \left\{ u \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}^{m+1}) \mid |u(x)| \stackrel{\Omega\text{-q.o.}}{=} 1 \right\} \\ \bullet BV(\Omega, \mathbb{S}^m) &= \left\{ u \in BV(\Omega, \mathbb{R}^{m+1}) \mid |u(x)| \stackrel{\Omega\text{-q.o.}}{=} 1 \right\} \end{aligned}$$

### 2.1 Lifting

**Lemma:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $p \in [1, +\infty]$

$$\forall \varphi \in u \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}) \quad e^{i\varphi} = (\cos \varphi, \sin \varphi) \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^1)$$

*Dimostrazione.* ...

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $p \in [1, +\infty]$  e  $u \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^1)$

$$\varphi \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}) : u = e^{i\varphi} \quad \text{lifting di } u$$

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso e  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{S}^1$

$$u \in C^k(\Omega, \mathbb{S}^1) \implies \exists \varphi \in C^k(\Omega, \mathbb{R}) : \forall x \in \Omega \quad u(x) = e^{i\varphi(x)}$$

*Dimostrazione.*

Dato  $\pi(t) = e^{it}$  il rivestimento universale di  $\mathbb{S}^1$ , poichè  $\Omega$  è semplicemente connesso, si ha

$$\forall u \in C^0(\Omega, \mathbb{S}^1) \quad \exists \varphi \in C^0(\Omega, \mathbb{R}) : u = \pi \circ \varphi.$$

Inoltre poichè  $\pi$  è localmente invertibile con inversa  $C^\infty$  e  $u$  è localmente non-suriettiva si ha

$$\forall x_0 \in \Omega \quad \varphi|_{B_r(x_0)} = \pi^{-1}|_{u(B_r(x_0))} \circ u|_{B_r(x_0)} \quad \text{ovvero} \quad \varphi \in C^k(\Omega, \mathbb{R}).$$

□

**Teorema:**  $\exists \Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato non semplicemente connesso :  $\exists u \in C^\infty(\Omega, \mathbb{S}^1) : \nexists \varphi \in C^0(\Omega) : u = e^{i\varphi}$

*Dimostrazione.*

Presi  $\Omega = B_2 \setminus B_1 \subset \mathbb{R}^2$  e  $u(x) = \frac{x}{|x|}$  per assurdo si avrebbe omotopia tra  $\text{Id}_{\mathbb{S}^1}$  e una costante.

□

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $u \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}^2)$

$$j u = u_1 \nabla u_2 - u_2 \nabla u_1$$

Proprietà:  $\forall u \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1) : \exists \varphi \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1)$  lifting di  $u \quad j u = \nabla \varphi$

**Lemma:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato

$$\forall u \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1) \quad j u = \nabla u$$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso e  $V \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}^N)$

$$\text{curl}(V) \in \mathbb{R}_{\text{skew-sym}}^{N \times N} : (\text{curl}(V))_{ij} = \frac{\partial V_i}{\partial x_j} - \frac{\partial V_j}{\partial x_i}$$

Proprietà:  $\forall u \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{R}^2) : \text{j} u \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^2) \quad \text{curl}(\text{j} u) = 0$

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $u \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}^2)$

$$\text{J} u = \frac{1}{2} \text{curl}(\text{j} u) \in \mathcal{D}'(\Omega, \mathbb{R}_{\text{skew-sym}}^{N \times N}) \quad \text{Jacobiano distribuzionale}$$

Proprietà:  $u \in W^{1,2}(\Omega, \mathbb{R}^2) \quad \text{J} u = \det(\nabla u)$

Proprietà:  $N = 2 \implies \forall \Psi \in \mathcal{D}(\Omega, \mathbb{R}) \quad \langle \text{J} u, \Psi \rangle = -\frac{1}{2} \langle \text{j} u, \nabla^\perp \Psi \rangle$

Proprietà:  $N = 3 \implies \forall \Psi \in \mathcal{D}(\Omega, \mathbb{R}^3) \quad \langle \text{J} u, \Psi \rangle = \langle \text{j} u, \text{curl}(\Psi) \rangle$

**Lemma [1]:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $u \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1)$

$$\forall j \quad u \perp \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

*Dimostrazione.*

$$\begin{aligned} u \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1) &\implies u_1^2 + u_2^2 = 1 \implies \forall j \quad \frac{\partial}{\partial x_j} [u_1^2 + u_2^2] = 2u_1 \frac{\partial u_1}{\partial x_j} + 2u_2 \frac{\partial u_2}{\partial x_j} = 0 \\ &\implies \left\langle u, \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\rangle_{\mathbb{R}^2} = 0 \implies u \perp \frac{\partial u}{\partial x_j} \end{aligned}$$

□

**Lemma [2]:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $u \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1)$

$$\text{j} u \equiv 0 \iff \nabla u \equiv 0 \iff u \text{ costante}$$

*Dimostrazione.*

$$\text{j} u \equiv 0 \implies u_1 \frac{\partial u_2}{\partial x_j} + u_2 \frac{\partial u_1}{\partial x_j} = 0 \implies u_1^2 \frac{\partial u_2}{\partial x_j} + u_1 u_2 \frac{\partial u_1}{\partial x_j} = 0 \xrightarrow{1} u_1^2 \frac{\partial u_1}{\partial x_j} - u_2^2 \frac{\partial u_2}{\partial x_j} = 0$$

□

**Lemma [3]:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato

$$\forall u, v \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^1) \quad \text{j}(u \cdot v) = \text{j} u + \text{j} v$$

*Dimostrazione.*

$$\forall u, v \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^1) \quad \text{si ha} \quad u \cdot v = (u_1 v_1 - u_2 v_2, u_1 v_2 + u_2 v_1) \text{ da cui}$$

$$\begin{aligned} \text{j}(u \cdot v) &= \text{j}(u_1 v_1 - u_2 v_2, u_1 v_2 + u_2 v_1) = (u_1 v_1 - u_2 v_2) \nabla(u_1 v_2 + u_2 v_1) - (u_1 v_2 + u_2 v_1) \nabla(u_1 v_1 - u_2 v_2) \\ &= \dots = (u_1 \nabla u_2 - u_2 \nabla u_1)(u_1^2 + u_2^2) + (v_1 \nabla v_2 - v_2 \nabla v_1)(v_1^2 + v_2^2) = \text{j} u + \text{j} v \end{aligned}$$

□

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $p \in [1, +\infty]$

$$p \geq 2 \implies \forall u \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^1) \quad \text{J} u \equiv 0$$

*Dimostrazione.*

$$u \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^1) \xrightarrow{1} \forall i, j \quad \frac{\partial u}{\partial x_i} \perp u \perp \frac{\partial u}{\partial x_j} \implies \frac{\partial u}{\partial x_i} \parallel \frac{\partial u}{\partial x_j}.$$

$$\text{Poichè } p \geq 2 \text{ vale } (\text{J} u)_{ij} = \det \begin{pmatrix} \partial_i u_1 & \partial_i u_2 \\ \partial_j u_1 & \partial_j u_2 \end{pmatrix} = 0 \implies \text{J} u \equiv 0$$

□

**Teorema** [ $L^p$  lifting]: Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato,  $p \in [1, +\infty]$  e  $u \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^1)$

$$\text{J} u \stackrel{\mathcal{D}'(\Omega)}{=} 0 \implies \exists \varphi \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{R}) : u = e^{i\varphi}$$

*Dimostrazione.*

.. to do...

□

**Corollario:**  $\varphi$  unica a meno di una costante in  $2\pi\mathbb{Z}$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Teorema:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso,  $p \in [1, +\infty]$  e  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{S}^1$   
 $u \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1) \cap C^0(\Omega, \mathbb{S}^1) \implies \mathbf{J} u = 0$

*Dimostrazione.* ...

**Teorema** [BV lifting]: Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato e  $u \in BV(\Omega, \mathbb{S}^1)$

$$\exists \varphi \in BV(\Omega, \mathbb{R}) : \begin{cases} u = e^{i\varphi} \\ \|\mathbf{D} \varphi\|_{\mathcal{M}(\Omega)} \leq 2 \|\mathbf{D} u\|_{\mathcal{M}(\Omega)} \end{cases}$$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

## 2.2 Vortex map

**Definizione:**  $\hat{u} : \begin{matrix} \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \\ x \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathbb{S}^1 \\ \mapsto \frac{x}{|x|} \end{matrix}$  vortex map

**Teorema:**  $\hat{u} \in W^{1,p}(B_1, \mathbb{S}^1) \iff p \in [1, 2)$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Corollario:**  $\mathbf{J} u = \pi \delta_0$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

## 2.3 Norme e problemi variazionali legati a $\mathbf{J} u$

**Definizione:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso e  $u \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1)$

- $R_p(u) = \min \left\{ \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} |\nabla u_n|^p \mid \{u_n\} \subseteq C^\infty(\overline{\Omega}, \mathbb{S}^1) : u_n \xrightarrow{q.o.} u \right\}$
- $L(u) = \min \{ \|\mathbf{D} \varphi\|_{\mathcal{M}(\Omega)} \mid \varphi \in BV(\Omega) : u = e^{i\varphi} \}$
- $L^{\mathbf{J}}(u) = \inf \{ \|\mathbf{D}^{\mathbf{J}} \varphi\|_{\mathcal{M}(\Omega)} \mid \varphi \in BV(\Omega) : u = e^{i\varphi} \}$
- $d_{\nabla}(\mathbf{j} u) = \inf \{ \|\mathbf{j} u - \nabla \varphi\|_{L^1(\Omega)} \mid \varphi \in W^{1,1}(\Omega) \} = \min \{ \|\mathbf{j} u - \mathbf{D} \varphi\|_{\mathcal{M}(\Omega)} \mid \varphi \in BV(\Omega) \}$
- $E_p(\mathbf{J} u) = \inf \left\{ \int_{\Omega} |\nabla v|^p \mid v \in W^{1,p}(\Omega) : \mathbf{J} v = \mathbf{J} u \right\}$
- $E_{\mathcal{M}}(\mathbf{J} u) = \min \{ \|\mu\|_{\mathcal{M}(\Omega)} \mid \mu \in \mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R}^N) : \frac{1}{2} \text{curl} \mu = \mathbf{J} u \}$
- $\|\mathbf{J} u\|_* = \sup \left\{ \langle \mathbf{J} u, \psi \rangle \mid \psi \in C_c^\infty(\Omega, \mathbb{R}_{\text{skew-sym}}^{N \times N}) : \|\text{curl}^* \psi\|_{L^\infty(\Omega)} = 1 \right\}$

**Proposizione:**  $d_{\nabla}(\mathbf{j} u) = E_1(\mathbf{j} u)$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Proposizione:**  $E_{\mathcal{M}}(\mathbf{J} u) = d_{\nabla}(\mathbf{j} u)$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Proposizione:**  $\|Ju\|_* = \frac{1}{2}d_{\nabla}(Ju)$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Proposizione:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso

- $\forall u, v \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1) \quad \|Ju - Jv\|_* \leq \|\nabla u - \nabla v\|_{L^1(\Omega)}$
- $\forall p > 1 \quad \forall u, v \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^1) \quad \|Ju - Jv\|_* \leq \frac{1}{2}\|u - v\|_{L^{p'}(\Omega)} (\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} + \|\nabla v\|_{L^p(\Omega)})$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Corollario:** .

- $J : (W^{1,1}, \text{strong}) \rightarrow (\mathcal{D}', \|\cdot\|_*) \quad \text{continuo}$
- $\forall p > 1 \quad J : (W^{1,p}, \text{weak}) \rightarrow (\mathcal{D}', \|\cdot\|_*) \quad \text{continuo}$

*Dimostrazione.* ...

**Proposizione:**  $L(u) = R_1(Ju)$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Proposizione:**  $\forall p > 1 \quad R_p(u) = \begin{cases} \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}^p & \text{se } Ju = 0 \\ +\infty & \text{se } Ju \neq 0 \end{cases}$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Lemma:** Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso,  $u \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1)$  e  $\varphi \in BV(\Omega) : u = e^{i\varphi}$   
 $D\varphi - Ju \perp Ju$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Corollario:**  $|D\varphi| = |D\varphi - Ju| + |\nabla u|$

*Dimostrazione.* ...

**Teorema:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso

$$\forall u \in W^{1,1}(\Omega, \mathbb{S}^1) \quad L(u) = \int_{\Omega} |\nabla u| + d_{\nabla}(Ju)$$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Corollario:**  $\forall \varphi \in BV(\Omega)$  lifting di  $u \quad \begin{cases} D^C \varphi = 0 \\ \varphi^+ - \varphi^- \in 2\pi\mathbb{Z} \end{cases}$

*Dimostrazione.* ...

**Corollario:**  $L^J(u) \geq d_{\nabla}(u)$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

## 2.4 Approssimazioni con mappe (più) lisce

**Proposizione:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso

$$\forall p > 1 \quad \overline{C^\infty(\overline{\Omega}, \mathbb{S}^1)}^{\|\cdot\|_{W^{1,p}(\Omega)}} = \{u \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^1) \mid Ju = 0\}$$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Corollario:**  $\forall p > 2 \quad \overline{C^\infty(\overline{\Omega}, \mathbb{S}^1)}^{\|\cdot\|_{W^{1,p}(\Omega)}} = W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^1)$

*Dimostrazione.* ...

**Teorema** [Schen-Uhlenbeck '83]: Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso e  $M$  varietà chiusa  
 $\forall p \geq N \quad C^\infty(\overline{\Omega}, M)$  denso in  $W^{1,p}(\Omega, M)$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Teorema** [Bethuel-Zheng '88]: Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso  
 $\forall p < m \quad C^\infty(\overline{\Omega}, \mathbb{S}^m)$  denso in  $W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^m)$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Definizione:** Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso

$$\mathcal{R}^p = \mathcal{R}_m^p(\Omega) = \left\{ u \in W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^m) \mid \exists \Sigma_u \subseteq \Omega \text{ (} N - m - 1 \text{) sottovarietà : } u \in C^\infty(\overline{\Omega} \setminus \Sigma_u, \mathbb{S}^m) \right\}$$

**Teorema** [Bethuel-Zheng '88, Bethuel '91]: Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso  
 $\forall p \in [m, m+1) \quad \mathcal{R}_m^p(\Omega)$  denso in  $W^{1,p}(\Omega, \mathbb{S}^m)$

*Dimostrazione.*

... to do ...

□

**Teorema** [Bethuel '91]: Dati  $B \subset \mathbb{R}^N$  palla,  $M$  varietà  $m$ -dimensionale e  $p < N$   
 $C^\infty(B, M)$  denso in  $W^{1,p}(B, M) \iff \pi_{[p]}(M) = 0$

*Dimostrazione.* ...

**Teorema** [Bethuel '91]: Date  $N$  varietà  $N$ -dimensionale e  $M$  varietà  $m$ -dimensionale

$$\forall p \quad \left\{ u \in W^{1,p}(N, M) \mid \exists \Sigma_u \subseteq \Omega \text{ (} N - [p] - 1 \text{) sottovarietà : } u \in C^\infty(\overline{\Omega} \setminus \Sigma_u, \mathbb{S}^m) \right\} \text{ denso in } W^{1,p}(N, M)$$

*Dimostrazione.* ...

**Teorema** [Bethuel '91]: Dati  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso,  $V$  spazio funzionale e  $p \notin \mathbb{N}$   
 $V$  debolmente denso in  $W^{1,p}(\Omega, ?) \iff V$  fortemente denso in  $W^{1,p}(\Omega, ?)$

*Dimostrazione.* ...

**Teorema** [- ?]: Dato  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  Lipschitz limitato semplicemente connesso  
 $\forall m \quad C^\infty(\Omega, \mathbb{S}^m)$  debolmente denso in  $W^{1,m}(\Omega, \mathbb{S}^m)$

*Dimostrazione.* ...

**Teorema** [Bethuel '20]:  $C^\infty(B^4, \mathbb{S}^2)$  non debolmente denso in  $W^{1,3}(B^4, \mathbb{S}^2)$

*Dimostrazione.* ...

**Corollario:**  $\overline{C^\infty(B^4, \mathbb{S}^2)}^{\|\cdot\|_{W^{1,3}(B^4, \mathbb{S}^2)}} \subset \overline{C^\infty(B^4, \mathbb{S}^2)}^{W_{\text{weak}}^{1,3}(B^4, \mathbb{S}^2)} \subset W^{1,3}(B^4, \mathbb{S}^2)$

*Dimostrazione.* ...