

Paciente: VELILLA CABRERA, LOURDES MARIANA



C.I.: 4868216
Sexo: F
Edad: 27 Años
Médico: DRA. RIQUELME DE OTTO, FABIOLA

Fecha de toma de muestra:
N° orden: 2223167 12/04/25
Origen: Meyer Lab - Casa Central
Página: 1 de 8

Puede verificar la
autenticidad del
resultado a través
del siguiente QR



	Resultado	Intervalo de Referencia
HEMOGRAMA CON ERITROSEDIMENTACION, SANGRE LEUCOCITOS <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Dispersión de luz</i>	5.35 10e3/ μ L	3.98 - 10.04 x10e3/uL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 07/12/2023
Neutrófilos segmentados <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Microscopía/Dispersión de luz</i>	51 %	
Linfocitos <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Microscopía/Dispersión de luz</i>	39 %	
Monocitos <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Microscopía/Dispersión de luz</i>	8 %	
Eosinófilos <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Microscopía/Dispersión de luz</i>	1 %	
Basófilos <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Microscopía/Dispersión de luz</i>	1 %	
Neutrófilos segmentados Absoluto <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	2.729 10e3/ μ L	
Linfocitos Absoluto <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	2.087 10e3/ μ L	
Monocitos Absoluto <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	0.428 10e3/ μ L	
Eosinófilos Absoluto <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	0.054 10e3/ μ L	
Basófilos Absoluto <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	0.054 10e3/ μ L	
ERITROCITOS <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Impedancia</i>	4.36 10e6/ μ L	3.93 - 5.22 10e6/ μ L Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 07/12/2023
HEMOGLOBINA <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Fotometría</i>	13.0 g/dL	11.2 - 15.7 g/dL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 07/12/2023

Dra. YESSICA GIMENEZ VILLALBA
Bioquímica
Reg. Prof. N° 4540

Tel + Whatsapp: (021) 20 80 80
info@meyerlab.com.py | meyerlab.com.py

CASA CENTRAL | SAN LORENZO | SAN CRISTÓBAL | PINEDO SHOPPING | PLAZA MADERO | LAMBARÉ

Un diagnóstico clínico definitivo no debe estar basado solamente en los resultados laboratoriales. Léase el punto (.) como decimal.

Paciente: VELILLA CABRERA, LOURDES MARIANA



C.I.: 4868216
Sexo: F
Edad: 27 Años
Médico: DRA. RIQUELME DE OTTO, FABIOLA

Fecha de toma de muestra:
N° orden: 2223167 12/04/25
Origen: Meyer Lab - Casa Central
Página: 2 de 8

Puede verificar la
autenticidad del
resultado a través
del siguiente QR



	Resultado	Intervalo de Referencia
HEMATOCRITO <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Impedancia</i>	38.5 %	34.1 - 44.9 % Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 07/12/2023
VCM <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	88.3 fL	79.4 - 94.8 fL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 07/12/2023
HCM <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	29.8 pg	
CHCM <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	33.8 g/dL	
RDW-CV <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	12.6 %	11.7 - 14.4 %
RDW-SD <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	41.3 fL	36.4 - 46.3 fL
ERITROSEDIMENTACION 1ª HORA <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Westergren</i>	10 mm	
PLAQUETAS <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Impedancia</i>	209.0 10e3/ μ L	182 - 369 x10e3/ μ L Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 07/12/2023
VPM <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: Razón</i>	9.20 fL	
COAGULOGRAMA, SANGRE		
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP), SANGRE	13.9 seg	
PORCENTAJE DE ACTIVIDAD	86 %	70 - 100 % de actividad
INR (RAZON NORMALIZADA INTERNACIONAL)	1.11	
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPa)	31 seg	25 - 35 seg
FIBRINOGENO	313 mg/dL	200 - 400 mg/dL
PLAQUETAS	209.0 10e3/ μ L	182 - 369 x10e3/ μ L Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 07/12/2023

Dra. YESSICA GIMENEZ VILLALBA
Bioquímica
Reg. Prof. N° 4540

Tel + Whatsapp: (021) 20 80 80
info@meyerlab.com.py | meyerlab.com.py

CASA CENTRAL | SAN LORENZO | SAN CRISTÓBAL | PINEDO SHOPPING | PLAZA MADERO | LAMBARÉ

Un diagnóstico clínico definitivo no debe estar basado solamente en los resultados laboratoriales. Léase el punto (.) como decimal.

Paciente: VELILLA CABRERA, LOURDES MARIANA



C.I.: 4868216
Sexo: F
Edad: 27 Años
Médico: DRA. RIQUELME DE OTTO, FABIOLA

Fecha de toma de muestra:
N° orden: 2223167 12/04/25
Origen: Meyer Lab - Casa Central
Página: 3 de 8

Puede verificar la autenticidad del resultado a través del siguiente QR

	Resultado	Intervalo de Referencia
UREA, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Ureasa</i>	22.3 mg/dL	15 - 40 mg/dL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
CREATININA, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Enzimático</i>	0.68 mg/dL	0.55 - 1.02 mg/dL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
ACIDO URICO, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Uricasa.</i>	4.5 mg/dL	2.5 - 6.2 mg/dL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
ELECTROLITOS, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: EIS indirecto</i>		
SODIO	137.3 mEq/L	136.0 - 145.0 mEq/L
POTASIO	3.91 mEq/L	3.5 - 5.1 mEq/L
CLORUROS	105.4 mEq/L	98.0 - 107.0 mEq/L
CALCIO, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Arzenazo-III</i>	9.3 mg/dL	8.4 - 10.2 mg/dL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
FOSFORO, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Fosfomolibdato.</i>	2.8 mg/dL	2.5 - 4.5 mg/dL Nuevo intervalo de referencia a partir del 21-03-2025
MAGNESIO, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Enzimático</i>	2.04 mg/dL	1.60 - 2.60 mg/dL
LIPIDOGRAMA, SANGRE COLESTEROL TOTAL <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Oxidasa/Esterasa/Peroxidasa</i>	201 mg/dL	Nivel Deseable: < 200 mg/dL Nivel Limite: 200 - 240 mg/dL Alto: > 240 mg/dL Según NCEP (Programa Nacional Educativo del Colesterol)
TRIGLICERIDOS <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Enzimático, punto final.</i>	47 mg/dL	Deseable: Inferior a 150 mg/dL Limite: 150 - 199 mg/dL Alto: 200 - 499 mg/dL Muy alto: Superior a 499 mg/dL

Dra. YESSICA GIMENEZ VILLALBA
Bioquímica
Reg. Prof. N° 4540

Tel + Whatsapp: (021) 20 80 80
info@meyerlab.com.py | meyerlab.com.py

CASA CENTRAL | SAN LORENZO | SAN CRISTÓBAL | PINEDO SHOPPING | PLAZA MADERO | LAMBARÉ

Un diagnóstico clínico definitivo no debe estar basado solamente en los resultados laboratoriales. Léase el punto (.) como decimal.

Paciente: VELILLA CABRERA, LOURDES MARIANA



C.I.: 4868216
Sexo: F
Edad: 27 Años
Médico: DRA. RIQUELME DE OTTO, FABIOLA

Fecha de toma de muestra:
N° orden: 2223167 12/04/25
Origen: Meyer Lab - Casa Central
Página: 4 de 8

Puede verificar la
autenticidad del
resultado a través
del siguiente QR



	Resultado	Intervalo de Referencia
COLESTEROL HDL <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Medida directa, polímero polianiónico</i>	65 mg/dL	Sin riesgo: Superior a 60 mg/dL Riesgo moderado: 40-60 mg/dL Riesgo alto: Inferior a 40 mg/dL * Según NCEP (Programa Nacional Educativo del Colesterol)
COLESTEROL LDL-PLUS <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Medición directa.</i>	129 mg/dL	Óptimo: Inferior a 100 mg/dL Deseable: 100 a 129 mg/dL Límite alto: 130 a 159 mg/dL Alto: 160 a 189 mg/dL Muy alto: Superior a igual a 190 mg/dL
COLESTEROL VLDL <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Razón</i>	9 mg/dL	Óptimo: Inferior a 30 mg/dL Límite: 31 - 40 mg/dL Elevado: Superior a 40 mg/dL
Índice de riesgo 1 <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Razón</i>	3.1	Inferior a 5.0
Índice de riesgo 2 <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Razón</i>	2.0	Inferior a 3.0
Aspecto del suero	Límpido	Límpido
HEPATOGRAMA, SANGRE		
GPT (ALT) <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Enzimática NADH (sin P5P)</i>	17 U/L	Inferior a 34 U/L Nuevo intervalo de referencia a partir del 08/01/2025
GOT (AST) <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Enzimática NADH (sin P5P)</i>	20 U/L	Inferior a 34 U/L Nuevo intervalo de referencia a partir del 04/02/2025
FOSFATASA ALCALINA <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Para-nitrofenil-fosfato</i>	56 U/L	44 - 107 U/L Nuevo intervalo de referencia a partir del 14/01/2025
BILIRRUBINA TOTAL <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Diazotización</i>	0.59 mg/dL	0.2 a 1.2 mg/dL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
BILIRRUBINA DIRECTA <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Reacción Diazo</i>	Inferior a 0.15 mg/dL	Inferior a 0.5 mg/dL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
BILIRRUBINA INDIRECTA <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Razón</i>	Resultado no calculable Debido a concentración del analito no cuantificable	Inferior a 1.00 mg/dL

Dra. YESSICA GIMENEZ VILLALBA
Bioquímica
Reg. Prof. N° 4540

Tel + Whatsapp: (021) 20 80 80
info@meyerlab.com.py | meyerlab.com.py

CASA CENTRAL | SAN LORENZO | SAN CRISTÓBAL | PINEDO SHOPPING | PLAZA MADERO | LAMBARÉ

Un diagnóstico clínico definitivo no debe estar basado solamente en los resultados laboratoriales. Léase el punto (.) como decimal.

Paciente: VELILLA CABRERA, LOURDES MARIANA



C.I.: 4868216
Sexo: F
Edad: 27 Años
Médico: DRA. RIQUELME DE OTTO, FABIOLA

Fecha de toma de muestra:
N° orden: 2223167 12/04/25
Origen: Meyer Lab - Casa Central
Página: 5 de 8

Puede verificar la
autenticidad del
resultado a través
del siguiente QR



	Resultado	Intervalo de Referencia
GAMMA GT (GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA), SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: L-gamma-glutamyl-3-carboxi-4-nitroanilida.</i>	15 U/L	Inferior a 38 U/L Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
PROTEINAS TOTALES, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Biuret.</i>	6.9 g/dL	6.4 - 8.3 g/dL
GLUCOSA <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Enzimático (Hexoquinasa/G6PDH)</i>	86 mg/dL	74 - 100 mg/dL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
HbA1c - HEMOGLOBINA GLICADA, SANGRE <i>Muestra: Sangre EDTA</i> <i>Método: HPLC-Cromatografía Líquida de Alta Resolución</i>		
PORCENTAJE HbA1c:	4.90 %	No diabéticos: 4.0 a 6.0% Diabéticos: Superior o igual a 6.5% Meta terapéutica en diabéticos: Inferior a 7.0% * Según NGSP/ADA
CONCENTRACION HbA1c:	30 mmol/mol	No diabéticos: 20 - 42 mmol/mol Diabéticos: Superior o igual a 48 mmol/mol Meta terapéutica en diabéticos: Inferior a 53 mmol/mol * Según IFCC Método certificado por el Programa Nacional de Estandarización de Glucohemoglobina (NGSP-USA) y trazable al método de referencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC)
TSH ULTRASENSIBLE, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA.</i> <i>Sensibilidad: 0.01 µUI/mL</i>	0.95 µUI/mL	0.35 - 4.94 µUI/mL
T3 TOTAL, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA.</i> <i>Sensibilidad: 40 ng/dL</i>	104 ng/dL	40 - 193 ng/dL

Dra. YESSICA GIMENEZ VILLALBA
Bioquímica
Reg. Prof. N° 4540

Tel + Whatsapp: (021) 20 80 80
info@meyerlab.com.py | meyerlab.com.py

CASA CENTRAL | SAN LORENZO | SAN CRISTÓBAL | PINEDO SHOPPING | PLAZA MADERO | LAMBARÉ

Un diagnóstico clínico definitivo no debe estar basado solamente en los resultados laboratoriales. Léase el punto (.) como decimal.

Paciente: VELILLA CABRERA, LOURDES MARIANA



C.I.: 4868216
Sexo: F
Edad: 27 Años
Médico: DRA. RIQUELME DE OTTO, FABIOLA

Fecha de toma de muestra:
N° orden: 2223167 12/04/25
Origen: Meyer Lab - Casa Central
Página: 6 de 8

Puede verificar la
autenticidad del
resultado a través
del siguiente QR



	Resultado	Intervalo de Referencia
T4 TOTAL, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA.</i> <i>Sensibilidad: 3.00 µg/dL</i>	8.2 µg/dL	4.9 - 11.7 µg/dL
CORTISOL AM, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA</i>	11.5 µg/dL	3.7 - 19.4 µg/dL
PROTEINA C REACTIVA, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Inmunoturbidimetría.</i>	Inferior a 1.0 mg/L	Inferior a 5.0 mg/L
HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBs Ag), SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA</i>	0.28 No reactivo	Reactivo: Igual o superior a 1 No reactivo: Inferior a 1 Esta prueba debe usarse de tamizaje o screening. Para su confirmación deben realizarse pruebas adicionales según criterio médico. El índice informado no guarda relación con el estadio de la enfermedad.
VIH COMBO, SANGRE VIH p24, ANTIGENO y VIH Tipo 1 y 2, ANTICUERPOS <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA 4ª generación</i>	0.05 No reactivo	Reactivo: Igual o superior a 1.00 No reactivo: Inferior a 1.00 Esta prueba debe usarse de tamizaje o screening y no establece un diagnóstico por sí sola. Los resultados se deben interpretar junto con otros datos clínicos del paciente, antecedentes y pruebas complementarias del laboratorio. El índice informado no guarda relación con el estadio o evolución de la enfermedad. Un resultado reactivo debe confirmarse con otra metodología, como Carga Viral o Western Blot.

Dra. YESSICA GIMENEZ VILLALBA
Bioquímica
Reg. Prof. N° 4540

Tel + Whatsapp: (021) 20 80 80
info@meyerlab.com.py | meyerlab.com.py

CASA CENTRAL | SAN LORENZO | SAN CRISTÓBAL | PINEDO SHOPPING | PLAZA MADERO | LAMBARÉ

Un diagnóstico clínico definitivo no debe estar basado solamente en los resultados laboratoriales. Léase el punto (.) como decimal.

Paciente: VELILLA CABRERA, LOURDES MARIANA



C.I.: 4868216
Sexo: F
Edad: 27 Años
Médico: DRA. RIQUELME DE OTTO, FABIOLA

Fecha de toma de muestra:
N° orden: 2223167 12/04/25
Origen: Meyer Lab - Casa Central
Página: 7 de 8

Puede verificar la
autenticidad del
resultado a través
del siguiente QR



VDRL, CUANTITATIVO, SANGRE

Muestra: Suero
Método: Floculación

Resultado
No reactiva

Intervalo de Referencia
No reactiva

Observación:
La prueba serológica, sólo constituye un dato auxiliar de diagnóstico que debe corroborarse con la historia clínica del paciente.

Resultados falsamente positivos pueden ser observados en individuos con cuadros patológicos diversos como hepatitis, influenza, brucelosis, lepra, malaria, asma, tuberculosis, cáncer, diabetes y enfermedades autoinmunes.

Resultados falsamente negativos pueden ocurrir en la sífilis tardía.

ANALISIS DE ORINA

Material:
EXAMEN FISICO
Método: Lectura automatizada de tiras reactivas

Orina chorro medio

Aspecto
Color
Densidad
pH

Limpido
Amarillo
1.002
6.0

EXAMEN QUIMICO
Proteínas

No detectable

No detectable: Negativo
25 mg/dL = (1+) 75 mg/dL = (2+)
150 mg/dL = (3+) 500 mg/dL = (4+)

Glucosa

No detectable

No detectable: Normal
50 mg/dL: (1+) 100 mg/dL: (2+)
300 mg/dL: (3+) 1000 mg/dL: (4+)

Cuerpos cetónicos

No detectable

No detectable: Negativo
5 mg/dL = (1+) 15 mg/dL = (2+)
50 mg/dL = (3+) 150 mg/dL = (4+)

Bilirrubina

No detectable

No detectable: Negativo
1 mg/dL = (1+) 3 mg/dL = (2+)
6 mg/dL = (3+)

Urobilinógeno

No detectable

No detectable: Negativo
1 mg/dL = (1+) 4 mg/dL = (2+)
8 mg/dL = (3+) 12 mg/dL = (4+)

Nitritos

Negativo

Dra. YESSICA GIMENEZ VILLALBA
Bioquímica
Reg. Prof. N° 4540

Tel + Whatsapp: (021) 20 80 80
info@meyerlab.com.py | meyerlab.com.py

CASA CENTRAL | SAN LORENZO | SAN CRISTÓBAL | PINEDO SHOPPING | PLAZA MADERO | LAMBARÉ

Un diagnóstico clínico definitivo no debe estar basado solamente en los resultados laboratoriales. Léase el punto (.) como decimal.

Paciente: **VELILLA CABRERA, LOURDES MARIANA**



C.I.: 4868216
Sexo: F
Edad: 27 Años
Médico: DRA. RIQUELME DE OTTO, FABIOLA

Fecha de toma de muestra:
N° orden: 2223167 12/04/25
Origen: Meyer Lab - Casa Central
Página: 8 de 8

Puede verificar la
autenticidad del
resultado a través
del siguiente QR



	Resultado	Intervalo de Referencia
Sangre (hemoglobina)	25 / μ L	No detectable: Negativo 10 / μ L = (1+) 25 / μ L = (2+) 50 / μ L = (3+) 150 / μ L = (4+) 250 / μ L = (5+)
Estearasa leucocitaria	No detectable	No detectable: Negativo 25 / μ L = (1+) 100 / μ L = (2+) 500 / μ L = (3+)
SEDIMENTO Método: Microscopía automatizada		
Leucocitos	1 / μ L	0 a 25 / μ L: 0 a 5/campo 26 a 50 / μ L: 6 a 10/campo 51 a 100 / μ L: 11 a 20/campo 101 a 200 / μ L: 21 a 40/campo Superior a 200 / μ L: superior a 40/campo
Hematíes	1.76 / μ L	0 a 25 / μ L: 0 a 5/campo 26 a 50 / μ L: 6 a 10/campo 51 a 100 / μ L: 11 a 20/campo 101 a 200 / μ L: 21 a 40/campo Superior a 200 / μ L: superior a 40/campo
Células epiteliales escamosas	No detectable	No detectable 0 a 15 / μ L: 1 a 3/campo 16 a 40 / μ L: 4 a 8/campo 41 a 75 / μ L: 9 a 15/campo
Células epiteliales redondas	No detectable	No detectable 1 - 5 / μ L: 0 a 1/campo 6 - 15 / μ L: 2 a 3/campo
Cristales	No detectable	
Cilindros	No detectable	No detectable 1 - 5 / μ L: 0 a 1/campo 6 - 15 / μ L: 2 a 3/campo
Mucus	No detectable	
Elementos micóticos	No detectable	

Fin del Informe

Impreso 12/04/2025 12:09 - Envío Automático

COR

Dra. YESSICA GIMENEZ VILLALBA
Bioquímica
Reg. Prof. N° 4540

Tel + Whatsapp: (021) 20 80 80
info@meyerlab.com.py | meyerlab.com.py

CASA CENTRAL | SAN LORENZO | SAN CRISTÓBAL | PINEDO SHOPPING | PLAZA MADERO | LAMBARÉ

Un diagnóstico clínico definitivo no debe estar basado solamente en los resultados laboratoriales. Léase el punto (.) como decimal.