

Лабораторная работа №14. Двумерные массивы (матрицы) в языке C++.

ЗАДАНИЕ. Написать программу, в которой с помощью генератора случайных значений формируются *три матрицы А, В, С* вещественных значений размерности *m x n* (где значения $2 \leq m \leq 5$ и $2 \leq n \leq 6$ вводятся с клавиатуры).

Значения элементов матриц должны быть в диапазоне $[-k, 2k]$, где значение $1.5 \leq k \leq 4.5$ вводится с клавиатуры.

В программе вывести на экран три сформированные матрицы и:

1. *имя (имена) матриц(ы)* с наибольшим количеством отрицательных элементов в четных столбцах.
2. *имя (имена) матриц(ы)* с наибольшим количеством неотрицательных элементов в нечетных столбцах.
3. *имя (имена) матриц(ы)* с наименьшим количеством отрицательных элементов в четных столбцах.
4. *имя (имена) матриц(ы)* с наименьшим количеством неотрицательных элементов в нечетных столбцах.
5. *имя (имена) матриц(ы)* с наибольшим количеством отрицательных элементов в нечетных строках.
6. *имя (имена) матриц(ы)* с наибольшим количеством положительных элементов в четных столбцах.
7. *имя (имена) матриц(ы)* с нечетным количеством отрицательных элементов в четных столбцах.
8. *имя (имена) матриц(ы)* с наибольшим количеством неположительных элементов в четных столбцах.
9. *имя (имена) матриц(ы)* с нечетным количеством неотрицательных элементов в четных столбцах.
10. *вывести имя (имена) матриц(ы)* с максимальной суммой отрицательных элементов в нечетных строках.
11. *имя (имена) матриц(ы)* с минимальной суммой положительных элементов в четных столбцах.
12. *имя (имена) матриц(ы)* с максимальной суммой отрицательных элементов в четных строках.
13. *имя (имена) матриц(ы)* с максимальной суммой положительных элементов в четных строках.
14. *имя (имена) матриц(ы)* с четным количеством отрицательных элементов в нечетных строках.
15. *имя (имена) матриц(ы)* с четным количеством отрицательных элементов в нечетных столбцах.
16. *имя (имена) матриц(ы)* с наименьшим количеством положительных элементов в нечетных столбцах.
17. *имя (имена) матриц(ы)* с наименьшим количеством ненулевых элементов в четных столбцах.
18. *имя (имена) матриц(ы)* с наименьшим количеством нулевых элементов в нечетных строках.