

- Izraziti vektor $\vec{x} = (3, 3, 2)$ kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{a} = (1, 0, 1)$, $\vec{b} = (0, 1, 1)$ i $\vec{c} = (1, 1, 0)$: $\vec{x} =$
- U vektorskom prostoru slobodnih vektora, četvorka vektora (a, b, c, d) je:
 - 1) uvek zavisna
 - 2) nikad baza
 - 3) može ali ne mora da bude generatorna
- U vektorskom prostoru slobodnih vektora, trojka vektora (a, b, c) je:
 - 1) uvek nezavisna
 - 2) uvek zavisna
 - 3) nekad nezavisna a nekad zavisna
- Neka su a, b i c proizvoljni vektori. Tada uređena trojka vektora $(a + b, a + c, b + c)$ je:
 - 1) uvek zavisna
 - 2) uvek nezavisna
 - 3) nekad zavisna, a nekad nezavisna, zavisi od izbora vektora a, b, c
- Neka su a, b i c proizvoljni vektori. Tada uređena trojka vektora $(a + b, a + c, -a + b - 2c)$ je:
 - 1) uvek zavisna
 - 2) uvek nezavisna
 - 3) nekad zavisna, a nekad nezavisna, zavisi od izbora vektora a, b, c
- Vektori $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ i $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ su kolinearni ako i samo ako:
 - 1) $(\exists \lambda \in \mathbb{R}) \vec{a} = \lambda \vec{b}$
 - 2) $\vec{a} \parallel \vec{b}$
 - 3) $(\exists \lambda \in \mathbb{R}) (\vec{a} = \lambda \vec{b} \vee \lambda \vec{a} = \vec{b})$
 - 4) $(\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} = 0 \wedge \alpha^2 + \beta^2 \neq 0$
 - 5) \vec{a} i \vec{b} su zavisni
- Neka je (a_1, a_2, \dots, a_n) nezavisna u prostoru V , (c_1, c_2, \dots, c_m) generatorna za prostor V i $\dim V = k$. Tada je
 - 1) $m \leq k \leq n$
 - 2) $n \leq k \leq m$
 - 3) $n \leq m \leq k$
 - 4) $k \leq m \leq n$
 - 5) $k \leq n \leq m$
 - 6) $m \leq n \leq k$
- Neka je k -torka vektora (b_1, b_2, \dots, b_k) baza prostora V i neka je $(d_1, d_2, \dots, d_\ell)$ zavisna ℓ -torka vektora. Tada je:
 - 1) $k \leq \ell$
 - 2) $\ell \leq k$
 - 3) $k = \ell$
 - 4) $\ell < k$
 - 5) $\ell > k$
 - 6) ništa od prethodnog
- Koji od sledećih podskupova $U \subseteq \mathbb{R}^3$ je potprostor i za one koji jesu napiši desno od njih njihovu dimenziju:
 - 1) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$, $\dim U =$ _____
 - 2) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 0\}$ $\dim U =$ _____
 - 3) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 0\}$ $\dim U =$ _____
 - 4) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y + z\}$ $\dim U =$ _____
- Neka je $a = (2, 0, 2)$, $b = (-3, 0, 3)$, $c = (1, 0, -1)$, $d = (-1, 0, 1)$, $e = (0, 1, 0)$, $f = (1, 0, 0)$, $g = (1, 0, 2)$. Odrediti dimenzije sledećih potprostora V vektorskog prostora \mathbb{R}^3 :
 - 1) $V = L(e, f, g) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 2) $V = L(a, b, c) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 3) $V = L(a) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 4) $V = L(a, b) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 5) $V = L(b, c, d) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 6) $V = L(b, c, e) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 7) $V = L(a, g) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
- Vektori a i b nad poljem \mathbb{R} su zavisni ako i samo ako je $(\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \alpha a + \beta b = 0$ i:
 - 1) $\alpha^2 + \beta^2 = 0$
 - 2) $\alpha \neq 0 \vee \beta \neq 0$
 - 3) $|\alpha| + |\beta| = 0$
 - 4) $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$
 - 5) svaki od α i β jednak nuli
- Vektori a i b nad poljem \mathbb{R} su nezavisni ako i samo ako $\alpha a + \beta b = 0$ implicira:
 - 1) $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$
 - 2) $\alpha = 0 \wedge \beta = 0$
 - 3) $|\alpha| + |\beta| \neq 0$
 - 4) $(\alpha, \beta) = (0, 0)$
 - 5) bar jedan od α i β različit od nule
- Vektori $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$, $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ i $\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$ su komplanarni ako i samo ako:
 - 1) $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$
 - 2) $\vec{a}(\vec{b} \times \vec{c}) = 0$
 - 3) $(\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \vec{a} = \alpha \vec{b} + \beta \vec{c}$
 - 4) $(\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} = 0 \wedge \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \neq 0$
 - 5) $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ je zavisna.
- Ako je $\vec{x} = (5, 4, 3)$, $\vec{a} = (1, 0, 1)$, $\vec{b} = (0, 1, 1)$, $\vec{c} = (1, 1, 0)$ i $\vec{x} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c}$, tada (α, β, γ) je:
 - 1) $(3, 2, 1)$
 - 2) $(2, 3, 1)$
 - 3) $(3, 1, 2)$
 - 4) $(1, 2, 3)$
 - 5) $(1, 3, 2)$
 - 6) $(2, -1, 3)$
 - 7) $(2, 2, 3)$
 - 8) $(2, 1, 3)$
 - 9) $(2, 3, 3)$
 - 10) $(1, 1, 3)$
- Koji od navedenih iskaza su tačni u vektorskom prostoru $(V, F, +, \cdot)$:
 - 1) $(\forall x, y \in V)(\forall \alpha \in F) \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$
 - 2) $(\forall x, y, z \in V) (x + y) + z = x + (y + z)$
 - 3) $(\forall x \in V) x + x = x$
 - 4) $(\forall x, y, z \in V) (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
 - 5) $(\forall x \in V)(\forall \alpha \in F \setminus \{0\})$ vektori x i $\alpha \cdot x$ su linearno nezavisni
 - 6) $(\forall x \in V)(\forall \alpha \in F \setminus \{0\})$ vektori x i $\alpha \cdot x$ su linearno zavisni
 - 7) $(\forall x \in V)$ je uređena četorka $(\{\alpha x \mid \alpha \in F\}, F, +, \cdot)$ potprostor prostora $(V, F, +, \cdot)$
- Zaokružiti one skupove $V \subseteq \mathbb{R}^3$ za koje važi $(1, 0, 2) \in V$:
 - 1) $V = \text{Lin}(\{(2, 0, 4)\})$
 - 2) $V = \text{Lin}(\{(-8, 10, 4), (4, -5, -2)\})$
 - 3) $V = \text{Lin}(\{(-8, 10, 4), (4, -5, -2), (0, 0, 0)\})$
 - 4) $V = \text{Lin}(\{(0, -1, 1), (1, 1, 1)\})$
 - 5) $V = \text{Lin}(\{(0, 0, 0)\})$
 - 6) $V = \text{Lin}(\{(2, 0, 3), (4, 0, 5)\})$
 - 7) $V = \text{Lin}(\{(1, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 3)\})$
- Neka je $a = (0, 0, 0)$, $b = (1, 0, 1)$, $c = (1, 0, -1)$, $d = (-1, 0, 1)$, $e = (1, 1, 1)$, $f = (1, 0, 0)$, $g = (2, 0, 2)$. Odrediti dimenzije sledećih potprostora V vektorskog prostora \mathbb{R}^3 :
 - 1) $V = L(a) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 2) $V = L(a, b) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 3) $V = L(a, b, c) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 4) $V = L(b, c, d) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 5) $V = L(b, c, e) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
 - 6) $V = L(e, f, g) \Rightarrow \dim(V) =$ _____
- Zaokružiti brojeve ispred podskupova $U_i \subseteq \mathbb{R}^3$ koji su potprostori i za one koji jesu napisati njihove dimenzije:
 - 1) $U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y \vee x = -y\}$
 - 2) $U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = -y\}$
 - 3) $U_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^3 = -y^3\}$
 - 4) $U_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = 0\}$
 - 5) $U_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^3 \mid xy = 0\}$
 - 6) $U_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 0\}$

$\dim U_1 =$ _____ $\dim U_2 =$ _____ $\dim U_3 =$ _____ $\dim U_4 =$ _____ $\dim U_5 =$ _____ $\dim U_6 =$ _____