
EXERCICE 1 - Trouver une base orthonormale

Déterminer une base orthonormale de $\mathbb{R}_2[X]$ muni du produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t)dt.$$

EXERCICE 2 - Projection dans un espace de matrices

Soit $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ que l'on munit du produit scalaire

$$\langle M, N \rangle = \text{Tr}(M^T N).$$

On pose $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}; (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

1. Déterminer une base orthonormée de F^\perp .
2. Calculer la projection de $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ sur F^\perp .
3. Calculer la distance de J à F .

EXERCICE 3 - Méthode des moindres carrés

Soit n et p deux entiers naturels avec $p \leq n$. On munit \mathbb{R}^n du produit scalaire canonique et on identifie \mathbb{R}^n avec $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On considère une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ de rang p et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

1. Démontrer qu'il existe une unique matrice X_0 de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ telle que

$$\|AX_0 - B\| = \inf\{\|AX - B\|; X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})\}.$$

2. Montrer que X_0 est l'unique solution de

$$A^T AX = A^T B.$$

3. Application : déterminer

$$\inf\{(x+y-1)^2 + (x-y)^2 + (2x+y+2)^2; (x,y) \in \mathbb{R}^2\}.$$

Cette feuille d'exercices a été conçue à l'aide du site <https://www.bibmath.net>