

(SOUS-)ESPACES VECTORIELS ET COMBINAISONS LINÉAIRES

- 1) Dans \mathbb{R}^3 , à quelle condition nécessaire et suffisante sur $a \in \mathbb{R}$ le vecteur $(1, -a, 1)$ est-il combinaison linéaire de $(1, 1, 1)$ et $(a, 0, 2)$?
- 2) Dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $x \mapsto \cos^2 x$ est-elle combinaison linéaire de $x \mapsto 1$ et $x \mapsto \cos(2x)$?
- 3) Dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $x \mapsto \sin(2x)$ est-elle combinaison linéaire des fonctions sinus et cosinus ?
- 4) Montrer que pour tout $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, A^2 est combinaison linéaire de I_2 et A .

- 2) Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels ?

- 1) $\{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 \mid x = y\}$.
- 2) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 5y - 1 = 0\}$.
- 3) $\{(x, 2x, 3x) \mid x \in \mathbb{R}\}$.
- 4) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 + x + y^2 = 0\}$.
- 5) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y \text{ et } 3y - 2z = 0\}$.
- 6) $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid \deg(P) \geq 2\}$.
- 7) $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(X^2) = P' + X^4 P\}$.
- 8) $\{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) + f(1) = f'(0)\}$.

- 3) Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$?

- 1) L'ensemble des fonctions 1-périodiques.
- 2) L'ensemble des fonctions croissantes.
- 3) L'ensemble des fonctions monotones.
- 4) L'ensemble des fonctions qui sont la somme d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante.
- 5) L'ensemble des fonctions majorées.
- 6) L'ensemble des fonctions bornées.

- 4) Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel.

- 1) Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.
- 2) Soit $(F_i)_{i \in I}$ une suite *filtrante* de sous-espaces vectoriels de E , i.e. pour laquelle :

$$\forall i, j \in I, \exists k \in I, F_i \cup F_j \subset F_k.$$

Montrer que $\bigcup_{i \in I} F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .

- 5) Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces affines :

- 1) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 2 \text{ et } 2x + y + 2z = 1\}$.
- 2) $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \text{tr}(M) = 1\}$.
- 3) $\{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 2 \text{ et } f(1) = -3\}$.
- 4) $\{y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \forall x \in \mathbb{R}, e^{x^2} y'(x) + y(x) = 1\}$.

- 6) Montrer par des opérations sur les Vect l'égalité :
 $\mathbb{R}_2[X] = \text{Vect}\left((X-1)^2, (X-1)(X+1), (X+1)^2\right).$

- 7) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:
 $\text{Vect}\left(x \mapsto \cos(kx)\right)_{0 \leq k \leq n} = \text{Vect}\left(x \mapsto \cos^k x\right)_{0 \leq k \leq n}.$

FAMILLES LIBRES ET BASES

- 8) Montrer que les fonctions $x \mapsto \sin x$, $x \mapsto \cos x$, $x \mapsto x \sin x$ et $x \mapsto x \cos x$ sont linéairement indépendantes dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

- 9) Montrer que $(x \mapsto e^x, x \mapsto e^{2x}, x \mapsto e^{x^2})$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$:

- 1) par une technique d'évaluation.
- 2) par une étude asymptotique en $+\infty$.

- 10) Montrer de deux manières différentes que les suites $(1)_{n \in \mathbb{N}}$, $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont linéairement indépendantes dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- 11) Montrer que les suites $(n^k)_{n \in \mathbb{N}}$, k décrivant \mathbb{N} , sont linéairement indépendantes dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- 12) On pose $P_0 = 1$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:
 $P_k = X(X-1)(X-2) \dots (X-k+1).$

Montrer de deux manières différentes que la famille $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est libre.

- 13) Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel et $u_1, \dots, u_n \in E$. Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $v_k = u_1 + \dots + u_k$.




- 1) Montrer que la famille (u_1, \dots, u_n) est libre si et seulement si la famille (v_1, \dots, v_n) l'est.
- 2) Montrer que (u_1, \dots, u_n) engendre E si et seulement si (v_1, \dots, v_n) engendre E .

- 14) Montrer que la famille $(x \mapsto |x - \lambda|)_{\lambda \in \mathbb{R}}$ de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est libre.

- 15) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice à diagonale strictement dominante, i.e. pour laquelle pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{ij}| < |a_{ii}|.$$

Soit $X \in \mathbb{C}^n$ une colonne pour laquelle $AX = 0$. Montrer que $X = 0$ en exploitant le réel $\max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$. Qu'en déduit-on sur A ?






- 16    Soit $n \in \mathbb{N}$. On veut montrer que la famille $((X+k)^n)_{0 \leq k \leq n}$ de $\mathbb{R}[X]$ est libre. Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. On suppose que $\sum_{k=0}^n \lambda_k (X+k)^n = 0$.




1) Montrer que pour tout $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$:





a) $\sum_{k=0}^n \lambda_k (X+k)^p = 0$. b) $\sum_{k=0}^n \lambda_k k^p = 0$.

2) Conclure en utilisant des polynômes de Lagrange.

- 17 Montrer que la famille $(x \mapsto e^{\lambda x})_{\lambda \in \mathbb{R}}$ de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est libre :

- 1)   en s'intéressant au comportement asymptotique des exponentielles.
2)    en utilisant des polynômes de Lagrange.

- 18    Montrer que la famille $(x \mapsto \sin(\lambda x))_{\lambda \in \mathbb{R}_+^*}$ de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est libre en utilisant des polynômes de Lagrange.

- 19    

1) Bien comprendre l'affirmation : « \mathbb{R} est un \mathbb{Q} -espace vectoriel. »

2) a) Montrer que la famille $(\ln p)_{p \in \mathbb{P}}$ est \mathbb{Q} -libre, i.e. libre dans le \mathbb{Q} -espace vectoriel \mathbb{R} .


b) En déduire que $\ln p$ est rationnel pour au plus un nombre premier p .

On peut montrer que $\ln r$ est irrationnel pour tout $r \in \mathbb{Q}_+^* \setminus \{1\}$, mais c'est autrement plus compliqué.

3) a) Montrer que la famille $(1, \sqrt{p})$ est \mathbb{Q} -libre pour tout $p \in \mathbb{P}$.

b) En déduire que la famille $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$ est \mathbb{Q} -libre.

BASES ET DIMENSION

- 20  Énoncer proprement en termes linéaires le résultat du cours sur les suites récurrentes linéaires homogènes d'ordre 2 (sous-espace vectoriel, base, dimension...).



- 21 

1) Montrer que $((-1, 1, 1), (1, -1, 1), (1, 1, -1))$ est une base de \mathbb{R}^3 et déterminer les coordonnées du vecteur $(8, 4, 2)$ dans cette base.

2) Montrer que la famille :



$$(X^3 + X^2 - X - 1, X^3 - X^2 + 1, X^3 - X^2 + X, X^3 + 2X + 1)$$

est une base de $\mathbb{R}_3[X]$ et déterminer les coordonnées de X^2 dans cette base.

- 22   Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose :



$$u_k = (k, k-1, \dots, 2, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n.$$

Montrer que la famille (u_1, \dots, u_n) est une base de \mathbb{R}^n .

- 23   Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}$ que la famille :


$$(1+X, X+X^2, \dots, X^{n-1}+X^n, X^n)$$

est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

- 24   Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$. On appelle *matrice de Vandermonde* de x_1, \dots, x_n la matrice :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Montrer que V est inversible si et seulement si x_1, \dots, x_n sont distincts.


- 25  Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels et déterminer une base de chacun d'eux :



1) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + z = 0\}$.



2) $\{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(X^2) = (X^3 + 1)P\}$.

3) $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t \text{ et } 2x - y - z + t = 0\}$.

4) $\{P \in \mathbb{R}_4[X] \mid P(0) = P(1) = P(2)\}$.

- 26  On note A la matrice $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$ et \mathcal{C} l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent à A . Montrer que \mathcal{C} est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et en déterminer une base.

- 27   Montrer que l'ensemble des matrices de trace nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est en un sous-espace vectoriel et déterminer sa dimension.

- 28   Montrer que l'ensemble des fonctions :



$$x \mapsto A \sin(x + \varphi), \quad A \text{ et } \varphi \text{ décrivant } \mathbb{R},$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et déterminer sa dimension.

- 29   Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1) Déterminer un entier $d \in \mathbb{N}$ pour lequel la famille $(I_n, M, M^2, \dots, M^d)$ est liée.

2) En déduire que M possède un polynôme annulateur non nul à coefficients dans \mathbb{K} .

- 30   Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices pour lesquelles $AB = A^2 + A + I_n$. Montrer que $AB = BA$.

- 31 ⌚⌚ Soient $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$ et $X \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.
Montrer que la matrice par blocs $\begin{pmatrix} A & X \\ 0_{q,p} & B \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si A et B le sont. Que vaut son inverse dans ce cas ?

- 32 ⌚ Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. Montrer que les trois fonctions $x \mapsto \sin(x + a)$, $x \mapsto \sin(x + b)$ et $x \mapsto \sin(x + c)$ sont linéairement dépendantes dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

- 33 ⌚ Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel, $x_1, \dots, x_n \in E$ et $y_1, \dots, y_n \in E$. On suppose que les vecteurs $x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n$ sont linéairement indépendants. Montrer que $\text{rg}(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \geq n$.

- 34 ⌚
1) Montrer que la famille :
 $(X^3 + X + 1, X^3 - 2X + 2, X^2 + 3X)$
est libre et la compléter en une base de $\mathbb{R}_4[X]$.
2) Montrer que la famille $((8, 4, 1, 2), (1, 3, 0, 5))$ est libre et la compléter en une base de \mathbb{R}^4 .
3) Soient E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension 3 et (e_1, e_2, e_3) une base de E . On pose $\varepsilon_1 = e_1 + 2e_2 + e_3$ et $\varepsilon_2 = e_2 - e_3$. Montrer que $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ est libre et la compléter en une base de E .

- 35 ⌚ Déterminer la dimension de :
 $\text{Vect}((1, 2, 1, 0), (4, -2, 1, 1), (7, 2, 4, 2), (1, 0, 1, 1))$.

■ MATRICE D'UNE FAMILLE DE VECTEURS DANS UNE BASE

- 36 ⌚ Les familles suivantes sont-elles des bases ?
1) $((2, 0, \alpha), (2, \alpha, 2), (\alpha, 0, 2)) \quad (\alpha \in \mathbb{R})$.
2) $((1, 0, 2, 1), (0, 1, 1, 2), (2, 0, 1, 1), (2, 1, 0, 1))$.

- 37 ⌚ Soient $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes pour lesquels $\deg(P_i) = i$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Montrer par une technique matricielle que la famille $(P_i)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. Comment montrer ce résultat sans matrices ?

- 38 ⌚⌚ Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel et (u_1, \dots, u_{2n+1}) une famille libre de E . Montrer que la famille :
 $(u_1 + u_2, u_2 + u_3, \dots, u_{2n} + u_{2n+1}, u_{2n+1} + u_1)$
est également libre par une technique matricielle.

■ SOMME DE DEUX SOUS-ESPACES VECTORIELS

- 39 ⌚ Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie et F et G deux sous-espaces vectoriels de E pour lesquels $\dim F + \dim G > \dim E$. Montrer que F et G ont au moins un vecteur non nul en commun.

- 40 ⌚⌚ Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $F \cup G = F + G$ si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

- 41 ⌚⌚ On pose : $a = (0, 0, 1, 0)$, $b = (1, 1, 0, -1)$,
 $u = (1, 0, 1, 0)$, $v = (0, 1, -1, 0)$ et $w = (1, 1, 1, 1)$,
ainsi que : $F = \text{Vect}(a, b)$ et $G = \text{Vect}(u, v, w)$.
Déterminer les dimensions de F , G , $F + G$ et $F \cap G$.

- 42 ⌚ On pose $F = \text{Vect}((1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0))$ et :
 $G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z = 0 \text{ et } y - z + t = 0\}$.
Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de \mathbb{R}^4 .

- 43 ⌚ Montrer que l'ensemble \mathcal{P} des fonctions paires de \mathbb{R} dans \mathbb{R} et l'ensemble \mathcal{I} des fonctions impaires de \mathbb{R} dans \mathbb{R} sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

- 44 ⌚⌚ Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. À quelle condition nécessaire et suffisante les sous-espaces vectoriels $\text{Vect}((\lambda, \lambda, 1))$ et $\text{Vect}((1, \lambda, 1), (2, 1, 1))$ sont-ils supplémentaires dans \mathbb{R}^3 ?

- 45 ⌚⌚ On note F l'ensemble des fonctions constantes sur $[0, 1]$ et on pose :

$$G = \left\{ f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \mid \int_0^1 f(t) dt = 0 \right\}.$$

Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

- 46 ⌚⌚ Montrer que $\{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(X^2) = X^2 P(X)\}$ et $\{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1) = P(2)\}$ sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans $\mathbb{R}_3[X]$.

- 47 ⌚⌚ Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel et F_1, F_2 et G trois sous-espaces vectoriels de E .
1) Si F_1 et F_2 sont en somme directe, montrer que $F_1 \cap G$ et $F_2 \cap G$ le sont aussi.

- 2) Si F_1 et F_2 sont supplémentaires dans E , $F_1 \cap G$ et $F_2 \cap G$ le sont-ils dans G ?
-

- 48 ⌚ Déterminer un supplémentaire des sous-espaces vectoriels suivants :

- 1) $\text{Vect}\left((1, 2, 1, 1), (2, 2, 1, 1)\right)$ dans \mathbb{R}^4 .
 - 2) $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + 2z - t = 0 \text{ et } 2x + y - z + t = 0\}$ dans \mathbb{R}^4 .
 - 3) $\{P \in \mathbb{R}_4[X] \mid P(-X) = P(X)\}$ dans $\mathbb{R}_4[X]$.
 - 4) dans $\mathbb{R}_3[X]$:
 $\{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P' + 3P = P(0)X^3 + P(1)X + P(1)\}$.
 - 5) $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1) = P(2) = 0\}$ dans $\mathbb{R}[X]$.
-

- 49 Pour tout $M = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, on pose :
- $$M^\circ = \begin{pmatrix} i & h & g \\ f & e & d \\ c & b & a \end{pmatrix},$$
- puis $E = \{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \mid M^\circ = M\}$. Déterminer un supplémentaire de E dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
-

- 50 Déterminer un supplémentaire des sous-espaces vectoriels suivants :

- 1) ⌚ $\{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(0) = P'(0) = 0\}$ dans $\mathbb{R}_3[X]$.
 - 2) ⌚⌚ $\{f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = f'(0) = 0\}$ dans $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
-

- 51 ⌚⌚⌚ Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ distincts. On pose :

$$F = \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(x_k) = 0\}.$$

Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et en déterminer un supplémentaire dans $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
