
TIMEPOINT.T1T2.anova
15
10
5
0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


TIMEPOINT.T1T2.Kruskal
count
0
3
6
9
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


TIMEPOINT.T1T2.pairedT
count
20
15
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


SUBTYPE.AN.HCT1.anova
count
20
15
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


SUBTYPE.AN.HCT1.Kruskal
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


SUBTYPE.AN.HCT2.anova
count
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


SUBTYPE.AN.HCT2.Kruskal
15
10
5
0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


ANOREXIA.HCT1.anova
50
40
30
20
10
0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


ANOREXIA.HCT1.Kruskal
count
50
40
30
20
10
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


ANOREXIA.HCT2.anova
count
50
40
30
20
10
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


ANOREXIA.HCT2.Kruskal
count
50
40
30
20
10
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


LOCATION.HC.anova
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


LOCATION.HC.Kruskal
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


LOCATION.HCT1.anova
15
10
5
0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


LOCATION.HCT1.Kruskal
15
10
5
0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


LOCATION.HCT2.anova
count
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


LOCATION.HCT2.Kruskal
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


Weight_kg.diff.T1.kendall
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


Weight_kg.diff.T1.pearson
count
0
3
6
9
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


Weight_kg.diff.T2.kendall
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


Weight_kg.diff.T2.pearson
count
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


Weight_kg.T1.kendall
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


Weight_kg.T1.pearson
count
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


Weight_kg.T2.kendall
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


Weight_kg.T2.pearson
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.diff.T1.kendall
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.diff.T1.pearson
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.diff.T2.kendall
count
7.5
5.0
2.5
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.diff.T2.pearson
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.gain.per.day.T1.kendall
count
7.5
5.0
2.5
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.gain.per.day.T1.pearson
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.gain.per.day.T2.kendall
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.gain.per.day.T2.pearson
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.T1.kendall
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.T1.pearson
count
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.T2.kendall
count
7.5
5.0
2.5
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


BMI.T2.pearson
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


PSS.diff.T1.kendall
count
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


PSS.diff.T1.pearson
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


PSS.diff.T2.kendall
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


PSS.diff.T2.pearson
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


PSS.T1.kendall
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


PSS.T1.pearson
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


PSS.T2.kendall
count
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


PSS.T2.pearson
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_TOTAL.diff.T1.kendall
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_TOTAL.diff.T1.pearson
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_TOTAL.diff.T2.kendall
count
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_TOTAL.diff.T2.pearson
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_TOTAL.T1.kendall
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_TOTAL.T1.pearson
count
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_TOTAL.T2.kendall
count
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_TOTAL.T2.pearson
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y1.diff.T1.kendall
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y1.diff.T1.pearson
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y1.diff.T2.kendall
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y1.diff.T2.pearson
count
7.5
5.0
2.5
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y1.T1.kendall
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y1.T1.pearson
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y1.T2.kendall
15
10
5
0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y1.T2.pearson
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y2.diff.T1.kendall
count
7.5
5.0
2.5
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y2.diff.T1.pearson
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y2.diff.T2.kendall
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y2.diff.T2.pearson
count
7.5
5.0
2.5
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y2.T1.kendall
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y2.T1.pearson
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
count
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y2.T2.kendall
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values


STAI_Y2.T2.pearson
count
9
6
3
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p−values