

Vorbereitung der Impfung

Vorbereitung der Durchstechflasche und Herstellung der Einmaldosis-Spritze

1. Vorbereitung der Durchstechflasche (5 Impfdosen)



1. Entnahme

Durchstechflaschen aus Gefrierschrank nehmen, öffnen und auf Beschädigungen oder fehlende Durchstechflaschen untersuchen



2. Auftauen

Empfehlung: Im Kühlschrank (volle Faltschachtel ca. 3 Stunden), alternativ bei Raumtemperatur (ca. 30 Minuten*); Datum und Uhrzeit notieren

* Für einzelne Durchstechflaschen



3. Prüfen

Auf Verfärbungen oder Partikel, Farbe: weiß bis gebrochen weiß; Raumtemperatur



4. Mischen

Vorsichtig 10 Mal umdrehen und dann violette Kappe abnehmen

Nicht schütteln!



5. Verdünnen*

Zugabe von 1,8 ml 0,9 % Natriumchlorid-Lösung in die Durchstechflasche; möglichst 2-ml-Spritze mit 21 Gauge verwenden; restliche Natriumchlorid-Lösung entsorgen

* Reinigen Sie davor den Flaschenverschluss mit einem antiseptischen Einwegtupfer



6. Druckausgleich

1,8 ml Luft aus Durchstechflasche in leere Diluent-Spritze ziehen; Entfernen der Nadel aus Durchstechflasche



7. Mischen

Vorsichtig 10-mal umdrehen; Farbe der Verdünnung: gebrochen weiße Suspension

Nicht schütteln!



8. Beschriften

Etikett mit Datum und Uhrzeit der Verdünnung beschriften; Haltbarkeit des vorbereiteten Impfstoffs: 6 Stunden nach Verdünnung bis 30 °C

2. Herstellung einer Einmaldosis-Spritze



1. Aufziehen*

0,3 ml der verdünnten Dosierlösung in sterile 1-ml-Luer-Spritze aufziehen; geeignete Kanüle für intramuskuläre Applikation verwenden

* Reinigen Sie davor den Flaschenverschluss mit einem antiseptischen Einwegtupfer



2. Prüfen

Auf Verfärbungen oder Partikel; Farbe: weiß bis gebrochen weiß, **endgültiges Injektionsvolumen: 0,3 ml**



3. Verabreichen

Innerhalb von 6 Stunden nach Verdünnung (Aufbewahrung bei 2 °C bis 30 °C)




Wichtige Hinweise

- Haltbarkeit der aufgetauten, noch nicht verdünnten Durchstechflasche bei Raumtemperatur (bis 30 °C) 2 Stunden, im Kühlschrank (2-8 °C) 120 Stunden bzw. 5 Tage
- Aufgetaute Durchstechflaschen nicht wieder einfrieren
- Bitte wenden Sie sich an den BioNTech Kundenservice, falls der Impfstoff unerwünschte Verfärbungen oder Partikel aufweist oder die Durchstechflasche beschädigt ist
- Impfstoff vor direkter Sonneneinstrahlung und ultravioletem Licht schützen



Informationen für Fachkreise

Fachinformation mit Hinweisen zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Gegenanzeigen und mehr finden Sie auf der Fachkreisseite: fachkreise.biontech.de



Weitere Informationen und ausführliche Video-Anleitung unter: impfzentrum.biontech.de/video



Alle Anleitungen detailliert nachlesen in der dazugehörigen Handlungshilfe



Sicherheitshinweise in der Handlungshilfe, im Sicherheitsdatenblatt und bei Ihrer Abteilung für Arbeitsschutz



BioNTech Kundenservice
Tel: +49 6131 9084-0, Fax: -2121
E-Mail: service@biontech.de
Täglich 8 – 22 Uhr