

---

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

## FACULTAD DE CIENCIAS

## FÍSICA

## COMPUTACIÓN

### EL PROGRAMA MACTZIL

```
def MACTZIL(a,b,c,d):  
  
    if a==0 and b==0: #Si la ec. es de primer grado, se usa fórmula para la ec. de primer grado  
  
        x = -b/a  
        print("La raíz es: {}".format(x)) #Se imprime "La raíz es x".  
  
    elif a==0: #Si la ec. es cuadrática, se procede a usar la fórmula de Bhaskara.  
  
        x1 = ( -c + ( (c**2 - (4*b*d))**(1/2) ) ) / (2*b) #A la posibilidad positiva de la fórmula se le asigna el valor x1.  
        x2 = ( -c - ( (c**2 - (4*b*d))**(1/2) ) ) / (2*b) #A la posibilidad negativa de la fórmula se le asigna el valor x2.  
  
        print("Las raíces son: {} y {}".format(x1,x2)) #Se imprime "Las raíces son x1, x2".  
  
    elif b==0: #Si la ec. es una cúbica reducida, se procede a usar la fórmula de Cardano.  
  
        #Se calculan los coeficientes "p" y "q" cuando se obliga el valor de a=1.  
        p = c/a  
        q = d/a  
  
        #Se dan a los valores "u" y "v" correspondientes según la fórmula de Cardano.  
        u = ( -(q/2) + ( ( ( (q**2)/4) + ((p**3)/27) )**(1/2) ) )**(1/3)  
        v = ( -(q/2) - ( ( ( (q**2)/4) + ((p**3)/27) )**(1/2) ) )**(1/3)  
  
        #Se calculan todas las raíces según sus fórmula dadas por Cardano.  
        z1 = u+v  
        z2 = ( (-1/2)(z1) ) + ( (1j)( ((3*(1/2))/2)(u-v) ) )  
        z3 = ( (-1/2)(z1) ) - ( (1j)( ((3*(1/2))/2)(u-v) ) )
```

GRUPO: 8108

### Profesor:

Pedro Arturo Flores Silva

### Ayudantes:

Ivan Jiménez Lopéz

Omar Montoya Trejo

### Integrantes del equipo:

Archundia Juárez Adrián

Duarte Martínez Jordán Aarón

Nayeli Rodríguez Vega

# Índice

1. Resumen.....	3
2. Introducción.....	3
3. Preludio al programa.....	3-5
4. El programa MACTZIL.....	5-7
5. Resultados.....	7
6. Conclusiones.....	8
7. Referencias.....	8

## 1. Resumen

El presente trabajo aborda la necesidad de estudiar sistemáticamente y de manera continua el cálculo de ecuaciones de segundo y tercer grado con números complejos, por medio de un programa hecho en python llamado <sup>.en</sup> programa MACTZIL.<sup>en</sup> el cual, nos tuvimos que basar en el método de Bhaskara y en el método de Cardano para realizar el programa, igualmente tuvimos que ocupar diversos comandos y/o códigos para que nos diera un resultado considerable.

Palabras clave: Ecuaciones, Programación, Método de Bhaskara, Método de Cardano, Programación.

## 2. Introducción

La resolución de problemas que involucran encontrar un valor desconocido o el valor de una variable apareció hace mucho tiempo, debido a que existen informes del periodo babilonio que tratan del 1700 A.C, en donde nos muestran la solución de problemas que involucran ecuaciones complejas, no obstante en la cultura egipcia también podemos ver en sus papiros como intentaban resolver problemas de ecuaciones, pero no llegaban a un resultado concreto ya que los egipcios obtenían la solución mediante un procedimiento llamado el método de la falsa posición, más tarde este método pasó a los árabes en donde trataban la solución de ecuaciones por simple y doble o falsa posición. Este último procedimiento es similar al actual que es utilizado para resolver ecuaciones no lineales por métodos numéricos, sin embargo, tuvo que pasar un poco menos de 3000 años para encontrar los primeros indicios de las ecuaciones como objetos matemáticos y procedimientos que actualmente conocemos, como el método de Bhaskara (fórmula general) que es utilizado para resolver ecuaciones de segundo grado o el método de Cardano que es usado para resolver ecuaciones de tercer grado.

Cuando hablamos de las ecuaciones nos referimos a una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas en las cuales aparecen valores conocidos y otros desconocidos, estos últimos son llamados variables o incógnitas que se llegan a representar por una letra y cuya magnitud puede considerarse a partir de las propiedades matemáticas de la ecuación o través de un sistema de ecuaciones. No obstante, dependiendo de la magnitud que sea la ecuación se puede clasificar en ecuación de primer grado, segundo, tercero, etc.

Empero, el objetivo del presente proyecto consiste en resolver ecuaciones de segundo grado y de tercer grado con números complejos a través de nuestro programa llamado MACTZIL.

## 3. Preludio al programa

En esta sección del proyecto escrito en cuestión se presenta un breve, pero suficiente, recuento histórico que da cabida a entender la importancia de la resolución de ecuaciones cuadráticas y cúbicas que hoy día podrían parecer una parte básica de las matemáticas, pero que sin duda, al igual que todas las bases, es fundamental para construir las grandes estructuras matemáticas que

nos han dado acceso a un sin número de comodidades y demás beneficios.

Durante la mayor parte de la historia del ser humano a los problemas de tipo matemático se les ha concebido de forma geométrica, siendo, por ejemplo, una incognita “x” imaginada como un recta de largo “x”, que sumada con otra recta de largo 4 da como resultado una recta más grande de largo igual a 8. Con simple algebra se llega a que la solución es que “x” es igual a 4 también. Análogamente, en las ecuaciones cuadráticas se llegaría a que x al cuadrado representa un área, que sumada a otra área nos da una más grande.

Esta comprensión de las matemáticas iba de la mano con un uso práctico en el que no tenía sentido que existieran rectas de longitud -5, áreas de -25, o -30 vacas. Por tanto, las restas eran sólo usadas con el fin de obtener resultados positivos. Hubo algunos grupos que llevaron las matemáticas más lejos (chinos, babilonios, persas, árabes, indús, griegos, etc.), y deducieron independientemente números como los enteros, y los racionales en ocasiones, sin embargo, jamás llegaron a ideas que salieran de lo geométrico.

Hablando en cuanto a la solución de ecuaciones cuadráticas, todos estos grupos susodichos idearon la fórmula de Bhaskara, aunque, debido a su apego geométrico, más bien crearon 6 diferentes ecuaciones básicas para resolver cualquier ecuación cuadrática, siempre dando como resultado números positivos. Las ecuaciones susodichas son expresadas a continuación:

$$ax^2 = bx \quad ; \quad ax^2 = c \quad ; \quad ax = c \quad ; \quad ax^2 + bx = c \quad ; \quad ax^2 + c = bx \quad ; \quad bx + c = ax^2$$

De igual modo, todas estas civilizaciones intentaron crear una serie de formulas, o una sola, para resolver las ecuaciones cúbicas durante más de 4000 años. El que tuvo más éxito entre todos ellos fue Omar Khayyam, de Persia, que logró desarrollar 33 ecuaciones para la resolución o formulación de cúbicas al usar como objeto auxiliar círculos; a pesar de su leve éxito, el matemático no terminó por encontrar un método confiable para todo polinomio de este grado.

No sería hasta que el siglo XVI cuando el matemático profesor en la universidad de Bologna, Italia, Scipione Del Ferro que daría a luz una ecuación para resolver polinomios de grado 3 reducidos, es decir, sin el elemento al cuadrado.

Contrario a lo que se podría pensar, Del Ferro no hizo público su descubrimiento, pues por aquellas épocas el oficio de matemático se mantenía a partir de la reputación con otros matemáticos, de modo que los miembros de este trabajo se podían para destituir a otro, así que, Del Ferro, al guardar en secreto esta fórmula aseguró su trabajo. Y así seguiría hasta que 20 años después se lo revelaría a su estudiante, Antonio Fior, mientras yacía en el lecho de la muerte.

Fior era más osado que su predecesor, así que se adueño del descubrimiento, y presumió ser capaz de resolver cúbicas reducidas, sin revelar el cómo, claro. Su audacia se elevó a tales niveles que en 1535 desafió a Tartaglia, un respetado matemático que empezó en la pobreza y de modo autodi-

dacta se hizo una reputación en el área en cuestión.

Como era costumbre, cada uno le planteo 30 ejercicios a su contricante, y contaban con 40 días para resolver la mayor cantidad posible. Como es previsible, Fior reto a Tartaglia con 30 ecuaciones cúbicas reducidas, lo que obligo a este último a llevar a los límites su intelecto con tal de mantener su empleo. Objetivo que cumplió, pues al concebir el monomio al cubo como, redundantemente, un cubo de lados “ $x$ ”, y al termino de grado uno como un prisma de volumen “ $bx$ ”, con  $b$  como su coeficiente, pudo hacer una serie de transformaciones geométricas que le permitieron crear un algoritmo capaz de resolver las ecuaciones de grado tres sin termino cuadrático.

Al final, Tartaglia logró resolver todas las ecuaciones en un aproximado de 2 horas, mientras que Fior no fue capaz de resolver uno solo de los problemas que se le plantearon; su infundado orgullo lo llevo al abismo. La victoria de Tartaglia se hizo viral para aquellos entonces, a tal punto que un erudito, llamado Cardano, le insitio tanto sobre revelar su método, que al final el 25 de Marzo de 1539 éste accedió tras serle entregada una cuantiosa cantidad de dinero por parte de Cardano, y que además este último jurará no revelar el secreto.

Cardano empezó a probar el método con metas más ambiciosa, es decir, resolver un polinomio cúbico, con todo y término al cuadrado. Y a partir de prueba y error dió lugar a un método para reducir cualquier ecuación cúbica a una ecuación cúbica reducida, que puede ser resuelta facilmente con el algoritmo de Tartaglia.

El erudito estaba emocionado y muy tentado a publicar su descubrimiento, pues a diferencia de sus predecesores en la inovación de polinomio de grado tres, el se mantenía con su trabajo de médico; aunque, a pesar de su entusiasmos, su promesa a Tartaglia lo mantenía con las manos atadas... Hasta que en 1542 el visitó a un matemático en Bologna, el cual de pura suerte resulto ser el sobrino de Del Ferro. De este modo, mientras que Cardano ojeaba los libros del fallecido erudito, notó que en uno de ellos estaba redactada la misma fórmula que dedujo Tartaglia.

Teniendo como excusa el descubrimiento previo de Del Ferro, Cardano publicó 3 años después el algoritmo para resolver las cúbicas completas y reducidas en su libro “*Artis Magna*”. Empero, aquí no acaba la historia, pues como consecuencia de esta publicación el ingeniero Bombelli encontró que para algunas soluciones aparecían raíces negativas, que al operarlas en cierto casos se cancelaban y daban lugar a una solución sin estas raíces; así, Bombelli demonio a este tipo de números como un nuevo tipo de número al no poder ser considerado como negativo o positivo. Años después el matemático Descartes los denominaría con el nombre de imaginarios, y el afamado Euler los denotaría con la letra “ $i$ ”.

## 4. El programa MACTZIL

Éste consiste de usar la palabra reservada “def”, de Python, para establecer una nueva función llamada con la palabra “MACTZIL(a,b,c,d)”, en la cual se establecen 4 variables, todas para los coeficientes del posible polinomio  $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ . A partir de ésto la función evalúa el valor de los coeficientes en 4 condiciones, las cuales dan lugar a 4 operaciones diferentes para la resolución del polinomio en cuestión.

A continuación se exponen las 4 condiciones, en orden de aparición en el código, y el procedimiento al que dan lugar una vez que se cumplen.

1. Si  $a=0$  y  $b=0$ .

Al cumplirse esta condición se concluye que el polinomio en cuestión es de grado 1, y por tanto se usa la formula para su resolución, es decir:  $x = -d/c$  (con los valores que tendría esta ecuación en cuestión). Tras lo anterior se imprime en la pantalla la solución para el polinomio.

2. Si no se cumple lo anterior, y  $a=0$ .

Como consecuencia del cumplimiento de esta condición se obvia que la ecuación es cuadrática, y por ello se usa la fórmula de Bhaskara (expuesta debajo de este párrafo) para su resolución, y futura impresión en pantalla de las dos soluciones.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

3. Si no se cumple el anterior, y  $b=0$ .

Se deduce que el polinomio en cuestión es una cúbica reducida, por lo que se procede a dividir los coeficientes entre el valor del coeficiente de la variable cúbica ( $p = c/a$  ;  $q = d/a$ ) para así poder usar el método de Cardano para la resolución de este tipo de ecuaciones, el cual es:

$$u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

$$v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

$$z_1 = u + v$$

$$z_{2,3} = \left[ -\frac{1}{2}(u + v) \right] \pm \left[ \frac{\sqrt{3}}{2}(u - v) \right] i$$

Con  $z_1$ ,  $z_2$  y  $z_3$  como raíces del polinomio en cuestión que serán impresas en la pantalla.

4. Si no se cumple ninguno de las anteriores condiciones.

El polinomio es una ecuación cúbica completa, por lo que se opera el método de Cardano para reducción a cúbica reducida con coeficientes 1,  $p$  y  $q$  (término cúbico, término de grado uno, y término independiente, correspondientemente), para así usar la resolución de Cardano de este tipo de cúbicas. A continuación, sus ecuaciones respectivas en el programa MACTZIL.

$$p = \frac{3ac - b^2}{3a^2}$$

$$q = \frac{2b^3 - 9abc + 27a^2d}{27a^3}$$

$$u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

$$v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

$$z_1 = u + v - \frac{b}{3a}$$

$$z_{2,3} = \left[ -\frac{1}{2}(u + v) - \frac{b}{3a} \right] \pm \left[ \frac{\sqrt{3}}{2}(u - v) \right] i$$

Con  $z_1$ ,  $z_2$  y  $z_3$  como raíces del polinomio en cuestión que serán impresas en la pantalla.

## 5. Resultado

Logramos obtener un código nos permite conocer de forma inmediata los resultados de ecuaciones cuadráticas o cubicas, asimismo, si el resultado arroja una solución compleja, lo resuelve por igual. También es importante recalcar que el código es capaz de resolver la ecuación sin que esta completa, también selecciona automáticamente el método o la vía por donde va a resolver la ecuación, dependiendo del tipo de ecuación en cuestión. Sin embargo, es importante mencionar que posiblemente por defectos de aproximación del sistema operativo, o quizás por la naturaleza de la formula usada para la resolución de ecuaciones cúbicas, hay ocasiones en las que la calculadora no arroja resultados correctos, siendo en su mayoría aproximaciones buenas, y en ocasiones completos errores

## 6. Conclusión

El código puede ser de gran ayuda, ya que, hace la función de una calculadora, en donde obtienes resultados de polinomios no triviales muy fácilmente, y este puede ser empleado en distintos campos donde se haga uso de el, haciendo que el trabajo de dichas ecuaciones sea mas sencillo y que de esta forma, ayude a la eficacia de trabajos y/o proyectos.

## 7. Referencias

- Ecuación. (s. f.). Significados. <https://www.significados.com/ecuacion/>
- Sobre el origen de las ecuaciones. (s. f.). Junta de extremadura.
- Veritasium en español. (12 de diciembre de 2021). Cómo se Inventaron los Números Imaginarios [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VN7nipynE0c>