

# Diszkrét matematika I. feladatok

## Komplex számok II

*Hatodik alkalom (2024.03.18-03.22.)*

1. Számítsd ki a következő kifejezéseket a trigonometrikus alak felhasználásával:

a) 
$$\frac{(1+i)^9}{(1-i)^7} = \frac{\left(\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)\right)^9}{\left(\sqrt{2} \left(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4})\right)\right)^7} = \frac{2^{9/2} \left(\cos \frac{9\pi}{4} + i \sin \frac{9\pi}{4}\right)}{2^{7/2} \left(\cos \frac{-7\pi}{4} + i \sin \frac{-7\pi}{4}\right)} =$$

$$= 2^{(9-7)/2} \left(\cos \frac{(9-(-7))\pi}{4} + i \sin \frac{(9-(-7))\pi}{4}\right) = 2(\cos 4\pi + i \sin 4\pi) = 2 = 2 + 0i$$

b) 
$$\left(1 - \frac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^{24} = \sum_{n=0}^{24} \binom{24}{n} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^n \cdot 1^{24-n} = \sum_{n=0}^{24} \binom{24}{n} \cdot \left(-\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)\right)^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{24} \binom{24}{n} \cdot (-1)^n \cdot \left(\cos \frac{n\pi}{6} + i \sin \frac{n\pi}{6}\right) = \dots$$

Kiasználjuk, hogy  $(24-n)\frac{\pi}{6} = 4\pi - n\frac{\pi}{6}$ ,  
ami ugyanazt az irányt jeleni, mint  $-n\frac{\pi}{6}$ . Továbbá  $\binom{24}{n} = \binom{24}{24-n}$ , és  $(-1)^{24-n} = (-1)^n$ .

Ezért  $\dots = \binom{24}{12} \cdot (-1)^{12} \cdot (\cos \frac{12\pi}{6} + i \sin \frac{12\pi}{6}) +$

$$+ \sum_{n=0}^{11} \binom{24}{n} \cdot (-1)^n \cdot \left(\left(\cos \frac{n\pi}{6} + i \sin \frac{n\pi}{6}\right) + \left(\cos \frac{-n\pi}{6} + i \sin \frac{-n\pi}{6}\right)\right) = \binom{24}{12} +$$

$$+ \sum_{n=0}^{11} \binom{24}{n} \cdot (-1)^n \cdot (2 \cos \frac{n\pi}{6}) = \binom{24}{12} + 2 \cdot \binom{24}{0} \cdot \left(\cos \frac{0\pi}{6}\right) - 2 \cdot \binom{24}{1} \cdot \left(\cos \frac{\pi}{6}\right) + 2 \cdot \binom{24}{2} \cdot$$

$$\left(\cos \frac{2\pi}{6}\right) - 2 \cdot \binom{24}{3} \cdot \left(\cos \frac{3\pi}{6}\right) + 2 \cdot \binom{24}{4} \cdot \left(\cos \frac{4\pi}{6}\right) - 2 \cdot \binom{24}{5} \cdot \left(\cos \frac{5\pi}{6}\right) + 2 \cdot \binom{24}{6} \cdot (\cos \pi) - 2 \cdot \binom{24}{7} \cdot$$

$$\left(\cos \frac{7\pi}{6}\right) + 2 \cdot \binom{24}{8} \cdot \left(\cos \frac{8\pi}{6}\right) - 2 \cdot \binom{24}{9} \cdot \left(\cos \frac{9\pi}{6}\right) + 2 \cdot \binom{24}{10} \cdot \left(\cos \frac{10\pi}{6}\right) - 2 \cdot \binom{24}{11} \cdot \left(\cos \frac{11\pi}{6}\right),$$

kihasználva azt, hogy  $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ . Tovább folytatva, a  $\cos \frac{\pi}{2} = 0$  miatt kieső tagokat kihagyva:  $= \binom{24}{12} + 2 \cdot 1 \cdot 1 - 2 \cdot (24 + \binom{24}{11}) \cdot \left(\cos \frac{\pi}{6}\right) + 2 \cdot \left(\binom{24}{2} + \binom{24}{10}\right) \cdot$

$$\left(\cos \frac{2\pi}{6}\right) + 2 \cdot \left(\binom{24}{4} + \binom{24}{8}\right) \cdot \left(\cos \frac{4\pi}{6}\right) - 2 \cdot \left(\binom{24}{5} + \binom{24}{7}\right) \cdot \left(\cos \frac{5\pi}{6}\right) + 2 \cdot \binom{24}{6} \cdot (-1),$$

tovább is számolható, ha kihasználjuk, hogy  $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ , azaz:  $\dots = \binom{24}{12} + 2 \cdot (1 -$

$$\left(\binom{24}{6} + \left(\binom{24}{5} + \binom{24}{7} - 24 - \binom{24}{11}\right) \cdot \left(\cos \frac{\pi}{6}\right) + \left(\binom{24}{2} + \binom{24}{10} - \binom{24}{4} - \binom{24}{8}\right) \cdot \left(\cos \frac{2\pi}{6}\right) =$$

$$\binom{24}{12} + 2 - 2 \binom{24}{6} + \left(\binom{24}{5} + \binom{24}{7} - 24 - \binom{24}{11}\right) \cdot \sqrt{3} + \left(\binom{24}{2} + \binom{24}{10} - \binom{24}{4} - \binom{24}{8}\right)$$

**Másik megoldás:** Ha az eredeti hatványozandó számot írjuk trigonometrikus alakba, de az sem lesz szebb.

c) 
$$\frac{(\sqrt{3}+i)^{11}}{(1+i\sqrt{3})^{13}} = \frac{(2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}))^{11}}{(2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}))^{13}} = \frac{2^{11}(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6})}{2^{13}(\cos \frac{13\pi}{3} + i \sin \frac{13\pi}{3})} =$$

$$= 2^{(11-13)}(\cos(\frac{11}{6} - \frac{13}{3})\pi + i \sin(\frac{11}{6} - \frac{13}{3})\pi) = 2^{-2}(\cos(-\frac{15}{6}\pi) + i \sin(-\frac{15}{6}\pi)) =$$

$$= \frac{1}{4}(\cos(-\frac{5\pi}{2}) + i \sin(-\frac{5\pi}{2})) = \frac{1}{4}(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}) = \frac{1}{4}(0 + i \cdot (-1)) = -\frac{1}{4}i$$

d) 
$$\frac{(1-i)^{13}}{(\sqrt{3}+i)^5} = \frac{\sqrt{2}^{13}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})^{13}}{2^5(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})^5} = 2^{\frac{13}{2}-5}(\cos(\frac{13\pi}{4} - \frac{5\pi}{6}) + i \sin(\frac{13\pi}{4} - \frac{5\pi}{6})) =$$

$$= 2^{\frac{3}{2}}(\cos(\frac{39\pi}{12} - \frac{10\pi}{12}) + i \sin(\frac{39\pi}{12} - \frac{10\pi}{12})) = 2^{3/2}(\cos(\frac{29\pi}{12}) + i \sin(\frac{29\pi}{12})) = 2^{3/2}(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12})$$

2. Az alábbi geometriai transzformációk a komplex számsík mely műveleteivel írhatóak le:

- a) origó körüli forgatás  $\pi/4$ -gyel; **Megoldás:**  $(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$ -vel való szorzás.  
 b) origó körüli forgatás  $5\pi/6$ -tal és 3-szoros nyújtás; **Megoldás:**  $3(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}) = (-\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i)$ -vel szorzás.

Írja fel a transzformáció mátrixát is.

**Megoldások:**  $z = x + iy \mapsto (\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i)(x + iy) = (\frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y) + i(\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y)$

$$\text{mátrixosan felírva} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y \\ \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y \end{pmatrix}$$

$$z = x + iy \mapsto 3(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6})(x + iy) = (\frac{3\sqrt{3}}{2}x - \frac{3}{2}y) + i(\frac{3\sqrt{3}}{2}y + \frac{3}{2}x)$$

$$\text{mátrixosan felírva} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3\sqrt{3}/2 & -3/2 \\ 3/2 & 3\sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{3}}{2}x - \frac{3}{2}y \\ \frac{3}{2}x + \frac{3\sqrt{3}}{2}y \end{pmatrix}$$

3. A sík mely geometriai transzformációnak felelnek meg a komplex számok halmazának alábbi leképezései:  $z \mapsto 3z$ ,  $z \mapsto (1 + i)z$ ,  $z \mapsto (1/2 + i\sqrt{3}/2)z$ . Írja fel a megfelelő transzformációt valós  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  mátrixok segítségével.

**Megoldás:**  $z \mapsto 3z$ , ez az origó középpontú 3-szorosra nyújtás:  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix}$

$z \mapsto (1 + i)z = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) z$ , ez az origó középpontú nyújtva forgatás:  $\sqrt{2}$ -szeresre nyújtás és  $\frac{\pi}{4}$  szögű forgatás (pozitív, azaz az óramutató járásával ellentétes irányban).

$x + iy \mapsto (1 + i)(x + iy) = (x - y) + (x + y)i$ , mátrixosan:  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \end{pmatrix}$

$z \mapsto \left( \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) z = \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) z$ , ez az origó középpontú  $\frac{\pi}{3}$  szögű forgatás (az óramutató járásával ellentétes irányban).  $x + iy \mapsto \left( \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) (x + iy) = \left( \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \right) + i \left( \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \right)$ ,

mátrixosan:  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \end{pmatrix}$

4. Legyenek  $z$  és  $w$  különböző komplex számok. Írjuk fel az őket összekötő szakasz felezőpontját, valamint az összekötő szakaszra állítható két szabályos háromszögnek a harmadik csúcsát.

**Megoldás:** Két, helyvektorral megadott pont szakaszának felezőpontja a két helyvektor összegének a fele (ez a vektorösszeadás "paralelogramma-szabályának" lerajzolásából látható). A komplex számsík  $x + iy$  pontja azonosítható az origóból az  $(x, y)$  koordinátájú pontba mutató helyvektorral, és a komplex számok összeadása pont a vektorösszeadás. Ezért a  $z$  és  $w$  számokat összekötő szakasz felezőpontja a  $\frac{z+w}{2}$  szám.

A két szabályos háromszög legyen az  $A = z$ ,  $B = w$ , és  $C$ , illetve az  $A = z$ ,  $B = w$ , és  $D$  pontokkal megadott háromszög. Két pont "összekötő vektora" a két helyvektor (illetve itt két komplex szám) különbsége:  $\overrightarrow{AB} = B - A = w - z$ ,  $\overrightarrow{AC} = C - A$ ,  $\overrightarrow{AD} = D - A$ . Mivel szabályos háromszögekről van szó, ezért  $\overrightarrow{AC}$  vektor az  $\overrightarrow{AB}$  vektornak  $60^\circ = \frac{\pi}{3}$  szögű elforgatottja. Ezt a forgatást a komplex számsíkon a  $(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$  egységnyi abszolútértékű számmal való szorzás valósítja meg:  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = (w - z)(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ .

Tehát  $C = A + \overrightarrow{AC} = z + (w - z)(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ .

Hasonlóan  $\overrightarrow{AD}$  vektor az  $\overrightarrow{AB}$  vektornak  $-60^\circ = -\frac{\pi}{3}$  szögű elforgatottja. Ezt a forgatást a komplex számsíkon a  $(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$  egységnyi abszolútértékű számmal való szorzás valósítja

meg:  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB}(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}) = (z - w)(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$ .

Tehát  $D = A + \overrightarrow{AD} = z + (z - w)(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$ .

Tetszőleges háromszög súlypontjának helyvektora az origóból a három csúcsba mutató vektorok összegének harmada. Most már ezt is ki tudjuk számolni erre a két háromszögre...

5. A komplex számsíkon egy négyzet középpontja a  $K = 1 + 2i$  illetve egyik csúcsa az  $A = 5 + 4i$  komplex számnak megfelelő pontban van. Határozza meg a négyzet többi csúcsának megfelelő komplex számokat.

**Megoldás:** A többi csúcs  $B$ ,  $C$  és  $D$ . Tudjuk, hogy a középpontból a csúcsokba mutató vektorok egymás derékszöggel való elforgatottjai, a derékszögű forgatást az  $i$ -vel való szorzás valósítja meg:  $\overrightarrow{KB} = i \cdot \overrightarrow{KA}$ ,  $\overrightarrow{KC} = i \cdot \overrightarrow{KB} = i^2 \cdot \overrightarrow{KA} = -\overrightarrow{KA}$ ,  $\overrightarrow{KD} = i \cdot \overrightarrow{KC} = -i \cdot \overrightarrow{KA}$ .

$$\overrightarrow{KA} = A - K = 4 + 2i$$

így  $\overrightarrow{KB} = i \cdot (4 + 2i) = -2 + 4i$ ,  $\overrightarrow{KC} = -(4 + 2i) = -4 - 2i$ ,  $\overrightarrow{KD} = -i \cdot (4 + 2i) = 2 - 4i$ .  
Tehát:

$$B = K + \overrightarrow{KB} = (1 + 2i) + (-2 + 4i) = -1 + 6i$$

$$C = K + \overrightarrow{KC} = (1 + 2i) + (-4 - 2i) = -3$$

$$D = K + \overrightarrow{KD} = (1 + 2i) + (2 - 4i) = 3 - 2i$$

6. Vonjon négyzetgyököt a következő számokból:

a)  $3 - 4i$ ; **Megoldás:**  $3 - 4i = 5(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ , ahol  $\tan \alpha = -4/3$  és  $\alpha$  a negyedik síknegyedben van, azaz  $\alpha = \arctan(-4/3) \approx -17,7^\circ$ . De ez a közelítő szögérték nem megfelelő, ha precíz eredményt akarunk! Viszont elővéve a függvénytáblázatot:  $\cos \frac{\alpha}{2} =$

$\pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$  és  $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ . Ha  $\alpha$  a negyedik síknegyedben van, akkor a felének a koszinusza pozitív, szinusza negatív. Ezt kihasználva  $3 - 4i$  két négyzetgyöke:  $w_{1,2} = \pm \sqrt{5}(\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2}) = \pm 5^{1/4} \left( \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} - i \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \right)$ . Ez a legutolsó alak már NEM

trigonometrikus alak, hanem bonyolultan írt algebrai alak. Mivel  $\cos \alpha = 3/5$ , ezt beírva:

$$w_1 = \sqrt{5} \frac{1 + 3/5}{2} - i \sqrt{5} \frac{1 - 3/5}{2} = \sqrt{\frac{5 + 3}{2}} - i \sqrt{\frac{5 - 3}{2}} = 2 - i, \text{ és } w_2 = -w_1 = -2 + i.$$

b)  $2i$ ; **Megoldás:**  $2i = 2(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$  két négyzetgyöke  $w_{1,2} = \pm \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$ . Itt a  $\pm$  váltja ki az argumentum  $\alpha + k \cdot \frac{2\pi}{2} = \alpha + k \cdot \pi$ ,  $k = 0, 1$  két esetét, de a  $w_2 = -\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$  NEM trigonometrikus alak! Ha trigonometrikus alak kell, akkor  $w_2 = \sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4} + \pi) + i \sin(\frac{\pi}{4} + \pi)) = \sqrt{2}(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4})$

$$\text{c) } z = (1 - i)^3 / (1 - \sqrt{3}i)^5 \quad \textbf{Megoldás: } z = \frac{\left( \sqrt{2} \left( \cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}) \right) \right)^3}{\left( 2 \left( \cos(-\frac{\pi}{3}) + i \sin(-\frac{\pi}{3}) \right) \right)^5}$$

$$z = \frac{2^{3/2} \left( \cos(-\frac{3\pi}{4}) + i \sin(-\frac{3\pi}{4}) \right)}{2^5 \left( \cos(-\frac{5\pi}{3}) + i \sin(-\frac{5\pi}{3}) \right)} = 2^{3/2-5} \left( \cos(-\frac{32\pi}{12}) + i \sin(-\frac{32\pi}{12}) \right)$$

$$z = 2^{7/2} \left( \cos(-\frac{8\pi}{12}) + i \sin(-\frac{8\pi}{12}) \right) = 2^{7/2} \left( \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right). \text{ Ebből már könnyen vonunk}$$

négyzetgyököt:  $w_{1,2} = \pm 2^{7/4} \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$ , ahol  $w_2$  trigonometrikus alakja természetesen

$$\text{nem } w_2 = -w_1, \text{ hanem } w_2 = 2^{7/4} \left( \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right)$$

7. Oldja meg a következő másodfokú egyenletet:  $(2+i)z^2 - (5-i)z + (2-2i) = 0$ .

**Megoldás:** Megoldóképlettel:  $z_{1,2} = \frac{5-i \pm \sqrt{(-5+i)^2 - 4(2+i)(2-2i)}}{2(2+i)}$ , ahol a gyök előtti

$\pm$  jelzi, hogy mindkét komplex négyzetgyök használandó.  $(-5+i)^2 - 4(2+i)(2-2i) = 24 - 10i - 4(6-2i) = -2i = 2(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2})$ , ennek a két négyzetgyöke közül az egyik  $\sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}) = -1+i$ , a másik pedig  $\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4})) = 1-i$ . Tehát  $z_{1,2} = \frac{5-i \pm (1-i)}{4+2i}$ , azaz

$$z_1 = \frac{6-2i}{4+2i} \cdot \frac{4-2i}{4-2i} = \frac{24-4-8i-12i}{4^2+2^2} = \frac{20-20i}{20} = 1-i, \text{ és}$$

$$z_2 = \frac{4}{4+2i} \cdot \frac{4-2i}{4-2i} = \frac{16-8i}{4^2+2^2} = \frac{16}{20} - \frac{8}{20}i = \frac{4}{5} - \frac{2}{5}i.$$

8. Adja meg a következő mátrixok sajátértékeit (számológép használata megengedett):

a)  $\begin{pmatrix} 7-2i & 8-4i \\ -6+3i & -7+5i \end{pmatrix}$ ; b)  $\begin{pmatrix} 10-7i & 12-8i \\ -9+6i & -11+7i \end{pmatrix}$ .

9. Vonjon harmadik gyököt a következő számokból

a)  $1 = (\cos 0 + i \sin 0)$  **Megoldás:**  $\left(\cos(k\frac{2\pi}{3}) + i \sin(k\frac{2\pi}{3})\right), k = 0, 1, 2$

b)  $-1 = (\cos \pi + i \sin \pi)$  **Megoldás:**  $\left(\cos(\frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3}) + i \sin(\frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3})\right), k = 0, 1, 2$

c)  $2+2i = 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2^3}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{8}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$

**Megoldás:**  $\sqrt{2}\left(\cos(\frac{\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3}) + i \sin(\frac{\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3})\right), k = 0, 1, 2$

d)  $\frac{3+4i}{1+i}$  **Megoldás:** Mivel  $3+4i$  trigonometrikus alakjában nem tudunk precíz szögértéket

megadni, ezért célszerűbb algebrai alakkal kiszámolni a törtet:  $\frac{3+4i}{1+i} = \frac{3+4i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{7+i}{2}$ ,

viszont ennek sem szép az argumentuma.  $z = \frac{7}{2} + \frac{1}{2}i = \sqrt{12,5}(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ , ahol  $\tan \alpha = 1/7$ , és  $\alpha$  az első síknegyedbe esik, tehát  $\alpha = \arctan(1/7)$ . Ezt a szöget kell harmadolni...

10. Vonjon negyedik gyököt a következő számból:  $\frac{-4}{(2+i)^3}$ . **Megoldás:** Megint az a gond, hogy

a nevezőnek nem nevezetes szög az argumentuma, így először algebrai alakkal érdemesebb vacakolni:  $(2+i)^3 = 8 + 3 \cdot 4i + 3 \cdot 2i^2 + i^3 = 8 - 6 + 12i - i = 2 + 11i$ , ezután a tört:  $\frac{-4}{(2+i)^3} =$

$$\frac{-4}{2+11i} \cdot \frac{2-11i}{2-11i} = \frac{-8+44i}{2^2+11^2} = \frac{-8+44i}{125} = -\frac{8}{125} + \frac{44}{125}i = r \cdot (\cos \alpha + i \sin \alpha), \text{ ahol } r = \sqrt{8^2+44^2}/125 = \sqrt{64+1936}/125 = \sqrt{2000}/125 = 20\sqrt{5}/125 = 4\sqrt{5}/25, \text{ és az } \alpha \text{ argumentum}$$

a második síknegyedbe esik, és  $\tan \alpha = -8/44 = -2/11$ , azaz  $\alpha = \arctan(-7/11) + \pi$ .

A negyedik gyökök:  $r^{1/4} \cdot \left(\cos(\frac{\alpha}{4} + k\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\alpha}{4} + k\frac{\pi}{2})\right), k = 0, 1, 2, 3$ .

Nevezetes szögek trigonometrikus értéke

$x$	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin x$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos x$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0