

10. előadás

FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 2.

Hatványsor összegfüggvényének a határértéke

Igazolni fogjuk, hogy egy hatványsor összegfüggvényének van határértéke a konvergenciahalmaza minden belső pontjában, és a határérték megegyezik a pont behelyettesítésével kapott sor összegével.

1. Tétel (Hatványsor összegfüggvényének a határértéke). Tegyük fel, hogy a $\sum \alpha_n(x-a)^n$ hatványsor R konvergenciasugara pozitív. Jelölje

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n(x-a)^n \quad (x \in K_R(a))$$

az összegfüggvényét. Ekkor $\forall b \in K_R(a)$ pontban létezik a $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ határérték, és

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n(b-a)^n.$$

Bizonyítás. Először azt igazoljuk, hogy

$$(*) \quad r \in (0, R) \quad \implies \quad a \sum_{n=1}^{\infty} n \alpha_n r^{n-1} \text{ sor abszolút konvergens.}$$

Legyen $\varrho \in (r, R)$. Ekkor $a + \varrho \in (a - R, a + R)$ a $\sum \alpha_n(x-a)^n$ hatványsor konvergenciahalmazának belső pontja, ezért a hatványsor konvergens az $x = a + \varrho$ pontban. Az $x - a = \varrho$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy a $\sum \alpha_n \varrho^n$ sor konvergens, és így $\lim(\alpha_n \varrho^n) = 0$. Emiatt az $(\alpha_n \varrho^n)$ sorozat korlátos, azaz

$$\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}: |\alpha_n \varrho^n| \leq M.$$

Ekkor minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén

$$|\alpha_n| \leq \frac{M}{\varrho^n} \quad \implies \quad |n \alpha_n r^{n-1}| = \frac{1}{r} n |\alpha_n| r^n \leq \frac{M}{r} n \left(\frac{r}{\varrho}\right)^n = A n q^n,$$

ahol $A := \frac{M}{r}$ és $0 < q := \frac{r}{\varrho} < 1$. A gyökkritérium szerint

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{A n q^n} = q < 1 \quad \implies \quad \sum_{n=1}^{\infty} A n q^n \text{ sor konvergens.}$$

Így a majoráns kritérium alapján a $\sum_{n=1}^{\infty} n \alpha_n r^{n-1}$ sor abszolút konvergens, tehát a $(*)$ állítást igazoltuk.

Vegyük most egy tetszőleges $b \in K_R(a)$ pontot. Válasszuk meg r -et úgy, hogy

$$0 \leq |b - a| < r < R \quad \implies \quad b \in K_r(a).$$

Legyen

$$C := \sum_{n=1}^{+\infty} n |\alpha_n| r^{n-1} < +\infty,$$

hiszen (*) miatt a fenti sor konvergens. Ekkor minden $x \in K_r(a)$ helyen a következő becslések érvényesek:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(b)| &= \left| \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (x-a)^n - \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (b-a)^n \right| = \left| \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n ((x-a)^n - (b-a)^n) \right| \leq \\ &\leq \sum_{n=1}^{+\infty} |\alpha_n| \cdot |x-b| \cdot (|x-a|^{n-1} + |x-a|^{n-2} \cdot |b-a| + \dots + |b-a|^{n-1}) \leq \\ &\leq \left(\text{mivel } |x-a| < r \text{ és } |b-a| < r \right) \leq |x-b| \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} |\alpha_n| n r^{n-1} = C \cdot |x-b|. \end{aligned}$$

Így

$$0 \leq |f(x) - f(b)| \leq C \cdot |x-b| \xrightarrow{x \rightarrow b} 0.$$

A függvényhatárértékre vonatkozó közrefogási elv szerint tehát

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b).$$

Nevezetes határértékek 2.

7. Az exp, a sin és a cos függvény végesben vett határértéke.

Az exp, a sin és a cos függvényt hatványsorok összegfüggvényeként értelmeztük. Ezért az előző tétel szerint a függvényeknek minden $a \in \mathbb{R}$ pontban van határértéke, és azok egyenlők az a -ban vett helyettesítési értékekkel:

$$\lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a, \quad \lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a, \quad \lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a.$$

8. Az exp függvény határértéke $(\pm\infty)$ -ben.

Mivel

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots > x \quad (x \geq 0)$$

és $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, ezért

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Mivel minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, ezért

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{-x}} = \left(\text{az } y = -x \text{ helyettesítéssel} \right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^y} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Így

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Megjegyzés. A helyettesítéssel történő határértékszámítást később fogjuk bevezetni. ■

9. Az $\frac{\sin x}{x}$ határértéke a 0 pontban.

2. Tétel.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Bizonyítás. A definíció szerint

$$\sin x := \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ezért

$$\mathbb{R} \ni \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

De a fenti hatványsor az $x = 0$ pontban is konvergens, hiszen ekkor a sor összege nyilvánvalóan 1. Ezért a hatványsor az egész \mathbb{R} -en konvergens, azaz konvergenciasugara $R = +\infty$. Így a hatványsor összegfüggvényének a határértéke szerint

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots \right) = 1,$$

hiszen a hatványsor a 0 pontban vett határértéke megegyezik az $x = 0$ pont behelyettesítésével kapott sor összegével, ami 1-gyel egyenlő.

Monoton függvények határértéke

Először emlékeztetünk függvények monotonitásainak a fogalmaira. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, és tegyük fel, hogy $\emptyset \neq H \subset \mathcal{D}_f$. Az f függvény

- **monoton növekvő H -n** (jelben $f \nearrow H$ -n), ha

$$\forall x_1, x_2 \in H, \ x_1 < x_2 \text{ esetén } f(x_1) \leq f(x_2),$$

- **szigorúan monoton növekvő H -n** (jelben $f \uparrow H$ -n), ha

$$\forall x_1, x_2 \in H, \ x_1 < x_2 \text{ esetén } f(x_1) < f(x_2),$$

- **monoton csökkenő H -n** (jelben $f \searrow H$ -n), ha

$$\forall x_1, x_2 \in H, \ x_1 < x_2 \text{ esetén } f(x_1) \geq f(x_2),$$

- **szigorúan monoton csökkenő H -n** (jelben $f \downarrow H$ -n), ha

$$\forall x_1, x_2 \in H, \ x_1 < x_2 \text{ esetén } f(x_1) > f(x_2).$$

Az f függvény **monoton H -n**, ha a fenti esetek valamelyike áll fenn.

Megjegyzés. A $H = \mathcal{D}_f = \mathbb{N}$ speciális esetben visszkapjuk a monoton sorozatok korábbi definícióit. ■

3. Tétel. Legyen $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$ tetszőleges (korlátos vagy nem korlátos) nyílt intervallum. Ha az f függvény monoton (α, β) -n, akkor f -nek $\forall a \in (\alpha, \beta)$ pontban létezik a jobb oldali, illetve a bal oldali határértéke, és ezek végesek.

a) Ha $f \nearrow (\alpha, \beta)$ -n, akkor

$$\lim_{a+0} f = \inf \{ f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x > a \},$$

$$\lim_{a-0} f = \sup \{ f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x < a \}.$$

b) Ha $f \searrow (\alpha, \beta)$ -n, akkor

$$\lim_{a+0} f = \sup \{ f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x > a \},$$

$$\lim_{a-0} f = \inf \{ f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x < a \}.$$

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy $f \nearrow (\alpha, \beta)$ -n. A jobb oldali határértékre vonatkozó állítást igazoljuk.

Legyen

$$m := \inf \{ f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x > a \}.$$

Világos, hogy $m \in \mathbb{R}$. Az infimum definíciójából következik, hogy

$$\text{i) } \forall x \in (\alpha, \beta), x > a: m \leq f(x),$$

$$\text{ii) } \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists x_1 \in (\alpha, \beta), x_1 > a: f(x_1) < m + \varepsilon.$$

Így $m \leq f(x_1) \leq m + \varepsilon$. Mivel $f \nearrow (\alpha, \beta)$ -n, ezért

$$m \leq f(x) \leq f(x_1) < m + \varepsilon \quad (x \in (a, x_1)).$$

A $\delta := x_1 - a > 0$ választással tehát azt mutattuk meg, hogy

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in (\alpha, \beta), a < x < a + \delta: \underbrace{0 \leq f(x) - m < \varepsilon}_{f(x) \in K_\varepsilon(m)}.$$

Ez pedig azt jelenti, hogy f -nek a -ban van jobb oldali határértéke, és az m -mel egyenlő, azaz

$$\lim_{a+0} f = m = \inf \{ f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x > a \}.$$

A tétel többi állítása hasonlóan bizonyítható.

Megjegyzés. Legyen f monoton növekvő. Ha $+\infty \in \mathcal{D}'_f$, akkor létezik a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ határérték, és

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f = \sup \mathcal{R}_f \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ha $-\infty \in \mathcal{D}'_f$, akkor létezik a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ határérték, és

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f = \inf \mathcal{R}_f \in \overline{\mathbb{R}}.$$

■

A pontbeli folytonosság fogalmának a motivációja

Tegyük fel, hogy egy megadott $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény helyettesítési értékét akarjuk kiszámítani egy adott $a \in \mathcal{D}_f$ pontban. Azonban előfordulhat, hogy a -nak csak közelítő értékeivel számolhatunk, pl. ha az a szám irracionális. Az a kérdés, hogy ha olyan számot választunk, ami elég közel van az a számhoz, akkor ennek helyettesítési értéke elég közel kerül-e az $f(a)$ értékhez, hiszen csak így tudunk az $f(a)$ értéket „jól becsülni” a kapott eredménnyel.

A függvényhatárérték megválaszolja az előbbi kérdést, hiszen éppen azt szeretnénk, hogy

$$(*) \quad \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

teljesüljön. Nézzük meg közelebbről a végesben vett véges határérték egyenlőtlenségekkal felírt definícióját:

$$\mathbb{R} \ni a \in \mathcal{D}'_f \quad \text{és} \quad \exists A \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, 0 < |x - a| < \delta: |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Többször említettük, hogy a határérték szempontjából érdektelen, hogy a függvény értelmezve van-e az a pontban, és ha igen, akkor ott mi a függvény helyettesítési értéke. Azonban a $(*)$ egyenlőséghez szükséges, hogy $a \in \mathcal{D}_f$, és nem mindegy mennyi az $f(a)$ értéke. Ehhez a következő módon meg kell változtatnunk a végesben vett véges határérték fogalmát:

$$(\Delta) \quad a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f \quad \text{és} \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta: |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Így már a (Δ) tulajdonság megfelel a $(*)$ egyenlőséghez. Annyi érdemes még észrevenni, hogy a $0 < |x - a|$ feltétel fölöslegessé válik, hiszen ha $x = a$, akkor nyilván

$$|f(x) - f(a)| = |f(a) - f(a)| = 0 < \varepsilon$$

teljesül. A fennmaradó $|x - a| < \delta$ feltétel a „rendes” $K_\delta(a)$ környezetet jelenti, és így már nem lesz szükségünk a pontozott környezetekre.

A pontbeli folytonosság fogalma

1. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban**, ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta: |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Jelölés: $f \in C\{a\}$.

Fontos! A függvény pontbeli folytonosságát csak értelmezési tartománybeli pontokra értelmezzük! Ezért csak ilyen pontokban lehet vizsgálni a folytonosságot. Azokat az értelmezési tartománybeli pontokat, ahol a függvény nem folytonos **szakadási helyeknek** nevezzük.

Vegyük észre, hogy a folytonosság és a (Δ) tulajdonság között csak annyi a különbség, hogy a folytonossághoz nem szükséges az $a \in \mathcal{D}'_f$ feltétel teljesülése. Ez azért kellett, hogy a folytonosságot lehessen minden értelmezési tartománybeli pontban értelmezni. De melyik pontok azok, amire $a \in \mathcal{D}_f$, de $a \notin \mathcal{D}'_f$ teljesül?

Legyen $H \neq \emptyset$ egy számhalmaz. Akkor mondjuk, hogy az a valós szám a H halmaz **izolált pontja**, ha $a \in H \setminus H'$, azaz a a H halmaz eleme, de nem torlódási pontja a H halmaznak. Más szavakkal:

$$\exists r > 0: K_r(a) \cap H = \{a\}.$$

Például $a := 2$ izolált pontja a $H := [0, 1] \cup \{2\}$ halmaznak.

Egy halmazbeli elem csak torlódási vagy izolált pontja lehet a halmaznak.

4. Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Ha $a \in \mathcal{D}_f \setminus \mathcal{D}'_f$, azaz izolált pontja \mathcal{D}_f -nek, akkor $f \in C\{a\}$,

2. Ha $a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$, azaz torlódási pontja \mathcal{D}_f -nek, akkor

$$f \in C\{a\} \iff \exists \lim_a f \text{ és } \lim_a f = f(a).$$

Bizonyítás.

1. Ha a izolált pontja \mathcal{D}_f -nek, akkor

$$\exists r > 0: K_r(a) \cap \mathcal{D}_f = \{a\}.$$

Így a folytonosság definíciójában $\delta := r$ mellett a $\forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta = r$ feltétel csak $x = a$ esetén teljesül. De ekkor igaz, hogy $|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$. Tehát a folytonosság definíciója szerint $f \in C\{a\}$.

2. Ha $a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$, akkor a folytonosság fogalma megegyezik a (Δ) tulajdonsággal, ami viszont megfelel a $(*)$ egyenlőséghez.

Megjegyzések.

1. Az előző tétel alapján világos, hogy ha $a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$, akkor az f függvény akkor és csak akkor folytonos a -ban, ha f -nek a -ban van határértéke, és az egyenlő az a -ban felvett $f(a)$ függvényértékkel.

2. A definícióból rögtön következik, hogy ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \mathcal{D}_f$, akkor

$$f \notin C\{a\} \iff \exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0\text{-hoz } \exists x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta: |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon.$$

Példák. Közvetlen az $f \in C\{a\}$ pontbeli folytonosság

$$a \in \mathcal{D}_f \text{ és } \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta: |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

definíciójából, nem nehéz az alábbi függvényeknél $\forall \varepsilon > 0$ -hoz „alkalmas” $\delta > 0$ számot találni.

- $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := c$ ($c \in \mathbb{R}$) konstans függvény folytonos $\forall a \in \mathcal{D}_f$ pontban, hiszen

$$|f(x) - f(a)| = |c - c| = 0 < \varepsilon \quad (x \in \mathcal{D}_f).$$

miatt $\forall \varepsilon > 0$ -hoz minden pozitív δ jó választás.

- $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := cx$ ($c \neq 0$) függvény folytonos $\forall a \in \mathcal{D}_f$ pontban, hiszen tetszőlegesen rögzített $\varepsilon > 0$ -hoz a $\delta := \varepsilon/|c|$ választással

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| = |cx - ca| = |c| \cdot |x - a| < |c| \cdot \delta = \varepsilon.$$

- $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := |x|$ függvény folytonos $\forall a \in \mathcal{D}_f$ pontban, hiszen tetszőlegesen rögzített $\varepsilon > 0$ -hoz a $\delta := \varepsilon$ választással

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| = ||x| - |a|| \leq |x - a| < \delta = \varepsilon.$$

- $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := x^2$ függvény folytonos $\forall a \in \mathcal{D}_f$ pontban, hiszen tetszőlegesen rögzített $\varepsilon > 0$ -hoz a $\delta := \sqrt{a^2 + \varepsilon} - |a| > 0$ választással $\forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta$ esetén

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &= |x^2 - a^2| = |x - a| \cdot |x + a| = |x - a| \cdot |(x - a) + 2a| < \delta(\delta + 2|a|) = \\ &= \delta^2 + 2\delta|a| = (\delta + |a|)^2 - a^2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Megjegyzések.

1. Vegyük észre, hogy az előbbi példákban a függvény értelmezési tartománya bármilyen számhalmaz lehet.
2. Az utolsó példából látható, hogy δ nem csak az ε -tól függhet, hanem attól az a ponttól is, ahol a folytonosságot vizsgáljuk.

Folytonos függvények alaptulajdonságai

„Összetettebb” függvények esetében az előző példákhoz képest jóval nehezebb a folytonosságot igazolni a definíció alapján. Ezért olyan állításokat fogunk megfogalmazni és igazolni, amelyek lényegesen leegyszerűsítik a folytonosság vizsgálatát.

5. Tétel (A folytonosságra vonatkozó átviteli elv). Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff \forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \text{ esetén } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a).$$

Bizonyítás. Ha a izolált pontja \mathcal{D}_f -nek, akkor egyrészt $f \in C\{a\}$, másrészt

$$(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \lim(x_n) = a \implies x_n = a \text{ m.m. } n\text{-re} \implies f(x_n) = f(a) \text{ m.m. } n\text{-re,}$$

és így $\lim(f(x_n)) = f(a)$. A két állítás tehát ekvivalens.

Ha a torlódási pontja \mathcal{D}_f -nek, akkor $f \in C\{a\} \iff \exists \lim_a f = f(a)$. A határértékre vonatkozó átviteli elv szerint ez ekvivalens azzal, hogy

$$\forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \text{ esetén } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A = f(a).$$

Nem nehéz meggondolni, hogy ez ekvivalens a tételben szereplő feltétellel.

Megjegyzés. Az előző tétel a határértékre vonatkozó átviteli elv bizonyításához hasonlóan igazolható. Ehhez környezetekkel felírjuk a pontbeli folytonosság fogalmát:

$$f \in C\{a\} \iff a \in \mathcal{D}_f \text{ és } \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in K_\delta(a) \cap \mathcal{D}_f : f(x) \in K_\varepsilon(f(a)).$$

A különbség lényegében az, hogy most „rendes” és nem pontozott környezetekkel dolgozunk.

6. Tétel (Az algebrai műveletek és a folytonosság kapcsolata). Tegyük fel, hogy $f, g \in C\{a\}$. Ekkor a

$$\lambda f \quad (\lambda \in \mathbb{R}), \quad f + g, \quad f \cdot g, \quad \frac{f}{g} \quad (\text{ha } g(a) \neq 0)$$

függvények is folytonosak a -ban.

Bizonyítás. A tétel állítása a folytonosságra vonatkozó átviteli elvnek, valamint a műveletek és a határérték kapcsolatára vonatkozó tételnek közvetlen következménye.

A tétel következménye, hogy ***a hatványfüggvények, a polinomok, valamint a racionális törtfüggvények az értelmezési tartományuk minden pontjában folytonosak.***

A gyökfüggvények is folytonosak az értelmezési tartományuk minden pontjában. Ez az állítás a folytonosságra vonatkozó átviteli elvnek, és a sorozatok m -edik gyökének a határértékére vonatkozó állítás közvetlen következménye, hiszen

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \quad \implies \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[m]{x_n} = \sqrt[m]{a} \quad (a \geq 0, m = 2, 3, \dots).$$

7. Tétel (Hatványsor összegfüggvényének folytonossága). Minden hatványsor összegfüggvénye folytonos a hatványsor teljes konvergenciahalmazán.

Bizonyítás. Legyen R , ill. f a $\sum \alpha_n(x-a)^n$ hatványsor konvergenciasugara ill. összegfüggvénye. Ekkor

- Ha $R = 0$, akkor $\mathcal{D}_f = \{a\}$, hiszen ekkor a hatványsor csak az $x = a$ pontban konvergens. Tehát a izolált pontja \mathcal{D}_f -nek, és így $f \in C\{a\}$.
- Ha $0 < R \leq +\infty$, akkor a szóban forgó hatványsor konvergenciahalmazának belseje az $(a-R, a+R)$ intervallum. A hatványsor összegfüggvényének a határértékére vonatkozó tétel szerint egy hatványsor összegfüggvényének van határértéke a konvergenciahalmaza minden b belső pontjában, és a határérték megegyezik a pont behelyettesítésével kapott sor összegével, ami nem más, mint $f(b)$, azaz

$$\exists \lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b) \quad \implies \quad f \in C\{b\}.$$

Tehát a hatványsor folytonos a konvergenciahalmaz minden belső pontjában.

- Ha $0 < R < +\infty$ és a hatványsor konvergens a konvergenciahalmaz valamelyik határpontjában, akkor is igazolható az összegfüggvény folytonosságát ezekben a pontokban. Ennek bizonyítása elég hosszadalmas, ezért azt nem részletezzük.

Az előző tétel következménye, hogy ***az exp, a sin és a cos függvény minden \mathbb{R} -beli pontban folytonos***, hiszen mindegyik az egész \mathbb{R} -en konvergens hatványsor összegfüggvénye.

8. Tétel (Előjeltartás). Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban és $f(a) > 0$. Ekkor

$$\exists K(a), \forall x \in \mathcal{D}_f \cap K(a): f(x) > 0,$$

azaz $f(a)$ előjelét egy alkalmas $K(a)$ környezetben felvett függvényértékek is öröklik.


Bizonyítás. Alkalmazzuk a folytonosság definícióját az $\varepsilon := f(a) > 0$ számmal. Ekkor $\exists \delta > 0$, hogy

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, |x-a| < \delta \text{ esetén } |f(x) - f(a)| < f(a),$$

azaz, ha $x \in \mathcal{D}_f$ és $x \in K_\delta(a)$, akkor

$$-f(a) < f(x) - f(a) < f(a) \quad \implies \quad 0 < f(x) \quad (< 2f(a)).$$

Az előjeltartást úgy tudjuk jól szemléltetni, ha veszünk egy intervallumon értelmezett folytonos függvényt. Az ábrán is látható, hogy ha a az intervallum olyan belső pontja, amire $f(a) > 0$ teljesül, akkor f pozitív értékeket vesz fel az $(a - r, a + r)$ környezetben.



Halmazon folytonos függvények

Eddig a folytonosságot a határértékhez hasonlóan pontban értelmeztünk. De a folytonosság kimondható az egész függvényre is.

2. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos, ha az értelmezési tartományuk minden pontjában folytonos. Jelölés: $f \in C$.

Ez azt jelenti, hogy a racionális törtfüggvények, a gyökfüggvények, illetve az exp, a sin és a cos függvények folytonosak.

Megjegyzés. Úgy tűnik, hogy a most bevezetett fogalom eltér a folytonosságról alkotott intuitív képünktől. Például az

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{x}$$

reciprokfüggvény folytonos, hiszen $0 \notin \mathcal{D}_f$, és ezért ott nem vizsgálhatjuk meg a folytonosságot. A többi pontban folytonos a hányadosra vonatkozó műveleti tétel alapján. A grafikonja azonban nem rajzolható meg a ceruza felemelése nélkül. Mégis intervallumon értelmezett függvények esetében ez az intuitív kép megmarad. ■

Más a helyzet, ha a folytonosságot egy A halmazon szeretnénk bevezetni.

3. Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $A \subset \mathcal{D}_f$. Az f függvény folytonos az A halmazon (jelben $f \in C(A)$), ha

$$\forall a \in A \text{ esetén } f|_A \in C\{a\},$$

ahol $f|_A$ jelöli az f függvény A halmazra való leszűkítését, vagyis az


$$f|_A : A \rightarrow \mathbb{R}, \quad f|_A(x) := f(x)$$

függvényt.

Vigyázat! az „ f folytonos A -n” nem jelenti azt, hogy f az A halmaz minden pontjában folytonos, hanem az, hogy $f|_A$ az A halmaz minden pontjában folytonos, ami nem ugyanaz. Például az

$$f(x) := \begin{cases} 1 & (0 \leq x < 1) \\ 2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

függvény folytonos az $[1, 2]$ halmazon, de $f \notin C\{1\}$.



A összetett függvény folytonossága és határértéke

A függvények közötti kompozíció műveletére a folytonosság és a határérték esetén lényegesen különböző tételeket kell megfogalmaznunk. Kezdjük a folytonosság és a kompozíció kapcsolatával.

9. Tétel (Az összetett függvény folytonossága). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C\{a\}$ és $f \in C\{g(a)\}$. Ekkor $f \circ g \in C\{a\}$, azaz az összetett függvény „örökli” a belső- és a külső függvény folytonosságát.

Bizonyítás. A feltételek szerint $g(a) \in \mathcal{D}_f$, ezért $g(a) \in \mathcal{R}_g \cap \mathcal{D}_f$, azaz $\mathcal{R}_g \cap \mathcal{D}_f \neq \emptyset$. Így valóban beszélhetünk az $f \circ g$ összetett függvényről, és $a \in \mathcal{D}_{f \circ g}$ is igaz.

Legyen $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_{f \circ g} \subset \mathcal{D}_g$ egy olyan sorozat, amelyre $\lim(x_n) = a$. Mivel $g \in C\{a\}$, így a folytonosságra vonatkozó átviteli elv szerint $\lim(g(x_n)) = g(a)$. Jelölje

$$b := g(a) \quad \text{és} \quad y_n := g(x_n) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $(y_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f$ és $\lim(y_n) = b$. Mivel $f \in C\{b\}$, így a folytonosságra vonatkozó átviteli elv szerint $\lim(f(y_n)) = f(b)$. Ugyanakkor

$$f(b) = f(g(a)) = (f \circ g)(a) \quad \text{és} \quad f(y_n) = f(g(x_n)) = (f \circ g)(x_n) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Azt igazoltuk tehát, hogy $\forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_{f \circ g}$, $\lim(x_n) = a$ sorozat esetén igaz, hogy

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (f \circ g)(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (f(y_n)) = f(b) = (f \circ g)(a).$$

Ezért a folytonosságra vonatkozó átviteli elv szerint $f \circ g \in C\{a\}$.

Az előző tétel értelmében a

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = \sin(x^2)$$


függvény folytonos minden $a \in \mathbb{R}$ pontban, hiszen

$$h = f \circ g, \quad \text{ahol} \quad f(x) := \sin x \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := x^2 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

és f, g folytonos minden \mathbb{R} -beli pontban.

Függvényhatárérték esetében más a helyzet. Az összetett függvény általában nem „örökli” a külső függvény határértékét. Nézzük erről két példát!


1. példa.



Ebben az esetben

$$\boxed{\lim_0 (f \circ g_1) = 2 \neq 0 = \lim_1 f}.$$

2. példa.



Ebben az esetben

$$\boxed{\nexists \lim_0 (f \circ g_2)}.$$

Vegyük észre, hogy a példákban mindkét g_1, g_2 függvény felveszi az $y = 1$ értéket a 0-nak minden pontosított környezetében, valamint az f függvény nem folytonos az 1 pontban. A következő tétel azt állítja, hogy ez okozza a problémát.

10. Tétel (Az összetett függvény határértéke). Legyen $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ két valós függvény, amire $R_g \subset \mathcal{D}_f$ teljesül, és $a \in \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

$$a \in \mathcal{D}'_g, \quad \exists \lim_a g =: b \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{és} \quad b \in \mathcal{D}'_f, \quad \exists \lim_b f =: A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ekkor

1. ha $b \in \mathbb{R}$ úgy, hogy $f \in C\{b\}$, akkor az $f \circ g$ függvénynek van határértéke az a pontban, és

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right) = A,$$

azaz a kompozíció- és a határérték képzés sorrendje felcserélhető.

2. ha a g függvény nem veszi fel a b értéket az a egy pontosított környezetében, akkor az $f \circ g$ függvénynek van határértéke az a pontban, és

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \lim_{y \rightarrow b} f(y) = A.$$

Bizonyítás. Az $R_g \subset \mathcal{D}_f$ feltételből következik, hogy $\mathcal{D}_{f \circ g} = \mathcal{D}_g$.

Legyen $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_g \setminus \{a\}$ egy olyan sorozat, amire $\lim(x_n) = a$ teljesül. Jelölje

$$y_n := g(x_n) \in \mathcal{D}_f \quad \text{és} \quad z_n := f(y_n) = f(g(x_n)) = (f \circ g)(x_n) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ha igazolni tudjuk, hogy $\lim(z_n) = A$, akkor a függvényhatárértékre vonatkozó átviteli elv szerint a tétel mindkét állítása teljesül.

A tétel feltétele szerint $\exists \lim_a g = b$. Mivel $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_g \setminus \{a\}$, $\lim(x_n) = a$ teljesül, így a függvényhatárértékre vonatkozó átviteli elv szerint

$$(\star) \quad (y_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = b$$

teljesül. Ekkor

1. ha $f \in C\{b\}$, akkor (\star) miatt a folytonosságra vonatkozó átviteli elv szerint

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = f(b) = A.$$

2. tegyük fel, hogy g nem veszi fel a b értéket egy $\dot{K}(a)$ pontozott környezetben, azaz

$$\forall x \in \dot{K}(a) \cap \mathcal{D}_g: g(x) \neq b, \quad \text{ahol} \quad \dot{K}(a) := K(a) \setminus \{a\}.$$

Mivel $\lim(x_n) = a$, így véges sok index kivételével $x_n \in K(a)$. Véges sok tag elhagyása nem befolyásolja a határértéket, ezért feltételezhetők, hogy $x_n \in K(a)$ minden n -re. De $x_n \neq a$, ezért $x_n \in \dot{K}(a)$ minden n -re. Ekkor a g feltétele miatt $y_n = g(x_n) \neq b$ minden n -re. Ezzel (\star) -ot átírhatjuk az alábbi módon:

$$(\star\star) \quad (y_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f \setminus \{b\}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = b.$$

Mivel $\exists \lim_b f = A$, így $(\star\star)$ miatt a függvényhatárértékre vonatkozó átviteli elv szerint

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = A.$$

Mindkét esetben igazoltuk, hogy $\lim(z_n) = A$.

Megjegyzések.

- Ha $b \notin \mathcal{D}'_f$, akkor $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b)$, hiszen ekkor $f \in C\{b\}$, és csak a folytonosságot használtuk fel a bizonyítás 1. pontjában.
- Vegyük észre, hogy ha $b = \pm\infty$, akkor b nem egy számérték, amit a g függvény fel tud venni. Ezért ebben az esetben a tétel 2. állítása szerint az összetett függvény mindig „örökölni” fogja a külső függvény határértékét.

A tétel mindkét állításának eredménye a

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \lim_{y \rightarrow b} f(y) \quad (y = g(x) \rightarrow b, \text{ ha } x \rightarrow a)}$$

módon is írható, ami úgy tekinthető, mint a $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x))$ határértékben alkalmazott $y = g(x)$ helyettesítés. A tétel értelmében ez a helyettesítés akkor alkalmazható, ha

- f folytonos a $b \in \mathbb{R}$ pontban,

vagy

- g nem veszi fel a b értéket az a egy pontozott környezetében (pl. ha g invertálható, mondjuk nem állandó, lineáris függvény; vagy $b = \pm\infty$).

Megjegyzés. Már korábban alkalmaztuk a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{-x}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^y} \quad (y = -x \rightarrow \infty, \text{ ha } x \rightarrow -\infty)$$

helyettesítést. Ebben $a = -\infty$, $b = +\infty$,

$$g(x) := -x \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad f(y) := \frac{1}{e^y} \quad (y \in \mathbb{R}).$$

Mivel g nem veheti fel a $b = +\infty$ elemet, ezért a helyettesítés alkalmazható. ■