Čo je to tracheálna stenóza?

Tracheálna stenóza je zúženie dýchacích ciest, ktoré vám sťažuje dýchanie. Máte operáciu na otvorenie dýchacích ciest.

Čo je to Montgomery T-Tube (MTT)?

MTT je trubica v tvare písmena T. Je vyrobený z gumového materiálu nazývaného silikón. MTT sa používa na stentovanie (otvorenie) dýchacích ciest, ak máte tracheálnu stenózu.



Čo sa stane pred mojou operáciou?

Budete mať stretnutie na predprijímacom oddelení. Pri tomto stretnutí:

- Môžete podstúpiť nejaké testy, ktoré vás pripravia na operáciu. Môžu zahŕňať:
  - krvné testy
  - EKG (elektrokardiogram)
  - röntgen hrudníka
- Stretnete sa s predprijímacou sestrou. Vaša zdravotná sestra skontroluje vašu zdravotnú anamnézu. V prípade potreby môžete navštíviť aj iných zdravotníckych pracovníkov, ako napríklad:
  - anestéziológ (lekár, ktorý vám podá lieky, aby ste počas operácie spali a zostali v pohodlí)

    - farmaceut
    - logopéd. Porozprávajú sa s vami o tom, ako operácia ovplyvní vaše dýchanie, rozprávanie a prehĺtanie a pomôžu vám tieto zmeny zvládnuť. Môžu vám ukázať obrázky a videá alebo vám predstaviť niekoho, kto žije svoj život s MTT.
    - sociálny pracovník
- Stretnete sa s koordinátorkou hlavy a krku (NC), ktorá s vami porozpráva viac o vašej operácii. NC vás môže vziať na chirurgické oddelenie, kde sa stretnete s ostatnými členmi zdravotníckeho tímu.

Ako sa pripravím na operáciu?

- **Nejedzte ani nepite nič (vrátane žuvačiek alebo cukríkov) po polnoci v noci pred operáciou.** Keď idete na operáciu, váš žalúdok musí byť prázdny.
- Príďte do nemocnice 2 hodiny pred časom operácie. Prihláste sa na chirurgickej prijímacej jednotke (SAU). Je na 2. poschodí, Munk Wing vo všeobecnej nemocnici v Toronte.
- Po registrácii vám poskytneme intravenóznu linku (IV). Toto je malá ihla, ktorú vám vložíme do žily v ruke. Používame ho, ak potrebujete:
    - Tekutín
    - antibiotiká (lieky, ktoré ničia baktérie)
    - Liek proti bolesti

Čo sa stane po operácii?

1. Vezmeme vás na jednotku anestéziologickej starostlivosti o pacienta (PACU) alebo na zotavovaciu miestnosť.
2. Keď ste dostatočne hore a je to bezpečné, presunieme vás z PACU na chirurgickú jednotku hlavy a krku, plastov (budova 6 munkov).
3. Po príchode na chirurgické oddelenie vás umiestnime do jednotky Step Down. Jednotka Step Down je špeciálna oblasť. Staráme sa tu o pacientov, ktorých potrebujeme bližšie a častejšie kontrolovať. Zdravotná sestra je stále s vami.

Čo môžem očakávať na svojom tele?



Môžete mať steh, ktorý spája bradu s hrudníkom. To zabráni tomu, aby vám hlava klesla dozadu. Steh bude odstránený 3 až 5 dní po operácii alebo keď sa váš lekár domnieva, že je to bezpečné.



Môžete mať rez (rez) v spodnej časti krku.

V jednej z rúk budete mať intravenóznu linku (IV). IV je špeciálna ihla, ktorá sa vpichuje do žily v ruke alebo ruke. Je pripevnený k hadičke a taške visiacej na tyči.

Vašu IV používame na podávanie tekutín a liekov počas alebo po operácii. Infúziu zvyčajne vyberieme, keď ste pripravení ísť domov.

Ako sa budem cítiť po operácii?

Je normálne cítiť bolesť po operácii. Aby sme vám pomohli kontrolovať bolesť, môžeme vám poskytnúť prístroj na analgéziu kontrolovanú pacientom (PCA). Môžete stlačiť tlačidlo na tomto stroji a získať liek proti bolesti, keď ho potrebujete. Počas užívania liekov proti bolesti sa môžete cítiť ospalí alebo zmätení. Poskytneme vám viac informácií o vašom PCA.

Môžete mať veľa opuchov okolo tváre a krku. Tento opuch pomaly klesá počas 1. týždňa po operácii. Klesá až 6 týždňov po operácii.



Krátko po operácii môže byť pre vás ťažké vyčistiť sliny. Aby sme vám pomohli, používame odsávací stroj na odsávanie (odstraňovanie) nahromadených slín. Vaša zdravotná sestra vás naučí, ako používať prístroj na odsávanie. Odsávanie nie je bolestivé, ale niekedy je nepríjemné, pretože môže spôsobiť kašeľ.

Kedy sa môžem pohybovať?

Žiadame vás, aby ste po prebudení z operácie urobili nejaké cvičenia. Tieto jednoduché cviky vám pomôžu zotaviť sa. Vaša zdravotná sestra vám dá ďalšie pokyny a v prípade potreby vám môže pomôcť fyzioterapeut.

- **Hlboké dýchanie a kašeľ**
  Zhlboka sa nadýchnite a pokúste sa vykašliavať. Vaša zdravotná sestra vám s tým pomôže.
- **Pohybujte**
  prstami na nohách a pohybujte chodidlami tam a späť. To pomáha cirkulovať krv v nohách (pohybovať sa).
- **Chôdza**
  Deň po operácii vám zdravotná sestra pomôže vstať z postele. Môžete sedieť na stoličke a/alebo chodiť. Po 2 až 3 dňoch sa začnete cítiť lepšie. Užívanie liekov proti bolesti pred chôdzou môže pomôcť.

Aké zmeny môžem očakávať po operácii?

Dýchanie

Budete dýchať ústami a nosom, kým je váš MTT obmedzený.

Jesť

Postupne začnete jesť ústami. Začnete s tekutinami, potom prejdete na pyré a potom na pevné látky. Možno nebudete jesť pevnú stravu, kým pôjdete domov.

Váš logopéd vás bude naďalej navštevovať počas vašich následných návštev u lekára. Váš lekár alebo váš logopéd vám dá vedieť, kedy je pre vás bezpečné jesť pravidelné jedlo.

Hovoriaci

Váš hlas sa po operácii zmení. Možno máte v hlase chrapľavosť. Väčšina pacientov má tendenciu šepkať, keď hovoria. Váš lekár sa s vami porozpráva o akýchkoľvek zmenách vo vašom hlase.

Ako dlho zostanem v nemocnici?

Ako dlho zostanete v nemocnici, závisí od toho, ako dobre je vaša bolesť kontrolovaná a ako dobre sa vaša pokožka po operácii hojí. Pozrieme sa aj na to, ako dobre dokážete jesť, dýchať a starať sa o seba. V nemocnici môžete zostať 5 až 7 dní. Váš lekár vás môže v prípade potreby nechať v nemocnici dlhšie.

Čo sa stane pred odchodom z nemocnice?

- Ukážeme vám alebo členovi rodiny, ako sa starať o MTT doma. Táto brožúra obsahuje aj potrebné informácie.
- Koordinátor domácej a komunitnej starostlivosti (predtým CCAC) zabezpečí, aby vás zdravotná sestra domácej starostlivosti navštevovala každý deň tak dlho, ako budete potrebovať. Tieto návštevy sa skončia, keď sa obaja zhodnete, že je ten správny čas. Za túto službu nemusíte platiť.
- Vaša zdravotná sestra v domácej starostlivosti vám poskytne zásoby pre starostlivosť o MTT predtým, ako pôjdete domov. Pred odchodom z nemocnice si možno budete musieť nechať doručiť odsávací prístroj domov. Váš koordinátor sa s vami porozpráva o doručení.

Kontrola bolesti a nové lieky

- Dáme vám lieky na kontrolu bolesti, keď ste v nemocnici. V čase, keď odídete, by ste mali mať veľmi malú bolesť. Pred odchodom vám dáme predpis na lieky proti bolesti. Ak kontroluje vašu bolesť, ste pripravení opustiť nemocnicu. **Ak máte po odchode z nemocnice problémy s kontrolou bolesti, zavolajte svojho rodinného lekára alebo chirurga.**
- Pred prepustením vám dáme predpisy na lieky proti bolesti, zmäkčovadlá stolice a akékoľvek ďalšie nové lieky, ktoré ste začali v nemocnici.

- Môžete začať užívať lieky, ktoré ste užívali pred operáciou, pokiaľ ich váš lekár nezmenil.
- Ak váš lekár zmenil množstvo liekov, ktoré ste užívali predtým, alebo chce, aby ste začali užívať nový liek, lekárnik sa s vami porozpráva predtým, ako pôjdete domov.

Stravovanie a výživa

- Váš lekár alebo logopéd vám dá pokyny, aké potraviny jesť, keď ste doma. Dietológ sa porozpráva s vami a vašou rodinou, aby vám vysvetlil pokyny. **Postupujte podľa týchto pokynov na stravovanie, kým sa nevrátite na kontrolné stretnutie.**
- Ak sa vaše prehĺtanie zhorší alebo chudnete, keď ste doma, zavolajte do ordinácie svojho lekára.

Čo môžem urobiť, aby som zostal doma v bezpečí a pohodlí?

Črevná rutina

- Vaše lieky proti bolesti môžu spôsobiť zápchu. Pomôcť môže pitie veľkého množstva tekutín a konzumácia ovocia a zeleniny (potraviny s vysokým obsahom vlákniny).
- Ak potrebujete, môžete užívať zmäkčovače stolice, ktoré vám predpísal lekár.

Činnosti

- **Neplávajte.** Voda vám pôjde do pľúc a môžete sa utopiť. Buďte opatrní pri vode (napríklad na člne, na rybách alebo pri bazéne).
- **Nezdvíhajte viac ako 10 libier (asi 5 kilogramov).** Zdvíhanie ťažkých predmetov môže namáhať váš krk. Váš lekár sa s vami porozpráva o tom, kedy môžete opäť začať zdvíhať.
- **Neodchádzajte z domu bez zásob na starostlivosť o MTT.** Nikdy neviete, kedy budete potrebovať zásoby MTT, a to ani počas krátkych ciest.
- **Pri sprchovaní alebo umývaní vlasov zakryte MTT.** Pomocou ručnej sprchovej hlavice môžete ovládať, kam voda smeruje. Ak ho nemáte, prikryte si MTT suchou handričkou na tvár alebo si okolo krku voľne zaviažte uterák. Namierte sprchovú hlavicu na spodnú časť hrudníka.
- **Nakupujte potraviny, ktoré sa ľahko pripravujú.**
- **Predtým, ako sa pokúsite šoférovať, otestujte, ako veľmi môžete pohnúť krkom.** Ak nemôžete pohodlne otočiť krk, nie je bezpečné šoférovať.
- **Požiadajte svojich priateľov a rodinu, aby vám pomohli pri zotavovaní.**

- **Pravidelne navštevujte svojho lekára.**
- **Pokračujte v chodení von, stretávajte sa s priateľmi a užívajte si život!**

Čo potrebujem vedieť o MTT?

Váš MTT sú malé dýchacie cesty, takže sa vám môžu ľahko vyvinúť slizničné zátky. Je dôležité, aby ste sa o svoj MTT dobre starali. Starostlivosť o MTT vám pomôže udržať dýchacie cesty otvorené.

- Váš MTT musí byť vždy uzavretý, s výnimkou odsávania (čistenia). Ak necháte MTT bez krytu, existuje vyššie riziko tvorby slizničných zátok.
- Mali by ste mať doma chladný vaporizér s hmlou. Mal by byť pri posteli, keď v noci spíte. Pomôže to udržať sliznicu vlhkú a ľahšie ju odstránite, keď ju čistíte.

Ako sa mám starať o MTT, keď som doma?

Na začiatku budete musieť MTT čistiť dvakrát denne, potom podľa potreby. Vaša zdravotná sestra vám ukáže, ako to urobiť predtým, ako pôjdete domov z nemocnice.

Ak chcete vyčistiť MTT, postupujte podľa týchto krokov.

1. **Zozbierajte si čistiace prostriedky.** Väčšinu týchto potrieb získate z Home Care . Keď sa minú, môžete si ich kúpiť v drogérii alebo v obchode so zdravotníckymi potrebami.
   Na čistenie MTT budete potrebovať:
   - peroxid vodíka
   - normálny fyziologický roztok (slaná voda)
   - niekoľko výterov z uší (napríklad Q-Tips)
   - 2 čisté jednorazové poháre
   - gázové štvorce
   - # 10 Francúzske sacie katétre
   - odsávací stroj
   - zrkadlo
   - vazelína (napríklad vazelína®)
   - jedna 3 ml injekčná striekačka bez ihly

   Všetky tieto zásoby položte na rovný povrch, napríklad na stôl alebo dosku.

2. **Pripravte si čistiace prostriedky.**
   - Umyte si ruky.
   - Uistite sa, že je vaše zrkadlo nastavené tak, aby ste jasne videli svoj krk a MTT.

- Nalejte čistiace roztoky (peroxid vodíka a normálny fyziologický roztok) do čistých pohárov.
- Natiahnite normálny fyziologický roztok do 3 ml injekčnej striekačky.

3. **Vyčistite vonkajšiu stranu MTT**
   - Ponorte Q-tipy do peroxidu vodíka a použite ich na čistenie vonkajšej časti MTT. Použite ich aj na čistenie pokožky okolo tuby. Robte to, kým sa neuvoľnia všetky kôry a sekréty (unikajúce tekutiny). Na čistenie pokožky pod MTT môžete použiť gázové štvorce.
   - Opakujte s normálnym fyziologickým roztokom.
   - Keď je všetko suché, naneste tenkú vrstvu vazelíny na pokožku vedľa tuby. Pomôže to chrániť vašu pokožku ako ochrannú bariéru .
   - Zavolajte svojho lekára, ak je koža okolo MTT:
     - je červená
     - je opuchnutý
     - zapácha
     - vyteká hnis (žltkastá tekutina)

     Môžu to byť príznaky infekcie.

4. **Vyčistite vnútro MTT**
   - Zložte uzáver z MTT.
   - Pri nádychu vystriekajte slanú vodu z naplnenej injekčnej striekačky do otvorenej hadičky. To pomáha uvoľniť sliznicu a uľahčuje vykašliavanie a odstraňovanie odsávaním.
   - Kašľajte a vyčistite čo najviac hlienu.
   - Pomocou francúzskeho sacieho katétra #10 pripojeného k odsávaciemu stroju a odsávaciemu stroju vyčistite vnútro MTT hore aj dole:
     - Zapnite odsávací stroj.
     - **Nasávanie nahor** jemným ohnutím vonkajšej časti MTT nadol.
     - Vložte sací katéter 1 až 2 palce do MTT.
     - Položte palec na otvor katétra, aby ste zabezpečili odsávanie.
     - Pri odsávaní držte palec na otvore a potom katéter vyberte. Nemali by ste odsávať dlhšie ako 10 sekúnd.
     - Opláchnite katéter v slanej vode.
     - **Nasávanie jemným** ohnutím vonkajšej časti MTT nahor.
   - Zopakujte vyššie uvedené kroky.
   - Po dokončení čistenia vypnite odsávací stroj.
   - Nasaďte späť uzáver na MTT.

dôležité: Po vyčistení MTT zatvorte alebo uzavrite.

Odsávanie nahor



Sací katéter je nasmerovaný nahor ohnutím vonkajšej časti MTT nadol.

Odsávanie smerom nadol



Sací katéter je nasmerovaný nadol ohnutím vonkajšej časti MTT nahor.

Ak máte problémy s dýchaním, skúste vyčistiť MTT striekaním slanej vody a odsávaním.

Ak sa vaše dýchanie nevráti do normálu, nechajte MTT neobmedzené a zavolajte lekára alebo choďte na najbližšiu pohotovosť.

Ako dlho budem mať MTT?

Je normálne mať MTT asi 4 až 6 týždňov. Keď je pripravený na odstránenie:

- Vrátite sa do nemocnice a zostanete asi 1 až 2 dni.
- Váš chirurg vám skontroluje dýchacie cesty na operačnej sále. Ak ste správne uzdravení, odstránia MTT a nahradia ho inou trubicou nazývanou **tracheostomická trubica**. Bude to trvať asi 1 hodinu a urobí sa to počas spánku. Táto tracheostomická trubica zostane cez noc, aby sa zabezpečilo, že vaše dýchacie cesty zostanú otvorené.

- Tracheostomická trubica bude odstránená deň po jej vložení. Odstráni sa, keď budete hore pri posteli. Jeho odstránenie je rýchle a bezbolestné. Budete mať malý obväz na zakrytie miesta tracheostómie.
- Potom vás prepustia domov.
- Zdravotná sestra domácej starostlivosti bude tento obväz meniť každý deň, kým sa nezahojí.

Kedy by som mal vyhľadať lekársku pomoc?

Ak máte niektorý z týchto príznakov, zavolajte koordinátora lekára alebo zdravotnú sestru:

- horúčka (teplota vyššia ako 38,5 °C alebo 98,6 °F)
- ťažkosti s dýchaním
- vykašliavanie žltého alebo zeleného hlienu alebo hlienu, ktorý zapácha
- vykašliavanie čerstvej červenej krvi
- začervenanie alebo zvýšená bolesť v mieste rezu
- krvácanie alebo akýkoľvek iný únik z miesta rezu

Komu môžem zavolať, ak mám nejaké otázky?

Vaša koordinátorka klinickej sestry odpovie na všetky otázky alebo obavy, ktoré máte počas prvých 2 týždňov, keď ste doma.

Koordinátorka
klinickej sestry Telefón: 416 340 4665

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, môžete tiež zavolať svojmu lekárovi alebo logopédovi.