

RESOLUÇÃO DE EXAME DE RECUPERAÇÃO
(VERSÃO A)

PRIMEIRA PARTE

QUESTÃO 1.—

(a) Temos,

$$\frac{n - \sin(n)}{\sqrt{n^3} + 2} = \frac{1 - \sin(n)/n}{\sqrt{n} + 2/\sqrt{n}} \rightarrow 0 (= \frac{1}{\infty}).$$

(b) Considerando $a_n = n^2 + 2^n$ obtemos,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2 + 2^{n+1}}{n^2 + 2^n} = \frac{(n+1)^2/2^n + 2}{n^2/2^n + 1} \rightarrow \frac{0+2}{0+1} = 2.$$

Como $(a_{n+1}/a_n) \rightarrow 2$ concluímos que $(\sqrt[n]{a_n}) = (\sqrt[n]{n^2 + 2^n}) \rightarrow 2$.

(c) Neste caso,

$$\frac{3^n + n^2}{2^{2n} - 1} = \frac{3^n(1 + n^2/3^n)}{4^n(1 - 1/4^n)} = \left(\frac{4}{3}\right)^n \frac{1 + n^2/3^n}{1 - 1/4^n} \rightarrow 0 \cdot \frac{1+0}{1-0} = 0.$$

(d) Temos,

$$\left(\frac{n-2}{n+2}\right)^{2n+3} = \left(\frac{(n+2)-4}{n+2}\right)^{2n+3} = \left(\left(1 + \frac{-4}{n+2}\right)^{n+3/2}\right)^2 = \left(\left(1 + \frac{-4}{n+2}\right)^{n+2} \left(1 + \frac{-4}{n+2}\right)^{-1/2}\right)^2$$

O produto à direita tende para $(e^{-4})^2 = e^{-8}$.

QUESTÃO 1.2(A)—A verificação de que $x_1 > x_0$ é trivial e deixa-se ao cuidado do leitor. A hipótese de indução é então: $x_{n+1} > x_n$, sendo a tese: $x_{n+2} > x_{n+1}$. Demonstramos que a hipótese implica a tese do seguinte modo:

$$x_{n+1} > x_n \Rightarrow 2x_{n+1} > 2x_n \Rightarrow 2x_{n+1} + 1 > 2x_n + 1 \Rightarrow \sqrt{2x_{n+1} + 1} > \sqrt{2x_n + 1} \equiv x_{n+2} > x_{n+1}.$$

QUESTÃO 1.2(B)—Nas condições indicadas tem-se $x_0 \leq x_n \leq 3$ pelo que a sucessão é limitada, como também é monótona resulta que é convergente. Digamos que $(x_n) \rightarrow \alpha$. Como (x_{n+1}) é uma subsucessão de (x_n) tem-se igualmente que $(x_{n+1}) \rightarrow \alpha$. Assim, passando ao limite a relação de recorrência, obtemos

$$\alpha = \sqrt{2\alpha + 1} \Rightarrow \alpha^2 = 2\alpha + 1 \equiv \alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0.$$

A equação da direita tem duas soluções, $1 - \sqrt{2}$ e $1 + \sqrt{2}$. Como α tem que ser positivo, só pode ser $1 + \sqrt{2}$.

QUESTÃO 1.3—Mais uma vez a verificação de que a relação é verdadeira para $n = 1$ é trivial e deixa-se a cargo do leitor. A hipótese de indução é então:

$$\sum_{k=1}^n (k-1)(3k+2) = (n-1)n(n+2)$$

e a tese:

$$\sum_{k=1}^{n+1} (k-1)(3k+2) = n(n+1)(n+3).$$

A tese pode estabelecer-se a partir da tese, do seguinte modo:

$$\sum_{k=1}^{n+1} (k-1)(3k+2) = \sum_{k=1}^n (k-1)(3k+2) + n(3n+5) \stackrel{\text{H.I.}}{=} (n-1)n(n+2) + n(3n+5) = n(n+1)(n+3).$$

QUESTÃO 1.4(A)—Em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ a função f obtém-se de funções elementares (que são contínuas) usando operações algébricas e composição de funções, logo é contínua naquele conjunto.

QUESTÃO 1.4(B)—Sendo f contínua em $x = 0$ tem-se que

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(3x)}{x}.$$

Para calcular este limite podemos fazer a mudança de variável $x = \tan(u)/3$. Tem-se assim:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(3x)}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\tan(u)/3} = \lim_{u \rightarrow 0} 3 \cdot \frac{(\cos u) \cdot u}{\sin u} = \lim_{u \rightarrow 0} 3 \cos u \frac{u}{\sin u} = 3.$$

QUESTÃO 1.4(C)—É fácil verificar que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$. Atendendo à definição de limite existem $K > 0$ e $L < 0$ tais que em $] -\infty, L] \cup [K, +\infty[$ se tem $|f(x)| < 1$. (sendo por isso f limitada naquele conjunto). Por outro lado, como f é contínua f é limitada em $[L, K]$. Assim f é limitada em $\mathbb{R} =]-\infty, L] \cup [K, +\infty[\cup [L, K]$.

QUESTÃO 1.5—A função $h(x) = f(x) - g(x)$ é contínua em $[0, 1]$ (por ser a diferença de duas funções contínuas). Por outro lado, $h(0) = f(0) - g(0) = 0 - 1 = -1 < 0$ e $h(1) = f(1) - g(1) = 1 - 0 = 1 > 0$. Assim, pelo teorema do valor intermédio de Bolzano tem-se que existe $c \in [0, 1]$ tal que $h(c) = f(c) - g(c) = 0$, ou seja, $f(c) = g(c)$.

QUESTÃO 1.6(A)—Falsa.

QUESTÃO 1.6(B)—Verdadeira.

QUESTÃO 1.6(A)—Falsa.

SEGUNDA PARTE

QUESTÃO 2.1(A)—Tem-se,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(1/x)(\ln x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(1/x)}{1/x} \frac{\ln x}{x}$$

o primeiro factor corresponde a um limite notável e tende para 1. Ao segundo factor corresponde uma indeterminação do tipo ∞/∞ . Recorrendo à regra de Cauchy temos:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Assim, concluímos que o limite original é 0.

QUESTÃO 2.1(B)—Temos que,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln(1/x)]^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp(x \ln(\ln(1/x))) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp\left(\frac{\ln(\ln(1/x))}{1/x}\right).$$

Recorrendo à regra de Cauchy,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln(\ln(1/x)))'}{(1/x)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{(-1/x^2)/(1/x)}{\ln(1/x)}}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\ln(1/x)} = 0$$

Assim o limite original é $\exp(0) = 1$.

QUESTÃO 2.2—Calculando a derivada através das derivadas esquerda e direita obtemos,

$$f'(-1^-) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{e^{-(x+1)} - 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} -\frac{e^{-(x+1)} - 1}{-(x + 1)} = -1$$

$$f'(-1^+) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{(x+1)} - 1}{x + 1} = 1.$$

Como as derivadas laterais são diferentes a função não é diferenciável em $x = -1$.

QUESTÃO 2.3(A)—A função é crescente em $[1, +\infty[$ (derivada positiva) e decrescente em $] - \infty, 1]$ (derivada negativa).

QUESTÃO 2.3(B)—A função apresenta um mínimo local em $x = 1$ (que é também um mínimo global).

QUESTÃO 2.4(A)—Tem-se que $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$. Por outro lado é claro que $f^{(4)}(0) > 0$. Como a ordem da primeira derivada que não se anula (a seguir à primeira) é par, temos um extremo. Como essa derivada é positiva esse extremo é um mínimo local.

QUESTÃO 2.4(B)—Sendo $R_4(x)$ o resto de Lagrange de ordem 4, o erro cometido aproximando a função pelo respectivo polinómio de Taylor de ordem 4 é

$$|f(x) - (1 + x^4/3)| = \left| \frac{f^{(5)}(\theta)}{5!} x^5 \right| = \frac{|f^{(5)}(\theta)|}{5!} |x|^5 \leq \frac{1}{5!} \cdot 1^5 = \frac{1}{120} < \frac{1}{100}.$$

QUESTÃO 2.5—Tem-se uma indeterminação do tipo 0/0. Aplicando a regra de Cauchy, obtemos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^{x^2} \cos^2 t \, dt \right)'}{(1 - \cos x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos^2(x^2)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{x}{\sin x} \cos^2(x^2) = 2.$$

QUESTÃO 2.6—O valor da área indicada é dado por

$$\int_0^1 (e^x - e^{-x}) \, dx = [e^x + e^{-x}]_0^1.$$

QUESTION 2.7—Considerando a substituição indicada temos que $x = e^t$ e, conseqüentemente, $dx = e^t \, dt$. Temos então,

$$\int \frac{\ln x}{x(\ln x - 1)^2} \, dx = \int \frac{t}{e^t(t-1)^2} e^t \, dt = \int \frac{t}{(t-1)^2} \, dt = \int \frac{A}{(t-1)^2} + \frac{B}{t-1} \, dt = A \int \frac{1}{(t-1)^2} + B \int \frac{1}{t-1} \, dt$$

onde os coeficiente A e B podem ser calculados pelo processo usual. Continuando,

$$A \int \frac{1}{(t-1)^2} + B \int \frac{1}{t-1} \, dt = -A \int \frac{-1}{(t-1)^2} + B \ln|t-1| = -\frac{A}{t-1} + B \ln|t-1|$$

A primitiva final pode agora obter-se substituindo t por $\ln x$.

QUESTÃO 2.8—Começando por calcular o raio de convergência, obtém-se:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{\sqrt{n^3+5}}}{\frac{n+2}{\sqrt{(n+1)^3+5}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} \sqrt{\frac{(n+1)^3+5}{n^3+5}} = 1.$$

Ficamos assim a saber que a série converge absolutamente no intervalo $] -1, 1[$ e diverge em $] -\infty, -1[\cup] 1, +\infty[$. Os casos $x = 1$ e $x = -1$ têm que ser estudados particularmente.

Para $x = 1$ obtem-se a série $\sum (n+1)/\sqrt{n^3+5}$. Observando a diferença de “grau” entre o numerador e o denominador, conclui-se que esta série é comparável com a série de Dirichlet $\sum 1/n^{1/2}$. Recorrendo ao critério geral de comparação:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{\sqrt{n^3+5}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3+5} + \sqrt{n}}{\sqrt{n^3+5}} = 1,$$

confirmando que as séries têm a mesma natureza, sendo por isso ambas divergentes (a natureza da série de Dirichlet utilizada é conhecida).

No caso $x = -1$ obtem-se a série alternada $\sum (-1)^n (n+1)/\sqrt{n^3+5}$. A série dos módulos é a série anterior (que é divergente) pelo que esta série não é absolutamente convergente. Contudo, aplicando o critério de Leibniz, verifica-se facilmente que a série converge, sendo por isso simplesmente convergente.