



LABORATORIO ALEMANY

LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Monte Esquinza, 25,
entresuelo izq. 28010 Madrid
tel. 91 308 11 12
mov. 686 26 07 36
administracion@alemanylab.com

DE TORO DE MURGA, JAVIER 29 años

FECHA: 30/07/2026

PRESCRIPCIÓN DEL DR.:

Alessandra Aloe Cavani

HEMATOLOGIA

Análisis	Resultado	Unid.	Val. Ref.
SERIE BLANCA			
LEUCOCITOS	5.0	$\times 10^3/\text{mm}^3$	[4 - 10]
LINFOCITOS %	34	%	[20 - 40]
MONOCITOS %	* 15	%	[2 - 10]
SEGMENTADOS %	47	%	[30 - 70]
EOSINOFILOS %	3	%	[1 - 5]
BASOFILOS %	1	%	[0 - 1]
LINFOCITOS	1.70	$\times 10^3/\text{mm}^3$	[1 - 4]
MONOCITOS	0.75	$\times 10^3/\text{mm}^3$	[0.35 - 0.95]
SEGMENTADOS	2.35	$\times 10^3/\text{mm}^3$	[1.8 - 8]
EOSINOFILOS	0.15	$\times 10^3/\text{mm}^3$	[0.01 - 0.5]
BASOFILOS	0.05	$\times 10^3/\text{mm}^3$	[0 - 0.15]
SERIE ROJA			
HEMATIES	5.18	mill/mm^3	[4.3 - 5.5]
HEMOGLOBINA	15.3	g/dl	[14 - 18]
HEMATOCRITO	46.8	%	[40 - 50]
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO	88.5	fl	[80 - 98]
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA	28.6	pg	[27 - 33]
CONC. HEMOGL. CORP. MEDIA	32.8	%	[30 - 36]
SERIE PLAQUETARIA			
PLAQUETAS	151	$\times 10^3/\text{mm}^3$	[140 - 450]
VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO	11.8	fl	[5 - 12]
PLAQUETOCRITO	* 41.3	%	[10 - 38]
PDW	15.7	fl	[0 - 50]
ERITROSEDIMENTACIÓN			
V.S.G. 1ª HORA	10	mm/h	[0 - 15]
V.S.G. 2ª HORA	17	mm/h	[0 - 30]
INDICE DE KATZ	9.25		

HEMOSTASIA

Análisis	Resultado	Unid.	Val. Ref.
TIEMPO DE PROTROMBINA			
TIEMPO CONTROL	13	segundos	[10 - 15]
TIEMPO DE PROTROMBINA	13	segundos	[10 - 15]
ACTIVIDAD DE PROTROMBINA (I. QUICK)	100	%	[70 - 120]
I.N.R.	1.00		
FACTORES DE COAGULACION			
FIBRINOGENO (Factor I)	* 189	mg/dl	[200 - 393]

Análisis		Resultado	Unid.	Val. Ref.
METABOLISMO DE GLUCIDOS				
GLUCOSA		78	mg/dl	[65 - 110]
FRUCTOSAMINA		239	μmol/L	[1 - 285]
HEMOGLOBINA GLICOSILADA		5.40	%	<5,7%Normal 5,7-6,4% ..Sugestivo Prediabetes >=6,5%Diabetes
METABOLISMO DE PURINAS				
ACIDO URICO		5.8	mg/dl	[3.5 - 7.7]
METABOLISMO RENAL				
UREA	*	49	mg/dl	[15 - 48]
CREATININA		1.02	mg/dl	[0.7 - 1.4]
METABOLISMO LIPIDICO				
COLESTEROL TOTAL	*	212	mg/dl	[122 - 200]
TRIGLICERIDOS		88	mg/dl	Nivel deseable
Nivel deseable: <150mg/dl Nivel límite superior: 150-200mg/dl Nivel alto: >200mg/dl				
AMINOACIDOS				
HOMOCISTEINA		10.30	μmol/l	[0.1 - 12]
METABOLISMO HEPATICO				
AST (GOT)		33	UI/l	[2 - 40]
ALT (GPT)		33	UI/l	[2 - 42]
GAMMA - GT		15	UI/l	[11 - 50]
BILIRRUBINA TOTAL		0.50	mg/dl	[0.3 - 1.2]
BILIRRUBINA DIRECTA		0.10	mg/dl	[0.1 - 0.3]
BILIRRUBINA INDIRECTA		0.40	mg/dl	[0.1 - 0.8]
METABOLISMO DEL HIERRO				
HIERRO		69	μg/dl	[65 - 175]
FERRITINA		220	ng/ml	[30 - 400]
VIT. B 12 (CIANOCOBALAMINA)		723	pg/ml	Deficiencia: Inf. a 200.80 pg/mL Marginal: 200.80 - 299.90 pg/mL Normal: Sup. a 299.90 pg/mL
ACIDO FOLICO		5.40	ng/ml	Deficiencia: Inf. a 3.09 ng/ml Marginal: 3.09 - 4.42 ng/ml Normal: Sup. a 4.42 ng/ml
METABOLISMO DEL CALCIO				
CALCIO		9.4	mg/dl	[8.5 - 11]
FOSFORO		4.34	mg/dl	[2.5 - 5]
PROTEINAS				
PROTEINAS TOTALES		6.83	g/dl	[6 - 8.3]

Análisis	Resultado	Unid.	Val. Ref.
VITAMINAS			
VITAMINA B1 (TIAMINA)	66.34	µg/l	[28.2 - 84.8]
VITAMINA B6 (PIRIDOXAL FOSFATO)	21.11	ng/ml	[4.9 - 30]
VITAMINA D (25 OH)	20.59	ng/ml	DEFICIT: Adulto: <20.0 ng/ml <14años: <15.0ng/ml INSUFICIENTE: Adulto: 20-29.99 ng/ml <14años: 5.0-30.0ng/ml SUFICIENTE: Adulto: 30-100 ng/ml <14 años: 20-100 ng/ml TOXICIDAD: >100 ng/ml
ELEMENTOS MINERALES			
MAGNESIO	0.89	mmol/l	[0.66 - 1.07]
SELENIO	113.67	µg/l	[63.19 - 157.98]
ZINC	690.54	µg/l	[569 - 1467]

HORMONAS

Análisis	Resultado	Unid.	Val. Ref.
ANDROGENOS			
TESTOSTERONA	631.12	ng/dl	
HOMBRES: 20-49 años: 249 - 836 ng/dl >50 años: 193 - 740 ng/dl			MUJERES: 20-49 años: <48 ng/dl >50 años: <41 ng/dl
<u>Según estadios de Tanner:</u>			
HOMBRES: Tanner 1: <2.5 ng/dl Tanner 2: <432 ng/dl Tanner 3: 65 - 778 ng/dl Tanner 4: 180 - 763 ng/dl Tanner 5: 188 - 882 ng/dl			MUJERES: Tanner 1: <6.1 ng/dl Tanner 2: <10.4 ng/dl Tanner 3: <23.7 ng/dl Tanner 4: <26.8 ng/dl Tanner 5: 4.6 - 38.3 ng/dl
DEHIDROEPIANDROSTERONA	3.11	ng/ml	[0.52 - 5.18]
GLUCOCORTICOIDES			
HORMONA ADRENOCORTICOTROPA	30.18	pg/ml	[0 - 63.3]
CORTISOL BASAL	16.29	µg/dl	[6.02 - 18.4]
HORMONA DEL CRECIMIENTO			
HORMONA DEL CRECIMIENTO (Somatotropina)	0.29	ng/ml	[0 - 2.47]
HORMONAS TIROIDEAS			
TRIYODOTIRONINA LIBRE (FT3)	* 2.35	pg/ml	[2.84 - 4.39]
AMBOS: 1-12 meses:2.15 - 5.83 pg/ml 1-5 años:2.41 - 5.50 pg/ml 6-10 años:2.53 - 5.22 pg/ml 11-19 años: 2.56 - 5.01 pg/ml			
MUJERES: 20-39 años: 2.38 - 4.37 pg/ml 40-69 años: 2.43 - 3.98 pg/ml >70 años: 2.37 - 3.78 pg/ml			HOMBRES: 20-39 años: 2.84 - 4.39 pg/ml 40-69 años: 2.59 - 4.26 pg/ml >70 años: 2.58 - 3.85 pg/ml
EMBARAZADAS: 1º trimestre: 2.46 - 3.89 pg/ml 2º trimestre: 2.09 - 3.55 pg/ml 3º trimestre: 2.01 - 3.27 pg/ml			
T3 REVERSE	0.22	ng/ml	[0.17 - 0.44]
TIROXINA LIBRE (FT4)	16.80	pmol/l	[13.4 - 21.26]
AMBOS: 1-12 meses:11.86 - 25.64 pmol/l 1-5 años:12.37 - 22.81 pmol/l 6-10 años:12.50 - 21.52 pmol/l 11-19 años: 12.63 - 21.01 pmol/l			
MUJERES: 20-39 años: 12.50 - 20.36 pmol/l 40-69 años: 11.47 - 19.59 pmol/l >70 años: 12.20 - 20.20 pmol/l			HOMBRES: 20-39 años: 13.40 - 21.26 pmol/l 40-69 años: 12.50 - 21.26 pmol/l >70 años: 12.10 - 20.20 pmol/l
EMBARAZADAS: 1º trimestre: 12.11 - 19.59 pmol/l 2º trimestre: 9.66 - 17.01 pmol/l 3º trimestre: 8.38 - 15.59 pmol/l			

HORMONAS

Análisis	Resultado	Unid.	Val. Ref.
TIROTROPINA (TSH)	1.87	μIU/ml	[0.81 - 4.33]
AMBOS:			
1-12 meses:0.73 - 8.35 μIU/ml			
1-5 años:0.70 - 5.97 μIU/ml			
6-10 años:0.60 - 4.84 μIU/ml			
11-19 años: 0.51 - 4.30 μIU/ml			
MUJERES:			
20-39 años: 0.50 - 5.10 μIU/ml			
40-69 años: 0.54 - 4.07 μIU/ml			
>70 años: 0.28 - 3.45 μIU/ml			
HOMBRES:			
20-39 años: 0.81 - 4.33 μIU/ml			
40-69 años: 0.45 - 3.67 μIU/ml			
>70 años: 0.31 - 3.83 μIU/ml			
EMBARAZADAS:			
1º trimestre: 0.33 - 4.59 μIU/ml			
2º trimestre: 0.35 - 4.10 μIU/ml			
3º trimestre: 0.21 - 3.15 μIU/ml			

CATECOLAMINAS EN SANGRE			
SEROTONINA	145.14	ng/ml	[50 - 200]

SEROLOGIA

Análisis	Resultado	Unid.	Val. Ref.
SEROLOGIA HEPATITIS B			
Ag HBs	1.90 POSITIVO	Índice	Negativo: Inf.a 0.9 Índice Indeterminado: 0.9-0.99 Índice Positivo: Sup.a 0.99 Índice

Se recomienda realizar el test de confirmación del AgHBs.
Si el resultado no cuadra con la historia clínica del paciente, remitir nueva muestra.

SEROLOGIA HEPATITIS C			
Ac Totales HEPATITIS C	0.10 NEGATIVO		Negativo: Inf.a 0.80 Indeterminado: 0.80 - 0.99 Positivo: Sup.=a 1.00

SEROLOGIA VIH			
Anticuerpos HIV tipo I / II	0.12 NEGATIVO		Negativo: Inf.a 1.00 Indeterminado: = a 1.00 Positivo: Sup.a 1.00

SEROLOGIA BORRELIA			
Ac IgM BORRELIA BURGDORFERI	0.17 NEGATIVO		Negativo: Inf.a 0.90 Indeterminado: 0.90 - 1.09 Positivo: Sup.a 1.09

NOTA: Pueden haber falsos positivos por otras espiroquetas o enfermedades inmunológicas, así como su permanencia positiva elevada durante años. Se recomienda realizar pruebas moleculares que complementen este resultado.

Ac IgG BORRELIA BURGDORFERI	<5 NEGATIVO	U/ml	Negativo: Inf. 10.0 UA/ml Indeterminado: 10.0-15.0 UA/ml Positivo: Sup.15.0 UA/ml
-----------------------------	-------------	------	---

SEROLOGIA TREPONEMA			
VDRL	NEGATIVO		Negativo

Análisis	Resultado	Unid.	Val. Ref.
PRUEBAS REUMATICAS			
PROTEINA "C" REACTIVA	2.2	mg/l	[0 - 5]
FACTOR REUMATOIDE	4.1	UI/ml	[0 - 14]
ANTIESTREPTOLISINA "O"	25	UI/ml	[0 - 200]

Ac NO ORGANO ESPECIFICOS

Ac ANTI-NUCLEARES (ANA)	NEGATIVO
	Título, Patrón: (AC-0)

De acuerdo con las recomendaciones internacionales, nuestro laboratorio ha implementado la nomenclatura ICAP para la interpretación de los anticuerpos antinucleares. Con esta nomenclatura, se busca la armonización y estandarización facilitando unas guías para el informe de resultados y su interpretación. Con ella se han definido 30 patrones diferentes codificados (AC+número), correspondiendo:

- el AC-0 al patrón negativo,
- los AC-1 a AC-14 y AC-29 a los patrones Nucleares
- los AC-15 a AC-23 a los patrones Citoplasmáticos
- los AC-24 a AC-28 a los patrones Mitóticos.

Ac ANTI-MITOCONDRIALES (AMA)	NEGATIVO	Título	Negativo: Inf.a 1/40 Título Positivo: Sup.=a 1/40 Título
------------------------------	----------	--------	---

Ac ANTIMUSCULATURA

Ac ANTI-MUSCULO LISO (SMA)	NEGATIVO	Negativo: Inf. a 1/40 Positivo: Sup= a 1/40
----------------------------	----------	--

Ac ANTITIROIDEOS

Ac ANTI-TIROGLOBULINA	16.50 NEGATIVO	UI/ml	[0 - 115]
Ac ANTI-TIROPEROXIDASA (TPO)	40.70 POSITIVO	UI/ml	[0 - 34]

INMUNOGLOBULINAS

INMUNOGLOBULINA G	1174	mg/dl	[700 - 1600]
INMUNOGLOBULINA A	261	mg/dl	[70 - 400]
INMUNOGLOBULINA M	68	mg/dl	[40 - 230]
INMUNOGLOBULINA E	45.50	KUI/l	[0 - 100]

Inferior a 1 año: < 1.50 UI/mL
 1 año: < 15.0 UI/mL
 2 - 5 años: < 60.0 UI/mL
 6 - 9 años: < 90.0 UI/mL
 10 - 15 años: < 200 UI/mL
 Superior 15 años: < 100 UI/mL

Ag. DE HISTOCOMPATIBILIDAD

HLA-B 27	NEGATIVO
----------	----------

NOTA: Aproximadamente un 8 % de la población normal es portador del antígeno HLA B27.
 Por otro lado, el antígeno HLA B27 está presente en el 89 % de los pacientes con Espondilitis Anquilosante, en el 79 % de los pacientes con Síndrome de Reiter y en un 42 % de los pacientes con Artritis Reumatoide Juvenil.

No obstante, la presencia de este antígeno no es diagnóstico, sino que representa un factor de riesgo para estas enfermedades y no todo individuo portador acabará desarrollando una de estas enfermedades.

Valores intermedios se consideran posibles reacciones cruzadas con otros antígenos o baja expresión del antígeno HLA B-27.

Análisis	Resultado	Unid.	Val. Ref.
MARCADORES TUMORALES			
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO	2.15	ng/ml	[0 - 5]

Fumadores < 6.50 ng/mL.

NOTA: Los resultados del CEA no son una prueba diagnóstica sino que siempre deben ser interpretados junto con la historia clínica y los resultados de otras pruebas de imagen en el seguimiento de los pacientes con cáncer.

Se pueden observar niveles elevados de este marcador en pacientes con enfermedades benignas: hepatopatías, insuficiencia renal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

Existen diferencias de resultados entre los distintos reactivos y metodologías, al utilizar anticuerpos distintos, por lo que es recomendable hacer siempre el seguimiento en un mismo laboratorio.

CARBOHIDRATO 19.9	9.18	U/mL	[0 - 39]
-------------------	------	------	------------

NOTA: Los resultados del CA 19.9 no siempre tendrán valor diagnóstico (este marcador no es específico ni de órgano ni de tipo de neoplasia) y siempre deben ser interpretados junto con la historia clínica y los resultados de otras pruebas complementarias en la orientación de los pacientes con neoplasia o con sospecha.

Se pueden observar concentraciones elevadas de este marcador en pacientes con enfermedades benignas pulmonares o gastrointestinales, endometriosis, quistes ováricos, hepatopatías, insuficiencia renal, pancreatitis, colestasis, quistes mucinosos o bronquiectasias. Por otro lado, pueden aparecer resultados falsamente negativos en personas que genéticamente no presentan el grupo sialil de Lewis (fenotipo Lewis negativo: 3-7% de la población).

Importante! Pueden existir diferencias de resultados entre reactivos de distintos fabricantes debido al uso de anticuerpos distintos u otras causas atribuibles a la prueba (interferencia por anticuerpos heterófilos, HAMA, factores reumatoides, etc.), por lo que es recomendable hacer siempre el seguimiento en un mismo laboratorio y con un mismo método.

MARCADORES PROSTATICOS

Ag PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.40	ng/ml	[0 - 4]
--------------------------------	------	-------	-----------

Los resultados del PSA no son una prueba diagnóstica sino que siempre deben ser interpretados junto con la historia clínica y los resultados de otras pruebas de imagen en el seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata.

Se pueden observar niveles elevados de este marcador en pacientes con enfermedades benignas: insuficiencia renal, hiperplasia prostática o prostatitis.

Existen diferencias de resultados entre los distintos reactivos y metodologías, al utilizar anticuerpos distintos, por lo que es recomendable hacer siempre el seguimiento en un mismo laboratorio.


PSA - LIBRE	0.19	ng/ml	[0 - 1.2]
Indice PSA LIBRE/PSA	47.50	%	[10 - 100]

En pacientes con PSA total entre 4.0 - 10.0 ng/ml un índice superior al 20% es sugestivo de hiperplasia prostática benigna.

ESTUDIO PROTEINAS

PROTEINAS TOTALES	6.83	g/dl	[6.4 - 8.3]
ALBUMINA (%)	66.0	%	[55.8 - 66.1]
COCIENTE A/G	* 1.94		[0.99 - 1.81]
GLOBULINAS (%)	34.00	%	[29 - 48]
alfa-1 GLOBULINA	* 2.80	%	[2.9 - 4.9]
alfa-2 GLOBULINA	* 6.60	%	[7.1 - 11.8]
β- GLOBULINA	9.60	%	[8.4 - 13.1]

Análisis	Resultado	Unid.	Val. Ref.
gamma-GLOBULINA	15.0	%	[11.1 - 18.8]



COMENTARIO PROTEINOGRAMA No se observa ninguna banda sugestiva de componente monoclonal.

alfa-FETOPROTEINA	<2.72	µg/l	[0 - 7]
-------------------	-------	------	-----------

Medianas Gestación:

14 Semanas	29.77	ug/l
15 Semanas	34.14	ug/l
16 Semanas	39.15	ug/l
17 Semanas	44.89	ug/l
18 Semanas	51.48	ug/l
19 Semanas	59.03	ug/l
20 Semanas	67.68	ug/l
21 Semanas	77.61	ug/l

ORINA

Análisis

BIOQUIMICA ORINA

DIURESIS en 24 horas	*	3100	ml/24 h.	[1000 - 2800]
CREATININA (Concentracion 24 horas)		0.78	g/l	
ACLARAMIENTO DE CREATININA	*	171.90	ml/minut	[94 - 140]

SISTEMÁTICO DE ORINA

DENSIDAD		1000	mg/dl	[1000 - 1030]
pH		5		[4.6 - 8]
PROTEINURIA		NEGATIVO	g/l	[0 - 0.1]
CUERPOS CETONICOS		NEGATIVO	mmol/l	[0 - 1]
GLUCOSURIA		NEGATIVO	mmol/l	[0 - 5]
BILLIRRUBINURIA		NEGATIVO		
UROBILINOGENO		NORMAL	mg/dl	[0 - 4]
ERITROCITOS/HGB		NEGATIVO	RBC/μl	[0 - 5]
NITRITOS		NEGATIVO		
LEUCOCITURIA		NEGATIVO	WBC/μl	[0 - 5]
SEDIMENTO		Se observan escasos cristalesl de oxalato cálcico en el sedimento obtenido por centrifugación.		

INFORME VALIDADO POR

Ana Tabernero García

Facultativo Especialista

Colegiado nº 18689-M

Laboratorio Alemany

