



UNIVERSIDAD  
DE GRANADA



TRABAJO FIN DE MÁSTER

MÁSTER EN MATEMÁTICAS

# Polinomios Ortogonales

**Autor**

Juan Antonio Villegas Recio

**Tutoras:**

Lidia Fernández Rodríguez

*Departamento de Matemática Aplicada*

Antonia María Delgado Amaro

*Departamento de Matemática Aplicada*

29 de marzo de 2023





## AGRADECIMIENTOS

Ya veremos a quién hay que agradecerle qué.



## DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, D. Juan Antonio Villegas Recio, autor de este TFM,

Declaro explícitamente que el trabajo aquí presentado como Trabajo de Fin de Máster de mis estudios en el Máster Interuniversitario en Matemáticas, correspondiente al curso académico 2022-2023, es original. Es decir, no se han utilizado para el desarrollo del trabajo fuentes sin haberlas citado debidamente.

Granada, a 29 de marzo de 2023.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Antonio', is written over a horizontal line.

Juan Antonio Villegas Recio



--

## RESUMEN

El resumen

### Palabras clave

Las, palabras, clave.





--

ABSTRACT

The abstract

## Keywords

The, abstract.



<b>Lista de Abreviaturas</b>	<b>13</b>
<b>Lista de Imágenes</b>	<b>15</b>
<b>Introducción</b>	<b>17</b>
<b>Objetivos</b>	<b>19</b>
<b>1. Introducción a los Polinomios Ortogonales</b>	<b>21</b>
1.1. Introducción . . . . .	21
1.2. Ortogonalidad y función peso . . . . .	22
1.3. Funcional de momentos . . . . .	23
1.4. Estandarizaciones de las SPO . . . . .	27
1.5. Existencia de SPO . . . . .	28
1.6. La relación de recurrencia a tres términos . . . . .	30
1.7. Propiedades de los ceros . . . . .	34
<b>2. Polinomios Ortogonales Clásicos</b>	<b>37</b>
2.1. La ecuación de Pearson . . . . .	37
2.2. Deducción de las familias de polinomios ortogonales clásicos . . . . .	39
2.2.1. Caso I: Polinomios de Hermite . . . . .	40
2.2.2. Caso II: Polinomios de Laguerre . . . . .	40
2.2.3. Caso III: Polinomios de Jacobi . . . . .	41
2.3. Caracterizaciones . . . . .	42
2.3.1. Ortogonalidad de las derivadas . . . . .	43
2.3.2. Ecuación diferencial hipergeométrica . . . . .	45
2.3.3. Fórmula de Rodrigues . . . . .	46
2.4. Polinomios de Hermite, Laguerre y Jacobi . . . . .	51
2.4.1. Polinomios de Hermite . . . . .	51
2.4.2. Polinomios de Laguerre . . . . .	52
2.4.3. Polinomios de Jacobi . . . . .	53

<b>3. Cadenas de Markov</b>	<b>55</b>
3.1. Cadenas de Markov discretas. Matriz de transición . . . . .	55
3.2. Distribuciones transitorias . . . . .	58
3.3. Comportamiento límite . . . . .	61
3.3.1. Clasificación de los estados de una cadena de Markov . . . . .	62
3.3.2. Teoremas límite . . . . .	64
<b>4. Polinomios Ortogonales y Procesos de Nacimiento y Muerte</b>	<b>67</b>
<b>Conclusiones</b>	<b>69</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>69</b>
 <b>Apéndices</b>	 <b>73</b>
<b>A. Tablas sobre Polinomios Ortogonales clásicos</b>	<b>73</b>
A.1. Relación de recurrencia a tres términos . . . . .	73
A.2. Ecuación de Pearson . . . . .	74
A.3. Ecuación diferencial hipergeométrica . . . . .	74
A.4. Fórmulas de Rodrigues . . . . .	74

## LISTA DE ABREVIATURAS

- PO: Polinomios Ortogonales



1.1. Polinomios de Tchebichef de tipo I y sus ceros . . . . .	36
2.1. Polinomios Ortogonales Clásicos . . . . .	37
2.2. Polinomios de Hermite . . . . .	52
2.3. Polinomios de Laguerre con distintos valores de $\alpha$ . . . . .	52
2.4. Polinomios de Laguerre de distintos grados . . . . .	53
2.5. Polinomios de Jacobi con distintos valores de $\alpha$ y $\beta$ . . . . .	54
2.6. Polinomios de Jacobi de distintos grados . . . . .	54





La introducción



OBJETIVOS

Los objetivos



### 1.1. Introducción

La *Ortogonalidad* es una propiedad que a menudo se ha relacionado con la geometría, siendo común pensar en la analogía con la *perpendicularidad*. Por ejemplo, es claro que en el plano vectorial  $\mathbb{R}^2$  se tiene que los vectores  $(1, 0)$  y  $(0, 1)$  son ortogonales, y es que estos forman un ángulo recto, y por ello también se dice que son perpendiculares. Sin embargo, este hecho no es más que una consecuencia de la ortogonalidad, y es que en el espacio vectorial  $\mathbb{R}^d$ , y en particular en  $\mathbb{R}^2$ , dos vectores se dicen ortogonales si, al dotar a  $\mathbb{R}^d$  de un producto escalar  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}$ , el resultado de operar estos dos vectores es 0.

El producto escalar mayormente utilizado en  $\mathbb{R}^d$  es el usual, el cual, si  $u = (u_1, \dots, u_d)$  y  $v = (v_1, \dots, v_d)$  se define como

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\longmapsto \langle u, v \rangle = u \cdot v^t = \sum_{i=1}^d u_i \cdot v_i. \end{aligned}$$

Y dos vectores  $u, v \in \mathbb{R}^d$  se dicen ortogonales siempre que  $\langle u, v \rangle = 0$ .

Sin embargo, en realidad la ortogonalidad va mucho más allá de  $\mathbb{R}^d$  y del producto escalar usual. Se puede utilizar cualquier espacio vectorial siempre que esté dotado de un producto escalar. En particular, dado  $\Omega \subseteq \mathbb{R}$  pensemos en el espacio de Lebesgue  $L^1(\Omega)$ , el cual está dotado del producto vectorial

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : L^1 \times L^1 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\longmapsto \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \cdot g(x) dx. \end{aligned}$$

Por ejemplo, si tomamos  $\Omega = [0, \pi]$ , tenemos que las funciones  $\cos(n\theta), \cos(m\theta)$  ( $n, m \in \mathbb{N}_0$ ) son ortogonales siempre que  $n \neq m$ , pues

$$\int_0^\pi \cos(n\theta) \cos(m\theta) d\theta = 0 \quad (n \neq m). \quad (1.1)$$

Si hacemos el cambio de variable  $x = \cos(\theta)$ , tenemos que  $dx = -\sin(\theta)d\theta = \sin(-\theta)d\theta$ , por lo que aplicando que  $\sin^2(-\theta) + \cos^2(-\theta) = 1$  y que  $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$ , tenemos que la ecuación (1.1) se expresa como

$$\int_{-1}^1 T_n(x)T_m(x)(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}dx = 0 \quad (n \neq m). \quad (1.2)$$

donde hemos denotado  $T_n(x) = \cos(n\theta) = \cos(n \arccos(\theta))$  con  $-1 \leq x \leq 1$ .

Y tenemos que  $T_0 = 1, T_1 = \cos(\theta) = x$ , y aplicando identidades trigonométricas se puede deducir que  $T_2 = 2x^2 - 1, T_3 = 4x^3 - 3x$ , etc.

Por lo tanto, si definimos en  $\mathbb{P}[x]$  el producto escalar

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{P}[x] \times \mathbb{P}[x] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (p, q) &\longmapsto \langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)\rho(x)dx, \end{aligned}$$

con  $\rho(x) = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$ , tenemos que las funciones (polinomios)  $T_n$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$  son ortogonales entre sí en el espacio  $(\mathbb{P}[x], \langle \cdot, \cdot \rangle)$  siempre que  $n \neq m$ .

De acuerdo a este ejemplo, decimos que los polinomios  $T_n$  son *ortogonales*, o que la sucesión  $\{T_n\}$  es una *Sucesión de Polinomios Ortogonales* con respecto a la *función peso*  $\rho(x) = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$  en el intervalo  $(-1, 1)$ . Los polinomios  $T_n$  recién presentados son los *Polinomios de Tchebichef de tipo I*, y conforman nuestra primera familia de polinomios ortogonales conocida.

## 1.2. Ortogonalidad y función peso

En la sección 1.1 pudimos ampliar el concepto generalmente conocido de ortogonalidad, restringido a espacios como  $\mathbb{R}^d$ , a otros tipos de espacios. Además, introdujimos la primera familia de polinomios ortogonales: los polinomios de Tchebichef de tipo I. En esta sección daremos definiciones más formales y genéricas sobre la ortogonalidad.

Sea  $\mu$  una función no decreciente y no constante definida en un intervalo  $(a, b)$  tal que si  $a = -\infty$  entonces  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \mu(x) > -\infty$  y si  $b = \infty$  entonces  $\lim_{x \rightarrow \infty} \mu(x) < \infty$ . Se define el espacio de funciones  $L_\mu^p[a, b]$  como el conjunto de funciones tales que

$$\int_a^b |f(x)|^p d\mu(x) < +\infty$$

En  $L_\mu^2[a, b]$ , se define un producto escalar:

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : L_\mu^2[a, b] \times L_\mu^2[a, b] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\longmapsto \langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)d\mu(x). \end{aligned} \quad (1.3)$$

A partir del espacio  $L_\mu^2[a, b]$  podemos dar una definición de ortogonalidad.

**Definición 1.1** (Ortogonalidad). Fijada una función  $\mu$  no decreciente y no constante definida en un intervalo  $(a, b)$  tal que si  $a = -\infty$  entonces  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \mu(x) > -\infty$  y si  $b = \infty$  entonces  $\lim_{x \rightarrow \infty} \mu(x) < \infty$  y dadas  $f, g \in L^2_\mu[a, b]$ , se dice que las funciones **f y g son ortogonales** o que **f es ortogonal a g** respecto a la distribución  $d\mu$  si

$$\langle f, g \rangle = 0. \quad (1.4)$$

No obstante, en la mayoría de los casos y por simplicidad en lugar de utilizar una función  $\mu$  y su medida inducida, si  $\mu$  es absolutamente continua podemos reescribir (1.3) como una integral de Lebesgue

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)\rho(x)dx, \quad (1.5)$$

siendo  $\rho$  una función medible no negativa tal que  $0 < \int_a^b \rho(x)dx < \infty$  denominada **función peso**.

**Definición 1.2** (Sucesión de Polinomios Ortogonales respecto a una función peso). Dada una función peso  $\rho$ , si existe una sucesión de polinomios  $\{P_n\}$  con  $P_n$  de grado  $n$  tal que

$$\langle P_n, P_m \rangle = \int_a^b P_n(x)P_m(x)\rho(x)dx = 0 \quad (n \neq m)$$

entonces decimos que  $\{P_n\}$  es una **Sucesión de Polinomios Ortogonales (SPO) respecto a la función peso  $\rho(x)$**  en el intervalo  $(a, b)$ .

### 1.3. Funcional de momentos

Tenemos ya por tanto una definición rigurosa de lo que es la ortogonalidad de funciones de  $L^2_\mu[a, b]$ . Podemos reescribir esta propiedad mediante el uso de funcionales lineales aprovechando la linealidad de la integral. Se define el funcional  $\mathcal{L}$  como

$$\begin{aligned} \mathcal{L} : L^2_\mu[a, b] &\longrightarrow \mathbb{C} \\ f &\longmapsto \mathcal{L}[f] = \int_a^b f(x)d\mu(x). \end{aligned} \quad (1.6)$$

Por tanto, vemos que la propiedad de ortogonalidad (1.4) es equivalente a  $\mathcal{L}[f \cdot g] = 0$ .

**Observación 1.1.** El funcional  $\mathcal{L}$  es lineal, pues por la linealidad del operador integral se tiene que

$$\mathcal{L}[af + bg] = a\mathcal{L}[f] + b\mathcal{L}[g], \quad (1.7)$$

para cualesquiera  $a, b \in \mathbb{C}$  y  $f, g \in L^2_\mu[a, b]$ .

**Ejemplo 1.**  $\{T_n\}$ , la sucesión de polinomios de Tchebichef de tipo I, es una Sucesión de Polinomios Ortogonales respecto de la función peso  $\rho(x) = (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}}$  en el intervalo  $(-1, 1)$ . También podemos establecer la ortogonalidad de los respectivos  $\{T_n\}$  no mediante un producto escalar sino a través del funcional

$$\mathcal{L}[f] := \int_{-1}^1 f(x)(1 - x^2)^{-\frac{1}{2}}dx \quad (1.8)$$

Por lo que podemos definir ortogonalidad indistintamente mediante un producto escalar  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  o mediante un funcional integral  $\mathcal{L}$ .

A partir de este momento consideraremos el espacio vectorial de los polinomios  $\mathbb{P}$ . Denotaremos como  $\mathbb{P}_n$  al subespacio de  $\mathbb{P}$  formado por los polinomios de grado menor o igual que  $n$ .

**Definición 1.3** (Momentos de un funcional). Dado un funcional  $\mathcal{L}$ , definimos los **momentos** del funcional, y los denotamos con  $\mu_n$ , como

$$\mu_n = \mathcal{L}[x^n], \quad n \in \mathbb{N}_0. \quad (1.9)$$

Gracias a los momentos de un funcional y considerando que cualquier polinomio de grado  $n$  puede escribirse como  $p(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$  podemos entonces combinar (1.7) y (1.9) para escribir la acción de un funcional  $\mathcal{L}$  sobre  $p(x)$  como

$$\mathcal{L}[p] = \mathcal{L} \left[ \sum_{k=0}^n c_k x^k \right] = \sum_{k=0}^n c_k \mu_k$$

Por lo que, de esta forma, únicamente conociendo la sucesión de momentos  $\{\mu_n\}$  podríamos conocer el resultado de aplicar  $\mathcal{L}$  a cualquier polinomio. Por tanto, es posible dar una nueva definición de ortogonalidad respecto a funcionales lineales que en este caso estén definidos no mediante una integral como en el caso de (1.6), sino a partir de una sucesión de momentos  $\{\mu_n\}$ .

**Definición 1.4** (Funcional de momentos). Dada una sucesión de números complejos  $\{\mu_n\}$ , diremos que  $\mathcal{L}$  es un **funcional de momentos** determinado por la sucesión  $\{\mu_n\}$ , donde  $\mu_n$  se denomina **momento de orden n**, si  $\mathcal{L}$  es lineal en  $\mathbb{P}$  y  $\mathcal{L}[x^n] = \mu_n$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$

Daremos ahora una nueva definición de SPO, en este caso con respecto a un funcional lineal y no respecto a una función peso como hicimos en la definición 1.2.

**Definición 1.5** (Sucesión de Polinomios Ortogonales respecto a un funcional lineal). Dado un funcional lineal  $\mathcal{L}$  definido como en (1.6), una sucesión de polinomios  $\{P_n\}$  es una **Sucesión de Polinomios Ortogonales (SPO) respecto al funcional  $\mathcal{L}$**  si:

1.  $P_n$  es de grado  $n$ .
2.  $\mathcal{L}[P_n P_m] = 0$  si  $n \neq m$ ,  $n, m \in \mathbb{N}_0$ .
3.  $\mathcal{L}[P_n^2] \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$ .

La sucesión  $\{P_n\}$  se llamará **ortonormal** si  $\mathcal{L}[P_n^2] = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$ .

La sucesión  $\{P_n\}$  se llamará **Sucesión de Polinomios Ortogonales Mónicos (SPOM)** si  $P_n$  es mónico para cada  $n$ , es decir, si  $P_n(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ .

En general, las condiciones (2) y (3) se suelen abreviar como

$$\mathcal{L}[P_n P_m] = K_n \delta_{mn}, \quad K_n \neq 0,$$

donde  $\delta_{mn}$  denota la función delta de Kronecker.

En el caso de que  $d\mu(x) = \rho(x)dx$ , es decir, en el caso de trabajar con funciones peso, la condición (3) se satisface de manera automática.



**Ejemplo 2.** Extraído de [Chi11, Capítulo 1, sección 1] Consideramos

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{x}{k} \frac{(-a)^{n-k}}{(n-k)!}.$$

$\{P_n\}$  son los llamados *Polinomios de Charlier*. Como

$$\binom{x}{n} = \frac{1}{n!} x(x-1) \cdots (x-n+1)$$

tenemos que  $P_n(x)$  es un polinomio de grado  $n$ . En [Chi11] pueden encontrarse los cálculos rigurosos mediante los cuales, si definimos

$$\mathcal{L}[x^n] = \sum_{k=0}^{\infty} k^n \frac{a^k}{k!}, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

y extendemos  $\mathcal{L}$  a  $\mathbb{P}$  por linealidad, tenemos que

$$\mathcal{L}[P_m(x)P_n(x)] = \frac{e^a a^n}{n!} \delta_{mn}, \quad m, n \in \mathbb{N}_0.$$

Al estar definido el funcional mediante sumatorias y no mediante integrales podría parecer que, aunque  $\{P_n\}$  satisfaga la definición 1.5 mediante un funcional de momentos, no satisface la ortogonalidad respecto a (1.6). Sin embargo, si denotamos como  $\phi$  a una función escalonada que es constante en cada intervalo  $(-\infty, 0)$  y  $(k, k+1)$  con  $k \in \mathbb{N}_0$  y tiene saltos de magnitud  $\frac{a^k}{k!}$  en cada  $k$ , entonces utilizando la integral de Riemann-Stieltjes los polinomios  $\{P_n\}$  verifican

$$\int_{-\infty}^{\infty} P_m(x)P_n(x)d\phi(x) = \frac{e^a a^n}{n!} \delta_{mn}, \quad m, n \in \mathbb{N}_0. \quad (1.10)$$

Evidentemente  $\phi$  no es una función absolutamente continua, por lo que no se puede escribir (1.10) en términos de (1.5).

**Observación 1.2.** No cualquier sucesión  $\{\mu_n\}$  da lugar a una SPO. Por ejemplo, si  $\mu_0 = \mu_1 = \mu_2 = 1$ , tendríamos que

$$P_0(x) = a \neq 0, \quad P_1(x) = bx + c, \quad b \neq 0.$$

Por la propiedad (2) de la definición 1.5

$$\mathcal{L}[P_0(x)P_1(x)] = a(b\mu_1 + c\mu_0) = a(b+c),$$

luego  $b = -c$ , y en este caso

$$\mathcal{L}[P_1(x)^2] = b^2(\mu_2 - 2\mu_1 + \mu_0) = 0,$$

lo cual contradice la propiedad (3).

Gracias a la observación 1.2 sabemos que no es válida cualquier sucesión de momentos para encontrar una SPO, por lo que necesitamos además probar y dar condiciones para la existencia de la susodicha SPO.

Previamente, introduciremos un resultado para la caracterización de SPO respecto a un funcional  $\mathcal{L}$ .

**Teorema 1.1.** Sea  $\mathcal{L}$  un funcional de momentos y  $\{P_n\}$  una sucesión de polinomios. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1.  $\{P_n\}$  es una SPO respecto al funcional  $\mathcal{L}$ .
2.  $\mathcal{L}[\pi(x)P_n(x)] = 0$  para cualquier polinomio  $\pi(x)$  de grado  $m < n$  y  $\mathcal{L}[\pi(x)P_n(x)] \neq 0$  si  $\pi(x)$  tiene grado  $n$ .
3.  $\mathcal{L}[x^m P_n(x)] = K_n \delta_{nm}$ , con  $K_n \neq 0$ ,  $m = 0, 1, \dots, n$

*Demostración.* Probaremos  $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$ .

■  $(1) \Rightarrow (2)$

Supongamos que  $\{P_n\}$  es una SPO respecto al funcional  $\mathcal{L}$ . Como  $P_k$  tiene grado  $k$ , entonces  $\{P_0, \dots, P_m\}$  forma una base de  $\mathbb{P}_m$ . Por lo que si  $\pi(x)$  es un polinomio de grado  $m$ , existen constantes  $c_1, \dots, c_m$ , con  $c_m \neq 0$  tales que  $\pi(x) = \sum_{i=0}^m c_i P_i(x)$ . Como  $\mathcal{L}$  es lineal,

$$\mathcal{L}[\pi(x)P_n(x)] = \sum_{k=0}^m c_k \mathcal{L}[P_k(x)P_n(x)] = \begin{cases} 0 & \text{si } m < n \\ c_n \mathcal{L}[P_n^2(x)] & \text{si } m = n \end{cases}$$

■  $(2) \Rightarrow (3)$  es trivial, basta con utilizar  $\pi(x) = x^m$  y aplicar (2).

■  $(3) \Rightarrow (1)$  también es trivial, pudiendo reconstruir  $P_m(x)$  por linealidad.

□

En la prueba de este último teorema, hemos hecho uso de que mediante una SPO podemos obtener bases de  $\mathbb{P}_n$ . Sacaremos provecho de este hecho en el siguiente resultado.

**Teorema 1.2.** Sea  $\{P_n\}$  una SPO respecto a un funcional lineal  $\mathcal{L}$ . Entonces, cualquier polinomio  $\pi(x)$  de grado  $n$  se puede expresar en la base  $\{P_0, \dots, P_n\}$  de la forma

$$\pi(x) = \sum_{k=0}^n c_k P_k(x), \quad \text{con } c_k = \frac{\mathcal{L}[\pi(x)P_k(x)]}{\mathcal{L}[P_k^2(x)]}.$$

*Demostración.* Ya es claro que si  $\pi(x)$  es un polinomio de grado  $n$ , entonces  $\pi(x) = \sum_{k=0}^n c_k P_k(x)$ . Por tanto, multiplicando ambos miembros de la igualdad por  $P_m(x)$  y aplicando el funcional  $\mathcal{L}$  se obtiene

$$\mathcal{L}[\pi(x)P_m(x)] = \sum_{k=0}^n c_k \mathcal{L}[P_k(x)P_m(x)] = c_m \mathcal{L}[P_m^2(x)],$$

donde hemos aplicado la ortogonalidad. De esta igualdad se deduce claramente la expresión de  $c_k$ .

□

Este resultado nos proporciona una consecuencia muy importante: la unicidad salvo constante multiplicativa de las SPO respecto a un funcional.

**Corolario 1.3.** Sea  $\{P_n\}$  una SPO respecto a un funcional lineal  $\mathcal{L}$ . Entonces cada  $P_n$  está unívocamente determinado salvo constante multiplicativa no nula. Esto es, si  $\{Q_n\}$  es otra SPO respecto a  $\mathcal{L}$ , entonces existen constantes  $c_n \neq 0$  tales que

$$Q_n(x) = c_n P_n(x), \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

*Demostración.* Utilizaremos el teorema 1.2 con  $\pi(x) = Q_n(x)$ , de modo que

$$Q_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\mathcal{L}[Q_n(x)P_k(x)]}{\mathcal{L}[P_k^2(x)]} P_k(x)$$

Por el teorema 1.1,  $\mathcal{L}[Q_n(x)P_k(x)] = 0$  siempre que  $k < n$  y  $\mathcal{L}[Q_n(x)P_k(x)] = r_n \neq 0$  si  $k = n$ , por lo que, tomando  $c_n = \frac{r_n}{\mathcal{L}[P_n^2(x)]}$ , se tiene  $Q_n(x) = c_n P_n(x)$ , como queríamos probar.  $\square$

## 1.4. Estandarizaciones de las SPO

El corolario 1.3 nos afirma que si tenemos una SPO  $\{P_n\}$  respecto a un funcional  $\mathcal{L}$ , entonces  $\{c_n P_n\}$  también es una SPO para cualquier sucesión  $\{c_n\}$  de constantes no nulas. Existen varias formas de estandarizar una SPO de forma que esta esté unívocamente determinada a partir de un funcional. En esta sección presentaremos algunas de las más comunes.

Una primera posibilidad es imponer el valor del coeficiente líder de cada polinomio de la sucesión. Por ejemplo, la estandarización más común de los polinomios de Laguerre  $L_n^{(\alpha)}$  consiste en obligar a que el término líder  $a_n$  verifique  $a_n = \frac{(-1)^n}{n!}$ .

En particular, podemos exigir que todos los polinomios que conforman la SPO sean mónicos. De esta forma, podemos afirmar que si tenemos una SPO  $\{P_n\}$  para un funcional  $\mathcal{L}$ , entonces existe una única sucesión de polinomios ortogonales mónicos (SPOM) respecto a  $\mathcal{L}$ . De hecho, si denotamos como  $a_n$  al coeficiente líder de  $P_n$ , entonces los polinomios

$$\hat{P}_n = a_n^{-1} P_n$$

forman una SPOM respecto a  $\mathcal{L}$ .

Otra forma de estandarizar una SPO  $\{P_n\}$  respecto a un funcional  $\mathcal{L}$  es tomando los polinomios

$$p_n = (-1)^{\text{sgn}(a_n)} (\mathcal{L}[P_n^2])^{-1/2} P_n,$$

siempre que  $\mathcal{L}[P_n^2] > 0$  y donde  $\text{sgn}(a_n)$  denota el signo de  $a_n$ . Esta normalización no siempre es posible de aplicar, ya que no todos los funcionales lineales verifican  $\mathcal{L}[P_n^2] > 0$ , aunque existe una clase de funcionales, los definidos positivos (ver definición 1.8), que aseguran esta condición.

Con esta operación conseguimos que  $\mathcal{L}[p_n^2] = 1$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}_0$ , es decir, la sucesión  $\{p_n\}$  es una SPO ortonormal. Por tanto, dada una SPO  $\{P_n\}$  para un funcional  $\mathcal{L}$  tal que  $\mathcal{L}[P_n^2] > 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ , existe una única SPO ortonormal  $\{p_n\}$  respecto a  $\mathcal{L}$ .

Por último, es común exigirle a cada polinomio  $P_n$  de la sucesión que verifique  $P_n(x_0) = K_n$  para cierto  $x_0 \in [a, b]$ . Es decir, se exige un valor concreto al evaluar

$P_n$  en un punto del intervalo  $[a, b]$ , que en ocasiones coincide con alguno de los extremos  $a, b$  cuando estos son finitos.

Por ejemplo, los polinomios de Tchebichef de tipo I, ortogonales en  $(-1, 1)$  suelen ser presentados verificando  $T_n(1) = 1$ . Por su parte, los polinomios de Jacobi  $P_n^{(\alpha, \beta)}$ , que también son ortogonales en  $(-1, 1)$ , se busca que verifiquen  $P_n^{(\alpha, \beta)} = \binom{n+\alpha}{n}$ .

En conclusión, no existe una única forma de estandarizar una SPO, sino que en realidad cada familia de polinomios ortogonales acepta una, o en ocasiones varias, estandarizaciones concretas dependiendo de la aplicación que se le dé y del contexto del problema.

## 1.5. Existencia de SPO

Recordemos que con anterioridad hemos comentado en la observación 1.2 que no cualquier sucesión de números complejos  $\{\mu_n\}$  da lugar a una SPO. Es necesario por tanto exigir alguna condición sobre dicha sucesión si realmente queremos asegurar la existencia la correspondiente SPO.

Para ello, introducimos el siguiente concepto.

**Definición 1.6** (Matriz de momentos). Llamaremos **matriz de momentos** a la matriz  $(\mu_{i+j})_{i,j=0}^n$ , y **determinante de momentos** a su determinante

$$\Delta_n = \det(\mu_{i+j})_{i,j=0}^n = \begin{vmatrix} \mu_0 & \mu_1 & \cdots & \mu_n \\ \mu_1 & \mu_2 & \cdots & \mu_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_n & \mu_{n+1} & \cdots & \mu_{2n} \end{vmatrix}. \quad (1.11)$$

Este determinante está directamente relacionado con la existencia de una SPO.

**Teorema 1.4.** Sea  $\{\mu_n\}$  una sucesión de números complejos y sea  $\mathcal{L}$  un funcional de momentos cuya sucesión de momentos es  $\{\mu_n\}$ .  $\mathcal{L}$  admite una sucesión de polinomios ortogonales si, y solo si el determinante de momentos  $\Delta_n \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$ .

*Demostración.* Comprobamos la doble implicación.

$\Rightarrow$  Supongamos que los polinomios  $P_n(x) = \sum_{k=0}^n c_{nk} x^k$  conforman una SPO para  $\mathcal{L}$ . Fijemos ahora  $n \in \mathbb{N}_0$  arbitrario. Por el teorema 1.1 (caracterización de una SPO), obsérvese que la condición de ortogonalidad

$$\mathcal{L}[x^m P_n(x)] = \sum_{k=0}^n c_{nk} \mu_{k+m} = K_n \delta_{nm}, \quad K_n \neq 0, m \leq n \quad (1.12)$$

equivale al sistema

$$\begin{pmatrix} \mu_0 & \mu_1 & \cdots & \mu_n \\ \mu_1 & \mu_2 & \cdots & \mu_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_n & \mu_{n+1} & \cdots & \mu_{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{n0} \\ c_{n1} \\ \vdots \\ c_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ K_n \end{pmatrix}. \quad (1.13)$$

Por tanto, si esta sucesión existe, necesariamente este sistema debe tener solución única determinada por  $K_n$ . Para ello ha de verificarse que  $\Delta_n \neq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$ .

⇐ Recíprocamente, supongamos ahora que  $\Delta_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}_0$ . En ese caso el sistema (1.13) tiene solución única para cualquier  $K_n \neq 0$ , por lo que podemos crear polinomios  $P_n(x)$  que cumplan (1.12) para cualquier  $n \in \mathbb{N}_0$ . Por otro lado, aplicando la regla de Cramer, tenemos que

$$c_{nn} = \frac{K_n \Delta_{n-1}}{\Delta_n} \neq 0, \quad n \geq 1, \quad (1.14)$$

expresión que también es válida para  $n = 0$  sin más que tomar  $\Delta_{-1} = 1$ . Por tanto, el polinomio  $P_n(x)$  tiene coeficiente líder no nulo, es decir, es de grado  $n$ , por lo que  $\{P_n(x)\}$  es una SPO para  $\mathcal{L}$ .

□

Con esta notación, podemos ponerle nombre a aquellos funcionales para los cuales existe una SPO.

**Definición 1.7** (Funcional cuasi-definido). Un funcional  $\mathcal{L}$  es **cuasi-definido** si, y solo si admite una sucesión de polinomios ortogonales. Equivalentemente, si  $\Delta_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}_0$ .

Un concepto muy relacionado con el de funcional cuasi-definido es el de definido positivo, que introducimos a continuación.

**Definición 1.8** (Funcional definido positivo). Un funcional de momentos  $\mathcal{L}$  se dice que es **definido positivo** si  $\mathcal{L}[\pi] > 0$  para cualquier polinomio  $\pi$  no nulo y no negativo en todo el eje real.

Presentamos ahora un sencillo lema que nos ayudará a encontrar una definición alternativa utilizada con bastante frecuencia.

**Lema 1.1.** Sea  $\pi(x)$  un polinomio no negativo en todo el eje real. Entonces existen polinomios  $p(x)$  y  $q(x)$  tales que

$$\pi(x) = p^2(x) + q^2(x).$$

*Demostración.* Si  $\pi(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ , entonces  $\pi(x)$  es un polinomio cuyos ceros reales tienen multiplicidad par y cuyos ceros complejos son pares conjugados. Por lo que podemos escribir

$$\pi(x) = r^2(x) \prod_{k=1}^m (x - a_k - b_k i)(x - a_k + b_k i),$$

donde  $r(x)$  es un polinomio real y  $a_k, b_k \in \mathbb{R}$ . Si ahora denotamos

$$\prod_{k=1}^m (x - a_k - b_k i) = A(x) + iB(x),$$

siendo  $A(x)$  y  $B(x)$  polinomios reales, podemos expresar  $\pi(x)$  como

$$\pi(x) = r^2(x)(A^2(x) + B^2(x)) = \underbrace{(r(x)A(x))^2}_{p^2(x)} + \underbrace{(r(x)B(x))^2}_{q^2(x)}.$$

□

Una consecuencia directa de este lema es una definición alternativa y equivalente de funcional definido positivo.

**Corolario 1.5.** *Un funcional de momentos  $\mathcal{L}$  es definido positivo si, y solo si  $\mathcal{L}[\pi^2(x)] > 0$  para cualquier polinomio  $\pi(x)$ .*

Finalmente, introducimos la relación entre el concepto de funcional definido positivo y los determinantes (1.11).

**Teorema 1.6.** *Un funcional  $\mathcal{L}$  es definido positivo si, y solo si sus momentos  $\{\mu_n\}$  son todos reales y  $\Delta_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$*

*Demostración.* La prueba de este resultado puede encontrarse en [Chi11, Teorema 3.4].  $\square$

Obsérvese que gracias a este teorema podemos entonces afirmar que los funcionales definidos positivos son, en particular, funcionales cuasi-definidos. Esto es, admiten una SPO.

## 1.6. La relación de recurrencia a tres términos

Las SPO respecto a un funcional siempre cumplen una ecuación que es la denominada ‘relación de recurrencia a tres términos’, en adelante también referida como ‘RRTT’.

**Teorema 1.7** (Relación de Recurrencia a Tres Términos). *Sea  $\{P_n\}$  una SPO respecto a un funcional lineal  $\mathcal{L}$ . Entonces,  $\{P_n\}$  satisface la relación de recurrencia*

$$xP_n(x) = \alpha_n P_{n+1}(x) + \beta_n P_n(x) + \gamma_n P_{n-1}(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}_0. \quad (1.15)$$

Normalmente se impone que  $P_{-1} = 0, P_0 = 1$ , por lo que una SPO queda determinada unívocamente a partir de las sucesiones  $\{\alpha_n\}, \{\beta_n\}, \{\gamma_n\}$ .

Además, si la SPO es mónica, los polinomios  $\{P_n\}$  verifican la ecuación equivalente

$$P_{n+1}(x) = (x - \beta_n)P_n - \gamma_n P_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0. \quad (1.16)$$

*Demostración.* Como  $xP_n(x)$  es un polinomio de grado  $n+1$ , este puede ser expresado como

$$xP_n(x) = \sum_{k=0}^{n+1} a_{k,n} P_k(x), \quad \text{con } a_{k,n} = \frac{\mathcal{L}[xP_n(x)P_k(x)]}{\mathcal{L}[P_k^2(x)]}.$$

Pero  $\mathcal{L}[xP_n(x)P_k(x)] = 0$  para  $k = 0, \dots, n-2$ , por lo que necesariamente debe cumplirse

$$xP_n(x) = \underbrace{a_{n-1,n}}_{\gamma_n} P_{n-1}(x) + \underbrace{a_{n,n}}_{\beta_n} P_n(x) + \underbrace{a_{n+1,n}}_{\alpha_n} P_{n+1}(x),$$

de donde se deduce (1.15). Si además  $P_n(x)$  es mónico,  $xP_n(x)$  también lo es, por lo que  $a_{n+1,n} = 1$ , luego se tiene que

$$xP_n(x) = P_{n+1}(x) + \beta_n P_n(x) + \gamma_n P_{n-1},$$

que es equivalente a (1.16).  $\square$

De esta demostración podemos deducir además la expresión de las constantes  $\alpha_n, \beta_n$  y  $\gamma_n$ :

$$\alpha_n = \frac{\mathcal{L}[xP_nP_{n+1}]}{\mathcal{L}[P_{n+1}^2]}, \quad \beta_n = \frac{\mathcal{L}[xP_n^2]}{\mathcal{L}[P_n^2]}, \quad \gamma_n = \frac{\mathcal{L}[xP_nP_{n-1}]}{\mathcal{L}[P_{n-1}^2]}, \quad (1.17)$$

donde la expresión de  $\alpha_n$  y la de  $\beta_n$  son válidas para  $n \geq 0$  y la de  $\gamma_n$  para  $n \geq 1$ .

Sin embargo, este cálculo puede complicarse bastante, por lo que presentaremos un algoritmo alternativo. Para ello, desarrollaremos los polinomios como

$$P_n(x) = a_n x^n + b_n x^{n-1} + c_n x^{n-2} + \dots$$

Si sustituimos esta expresión en la RRTT (1.15) e igualamos los coeficientes de los monomios  $x^{n+1}, x^n$  y  $x^{n-1}$  llegamos a las expresiones

$$\alpha_n = \frac{a_n}{a_{n+1}}, \quad \beta_n = \frac{b_n}{a_n} - \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}, \quad \gamma_n = \frac{1}{a_{n-1}} (c_n - \alpha_n c_{n+1} - \beta_n b_n). \quad (1.18)$$

donde de nuevo la expresión de  $\alpha_n$  y la de  $\beta_n$  son válidas para  $n \geq 0$  y la de  $\gamma_n$  para  $n \geq 1$ .

Con las ecuaciones (1.17) podemos construir la SPO utilizando la RR3T si conocemos el funcional, deduciendo simultáneamente los coeficientes de la RR3T y los polinomios que conforman la sucesión. Por su parte, utilizando (1.18) podemos calcular de una manera sencilla los coeficientes de la RR3T sin utilizar el funcional ni integrales, en ocasiones complejas. Sin embargo, en este último caso necesitamos conocer los polinomios  $P_{n-1}, P_n$  y  $P_{n+1}$  para obtener dichos coeficientes, no pudiendo construir la SPO como si podíamos hacer si aplicábamos (1.17). Comprobemos este hecho con el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 3.** Vamos a clarificar estas ideas con un ejemplo práctico. En el archivo `software/Hermite.ipynb`<sup>1</sup> se ha implementado, utilizando el software matemático ‘SageMath’, el cálculo de una SPO mediante la RR3T. También se ha realizado una estimación de los tiempos de ejecución para distintos valores de  $n$ . En este ejemplo únicamente se recogen los resultados arrojados por el software, pero en dicho archivo se puede consultar e incluso modificar el código fuente.

En particular, se ha trabajado con los polinomios de Hermite, (véase sección 2.2.1) que son aquellos que conforman la SPO con respecto a la función peso  $\rho(x) = e^{-x^2}$  en todo  $\mathbb{R}$ . Por tanto, tenemos el funcional

$$\mathcal{L}[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-x^2} dx.$$

Calculemos la SPOM correspondiente al funcional  $\mathcal{L}$ . Si tomamos  $P_{-1} = 0, P_0 = 1$ , podemos calcular a partir de (1.17) las constantes  $\beta_n, \gamma_n$  para  $n \leq 1$  y mediante (1.16) obtenemos los polinomios  $P_n$  para  $n \geq 1$ , véase la tabla 1.1.

Sin embargo, comprobamos que este método es lento, pues los tiempos de cálculo<sup>2</sup> se incrementan considerablemente con  $n$ . De hecho, para  $n = 15$ , que es un valor aún bajo y cercano a 10, el tiempo de ejecución ya es de 58.9024 segundos, casi un minuto.

<sup>1</sup>Puede ser consultado en la URL <https://github.com/JAntonioVR/Polinomios-Ortogonales/blob/main/software/Hermite.ipynb>

<sup>2</sup>Estos tiempos han sido obtenidos mediante la media de los tiempos de ejecución de 10 ejecuciones independientes.

$n$	$P_n(x)$	Tiempo de cálculo (s)
0	1	$1.1897 \times 10^{-5}$
1	$x$	0.0133
2	$x^2 - \frac{1}{2}$	0.0449
3	$x^3 - \frac{3}{2}x$	0.1073
4	$x^4 - 3x^2 + \frac{3}{4}$	0.2161
5	$x^5 - 5x^3 + \frac{15}{4}x$	0.4162
6	$x^6 - \frac{15}{2}x^4 + \frac{45}{4}x^2 - \frac{15}{8}$	0.6752
7	$x^7 - \frac{21}{2}x^5 + \frac{105}{4}x^3 - \frac{105}{8}x$	1.2009
8	$x^8 - 14x^6 + \frac{105}{2}x^4 - \frac{105}{2}x^2 + \frac{105}{16}$	2.0665
9	$x^9 - 18x^7 + \frac{189}{2}x^5 - \frac{315}{2}x^3 + \frac{945}{16}x$	3.5725
10	$x^{10} - \frac{45}{2}x^8 + \frac{315}{2}x^6 - \frac{1575}{4}x^4 + \frac{4725}{16}x^2 - \frac{945}{32}$	5.5059

Tabla 1.1: 10 primeros polinomios de Hermite mónicos

Por otro lado, existe un resultado recíproco al teorema 1.7. Este resultado es el conocido como teorema de Favard.

**Teorema 1.8** (Favard). *Sean  $\{\beta_n\}$  y  $\{\gamma_n\}$  dos sucesiones de números reales y sea  $\{P_n\}$  una sucesión de polinomios mónicos definida mediante la relación (1.16):*

$$P_{n+1}(x) = (x - \beta_n)P_n - \gamma_n P_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

con  $P_{-1} = 0$  y  $P_0 = 1$ . Entonces existe un único funcional de momentos  $\mathcal{L}$  tal que

$$\mathcal{L}[1] = \gamma_0, \quad \mathcal{L}[P_n P_m] = \delta_{n,m} K_n, \quad K_n \neq 0.$$

Este funcional es cuasi-definido y  $\{P_n\}$  es su correspondiente SPOM si, y solo si  $\gamma_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ . Además,  $\mathcal{L}$  es definido positivo si y solo si  $\gamma_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ .

*Demostración.* Definamos el funcional  $\mathcal{L}$  por inducción en  $\mathbb{P}$ . Sea

$$\mathcal{L}[1] = \mathcal{L}[P_0] = \mu_0 := \gamma_0,$$

$$\mathcal{L}[P_n] = \mathcal{L}[1 \cdot P_n] = \mathcal{L}[P_0 P_n] := 0 \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Así, aplicando (1.16) podemos calcular los momentos del funcional. Si tomamos  $n = 0$  en (1.16) obtenemos

$$P_1(x) = x - \beta_0,$$

luego, como  $\mathcal{L}[P_1] = 0$ :

$$\begin{aligned} 0 = \mathcal{L}[P_1] &= \mathcal{L}[x - \beta_0] \\ &= \mu_1 - \beta_0 \mathcal{L}[1] \\ &= \mu_1 - \beta_0 \gamma_0, \end{aligned}$$

de donde  $\mu_1 = \beta_0 \gamma_0$ . Si  $n = 1$  en (1.16) obtenemos

$$P_2(x) = (x - \beta_1)P_1 - \gamma_1,$$



por tanto,

$$\begin{aligned} 0 &= \mathcal{L}[P_2] = \mathcal{L}[(x - \beta_1)P_1 - \gamma_1] \\ &= \mathcal{L}[(x - \beta_1)(x - \beta_0) - \gamma_1] \\ &= \mu_2 - (\beta_0 + \beta_1)\mu_1 + (\beta_1\beta_0 - \gamma_1)\gamma_0, \end{aligned}$$

de donde  $\mu_2 = (\beta_0 + \beta_1)\mu_1 - (\beta_1\beta_0 - \gamma_1)\gamma_0$ . Continuando este proceso se pueden obtener todos los momentos  $\mu_n$ , y una vez se tienen todos los momentos podemos extender el funcional por linealidad.

Utilizando (1.15) sucesivamente obtenemos que

$$x^k P_n = \sum_{i=n-k}^{n+k} d_{n,i} P_i(x),$$

y aplicando que  $\mathcal{L}[P_n] = 0$  se deduce que  $\mathcal{L}[x^k P_n] = 0$  para todo  $k = 1, \dots, n-1$ . Comprobemos qué ocurre cuando  $k = n$ . De nuevo, por (1.15):

$$\mathcal{L}[x^n P_n] = \mathcal{L}[x^{n-1}(P_{n+1} + \beta_n P_n + \gamma_n P_{n-1})] = \mathcal{L}[\gamma_n x^{n-1} P_{n-1}] = \gamma_n \mathcal{L}[x^{n-1} P_{n-1}].$$

Aplicando este razonamiento sucesivamente llegamos a que

$$\mathcal{L}[x^n P_n] = \gamma_n \gamma_{n-1} \cdots \gamma_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0. \quad (1.19)$$

Por tanto, el funcional es cuasi-definido y  $\{P_n\}$  es su SPOM si, y solo si  $\gamma_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ .

Por último, véamos que  $\mathcal{L}$  es definido positivo si y solo si  $\gamma_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ . Sea  $\pi(x)$  un polinomio y  $m$  su grado. Podemos entonces escribir  $\pi(x) = \sum_{i=1}^m c_i P_i(x)$ . De esta forma

$$\mathcal{L}[\pi^2(x)] = \mathcal{L}\left[\sum_{i=1}^m c_i^2 P_i^2(x)\right] = \sum_{i=1}^m c_i^2 \mathcal{L}[P_i^2(x)],$$

donde hemos utilizado la ortogonalidad de  $\{P_n\}$ . Por tanto, la condición  $\mathcal{L}[\pi^2(x)] > 0$  es equivalente a  $\mathcal{L}[P_n^2(x)] > 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ . Aplicando de nuevo la ortogonalidad de la sucesión, tenemos que

$$\mathcal{L}[P_n^2(x)] = \mathcal{L}[P_n \cdot P_n] = \mathcal{L}[x^n P_n],$$

que por (1.19) es positivo si y solo si  $\gamma_n \gamma_{n-1} \cdots \gamma_0 > 0$ , que es equivalente a que  $\gamma_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ .  $\square$

**Observación 1.3.** Nótese que el teorema de Favard está descrito partiendo de una sucesión de polinomios ortogonales *mónicos*. Sin embargo, una vez es calculado el funcional, se puede utilizar cualquier otra estandarización sin cambiar el funcional.

Si partimos de una sucesión de polinomios mónicos  $\{P_n\}$  y dos sucesiones de números reales  $\{\beta_n\}$  y  $\{\gamma_n\}$  verificando las condiciones del teorema de Favard, entonces existe un funcional  $\mathcal{L}$  para el cual  $\{P_n\}$  es una SPOM. Si  $\{Q_n\} = \{c_n P_n\}$  es otra SPO para  $\mathcal{L}$ , podemos sustituir  $P_n = \frac{1}{c_n} Q_n$  en (1.17) para obtener la relación

$$x Q_n(x) = \frac{c_n}{c_{n+1}} Q_{n+1} + \beta_n Q_n + \frac{\gamma_n}{c_{n-1}} Q_{n-1}.$$

## 1.7. Propiedades de los ceros

Los ceros o raíces de los polinomios ortogonales tienen propiedades y comportamientos que guardan cierta regularidad cuando el funcional que los define es definido positivo. En esta sección conoceremos estas peculiaridades de los ceros. Comencemos con una definición que refina en cierto modo la definición de funcional definido positivo.

**Definición 1.9** (Funcional definido positivo en un conjunto). Sea  $E \subseteq \mathbb{R}$ . Decimos que un funcional  $\mathcal{L}$  es **definido positivo en  $E$**  si  $\mathcal{L}[\pi] > 0$  para cualquier polinomio  $\pi(x)$  real, no negativo y no idénticamente nulo en  $E$ . En este contexto, se dice que  $E$  es un **soporte** de  $\mathcal{L}$ .

Por ejemplo, el funcional de momentos (1.8) de los polinomios de Tchebichef de tipo I es definido positivo en  $(-1, 1)$ , el de los polinomios de Charlier definido en el ejemplo 2 lo es en  $\mathbb{N}$  y el de los polinomios de Hermite en  $\mathbb{R}$ . Respecto a este último caso, es claro que ser ‘definido positivo en  $\mathbb{R}$ ’ equivale a ser ‘definido positivo’ según la definición 1.8.

A partir de este concepto y los siguientes teoremas podremos conocer la dinámica que siguen los ceros de los polinomios ortogonales. En adelante,  $\mathcal{L}$  es un funcional definido positivo y  $\{P_n(x)\}$  su correspondiente SPO.

**Teorema 1.9.** *Sea  $I$  un intervalo que es un soporte de  $\mathcal{L}$ . Entonces los ceros de  $P_n$  ( $n \geq 1$ ) son todos simples, reales y se encuentran en el interior de  $I$  (denotado en adelante como  $\overset{\circ}{I}$ ).*

*Demostración.* Supongamos que  $P_0 = 1$ , entonces  $\mathcal{L}[P_n] = \mathcal{L}[P_0 P_n] = 0$ ,  $n \geq 1$ . Por tanto,  $P_n$  tiene que cambiar de signo al menos una vez en  $\overset{\circ}{I}$ . Esto es,  $P_n$  tiene al menos un cero con multiplicidad impar en  $\overset{\circ}{I}$ . Sean  $x_1, \dots, x_k \in \overset{\circ}{I}$  los ceros de multiplicidad impar de  $P_n$  que están en  $\overset{\circ}{I}$ . Consideramos entonces el polinomio

$$q(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_k).$$

Entonces  $q(x)P_n(x)$  es un polinomio que no tiene ceros de multiplicidad impar en  $\overset{\circ}{I}$ , por lo que  $q(x)P_n(x) \geq 0 \forall x \in I$ . Por tanto,  $\mathcal{L}[q(x)P_n(x)] > 0$ , pero esto contradice el teorema 1.1 salvo que  $k = n$ , luego necesariamente  $P_n(x)$  tiene  $n$  ceros simples en  $\overset{\circ}{I}$ .  $\square$

A partir de este teorema, podemos denotar los ceros del polinomio  $P_n(x)$  como

$$x_{n1} < x_{n2} < \cdots < x_{nn}, \quad n \geq 1.$$

**Observación 1.4.** Si tomamos  $P_n$  con coeficiente líder positivo, entonces tenemos que

1.  $P_n(x) > 0 \quad \forall x > x_{nn}$  y
2.  $\text{sgn} P_n(x) = (-1)^n \quad \forall x < x_{n1}$ .

**Observación 1.5.**  $P'_n$  tiene exactamente un cero en cada intervalo  $(x_{n,k}, x_{n,k+1})$ , por lo que  $P'_n(x_{nk})$  alterna su signo con  $k = 1, \dots, n$ . Como el signo de  $P'_n(x)$  también es positivo, concluimos que

$$\text{sgn} P'_n(x_{nk}) = (-1)^{n-k}, \quad k = 1, \dots, n. \quad (1.20)$$

Estas dos observaciones relacionan en cierto modo los ceros de  $P_n$  con el comportamiento de  $P'_n$ . El siguiente lema relaciona directamente la SPO  $\{P_n\}$  con la sucesión de las derivadas de los polinomios ortogonales  $\{P'_n\}$ .

**Lema 1.2.** Si  $\mathcal{L}$  es un funcional definido positivo y  $\{P_n\}$  es su SPO, entonces se verifica la desigualdad

$$P'_{n+1}(x)P_n(x) - P'_n(x)P_{n+1} > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (1.21)$$

Esta desigualdad es una consecuencia de la conocida *Identidad de Christoffel-Darboux* (véase [Chi11, Theorem 4.5]), y nos será de gran utilidad para probar el siguiente teorema.

**Teorema 1.10** (Serparación de los ceros). *Los ceros de  $P_n$  y de  $P_{n+1}$  están mutuamente separados. Es decir,*

$$x_{n+1,i} < x_{n,i} < x_{n+1,i+1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

*Demostración.* A partir de la desigualdad (1.21) obtenemos que  $P'_{n+1}(x)P_n(x) > 0$ , y si evaluamos en  $x = x_{n+1,k}$  se tiene que

$$P'_{n+1}(x_{n+1,k})P_n(x_{n+1,k}) > 0, \quad k = 1, \dots, n+1$$

Si aplicamos (1.20), tenemos que  $\text{sgn}P'_{n+1}(x_{n+1,k}) = (-1)^{n+1-k}$ , por lo que para que se cumpla la desigualdad necesariamente  $\text{sgn}P_n(x_{n+1,k}) = (-1)^{n+1-k}$ . Esto es,  $P_n(x)$  tiene que cambiar de signo un número de impar de veces en el intervalo  $(x_{n+1,k}, x_{n+1,k+1})$ , y como esto ocurre para todo  $k$ , necesariamente  $P_n$  tiene un único cero en cada uno de los  $n$  intervalos  $(x_{n+1,k}, x_{n+1,k+1})$ ,  $k = 1, \dots, n$ .  $\square$

Este teorema tiene una consecuencia inmediata

**Corolario 1.11.** *Para cada  $k \geq 1$ , la sucesión  $\{x_{nk}\}$  es estrictamente decreciente y la sucesión  $\{x_{n,n-k+1}\}$  es estrictamente creciente.*

*De hecho, los límites*

$$\xi_k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{nk}, \quad \eta_k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n,n-k+1}$$

*existen para todo  $k = 1, \dots, n$ , pudiendo tomar los valores  $\pm\infty$ .*

Estos límites nos llevan a la siguiente definición

**Definición 1.10** (Verdadero Intervalo de Ortogonalidad). El intervalo cerrado  $[\xi_1, \eta_1]$  es conocido como el **Verdadero Intervalo de Ortogonalidad** de la SPO asociada al funcional  $\mathcal{L}$ .

Este intervalo recién presentado es el intervalo cerrado más pequeño que contiene todos los ceros de todos los polinomios de la SPO  $\{P_n\}$ . Es posible probar que el conjunto de todos los ceros de todos los  $P_n$ , llamémoslo  $I$ , es un soporte de  $\mathcal{L}$ , por lo que el verdadero intervalo de ortogonalidad es además el intervalo cerrado más pequeño que es un soporte de  $\mathcal{L}$ .

En muchos casos se presenta una familia de polinomios ortogonales mediante un funcional y un intervalo  $(a, b)$  en el cual se verifica la ortogonalidad. El conjunto  $I$  de

todos los ceros es un conjunto denso en  $(a, b)$ , de forma que su adherencia,  $[\xi_1, \eta_1]$ , coincide con el intervalo de ortogonalidad.

Sin embargo, recordemos que mediante el teorema de Favard también podemos obtener funcionales definidos positivos a partir de una sucesión de polinomios  $\{P_n\}$  y sucesiones de números reales  $\{\beta_n\}, \{\gamma\}$  verificando ciertas condiciones. Dicho funcional no especifica el intervalo de ortogonalidad, el cual se puede obtener entonces mediante los ceros de los polinomios  $\{P_n\}$ .

TODO Demostraciones de todo y preguntar si esto está bien o entendí seriamente mal

**Ejemplo 4.** Como ejemplo, véamos los ceros de los polinomios de Tchebichef de tipo I, que están todos situados en el intervalo  $[-1, 1]$ . En la imagen 1.1 hemos representado<sup>3</sup> gráficamente los polinomios de Tchebichef para  $n = 2, 3, 4, 5$ , asignando los colores rojo, verde, azul y negro respectivamente, señalando los ceros de cada polinomio con su color correspondiente.

Obsérvese que en efecto estos ceros están entrelazados, de forma que un cero rojo está entre dos ceros verdes; uno verde entre dos azules y uno azul entre dos negros.

Además, el primer cero de cada polinomio es cada vez menor, de forma que el primer cero negro es el más pequeño. Análogamente, el último cero es cada vez mayor, siendo el negro el más pequeño de todos. Este hecho ejemplifica el corolario 1.11 con  $k = 1$ .




Imagen 1.1: Polinomios de Tchebichef de tipo I y sus ceros

Los ceros de los polinomios ortogonales tienen un papel importante, por ejemplo, en fórmulas de integración numérica, ya que tomar los nodos en los ceros de los polinomios ortogonales reduce considerablemente el error en la integración. Una aplicación bastante directa podrían ser las fórmulas de cuadratura gaussiana (véase [Chi11, Ch. I, Sección 6]). También serán relevantes en los próximos capítulos al jugar  $\xi_1$  un papel importante en el soporte de la medida. Incluso tienen una interpretación en el campo del equilibrio electrostático (véase [Ste18]).

<sup>3</sup>En el archivo `software/ceros.ipynb`, también disponible en la URL <https://github.com/JAntonioVR/Polinomios-Ortogonales/blob/main/software/ceros.ipynb>, puede encontrarse el código con el cual se han generado las imágenes, pudiendo ser ejecutado o incluso modificado para visualizar las gráficas con grados superiores a 5 u otras familias de polinomios.

En el capítulo 1 hemos mostrado una amplia introducción a la ortogonalidad y presentado ejemplos concretos de polinomios ortogonales. En este capítulo presentaremos las familias concretas de polinomios ortogonales más importantes: los *polinomios ortogonales clásicos*. Estos son los polinomios de Hermite, Laguerre, Jacobi y Bessel. Estas familias presentan la peculiaridad de ser las únicas que verifican ciertas propiedades, entre las que destaca la *ecuación diferencial de Pearson*. Estos polinomios, entre otras disciplinas pueden ser encontrados en problemas de Sturm-Liouville cuando se utilizan ecuaciones diferenciales hipergeométricas.




Imagen 2.1: Polinomios Ortogonales Clásicos

En las imágenes 2.1 podemos ver la representación gráfica, para parámetros concretos que definiremos próximamente, de los polinomios ortogonales de Hermite, Laguerre y Jacobi. Estas tres son las familias que mayor atención recibirán de nuestra parte al ser aquellas cuya ortogonalidad se manifiesta en intervalos reales.

## 2.1. La ecuación de Pearson

Para empezar, introduciremos una nueva notación para los funcionales de momentos que también se suele utilizar. Sea  $\mathbf{u}$  un funcional de momentos y  $\{\mu_n\}$  su sucesión de

momentos, entonces denotamos

$$\begin{aligned} \mathbf{u} : \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x^n &\longmapsto \langle \mathbf{u}, x^n \rangle = \mu_n \end{aligned} \quad (2.1)$$

A lo largo de este capítulo denotaremos como  $\langle \mathbf{u}, \pi(x) \rangle$  a la aplicación del funcional  $\mathbf{u}$  a un polinomio  $\pi(x)$ .

Definimos a continuación dos operadores que actúan sobre los funcionales.

**Definición 2.1** (Producto por un polinomio). Para cada polinomio  $\pi$ , definimos un nuevo funcional de momentos a partir de  $\mathbf{u}$  como

$$\begin{aligned} \pi \mathbf{u} : \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \phi &\longmapsto \langle \pi \mathbf{u}, \phi \rangle = \langle \mathbf{u}, \pi \phi \rangle \end{aligned} \quad (2.2)$$

**Definición 2.2** (Derivada). Definimos el funcional derivada como

$$\begin{aligned} D(\mathbf{u}) : \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \phi &\longmapsto \langle D(\mathbf{u}), \phi \rangle = -\langle \mathbf{u}, \phi' \rangle \end{aligned} \quad (2.3)$$

A partir de estos dos operadores y esta nueva notación daremos una primera definición de lo que es una SPO clásica.

**Definición 2.3** (SPO Clásica). La SPO  $\{P_n\}$  para el funcional  $\mathbf{u}$  se dice que es **clásica** (Hermite, Laguerre, Jacobi o Bessel) si existen polinomios  $\sigma(x), \tau(x)$  con  $\deg(\sigma) \leq 2$  y  $\deg(\tau) = 1$  tales que el funcional  $\mathbf{u}$  verifica la ecuación diferencial

$$D(\sigma \mathbf{u}) = \tau \mathbf{u} \quad (2.4)$$

La ecuación (2.4) es conocida como la **ecuación de Pearson**.

En el caso de que la SPO sea ortogonal respecto a una función peso  $\rho$  con momentos finitos, esto es,  $\mathbf{u}$  es de la forma

$$\langle \mathbf{u}, \pi(x) \rangle = \int_a^b \pi(x) \rho(x) dx, \quad (2.5)$$

donde  $(a, b)$  es cierto intervalo de la recta real donde  $\rho > 0$  y  $\left| \int_a^b x^k \rho(x) dx \right| < \infty$  ( $k \geq 0$ ), podemos deducir una condición equivalente.

**Lema 2.1.** Sean  $\rho(x)$  una función peso positiva en el intervalo  $(a, b)$  con momentos finitos,  $\mathbf{u}$  el funcional definido como en (2.5) y  $\{P_n\}$  la SPO respecto a  $\mathbf{u}$ . Si la función peso  $\rho(x)$  es solución de la ecuación diferencial

$$[\sigma(x)\rho(x)]' = \tau(x)\rho(x) \quad (2.6)$$

y además verifica las condiciones de frontera

$$\lim_{x \rightarrow a} \sigma(x)\rho(x)x^n = \lim_{x \rightarrow b} \sigma(x)\rho(x)x^n, \quad n \geq 0, \quad (2.7)$$

entonces la SPO  $\{P_n\}$  es clásica, *i.e.*  $\mathbf{u}$  verifica la ecuación de Pearson (2.4).

*Demostración.* Queremos comprobar la igualdad de funcionales  $D(\sigma \mathbf{u}) = \tau \mathbf{u}$ . Para ello, tengamos en cuenta que dos funcionales lineales son iguales si, y solo si actúan igual sobre una base de  $\mathbb{P}$ . Escogemos la base  $\{x^n\}_{n \geq 0}$ . Entonces tenemos que

$$\langle D(\sigma \mathbf{u}), x^n \rangle = -\langle \sigma \mathbf{u}, nx^{n-1} \rangle = -\langle \mathbf{u}, \sigma(x)nx^{n-1} \rangle,$$

aplicando (2.5) e integración por partes, llegamos a

$$\begin{aligned} \langle D(\sigma \mathbf{u}), x^n \rangle &= -\int_a^b \sigma(x)nx^{n-1}\rho(x)dx = \left\{ \begin{array}{ll} u = \sigma(x)\rho(x) & du = [\sigma(x)\rho(x)]'dx \\ dv = nx^{n-1}dx & v = x^n \end{array} \right\} \\ &= -\underbrace{[\sigma(x)\rho(x)x^n]_a^b}_{=0 \text{ por (2.7)}} + \int_a^b x^n[\sigma(x)\rho(x)]'dx \quad (\text{aplicando (2.6)}) \\ &= \int_a^b x^n\tau(x)\rho(x)dx = \langle \mathbf{u}, \tau(x)x^n \rangle = \langle \tau \mathbf{u}, x^n \rangle \end{aligned}$$

□

REVIEW El recíproco tiene que ser cierto, pero no tengo la demostración

## 2.2. Deducción de las familias de polinomios ortogonales clásicos

A partir del lema 2.1 podremos obtener las principales familias de polinomios ortogonales. Hemos impuesto que  $\tau(x) = Ax + B$  sea un polinomio de grado exactamente 1, por lo que tenemos cuatro grados de libertad a partir de las posibilidades de  $\sigma(x)$ , que supondremos mónico:

1. **Caso I:**  $\sigma(x) = 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . En este caso obtendremos los llamados polinomios de Hermite.
2. **Caso II:**  $\sigma(x) = x - a$ ,  $x \in [a, \infty)$ . Haciendo el cambio de variable lineal  $t = -(x - a)/A$  se tiene  $\sigma(x) = x$  y  $\tau(x) = -x + B$ ,  $x \in [0, \infty)$ . Con estos valores calcularemos los polinomios de Laguerre.
3. **Caso III:**  $\sigma(x) = (x - a)(b - x)$ ,  $x \in [a, b]$ . Con el cambio de variable  $x = (b - a)/2t + (a + b)/2$  podemos escribir  $\sigma(x) = 1 - x^2$  y  $\tau = Ax + B$ ,  $x \in [-1, 1]$ . Y así deduciremos los polinomios de Jacobi.
4. **Caso IV:**  $\sigma(x) = (x - a)^2$ . En este último caso se obtienen los polinomios de Bessel.

Obsérvese que, a pesar de que  $\sigma(x)$  puede estar definida en todo  $\mathbb{R}$ , tan sólo utilizamos valores de  $x$  en los que  $\sigma(x) \geq 0$ . La justificación de esta elección se encontrará más adelante cuando resolvamos la ecuación de Pearson en cada caso, aunque adelantamos que los intervalos elegidos son los que hacen que la función peso  $\rho$  sea positiva.

De acuerdo al lema 2.1, si resolvemos la ecuación diferencial (2.6) asegurándonos de que las soluciones calculadas verifiquen las condiciones de frontera (2.7), habremos hallado las funciones peso  $\rho(x)$  para las cuales el funcional (2.5) genera una SPO clásica. Nos centraremos principalmente en los casos I, II y III, en los cuales obtenemos un funcional definido positivo.

### 2.2.1. Caso I: Polinomios de Hermite

Supongamos que  $\sigma(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$ . Tenemos entonces la ecuación diferencial

$$\rho'(x) = (Ax + B)\rho(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Esta ecuación es de variables separadas, por lo que podemos tomar

$$\begin{aligned} \int \frac{\rho'(x)}{\rho(x)} dx &= \int (Ax + B) dx \Leftrightarrow \log(\rho(x)) = \frac{A}{2}x^2 + Bx + \log(C) \Leftrightarrow \\ \rho(x) &= Ce^{\frac{A}{2}x^2 + Bx} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Si queremos que los momentos sean finitos, necesariamente debemos imponer  $A < 0$ . Por su parte,  $B$  es indiferente para la convergencia de los momentos una vez se fija  $A$ . Por este motivo, podemos reducir el caso genérico mediante un cambio de variable lineal al caso  $A = -2, B = 0$ . Tomamos  $C = 1$  y llegamos a

$$\sigma(x) = 1, \quad \tau(x) = -2x, \quad \rho(x) = e^{-x^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2.8)$$

Sobre las condiciones de frontera, tenemos que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-x^2} x^n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$ . Por tanto, la sucesión de polinomios ortogonales con respecto al funcional

$$\langle \mathbf{u}, \pi(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \pi(x) e^{-x^2} dx \quad (2.9)$$

es clásica, y sus elementos son los **polinomios de Hermite**, normalmente denotados como  $\{H_n(x)\}_{n \geq 0}$ .

### 2.2.2. Caso II: Polinomios de Laguerre

Supongamos que  $\sigma(x) = x$  y  $\tau(x) = Ax + B$  con  $x \in [0, +\infty)$ . La ecuación (2.6) queda entonces como

$$(x\rho(x))' = (Ax + B)\rho(x),$$

que si derivamos el primer producto y agrupamos equivale a  $x\rho'(x) = (Ax + B - 1)\rho(x)$ , que es de nuevo una ecuación de variables separadas, de manera que

$$\begin{aligned} \int \frac{\rho'(x)}{\rho(x)} dx &= \int \frac{Ax + B - 1}{x} dx \Leftrightarrow \log(\rho(x)) = Ax + (B - 1)\log(x) + \log(C) \Leftrightarrow \\ \rho(x) &= Ce^{Ax} x^{B-1} \neq 0 \quad \forall x \in [0, +\infty). \end{aligned}$$

De nuevo, para que los momentos resulten finitos exigimos  $A < 0$  y  $B > 0$ , y salvo cambio de escala podemos reducir el problema al caso  $A = -1$ . Tomamos  $C = 1$  y definimos  $\alpha = B - 1$ , de forma que

$$\sigma(x) = x, \quad \tau(x) = -x + \alpha + 1, \quad \rho(x) = x^\alpha e^{-x} \quad \forall x \in [0, +\infty), \quad \alpha > -1. \quad (2.10)$$

En este caso, las condiciones de frontera también se cumplen, pues  $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot x^\alpha e^{-x} \cdot x^n = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot x^\alpha \cdot e^{-x} x^n = 0$ . Así, la SPO con respecto al funcional

$$\langle \mathbf{u}, \pi(x) \rangle = \int_0^\infty \pi(x) x^\alpha e^{-x} dx, \quad \alpha > -1 \quad (2.11)$$

es clásica, y sus elementos son los **polinomios de Laguerre**, que son denotados con  $\{L_n^{(\alpha)}(x)\}_{n \geq 0}$ .



### 2.2.3. Caso III: Polinomios de Jacobi

Por último, consideremos  $\sigma(x) = 1 - x^2$  y  $\tau(x) = Ax + B$  con  $x \in [-1, 1]$ . Aplicado a la ecuación (2.6) tenemos

$$((1 - x^2)\rho(x))' = (Ax + B)\rho(x),$$

Derivando el primer miembro y agrupando obtenemos a  $(1 - x^2)\rho'(x) = (Ax + B + 2x)\rho(x)$ . Si dividimos y multiplicamos el segundo miembro por  $\sigma(x)$  y dividimos la ecuación por  $\sigma(x)\rho(x)$  obtenemos la ecuación

$$\frac{(\sigma(x)\rho(x))'}{\sigma(x)\rho(x)} = \frac{Ax + B}{1 - x^2}.$$

Resolveremos esta ecuación en la que  $(\sigma\rho)$  es la incógnita. Una vez resuelta podremos deducir la solución de (2.6).

$$\int \frac{(\sigma(x)\rho(x))'}{\sigma(x)\rho(x)} dx = \int \frac{Ax + B}{1 - x^2} dx \Leftrightarrow$$

$$\log(\sigma(x)\rho(x)) = -\frac{A+B}{2} \log(1-x) - \frac{A-B}{2} \log(1+x) + \log(C) \Leftrightarrow$$

$$\sigma(x)\rho(x) = C(1-x)^{-\frac{A+B}{2}}(1+x)^{-\frac{A-B}{2}} \Leftrightarrow$$

$$\rho(x) = C(1-x)^{-\frac{A+B}{2}-1}(1+x)^{-\frac{A-B}{2}-1} \neq 0 \quad \forall x \in [-1, 1].$$

Para que los momentos del funcional sean finitos, exigimos que  $A, B$  verifiquen  $\frac{A+B}{2} < 0, \frac{A-B}{2} < 0$ . Tomamos  $C = 1$  y definimos  $\alpha = -\frac{A+B}{2} - 1$  y  $\beta = -\frac{A-B}{2} - 1$ , obteniendo

$$\begin{aligned} \sigma(x) &= 1 - x^2, & \tau(x) &= -(\alpha + \beta + 2)x + (\beta - \alpha), \\ \rho(x) &= (1-x)^\alpha(1+x)^\beta \quad \forall x \in [-1, 1], \quad \alpha, \beta > -1. \end{aligned} \tag{2.12}$$

Las condiciones de frontera se verifican nuevamente, pues

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1} (1 - x^2) \cdot (1 - x)^\alpha(1 + x)^\beta \cdot x^n = 0.$$

Así, la SPO con respecto al funcional

$$\langle \mathbf{u}, \pi(x) \rangle = \int_{-1}^1 \pi(x)(1-x)^\alpha(1+x)^\beta dx, \quad \alpha, \beta > -1 \tag{2.13}$$

es clásica, y sus elementos son los **polinomios de Jacobi**, denotados como  $\{P_n^{(\alpha, \beta)}(x)\}_{n \geq 0}$ .

Resumiendo, tenemos tres familias de polinomios ortogonales clásicos además de la Bessel: Hermite, Laguerre y Jacobi. En la tabla 2.1 recogemos los datos más importantes sobre cada una de ellas: la notación, el intervalo de ortogonalidad y las funciones  $\sigma(x)$ ,  $\tau(x)$  y  $\rho(x)$  involucradas en las ecuaciones de Pearson.

Familia	Notación	Intervalo	$\sigma(x)$	$\tau(x)$	$\rho(x)$
Hermite	$H_n(x)$	$(-\infty, \infty)$	1	$-2x$	$e^{-x^2}$
Laguerre	$L_n^{(\alpha)}(x)$	$[0, \infty)$	$x$	$-x + \alpha + 1$	$x^\alpha e^{-x}$
Jacobi	$P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$	$[-1, 1]$	$1 - x^2$	$-(\alpha + \beta + 2)x + (\beta - \alpha)$	$(1 - x)^\alpha (1 + x)^\beta$

Tabla 2.1: Resumen sobre las SPO clásicas

## 2.3. Caracterizaciones

Hasta el momento hemos podido conocer las distintas familias de polinomios ortogonales clásicos y su peculiaridad respecto a las distintas formas de presentar la ecuación de Pearson. Sin embargo, estos polinomios cumplen varias propiedades destacables que además los caracterizan como clásicos. Es decir, son los únicos polinomios ortogonales que las verifican. En esta sección estudiaremos algunas de estas propiedades.

Previamente, presentaremos un resultado que nos ahorrará el tener que probar las condiciones de frontera (2.7) cuando queramos comprobar que una SPO es clásica.

**Proposición 2.1.** Sean  $\rho(x)$  una función peso positiva en el intervalo  $(a, b)$ ,  $\mathbf{u}$  el funcional definido como en (2.5) y  $\{P_n\}$  una SPO respecto a  $\mathbf{u}$ . Entonces  $\{P_n\}$  es clásica si, y sólo si la función peso  $\rho(x)$  es solución de la ecuación diferencial

$$[\sigma(x)\rho(x)]' = \tau(x)\rho(x).$$

*Demostración.* Notemos que por el lema 2.1 esta proposición es cierta siempre que se cumplan las condiciones de frontera 2.7. Véamos que para cualquiera de los posibles valores de  $\sigma(x)$  y siendo  $\tau(x)$  un polinomio de grado 1 estas condiciones se verifican incluso antes de resolver la ecuación diferencial. En el caso III tenemos que  $\sigma(-1) = \sigma(1) = 0$ , por lo que la igualdad se verifica trivialmente. Sobre el caso II, tenemos  $\sigma(x) = x$ , de tal forma que  $\lim_{x \rightarrow 0} x\rho(x)x^n = 0$ . Véamos que ocurre cuando  $x \rightarrow \infty$ . Fijamos  $k \geq 0$ .

Consideramos la siguiente integral, en la que aplicamos en la primera igualdad el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow y en la segunda derivamos el integrando y aplicamos la ecuación de Pearson (2.6).

$$\int_0^x [t^k \sigma(t) \rho(t)]' dt = [t^k \sigma(t) \rho(t)]_{t=0}^{t=x} = \int_0^x [kt^{k-1} \sigma(t) \rho(t) + t^k \tau(t) \rho(t)] dt$$

Fijémonos en que si expandimos la última integral esta se reduce al cálculo de momentos, los cuales son finitos, por lo que si aplicamos límite cuando  $x \rightarrow \infty$  la última integral es finita. De esto deducimos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [t^k \sigma(t) \rho(t)]_{t=0}^{t=x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^k \sigma(x) \rho(x) =: A_k \Rightarrow |A_k| < \infty.$$

Por otro lado,

$$A_{k+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{k+1} \sigma(x) \rho(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x A_k.$$

La única forma de que exista  $A_{k+1}$  y sea finito es que ese último límite también lo sea, lo cual únicamente se verifica si  $A_k = \lim_{x \rightarrow 0} x^k \sigma(x) \rho(x) = 0$ ,  $k \geq 0$ . Por tanto, las condiciones

de frontera también se verifican en el caso II. Por último, el caso I, en el que  $\sigma(x) = 1$  es análogo al caso II:

$$\int_{-x}^x [t^k \rho(t)]' dt = [t^k \rho(t)]_{t=-x}^{t=x} = \int_{-x}^x [kt^{k-1} \rho(t) + t^k \tau(t) \rho(t)] dt$$

Como los momentos son finitos, al tomar límite en la última integral esta es finita. Esto es

$$\left| \lim_{x \rightarrow \infty} [t^k \rho(t)]_{t=-x}^{t=x} \right| =: B_k < \infty.$$

Como  $B_{k+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} x B_k < \infty$ , necesariamente  $B_k = 0$ ,  $k \geq 0$ , de donde  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k \rho(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^k \rho(x)$ .  $\square$

Este resultado afirma que el hecho de que un funcional  $\mathbf{u}$  definido a partir de una función peso  $\rho$  verifique (2.4) es equivalente a que  $\rho$  sea una solución de (2.6). De esta forma, tan sólo con comprobar que una función peso verifica la ecuación de Pearson podemos concluir que una SPO es clásica.

Con esta nueva herramienta presentamos la primera de las propiedades.

### 2.3.1. Ortogonalidad de las derivadas

La primera de estas caracterizaciones atiende a la sucesión  $\{P'_n\}$  formada por las derivadas de los elementos de una SPO  $\{P_n\}$ , que en el caso de los polinomios ortogonales clásicos resulta no sólo ser también una SPO, sino que además también es clásica.

**Teorema 2.1.** *Sea  $\{P_n\}$  una SPO clásica respecto a la función peso  $\rho(x)$ . Entonces la sucesión  $\{P'_n\}$  es una SPO respecto a  $\sigma(x)\rho(x)$ .*

*Demostración.* Al ser  $\{P_n\}$  una SPO y  $\tau(x)$  un polinomio de grado 1, tenemos que para  $k < n$ :

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b P_n(x) x^{k-1} \tau(x) \rho(x) dx \\ &= \int_a^b P_n(x) x^{k-1} [\sigma(x) \rho(x)]' dx \quad (\text{por (2.6).}) \end{aligned}$$

Si aplicamos integración por partes tomando

$$\left\{ \begin{array}{ll} u = P_n(x) x^{k-1} & du = P'_n(x) x^{k-1} + (k-1) P_n(x) x^{k-2} dx \\ dv = [\sigma(x) \rho(x)]' dx & v = \sigma(x) \rho(x) \end{array} \right\},$$

tenemos

$$0 = \underbrace{[P_n(x) x^{k-1} \sigma(x) \rho(x)]_a^b}_{=0 \text{ por (2.7)}} - \int_a^b P'_n(x) x^{k-1} \sigma(x) \rho(x) dx - (k-1) \underbrace{\int_a^b P_n(x) x^{k-2} \sigma(x) \rho(x) dx}_{=0 \text{ por la ortogonalidad de } \{P_n\}}.$$

Por tanto  $\int_a^b P'_n(x) x^{k-1} [\sigma(x) \rho(x)] dx = 0$  para  $k < n$ . Comprobemos ahora que  $\int_a^b P'_n(x) x^{n-1} [\sigma(x) \rho(x)] dx \neq 0$ .

Si procedemos análogamente para  $k = n$  llegamos a

$$\begin{aligned} \int_a^b P_n(x)x^{n-1}\tau(x)\rho(x)dx &= - \int_a^b P'_n(x)x^{n-1}\sigma(x)\rho(x)dx \\ &\quad - (n-1) \int_a^b P_n(x)x^{n-2}\sigma(x)\rho(x)dx. \end{aligned}$$

De esta igualdad deducimos

$$\int_a^b P'_n(x)x^{n-1}\sigma(x)\rho(x)dx = - \int_a^b P_n(x)[x^{n-1}\tau(x) + (n-1)x^{n-2}\sigma(x)]\rho(x)dx.$$

Y esta integral no es cero únicamente si  $x^{n-1}\tau(x) + (n-1)x^{n-2}\sigma(x)$  tiene grado  $n$ , o equivalentemente si  $\Delta(x) := x\tau(x) + (n-1)\sigma(x)$  tiene grado 2. Si  $\sigma(x)$  tiene grado 0 o 1 es claro que  $\Delta(x)$  tendrá grado 2. Si  $\sigma(x)$  tiene grado 2 entonces estamos en el caso III, en el que  $\sigma(x) = 1 - x^2$  y  $\tau(x) = -(\alpha + \beta + 2)x + \beta - \alpha$ . Con esta asunción,  $x\tau(x)$  tiene coeficiente líder negativo y  $(n-1)\sigma(x)$  también, por lo que el coeficiente de grado 2 de  $\Delta(x)$  será no nulo y por tanto  $\deg(\Delta) = 2$ . Es decir,  $\int_a^b P'_n(x)x^{n-1}\sigma(x)\rho(x)dx \neq 0$ .

Esto es,  $\{P'_n\}$  es una SPO respecto a  $\sigma(x)\rho(x)$ .  $\square$

A partir de este último resultado ya podemos probar la consecuencia que ya adelantábamos: la sucesión de las derivadas también es clásica.

**Corolario 2.2.** *Si la sucesión  $\{P_n\}$  una SPO clásica respecto a la función peso  $\rho(x)$ , entonces la sucesión  $\{P'_n\}$  también es clásica respecto  $\rho_1(x) = \sigma(x)\rho(x)$ , que es solución de la ecuación de Pearson*

$$[\sigma(x)\rho_1(x)]' = \tau_1(x)\rho_1(x), \quad (2.14)$$

donde  $\tau_1(x) = \tau(x) + \sigma'(x)$ .

*Demostración.* Tenemos que  $\{P'_n\}$  es una SPO respecto a  $\rho_1(x) = \sigma(x)\rho(x)$ . Tenemos además que

$$\begin{aligned} [\sigma(x)\rho_1(x)]' &= \sigma(x)[\sigma(x)\rho(x)]' + \sigma'(x)[\sigma(x)\rho(x)] \\ &= \sigma(x)\tau(x)\rho(x) + \sigma'(x)[\sigma(x)\rho(x)] \quad (\text{por (2.6) para } \rho(x)) \\ &= \underbrace{(\tau(x) + \sigma'(x))}_{\tau_1(x)}\rho_1(x). \end{aligned}$$

Nótese que  $\tau_1(x) = \tau(x) + \sigma'(x)$  es de nuevo un polinomio de grado 1. Por tanto,  $\rho_1$  es solución de la ecuación de Pearson, por lo que  $\{P'_n\}$  es una SPO clásica.  $\square$

Por inducción en las sucesivas derivadas  $\{P_n^{(k)}\}$  podemos deducir el siguiente resultado:

**Corolario 2.3.** *Si la sucesión  $\{P_n\}$  una SPO clásica entonces la sucesión  $\{P_n^{(k)}\}$  es una SPO clásica respecto a la función peso  $\rho_k(x) = \sigma^k(x)\rho(x)$ , que es solución de la ecuación*

$$[\sigma(x)\rho_k(x)]' = \tau_k(x)\rho_k(x), \quad (2.15)$$

donde  $\tau_k(x) = \tau(x) + k\sigma'(x)$ .

### 2.3.2. Ecuación diferencial hipergeométrica

A partir de la ortogonalidad de las derivadas podemos encontrar una interesante ecuación diferencial que veremos también caracteriza a las familias clásicas de polinomios ortogonales.

**Teorema 2.4.** *Sea  $\{P_n\}$  una SPO clásica respecto a la función peso  $\rho(x)$ . Entonces cada polinomio  $P_n(x)$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$  es solución de la ecuación diferencial*

$$\sigma(x)P_n''(x) + \tau(x)P_n'(x) + \lambda_n P_n(x) = 0, \quad (2.16)$$

$$\text{con } \lambda_n = -n \left( \tau' + (n-1) \frac{\sigma''}{2} \right) \in \mathbb{R}.$$

*Demostración.* Al ser  $\{P_n\}$  una SPO clásica, por el corolario 2.2  $\{P_n'\}$  es ortogonal y clásica respecto a  $\rho_1(x) = \sigma(x)\rho(x)$ . Esto es, para  $k < n$ :

$$0 = \int_a^b P_n'(x)(x^k)' \rho_1(x) dx. \quad (2.17)$$

Si aplicamos integración por partes y las condiciones de frontera (2.7), tenemos

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b x^k (P_n'(x) \rho_1(x))' dx \\ &= \int_a^b x^k (P_n''(x) \rho_1(x) + P_n'(x) \rho_1'(x)) dx \\ &= \int_a^b x^k (P_n''(x) \sigma(x) \rho(x) + P_n'(x) \tau(x) \rho(x)) dx \quad (\text{por (2.6)}) \\ &= \int_a^b x^k (P_n''(x) \sigma(x) + P_n'(x) \tau(x)) \rho(x) dx \end{aligned}$$

para todo  $k < n$ . Análogamente, teniendo en cuenta que para  $k = n$  la integral (2.17) no se anula, podemos comprobar que

$$\int_a^b x^n (P_n''(x) \sigma(x) + P_n'(x) \tau(x)) \rho(x) dx \neq 0.$$

Por el teorema 1.1, esto significa que la sucesión de polinomios  $\{P_n''(x) \sigma(x) + P_n'(x) \tau(x)\}$  es ortogonal respecto a la función peso  $\rho$ . Pero por el corolario 1.3, la SPO respecto a  $\rho$  es única salvo constante multiplicativa, de forma que para todo  $n \in \mathbb{N}_0$  existe una constante  $\lambda_n \in \mathbb{R}$  tal que

$$P_n''(x) \sigma(x) + P_n'(x) \tau(x) = -\lambda_n P_n(x).$$

Esto es,  $P_n(x)$  es solución de (2.16).

Comprobemos ahora la expresión de  $\lambda_n$  igualando las potencias  $x^n$  en (2.16). Si consideramos  $\sigma(x)$  un polinomio de grado 2 (considerando que  $\mathbb{P}_0 \subset \mathbb{P}_1 \subset \mathbb{P}_2$ ), tendríamos que su coeficiente líder es  $\sigma''(x)/2$ . Análogamente, el coeficiente líder de  $\tau(x)$  es  $\tau'$ . Denotamos  $\sigma'' \equiv \sigma(x)$ ,  $\tau' \equiv \tau(x)$  ya que ambas son constantes. Por otro lado, si  $c_n \neq 0$  es el coeficiente líder de  $P_n(x)$ , igualando los términos líderes de (2.16) obtenemos

$$\frac{\sigma''}{2} n(n-1) c_n + \tau' n c_n + \lambda_n c_n = 0 \Leftrightarrow \lambda_n = -n \left( \tau' + (n-1) \frac{\sigma''}{2} \right)$$

□

Naturalmente, al ser la sucesión de derivadas sucesivas  $\{P_n^{(k)}\}$  una SPO clásica, también verificarán su propia ecuación diferencial.

**Corolario 2.5.** *Si la sucesión  $\{P_n\}$  una SPO clásica, entonces cada polinomio  $P_n^{(k)}(x)$ ,  $k \geq 0, n \in \mathbb{N}_0$  es solución de la ecuación diferencial*

$$\sigma(x)[P_n^{(k)}(x)]'' + \tau_k(x)[P_n^{(k)}(x)]' + \lambda_n P_n^{(k)}(x) = 0, \quad (2.18)$$

con  $\lambda_n \in \mathbb{R}$  y donde  $\tau_k(x) = \tau(x) + k\sigma'(x)$ .

De forma general, la ecuación (2.16) es normalmente conocida como la **ecuación diferencial hipergeométrica**:

$$\sigma(x)y'' + \tau(x)y' + \lambda y = 0, \quad (2.19)$$

donde  $\deg(\sigma) \leq 2, \deg(\tau) \leq 1$ .

Esta ecuación veremos próximamente que es de hecho equivalente a la ecuación de Pearson.

Supongamos ahora que la ecuación (2.19) admite una solución polinómica de grado  $n$ , digamos  $y_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$ , con coeficiente líder  $c_n \neq 0$ . Por otro lado, sea  $\rho(x)$  una solución de la ecuación de Pearson (2.6):

$$[\sigma(x)\rho(x)]' = \tau(x)\rho(x). \quad (2.6)$$

Entonces podemos escribir la ecuación (2.19) en su forma **simétrica** o **conjugada**:

$$[\rho(x)\sigma(x)y']' + \lambda\rho(x)y = 0. \quad (2.20)$$

**REVIEW** Esto al final no lo uso para nada.

Como vemos, las soluciones de la ecuación de Pearson y las soluciones de la ecuación hipergeométrica están íntimamente relacionadas. Benjamin Olinde Rodrigues (1795–1851) demostró que las soluciones polinómicas de la EDO (2.19) pueden escribirse de una peculiar y compacta forma hoy llamada fórmula de Rodrigues, que veremos que también caracteriza a los polinomios ortogonales clásicos.

### 2.3.3. Fórmula de Rodrigues

Originalmente, Olinde Rodrigues (1816), James Ivory (1824) y Carl Gustav Jacobi (1827) introdujeron una fórmula inicialmente definida para los polinomios de Legendre, posteriormente extendida a todas las soluciones polinómicas de la ecuación hipergeométrica. El nombre de fórmula de Rodrigues fue propuesto por Eduard Heine en 1878, después de que Hermite recuperara en 1860 el trabajo original de Rodrigues y señalara que fue él el primero en descubrir esta fórmula. Ya anunciada la peculiaridad de esta fórmula, presentamos su aspecto y demostración en el siguiente resultado.

**Teorema 2.6 (Fórmula de Rodrigues).** *Las soluciones polinómicas de la ecuación hipergeométrica (2.19) se pueden expresar como*

$$y_n(x) = \frac{1}{\rho(x)} \frac{d^n}{dx^n} (\rho(x)\sigma^n(x)), \quad (2.21)$$

donde  $\rho(x)$  es una solución de la ecuación de Pearson (2.6).

*Demostración.* Por simplicidad en la notación, en esta demostración será omitida y asumida la dependencia de  $x$  en las distintas funciones. Al ser  $\rho$  una solución de la ecuación de Pearson (2.6), tenemos que

$$\begin{aligned}\sigma(\rho\sigma^n)' &= \sigma(\sigma^{n-1} \cdot \sigma\rho)' \\ &= \sigma((n-1)\sigma^{n-2}\sigma'\sigma\rho + \sigma^{n-1}\tau\rho) \\ &= \rho\sigma^n((n-1)\sigma' + \tau), \\ \sigma(\rho\sigma^n)' &= \rho\sigma^n((n-1)\sigma' + \tau)\end{aligned}\tag{2.22}$$

Derivamos ahora la ecuación (2.22)  $n+1$  veces y dividimos entre la función peso  $\rho(x)$ . Para derivar la ecuación (2.22)  $n+1$  veces aplicamos la fórmula de Leibniz<sup>1</sup> y tenemos en cuenta que, como  $\sigma$  tiene grado a lo sumo 2 el miembro de la izquierda se anularía a partir de la tercera derivada. Análogamente, como  $\sigma', \tau$  tienen grado a lo sumo 1 el miembro derecho se anularía a partir de la segunda derivada. Así:

$$\begin{aligned}\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(\sigma(\rho\sigma^n)') &= \sigma\frac{d^{n+2}}{dx^{n+2}}(\rho\sigma^n) + (n+1)\sigma'\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(\rho\sigma^n) + \frac{(n+1)n}{2}\sigma''\frac{d^n}{dx^n}(\rho\sigma^n), \\ \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(\rho\sigma^n((n-1)\sigma' + \tau)) &= ((n-1)\sigma' + \tau)\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(\rho\sigma^n) + (n+1)((n-1)\sigma'' + \tau')\frac{d^n}{dx^n}(\rho\sigma^n)\end{aligned}$$

Igualando los segundos miembros de ambas igualdades y dividiendo entre  $\rho$  obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{\sigma}{\rho}\frac{d^{n+2}}{dx^{n+2}}(\rho\sigma^n) + \frac{(n+1)\sigma'}{\rho}\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(\rho\sigma^n) + \frac{(n+1)n\sigma''}{2\rho}\frac{d^n}{dx^n}(\rho\sigma^n) = \\ \frac{(n-1)\sigma' + \tau}{\rho}\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(\rho\sigma^n) + \frac{(n+1)((n-1)\sigma'' + \tau')}{\rho}\frac{d^n}{dx^n}(\rho\sigma^n)\end{aligned}\tag{2.23}$$

Nuestro objetivo ahora es manipular (2.23) de forma que podamos comprobar que una función  $y_n$  dada como en (2.21) es una solución de la ecuación hipergeométrica (2.19). Si en (2.23) agrupamos términos y teniendo en cuenta la definición de  $y_n$ , tenemos la ecuación

$$\frac{\sigma}{\rho}\frac{d^{n+2}}{dx^{n+2}}(\rho\sigma^n) + \frac{2\sigma' - \tau}{\rho}\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(\rho\sigma^n) - \left(\frac{n^2 - n - 2}{2}\sigma'' + (n+1)\tau'\right)y_n = 0.\tag{2.24}$$

Seguidamente, debemos ajustar la ecuación de manera que los factores  $1/\rho$  solo tengan  $n$  derivadas a su derecha. Para ello primero nos ayudamos de la siguiente identidad:

$$\frac{\sigma}{\rho}\frac{d^{n+2}}{dx^{n+2}}(\rho\sigma^n) = \sigma\left(\frac{1}{\rho}\frac{d^n}{dx^n}(\rho\sigma^n)\right)'' - 2\sigma(1/\rho)'\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(\rho\sigma^n) - \sigma(1/\rho)''\frac{d^n}{dx^n}(\rho\sigma^n).\tag{2.25}$$

Esta igualdad se puede deducir sin más que derivar dos veces el producto  $\left(\frac{1}{\rho}\right) \cdot \left(\frac{d^n}{dx^n}(\rho\sigma^n)\right)$  utilizando la fórmula de Leibniz e intercambiando miembros en la

---

<sup>1</sup>Fórmula de Leibniz: Sean  $u, v : I \rightarrow \mathbb{R}$  dos funciones reales  $n$ -veces derivables en  $I \subseteq \mathbb{R}$ , entonces se verifica en  $I$  que  $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$ .

igualdad. Si calculamos explícitamente las derivadas primera y segunda de  $1/\rho$  y aplicamos que, como consecuencia de la ecuación de Pearson (2.6), podemos deducir la identidad

$$\rho' = \rho \frac{\tau - \sigma'}{\sigma}. \quad (2.26)$$

Entonces la ecuación (2.25) puede reducirse a

$$\frac{\sigma}{\rho} \frac{d^{n+2}}{dx^{n+2}} (\rho \sigma^n) = \sigma y_n'' + \frac{2(\tau - \sigma')}{\rho} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (\rho \sigma^n) - \left( \sigma'' - \tau' - \frac{\tau - \sigma'}{\rho} \right) y_n. \quad (2.27)$$

Si ahora sustituimos (2.27) en (2.24), con algunas simplificaciones obtenemos

$$\sigma y_n'' + \frac{\tau}{\rho} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (\rho \sigma^n) - \left( \frac{n^2 - n}{2} \sigma'' + n\tau' - \frac{\tau(\tau - \sigma')}{\sigma} \right) y_n = 0. \quad (2.28)$$

El último paso es aplicar la identidad

$$\frac{\tau}{\rho} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (\rho \sigma^n) = \tau y_n' - \frac{\tau(\tau - \sigma')}{\sigma} y_n. \quad (2.29)$$

De forma similar a la ecuación (2.27), esta expresión se obtiene al derivar una sola vez el producto  $\left(\frac{1}{\rho}\right) \cdot \left(\frac{d^n}{dx^n}(\rho \sigma^n)\right)$ , intercambiando miembros de la igualdad y teniendo en cuenta el valor de  $\rho'$  deducido de la ecuación de Pearson.

Sustituyendo (2.29) en (2.27) llegamos finalmente a

$$\sigma y_n'' + \tau y_n' - \left( \frac{n^2 - n}{2} \sigma'' + n\tau' \right) y_n = 0. \quad (2.30)$$

Como  $\deg \sigma \leq 2$ ,  $\deg \tau \leq 1$ , tenemos que  $\frac{n^2 - n}{2} \sigma'' + n\tau'$  es una constante, por lo que concluimos que  $y_n$  en efecto es una solución de (2.19).

Para finalizar, tenemos que probar que la solución  $y_n$  dada por la fórmula de Rodrigues (2.21) es un polinomio de grado  $n$ . Observemos que, aplicando de nuevo la fórmula de Leibniz para la derivada, tendríamos

$$y_n = \frac{1}{\rho} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d^k \rho}{dx^k} \frac{d^{n-k} \sigma^n}{dx^{n-k}}. \quad (2.31)$$

Mediante inducción y utilizando (2.26) podemos probar que

$$\frac{d^k \rho}{dx^k} = \frac{\rho}{\sigma^k} P_k, \quad k \geq 0$$

donde  $P_k$  es un polinomio de grado a lo sumo  $k$ .

También podemos probar por inducción que

$$\frac{d^s \sigma^n}{dx^s} = \sigma^{n-s} Q_s, \quad 1 \leq s \leq n,$$

siendo  $Q_s$  un polinomio de grado a lo sumo  $s$ .



Teniendo en cuenta estas dos igualdades, tomando  $s = n - k$  y sustituyendo en (2.31), llegamos a que

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} \frac{d^n}{dx^n}(\rho \sigma^n) &= \frac{1}{\rho} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{\rho}{\sigma^k} P_k \sigma^k Q_{n-k} \\ &= \frac{1}{\rho} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \rho P_k Q_{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P_k Q_{n-k}, \end{aligned} \quad (2.32)$$

que en definitiva es un polinomio de grado a lo sumo  $n$ .

REVIEW Modificada esta prueba, pero falta asegurar que el grado es exactamente  $n$ . □

Como ya anunciamos en el teorema 2.4, los polinomios clásicos son soluciones polinómicas de la ecuación diferencial hipergeométrica. De acuerdo con este último resultado, podemos escribir los polinomios ortogonales clásicos mediante la fórmula de Rodrigues (2.21). Lo habitual es multiplicar la fórmula de Rodrigues por una constante  $B_n$ , la cual depende de la familia y de la estandarización que se desee. De esta forma, si  $\{P_n\}$  es una SPO clásica respecto a la función peso  $\rho(x)$ , entonces

$$P_n(x) = \frac{B_n}{\rho(x)} \frac{d^n}{dx^n}(\rho(x) \sigma^n(x)). \quad (2.33)$$

Y como ya anunciamos anteriormente, la fórmula de Rodrigues caracteriza a los polinomios ortogonales clásicos.

**Teorema 2.7.** *Si una SPO  $\{P_n\}$  respecto a una función peso  $\rho(x)$  se puede expresar mediante la fórmula de Rodrigues (2.33), entonces  $\{P_n\}$  es una SPO clásica.*

*Demostración.* Si tomamos  $n = 1$  en (2.33), obtenemos

$$\frac{P_1(x)}{B_1} \rho(x) = [\rho(x) \sigma(x)]'.$$

Si denotamos  $\tau(x) := \frac{1}{B_1} P_1(x)$ , que es claramente un polinomio de grado 1, tenemos que  $\rho(x)$  verifica la ecuación de Pearson (2.6), por lo que  $\{P_n\}$  es clásica. □

El conjunto completo de teoremas e implicaciones demostradas hasta el momento conforma el siguiente teorema de caracterización.

**Teorema 2.8.** *Sea  $\{P_n\}$  una SPO reales respecto a un funcional  $\mathbf{u}$  definido como en (2.5) a partir de la función peso  $\rho(x)$ . Sean  $\sigma(x), \tau(x)$  dos polinomios de grado a lo sumo 2 y exactamente 1 respectivamente. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1.  $\{P_n\}$  es una SPO clásica respecto a la función peso  $\rho(x)$ , solución de la EDO (2.6).
2. La sucesión de derivadas  $\{P'_n\}$  es una SPO clásica respecto a la función peso  $\rho_1(x) = \sigma(x)\rho(x)$ , solución de la EDO (2.14).

3. La sucesión de derivadas  $k$ -ésimas  $\{P_n^{(k)}\}$  es una SPO clásica respecto a la función peso  $\rho_k(x) = \sigma^k(x)\rho(x)$ , solución de la EDO (2.15).
4. Cada polinomio  $P_n(x)$  es solución de la ecuación diferencial hipergeométrica (2.19).
5.  $\{P_n\}$  puede ser expresado mediante la fórmula de Rodrigues (2.33).

**Ejemplo 5** (Fórmula de Rodrigues de los polinomios de Jacobi). Pongamos en práctica lo aprendido a partir de un ejemplo en el que emplearemos lo que sabemos hasta el momento de los polinomios de Jacobi. Atendiendo a la tabla 2.1, sabemos que

$$\sigma(x) = 1 - x^2, \quad \tau(x) = -(\alpha + \beta + 2)x + (\beta - \alpha) \quad \rho(x) = (1 - x)^\alpha(1 + x)^\beta,$$

con  $x \in [-1, 1]$ ,  $\alpha, \beta > -1$ . Con estos datos, tenemos que los polinomios de Jacobi  $P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$  son soluciones de la ecuación hipergeométrica

$$(1 - x^2)y'' - ((\alpha + \beta + 2)x + \alpha - \beta)y' + n(n + \alpha + \beta + 1)y = 0.$$

Y la fórmula de Rodrigues, teniendo en cuenta que se suele tomar  $B_n = \frac{(-1)^n}{2^n n!}$ , sería:

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} (1 - x)^{-\alpha} (1 + x)^{-\beta} \frac{d^n}{dx^n} (1 - x)^{n+\alpha} (1 + x)^{n+\beta}.$$

**Ejemplo 6** (Cálculo de la SPO de Hermite mediante la fórmula de Rodrigues). Recordemos el ejemplo 3, en el cual utilizamos la versión más primitiva de la RR3T para calcular de forma explícita los polinomios mónicos de Hermite. La fórmula de Rodrigues nos proporciona un nuevo método de cálculo explícito de polinomios, que es el que pondremos en práctica en este caso. En el archivo `software/Rodrigues.ipynb` se ha implementado el código necesario para este ejemplo.

De manera análoga a lo realizado en el ejemplo 5 y sabiendo que, por convenio, lo usual en los polinomios de Hermite es tomar  $B_n = (-1)^n$ , podemos deducir la siguiente fórmula de Rodrigues.

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

Así, obtenemos los polinomios de Hermite estándar, los cuales se pueden consultar en la segunda columna de la tabla 2.2. En este caso se ha hecho también un análisis de tiempos de ejecución siguiendo la misma metodología que en el ejemplo 3. Es decir, se han realizado 10 ejecuciones independientes de cada polinomio y el dato presentado en la cuarta columna de la tabla es la media de estas diez ejecuciones. Como puede observarse, el cálculo mediante la fórmula de Rodrigues mejora considerablemente los tiempos de ejecución de la RR3T, de forma que para ninguno de estos grados alcanza media décima de ejecución, mientras que la RR3T alcanzaba el orden de segundos a partir de grado 7.

De hecho, con la fórmula de Rodrigues se ha conseguido calcular el polinomio de Hermite de grado 500 en tan sólo 15 segundos, lo cual contrasta con los casi 60 segundos que tardó la RR3T en calcular el polinomio de grado 15.

Finalmente, y para cerrar esta sección, mencionaremos que en el apéndice A puede encontrarse una serie de tablas con toda la información descrita para cada familia de polinomios clásicos.

$n$	$H_n(x)$	RR3T	Rodrigues	Nativa
0	1	$1.1897 \times 10^{-5}$	0.0086	0.00019
1	$2x$	0.0133	0.0104	0.00028
2	$4x^2 - 2$	0.0449	0.0136	0.00035
3	$8x^3 - 12x$	0.1073	0.0133	0.00037
4	$16x^4 - 48x^2 + 12$	0.2161	0.0162	0.00041
5	$32x^5 - 160x^3 + 120x$	0.4162	0.0182	0.00051
6	$64x^6 - 480x^4 + 720x^2 - 120$	0.6752	0.0186	0.0186
7	$128x^7 - 1344x^5 + 3360x^3 - 1680x$	1.2009	0.0196	0.00054
8	$256x^8 - 3584x^6 + 13440x^4 - 13440x^2 + 1680$	2.0665	0.0305	0.00061
9	$512x^9 - 9216x^7 + 48384x^5 - 80640x^3 + 30240x$	3.5725	0.0229	0.00064

Tabla 2.2: Polinomios de Hermite y tiempos de cálculo de distintos métodos

## 2.4. Polinomios de Hermite, Laguerre y Jacobi

En la sección 2.2 redujimos las posibles familias reales de polinomios ortogonales clásicos a tres casos distintos: las familias de Hermite, Laguerre y Jacobi. Tanto los polinomios de Laguerre  $\{L_n^{(\alpha)}\}$ , como los de Jacobi  $\{P_n^{(\alpha,\beta)}\}$  dependen respectivamente de uno y dos parámetros, teniendo en todos los casos que cumplir que estos parámetros sean mayores que  $-1$ .

Por otro lado, en la sección 2.3 hemos visto algunas de las propiedades más relevantes que caracterizan a los polinomios ortogonales clásicos. En esta sección, teniendo presente la fórmula de Rodrigues que se introdujo en la sección 2.3.3, presentaremos y describiremos algunas gráficas de las familias de Hermite, Laguerre y Jacobi para comprender el impacto sobre estas de la variación de los parámetros y del grado del polinomio. Todas las gráficas que se presentan a lo largo de esta sección (y algunas más), pueden consultarse en el archivo `software/graficas-clasicos.ipynb`<sup>2</sup>. En este archivo además también pueden encontrarse gráficas interactivas en las que pueden modificarse dinámicamente los parámetros de cada polinomio, permitiendo así observar los cambios en las gráficas de manera visual.

### 2.4.1. Polinomios de Hermite

En el caso de la familia de polinomios de Hermite,  $\{H_n\}$ , estos no dependen de ningún parámetro, por lo que tan sólo mostraremos la variación de sus gráficas respecto al grado del polinomio. Véanse las imágenes 2.2.

La primera evidencia es que los polinomios son pares cuando el grado  $n$  es par, e impares cuando el grado es impar. Por otra parte, nótese que el rango de representación del eje  $X$  escogido en cada una de las tres imágenes es cada uno mayor que el anterior. Esto se debe a que se ha buscado representar todos los ceros de cada polinomio en la gráfica, y recordemos que el intervalo  $[x_{n1}, x_{nn}]$  es cada vez más grande conforme  $n$  aumenta

<sup>2</sup>Puede ser consultado en la URL <https://github.com/JAntonioVR/Polinomios-Ortogonales/blob/main/software/graficas-clasicos.ipynb>




Imagen 2.2: Polinomios de Hermite

(véase corolario 1.11). De hecho, si quisiéramos representar todos los ceros de todos los polinomios de Hermite sería imposible, pues el verdadero intervalo de ortogonalidad es  $I = (-\infty, +\infty)$ .

### 2.4.2. Polinomios de Laguerre

Los polinomios de Laguerre, tal y como indica su notación,  $\{L_n^{(\alpha)}\}$ , admiten un parámetro real  $\alpha > -1$ . Además, su intervalo de ortogonalidad es  $[0, +\infty)$ , por lo que representaremos subconjuntos acotados de este intervalo. En las imágenes 2.3 podemos ver gráficas de los polinomios de Laguerre para distintos valores de  $\alpha$  y un grado fijo. En particular, las imágenes 2.3(a) y 2.3(b) presentan gráficas para los polinomios de Laguerre de grado 2 y 3 respectivamente para valores de  $\alpha = 0, 1, 5, 15, 20, 25$ . El efecto que notamos es que a mayor valor de  $\alpha$  la cola derecha es más suave y el crecimiento (resp. decrecimiento) hacia  $+\infty$  (resp.  $-\infty$ ) es más lento conforme crece  $\alpha$ .

En la imagen 2.3(c) presentamos de nuevo polinomios de Laguerre de grado 3 pero con valores de  $\alpha$  pequeños en valor absoluto, concretamente  $\alpha = -0.9, -0.5, 0, 0.5, 1$ . Vemos que la conclusión es la misma que en las gráficas (a) y (b) salvo cambio de escala.




Imagen 2.3: Polinomios de Laguerre con distintos valores de  $\alpha$

Véamos ahora el efecto que tiene en las gráficas el aumento del grado  $n$ . Para ello, fijamos  $\alpha = 0$  y observamos algunas imágenes en las que se ha modificado el grado. En la imagen 2.4(a) podemos observar las gráficas de grados 0, 1 y 2, mientras que en la imagen (b) se representan los polinomios de grados 3, 4 y 5 y en la (c) los grados 6, 7 y 8.

En este caso no se presenta, al menos de manera evidente, ningún tipo de simetría o paridad como sí se manifestaba en el caso de los polinomios de Hermite. Por otro lado,




Imagen 2.4: Polinomios de Laguerre de distintos grados

nótese que la gráfica (b) está truncada, es decir, no aparecen todos los ceros de todos los polinomios. Por ejemplo, aunque sabemos que  $L_5^{(0)}$  tiene 5 ceros simples, únicamente representamos 4 de ellos con el objetivo de observar mejor las ondulaciones y curvas de las gráficas. Sin embargo, en la gráfica (c) sí hemos representado todos los ceros de los tres polinomios indicados, de forma que para que puedan visualizarse todos ellos en una misma gráfica se ha elegido el rango  $[0, 25]$  y hemos renunciado a los detalles de las curvas en valores más pequeños de  $x$ .

Podemos recordar entonces la discusión sobre los ceros ya introducida en la sección anterior. Los intervalos  $[x_{n1}, x_{nn}]$  son cada vez más amplios, de forma que el primer cero es cada vez más pequeño y cercano a cero, como puede verse en las imágenes 2.4 (a) y (b), mientras que el último cero crece sin límite. Esto se debe a que el verdadero intervalo de ortogonalidad en este caso es  $[0, +\infty)$ .

### 2.4.3. Polinomios de Jacobi

Por último, analizaremos los polinomios de Jacobi  $\{P_n^{(\alpha, \beta)}\}$ . Estos admiten hasta dos grados de libertad  $\alpha, \beta > -1$  y manifiestan su ortogonalidad en el intervalo  $[-1, 1]$ , lo cual facilita considerablemente la representación gráfica de estos polinomios.

Comenzaremos analizando el efecto del parámetro  $\alpha$ . Para ello, hemos fijado  $n = 2$  y  $\beta = 0$ , representando el polinomio de Jacobi  $P_2^{(\alpha, 0)}$  para los valores  $\alpha = 0, 1, 5, 15, 20, 25$ , véase la imagen 2.5(a). Obsérvese que, de forma similar a los polinomios de Laguerre, este parámetro interviene en la velocidad a la que aumenta la cola derecha. Sin embargo, lo hace de forma inversa, ya que mientras que a mayores valores de  $\alpha$  la inclinación era menor en los polinomios de Laguerre, en este caso conforme crece  $\alpha$  aumenta también la misma.

Respecto a  $\beta$ , para analizar su impacto en las gráficas fijamos  $n = 3$  y  $\alpha = 0$ , presentando los polinomios  $P_3^{(0, \beta)}$  para  $\beta = 0, 1, 5, 15, 20, 25$  en la imagen 2.5(b). El comportamiento de  $\beta$  es análogo al de  $\alpha$  pero en la cola izquierda en lugar de la derecha. Es decir, a mayor valor de  $\beta$ , mayor inclinación de la cola derecha, que en estas gráficas se traduce en un descenso a  $-\infty$  más pronunciado.

En los casos de Hermite y Laguerre hemos discutido también la paridad y/o simetría de los gráficos. A juzgar por las imágenes 2.5(a) y 2.5(b), los polinomios de Jacobi no cumplen ningún tipo de simetría en general. Sin embargo, en la imagen 2.5(c) puede comprobarse




Imagen 2.5: Polinomios de Jacobi con distintos valores de  $\alpha$  y  $\beta$

qué ocurre al igualar  $\alpha = \beta$ . En efecto, en este caso las gráficas son simétricas respecto al eje  $Y$  cuando el grado es par ( $P_{2n}^{(\alpha, \alpha)}$  es par). Respectivamente,  $P_{2n+1}^{(\alpha, \alpha)}$  es impar.

Finalmente, comprobemos gracias a las imágenes 2.6 la variación de estas gráficas al aumentar el grado cuando fijamos  $\alpha = \beta = 0$ .




Imagen 2.6: Polinomios de Jacobi de distintos grados

En estas tres figuras se puede comprobar más fácilmente la paridad e imparidad de los polinomios de Jacobi en el caso  $\alpha = \beta$  con respecto al grado  $n$ . Como además el intervalo de ortogonalidad es  $I = [-1, 1]$ , todos los ceros de estos polinomios están representados siempre en el mismo.

REVIEW: Nada más empezar. El título está bien así o lo llamo ‘procesos de Markov’ o algo similar?

Hasta este momento, en los dos primeros capítulos, nos hemos centrado totalmente en una introducción teórico-práctica a los polinomios ortogonales y sus principales propiedades, profundizando en las llamadas familias clásicas. En este capítulo explicaremos una teoría probabilística que, aparentemente, nada tiene que ver con los polinomios ortogonales, aunque estudiaremos la estrecha relación que hay entre ambas teorías en el capítulo 4.

En concreto, analizaremos desde un punto de vista general los llamados *procesos de Markov*, *procesos markovianos* o simplemente *cadenas de Markov*. Estos modelos, basados en estados, tratan de explicar las probabilidades de los posibles cambios de estado basándose en un principio denominado *propiedad de Markov*. Esta denominación tanto del modelo como de la propiedad se debe a Andrey Markov, matemático que fue el primero en estudiar, en la década de 1900, los procesos estocásticos con dicha propiedad, que posteriormente se popularizarían.

Nos centraremos principalmente en procesos discretos, es decir, consideramos que el tiempo se divide en instantes  $n = 0, 1, 2, \dots$ , sin olvidar que existe una teoría análoga en la que el tiempo es continuo  $t \in [0, \infty)$ . Denominamos *estado* a cualquiera de las situaciones en las que se puede encontrar el sistema en un instante determinado. Por ejemplo, pensemos en una región en la que hay  $N$  ciudades y dividimos el tiempo en años. Asumimos que un individuo siempre se encuentra asentado en una de estas ciudades aunque hay posibilidad de que de un año a otro se mude a otra distinta. Etiquetamos cada una de las ciudades con un número: ciudad 1, ciudad 2, ..., ciudad  $N$ .

### 3.1. Cadenas de Markov discretas. Matriz de transición

De forma general, consideramos un espacio de estados finito que con frecuencia denotaremos como  $S = \{1, \dots, N\}$  y dividimos el tiempo en instantes  $n = 0, 1, 2, \dots$ . Llamemos  $X_n \in S$  al estado del sistema en el instante  $n$ . La propiedad específica que

consideró Markov consiste en asumir que, suponiendo que el sistema se encuentra en un estado concreto en un instante concreto, la probabilidad de que ocurra una transición en el siguiente instante depende única y exclusivamente del estado actual.

**Definición 3.1** (Cadena de Markov). Un proceso estocástico  $\{X_n, n \geq 0\}$  en un espacio de estados  $S$  verifica la **propiedad markoviana** o **propiedad de Markov** si, para todo  $n \in \mathbb{N}_0$  y  $j, i, i_{n-1}, \dots, i_0 \in S$ :

$$P[X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0] = P[X_{n+1} = j | X_n = i]. \quad (3.1)$$

En caso de que el proceso cumpla la propiedad (3.1) se denominará **cadena de Markov discreta**.

Una cadena de Markov  $\{X_n, n \geq 0\}$  se llamará **homogénea** si, para todo  $n \in \mathbb{N}_0$ ,

$$P[X_{n+1} = j | X_n = i] = P[X_1 = j | X_0 = i]. \quad (3.2)$$

Es decir, la probabilidad de que en un instante  $n+1$  el sistema se encuentre en el estado  $j$  es independiente de lo que haya ocurrido en los instantes anteriores a  $n$ . Por ejemplo, aplicando esta propiedad al tiempo atmosférico podríamos afirmar que la probabilidad de que mañana llueva únicamente depende de si hoy ha llovido, sin tener en cuenta el clima de los días anteriores. En epidemiología, es como afirmar que el número de contagios de una enfermedad únicamente depende del número de contagios que haya habido el día anterior, independientemente del número de contagios de los días anteriores ni los posibles factores externos. Intuitivamente, no parece que esta suposición sea muy realista y no cabe esperar resultados precisos en predicciones futuras. Sin embargo, lo cierto es que es útil para hacernos una idea de lo que puede ocurrir a largo plazo con relativa exactitud y es muy utilizada a la hora de implementar medidas en ámbitos como la migración, la extinción de animales, uso de suelo, etc.

La probabilidad  $P[X_{n+1} = j | X_n = i]$  se denomina **probabilidad de transición en un paso** de la cadena en el instante  $n$ . Si además la cadena es homogénea, este valor es el mismo para todo instante  $n$ , de ahí el término ‘homogénea’. En adelante, cuando utilicemos el término ‘cadena de Markov’ nos estaremos refiriendo a una cadena de Markov homogénea. Una vez anulada la dependencia de  $n$ , introducimos una nueva notación:

$$p_{ij} := P[X_{n+1} = j | X_n = i], \quad \forall i, j \in \{1, \dots, N\}.$$

Con esta notación, y teniendo en cuenta que en un espacio de  $N$  estados existen  $N^2$  posibles transiciones, agrupamos todas estas probabilidades en una matriz.

**Definición 3.2** (Matriz de transición). Llamamos **matriz de transición** de una cadena de Markov  $\{X_n, n \geq 0\}$  a la matriz

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1N} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{N1} & p_{N2} & \cdots & p_{NN} \end{pmatrix}. \quad (3.3)$$



**Observación 3.1.** Obsérvese que la  $i$ -ésima fila corresponde a la distribución de la probabilidad saliente del estado  $i$ , mientras que la  $j$ -ésima columna describe la probabilidad entrante al estado  $j$ .

Presentamos a continuación dos propiedades directas de las matrices de transición.

**Proposición 3.1.** Sea  $\{X_n, n \geq 0\}$  una cadena de Markov sobre el espacio de estados  $S = \{1, \dots, N\}$  y cuya matriz de transición es  $P = (p_{ij})_{i,j=1,\dots,N}$ . Entonces

1.  $0 \leq p_{ij} \leq 1 \quad \forall i, j \in S$ .
2.  $\sum_{j=1}^N p_{ij} = 1 \quad \forall i \in S$  (todas las filas de  $P$  suman 1).

*Demostración.* La propiedad (1) es evidente teniendo en cuenta que  $p_{ij}$  es una probabilidad. Sobre la propiedad (2), tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N p_{ij} &= \sum_{j=1}^N P[X_{n+1} = j | X_n = i] \\ &= P[X_{n+1} \in S | X_n = i] \quad (\text{por el teorema de la probabilidad total}) \\ &= 1 \end{aligned}$$

□

A las matrices que cumplen estas dos propiedades se les denomina **matrices estocásticas** y pueden ser consideradas matrices de transición de alguna cadena de Markov.

**Ejemplo 7** (Tiempo atmosférico). Extraído de [Kul12][Ch. 2, Example 2.3]. Supongamos que podemos clasificar el tiempo de una ciudad como soleado (1), nublado (2) o lluvioso (3) y que el tiempo del día siguiente únicamente depende del tiempo del día anterior con las siguientes probabilidades:

- Si hoy hace sol, mañana estará nublado con probabilidad 0.3 y lloverá con probabilidad 0.2.
- Si hoy está nublado, mañana hará sol con probabilidad 0.5 y lloverá con probabilidad 0.3.
- Si hoy está lloviendo, mañana será un día soleado con probabilidad 0.4 y nublado con probabilidad 0.5.

Modelaremos este sistema mediante una cadena de Markov. Para ello, consideraremos la variable  $X_n \equiv$  “Tiempo atmosférico en el día  $n$ ”. Y consideramos el espacio de estados  $S = \{1 \equiv \text{soleado}, 2 \equiv \text{nublado}, 3 \equiv \text{lluvioso}\}$ . Atendiendo a las indicaciones anteriores y al ítem (2) de la proposición 3.1, la matriz de transición sería por tanto

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.5 & 0.2 & 0.3 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

### 3.2. Distribuciones transitorias

Hasta el momento nos hemos centrado en la adaptación de distintas situaciones de acuerdo a modelos de estados regidos por cadenas de Markov, que en el caso homogéneo concentra toda su información en una matriz estocástica que denominamos matriz de transición. Sin embargo, ya adelantamos en la introducción que la principal función de este método consiste en tratar de predecir el comportamiento de la variable  $X_n$  en algún instante futuro. Pongamos el caso del ejemplo 7 sobre el tiempo atmosférico. Podría interesar predecir el tiempo que va a hacer dentro de 2 o 3 días para posponer o no un evento por lluvia. En esta sección estudiaremos cómo podemos utilizar cadenas de Markov con este objetivo.

Sea  $\{X_n, n \geq 0\}$  una cadena de Markov discreta y homogénea sobre un espacio de estados  $S = \{1, \dots, N\}$ , una matriz de transición  $P$  y supongamos conocida la distribución inicial, que denotaremos en forma de vector columna como  $X_0 = (a_1, \dots, a_N)^T$ , donde  $a_i = P[X_0 = i]$ ,  $\forall i \in S$ . Se denomina **distribución transitoria** a la distribución que sigue la variable  $X_n$  para cierto  $n \geq 0$  fijo cuando es conocida la distribución de  $X_0$ .

Abordemos este problema con lo que conocemos hasta el momento. Tenemos que

$$\begin{aligned} P[X_n = j] &= \sum_{i=1}^N P[X_n = j | X_0 = i] P[X_0 = i] \\ &= a_i \sum_{i=1}^N P[X_n = j | X_0 = i]. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Por lo que nuestro problema se reduce a encontrar la probabilidad de que el proceso esté en el estado  $j$  tras  $n$  instantes suponiendo que inicialmente se encontraba en el estado  $i$ ,  $P[X_n = j | X_0 = i]$ . Esta probabilidad extiende a la que en su momento llamamos probabilidad de transición en un paso y, naturalmente, se denomina **probabilidad de transición en  $n$  pasos**. Utilizamos la notación

$$a_i^{(n)} := P[X_n = i], \quad p_{ij}^{(n)} := P[X_n = j | X_0 = i],$$

$\forall i, j \in \{1, \dots, N\}$ . De esta forma, buscar la distribución de  $X_n$  equivale a buscar la distribución del vector aleatorio  $a^{(n)} = (a_1^{(n)}, \dots, a_N^{(n)})^T$ . Análogamente al caso en el que considerábamos un único paso, agrupamos todos los posibles valores de  $p_{ij}^{(n)}$  en una matriz.

**Definición 3.3** (Matriz de transición en  $n$  pasos). Llamamos **matriz de transición en  $n$  pasos** de una cadena de Markov  $\{X_n, n \geq 0\}$  a la matriz

$$P^{(n)} = \begin{pmatrix} p_{11}^{(n)} & p_{12}^{(n)} & \cdots & p_{1N}^{(n)} \\ p_{21}^{(n)} & p_{22}^{(n)} & \cdots & p_{2N}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{N1}^{(n)} & p_{N2}^{(n)} & \cdots & p_{NN}^{(n)} \end{pmatrix}. \quad (3.5)$$

**Observación 3.2.** Si tomamos  $n = 0$ , tenemos que  $p_{ij} = \delta_{ij}$ ,  $i, j \in S$ . Esto es,  $P^{(0)} = I_N$ . Por otro lado, si  $n = 1$ , tenemos que  $P^{(1)} = P$ , la matriz de transición (3.3).

Así, podemos reescribir (3.4) de forma matricial como

$$a^{(n)} = P^{(n)} \cdot X_0.$$

Por lo que resta obtener un método para calcular la matriz de transición en  $n$  pasos,  $P^{(n)}$ . Este método nos lo da el siguiente teorema:

**Teorema 3.1** (Matriz de transición en  $n$  pasos). *Sea  $\{X_n, n \geq 0\}$  una cadena de Markov homogénea con matriz de transición  $P$ , entonces*

$$P^{(n)} = P^n. \quad (3.6)$$

*Demostración.* Consúltese [Kul12, Ch. II, theorem 2.2]. □

De este resultado obtenemos dos sencillas consecuencias:

**Corolario 3.2.** *La variable aleatoria  $X_n$  se distribuye según la función masa de probabilidad descrita por el vector aleatorio*

$$a^{(n)} = P^n X_0.$$

**Corolario 3.3.**

$$P[X_{n+m} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0] = P[X_{n+m} = j | X_n = i] = p_{ij}^{(m)},$$

$$j, i, i_{n-1}, \dots, i_0 \in S.$$

Seguidamente, presentamos una ecuación importante en este ámbito.

**Teorema 3.4** (Ecuación de Chapman-Kolmogorov). *Sea  $\{X_n, n \geq 0\}$  una cadena de Markov homogénea, entonces las probabilidades de transición en  $n$  pasos satisfacen la siguiente igualdad, denominada ecuación de Chapman-Kolmogorov.*

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k=1}^N p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}. \quad (3.7)$$

*Demostración.*

$$\begin{aligned} p_{ij}^{(n+m)} &= P[X_{n+m} = j | X_0 = i] \\ &= \sum_{k=1}^N P[X_{n+m} = j | X_n = k, X_0 = i] P[X_n = k | X_0 = i] \text{ (th. de la prob. total)} \\ &= \sum_{k=1}^N P[X_{n+m} = j | X_n = k] P[X_n = k | X_0 = i] \text{ (corolario 3.3)} \\ &= \sum_{k=1}^N P[X_m = j | X_0 = k] P[X_n = k | X_0 = i] \text{ (por la homogeneidad)} \\ &= \sum_{k=1}^N p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)} \end{aligned}$$

□

Si escribimos la ecuación (3.7) en forma matricial, tenemos que

$$P^{(n+m)} = P^{(n)} \cdot P^{(m)},$$

lo cual es evidente teniendo en cuenta el teorema 3.1. Intercambiando los roles de  $n$  y  $m$  llegamos a la conclusión de que las matrices  $P^{(n)}$  y  $P^{(m)}$  conmutan para todo  $n, m \geq 0$ . El teorema 3.1 es la clave del método para calcular las distribuciones transitorias, pues reduce el problema a potencias y multiplicaciones de matrices.

**Ejemplo 8.** Tratemos ahora un ejemplo distinto. En este caso nos centraremos en las variaciones interprovinciales. La tabla 3.1 muestra en cada celda el número de individuos que cambiaron su vivienda habitual desde la provincia indicada en la fila hacia la provincia indicada en la columna correspondiente (datos extraídos del INE: Instituto Nacional de Estadística).

Provincia	Alicante	Castellón	Valencia
Alicante	41.685	484	3.957
Castellón	369	11.059	2.232
Valencia	3.516	2.903	71.741

Tabla 3.1: Variaciones interprovinciales en la comunidad valenciana (2021)

Por su parte, la tabla 3.2 muestra la población de cada una de las provincias en el año 2021.

Provincia	Población
Alicante	1881762
Castellón	587064
Valencia	2589312

Tabla 3.2: Población de las provincias de la comunidad valenciana (2021)

Con estos datos y asumiendo que la población total permanece constante, ¿podemos comprobar la población de cada una de las provincias de la Comunidad Valenciana en el año 2022? ¿Y predecir las que habrá en el año 2023?

Antes de proceder al propio modelado, queremos mencionar que estos datos han sido manipulados y presentados utilizando el software estadístico R<sup>1</sup>. El archivo de ‘R Markdown’ `software/ejemplo-migraciones.Rmd` contiene el código fuente en R y algunas descripciones, mientras que el fichero `software/ejemplo-migraciones.html`, aunque tiene el mismo contenido, es un archivo compilado que es posible abrir con cualquier navegador web y en el que no es necesario ejecutar nada para visualizar las salidas de los distintos comandos<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Consúltese su página web <https://www.r-project.org/>.

<sup>2</sup>Ambos ficheros están disponibles en las URLs <https://github.com/JAntonioVR/Polinomios-Ortogonales/blob/main/software/ejemplo-migraciones.Rmd> y <https://github.com/JAntonioVR/Polinomios-Ortogonales/blob/main/software/ejemplo-migraciones.html>

Procedemos a modelar el problema como una cadena de Markov  $\{X_n, n \geq 0\}$ , donde  $X_n \equiv$  Distribución de la población total de la Comunidad Valenciana en el año  $2021+n$ . Esta cadena se construye sobre los estados

$$S = \{1 \equiv \text{'Alicante'}, 2 \equiv \text{'Castellón'}, 3 \equiv \text{'Valencia'}\}.$$

Podemos tomar una matriz asociada a la tabla 3.1 y a partir de ella construir la matriz de transición de la cadena, teniendo en cuenta que de esta matriz la celda  $(i, j)$  representa el número de migraciones de la provincia  $i$  a la provincia  $j$ . Sin embargo, es claro que la tabla 3.1 no verifica las condiciones de la proposición 3.1, por lo que no podemos formar directamente una matriz estocástica. De igual manera, el vector cuyas componentes son las de la tabla 3.2 no puede ser una función masa de probabilidad pues sus componentes no suman 1. Por suerte, estos problemas pueden solucionarse rápidamente sin más que dividir cada fila de la tabla 3.1 entre el total de cada fila y cada componente de la tabla 3.2 entre la suma de las tres celdas. De esta forma, tenemos la siguiente matriz de transición  $P$  y la distribución inicial  $X_0$ .

$$P = \begin{pmatrix} 0.90372024 & 0.01049300 & 0.08578676 \\ 0.02701318 & 0.80959004 & 0.16339678 \\ 0.04498465 & 0.03714176 & 0.91787359 \end{pmatrix}, \quad X_0 = \begin{pmatrix} 0.3720266 \\ 0.1160633 \\ 0.5119101 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, para conocer la distribución poblacional del año 2022 y la de 2023 simplemente tenemos que aplicar el teorema 3.1 y el corolario 3.2 para  $n = 1$  y  $n = 2$ . Así,

$$X_1 = PX_0 = \begin{pmatrix} 0.3813410 \\ 0.1876577 \\ 0.4909151 \end{pmatrix}, \quad X_2 = P^2X_0 = \begin{pmatrix} 0.3887086 \\ 0.2424410 \\ 0.4747224 \end{pmatrix}.$$

Por último, si lo que queremos es predecir la población (y no realmente su distribución), tendríamos que multiplicar estas distribuciones por la población total en 2021, obteniendo las poblaciones que recogemos en las tablas 3.3.

Provincia	2022	2023
Alicante	1.928.875,2	1.966.142
Castellón	949.198,8	1.226.300
Valencia	2.483.116,1	2.401.211

Tabla 3.3: Predicciones de la población de las provincias de la C. Valenciana en 2022 y 2023

REVIEW no me termina de convencer cómo he redactado el ejemplo, no sé si le doy el rigor suficiente.

### 3.3. Comportamiento límite

De nuevo, sea  $\{X_n, n \geq 0\}$  una cadena de Markov homogénea sobre un conjunto finito de estados  $S = \{1, \dots, N\}$ . Hasta el momento hemos aprendido a calcular la distribución

de la variable  $X_n$  para cualquier  $n \in \mathbb{N}_0$ , pero es el momento de preguntar qué ocurre con dicha distribución cuando  $n \rightarrow \infty$ . Surgen así varias preguntas: ¿La distribución de  $X_n$  converge a alguna distribución límite? ¿En caso de que converja, la distribución límite es única? ¿Cómo podríamos calcularla? En esta sección trataremos, de manera resumida, de responder a dichas preguntas.

### 3.3.1. Clasificación de los estados de una cadena de Markov

Antes de enunciar los principales resultados sobre existencia y unicidad de límite introducimos alguna terminología sobre las cadenas de Markov y sus estados.

**Definición 3.4.** Sean  $i, j \in S$  dos estados. Decimos que el estado  $j$  es **accesible** desde el estado  $i$  si existe algún  $k \geq 0$  tal que  $p_{ij}^{(k)} > 0$ . Decimos que los estados  $i$  y  $j$  **se comunican** o que son **comunicantes**, y lo denotamos como  $i \leftrightarrow j$ , si son accesibles entre ellos.

La siguiente proposición nos permitirá trabajar con cierta comodidad con la relación de comunicación.

**Proposición 3.2.** La ‘comunicación’ ( $\leftrightarrow$ ) es una relación de equivalencia sobre  $S$ .

*Demostración.* Consúltese [Ros83, Proposition 4.2.1]. □

**Definición 3.5** (Cadena de Markov irreducible). Una cadena de Markov  $\{X_n, n \geq 0\}$  sobre un conjunto de estados  $S$  es **irreducible** si todos sus estados se comunican entre sí, es decir, si el cociente  $S / \leftrightarrow$  consta de una sola clase de equivalencia. Una cadena de Markov que no es irreducible se dice **reducible**.

Nótese que la condición de cadena irreducible equivale a que sea posible llegar a cualquier estado  $j$  desde cualquier estado  $i$ . Podemos comprobarlo con la matriz de transición sin más que mirar las entradas correspondientes, pero existe un mecanismo más visual e intuitivo que la matriz de transición: el **diagrama de transición**.

Si una cadena de Markov  $\{X_n, n \geq 0\}$  sobre un conjunto de estados  $S = \{1, \dots, N\}$  tiene una matriz de transición  $P$ , podemos construir su diagrama de transición de la siguiente forma:

1. Dibujamos un nodo por cada posible estado, cada uno con su correspondiente etiqueta.
2. Para cada  $i, j \in S$ , trazamos una flecha desde el nodo  $i$  al nodo  $j$  únicamente si la entrada  $(i, j)$  de la matriz es estrictamente positiva. Esto es, si  $p_{ij} > 0$ . En caso de dibujar la flecha, es recomendable etiquetarla con el correspondiente valor de  $p_{ij}$ .


Entonces, podemos trasladar las anteriores definiciones con respecto al diagrama de Markov:

- Un estado  $j$  es accesible desde el estado  $i$  si, y solo si existe un camino en el diagrama de transición desde el nodo  $i$  hacia el nodo  $j$ .

- Dos estados  $i, j$  son comunicantes si, y solo si existe un camino del nodo  $j$  al  $i$  y viceversa.
- Una cadena es irreducible si, y solo si cada pareja de nodos es mutuamente accesible.

**Ejemplo 9.** 1. Supongamos una cadena de Markov cuya matriz y diagrama de transición son los siguientes:


$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



En este caso, la cadena sería irreducible.

2. Supongamos ahora que la matriz y el diagrama son: [REVIEW como alineo estas](#)

$$P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



[cosas sin meter 800 paquetes?](#)

Fijémonos que, aunque el estado 2 es accesible desde todos los estados, ni el estado 1 ni el 3 son accesibles desde el 2, lo cual impide que la cadena sea irreducible. Cuando un estado cumple esta propiedad se denomina estado *absorbente*, término que definiremos formalmente más adelante.

[REVIEW](#) [añado algo sobre tema de matrices reducibles/irreducibles?](#)

Hemos clasificado los estados según su accesibilidad, pero fijémonos ahora en la posibilidad de visitar o no un estado. En el ejemplo 9(1) es posible visitar cualquiera de los tres estados cada dos transiciones, mientras que en el ejemplo 9(2) es posible mantenerse estado 1 o en el 2 iteración tras iteración. Sobre esta noción insiste la siguiente definición.

**Definición 3.6** (Estado periódico, aperiódico y absorbente). Un estado  $i$  es **periódico** de periodo  $d_i$  si la cadena puede regresar a  $i$  en pasos múltiplos de  $d_i$ . Si  $d_i = 1$ , decimos que el estado  $i$  es **aperiódico**. Si ningún estado de la cadena es accesible desde el estado  $i$  (*i.e.*  $p_{ii} = 1$ ), entonces el estado  $i$  se denomina **absorbente**.

**Observación 3.3.** Si el estado  $j$  es comunicante con un estado periódico, entonces  $j$  es periódico.

Podemos extender esta definición a la cadena de Markov completa:

**Definición 3.7** (Cadena de Markov periódica y aperiódica). Sea  $\{X_n, n \geq 0\}$  una cadena de Markov homogénea, irreducible sobre un espacio de estados  $S = \{1, \dots, N\}$ . Sea  $d$  el mayor número entero tal que,

$$p_{ii}^{(n)} > 0 \Rightarrow d|n, \quad \forall i \in S. \quad (3.8)$$

Si  $d > 1$ , la cadena de Markov es **periódica**, si  $d = 1$  es **aperiódica**.

Nótese que una cadena periódica puede volver a su estado inicial en  $d, 2d, 3d, \dots$  transiciones. Lo interesante de esta definición y de que únicamente se aplique a cadenas irreducibles es que basta con hallar el mayor periodo  $d_i$  (según la definición 3.6) común a todos los estados, de forma que la irreducibilidad de la cadena garantiza que ese valor  $d$  es válido para todos los estados. Por otro lado, si  $p_{ii} > 0$  para algún estado  $i \in S$  en una cadena irreducible, necesariamente  $d = 1$  y la cadena es aperiódica.

**Observación 3.4.** La periodicidad también es fácil de consultar en los diagramas. Basta con definir un ciclo que empiece y termine en cada uno de los nodos. Entonces  $d$  es el máximo común divisor de las longitudes de estos ciclos.

Así, la cadena del ejemplo 9.1 es periódica con  $d = 2$ . Sin embargo, no podemos plantearnos la periodicidad de la cadena del ejemplo 9.2, ya que ésta no es irreducible.

[REVIEW Incluyo tema de estados absorbentes y transitorios?](#)

### 3.3.2. Teoremas límite

Una vez introducida la terminología principal de estados y cadenas, podemos estudiar la existencia y unicidad de una distribución límite. En primer lugar, vamos a asumir que existe al menos una distribución de probabilidad a la cual converge la distribución de  $X_n$ .

**Definición 3.8.** Llamamos **distribución límite** a la función masa de probabilidad a la cual converge la fmp de  $X_n$  cuando  $n$  tiende a infinito. Denotamos esta fmp como

$$\pi = (\pi_1, \dots, \pi_N)^T, \quad (3.9)$$

donde  $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} P[X_n = j], \quad j \in S$ .

[TODO Aclarar que denotamos con vectores las funciones masa de probabilidad y aclarar la abreviatura ‘fmp’ para que al personal no le pase como a mí](#)

Si asumimos la existencia de una distribución límite, esta debe cumplir ciertas propiedades.

**Proposición 3.3.** Si una cadena de Markov  $\{X_n, n \geq 0\}$  admite una distribución límite  $\pi$ , entonces ésta verifica las siguientes propiedades:

$$\pi_j = \sum_{i=1}^N \pi_i p_{ij}, \quad \forall j \in S \quad (1), \quad \sum_{j=1}^N \pi_j = 1 \quad (2) \quad (3.10)$$



*Demostración.* Aplicando el teorema de la probabilidad total y el teorema de la probabilidad condicionada, tenemos que

$$P[X_{n+1} = j] = \sum_{i=1}^N P[X_n = i]p_{ij}, \quad \forall j \in S. \quad (3.11)$$

Si tomamos límite en ambos miembros de la igualdad cuando  $n \rightarrow \infty$  y asumimos la existencia de esta distribución límite obtenemos la igualdad (1). La igualdad (2) se asume de la representación de  $\pi$  como una función masa de probabilidad.  $\square$

Las ecuaciones (3.10.1) también se escriben en forma matricial como

$$\pi = P \cdot \pi. \quad (3.12)$$

Esta ecuación matricial puede resolverse, y si normalizamos el vector obtenido de forma que la suma de sus componentes resulte 1, obtenemos un vector que denominaremos  $\pi^*$ . Supongamos ahora que  $a^{(0)} = \pi^*$ . Entonces, aplicando que es solución de (3.12),  $a^{(1)} = P \cdot \pi^* = \pi^*$ ,  $a^{(2)} = P^2 \pi^* = P(P \cdot \pi^*) = P \cdot \pi^* = \pi^*$ ,  $\dots$ ,  $a^{(n)} = \pi^*$ . Es decir, la distribución de  $X_n$ , representada por el vector  $a^{(n)}$ , es la misma siempre independientemente de  $n$  e igual a  $\pi^*$ . Es lo que en adelante denominaremos distribución estacionaria.

**Definición 3.9** (Distribución estacionaria). Una función masa de probabilidad dada por un vector  $\pi^* = (\pi_1^*, \dots, \pi_N^*)^T$ , se denomina **distribución estacionaria** de una cadena de Markov si

$$P[X_0 = i] = \pi_i^* \quad \forall i \in S \Rightarrow P[X_n = i] = \pi_i^* \quad \forall i \in S, n \geq 0 \quad (3.13)$$

Como vemos, las distribuciones límite y las distribuciones estacionarias guardan ambas una estrecha relación con las ecuaciones de la proposición 3.10, y vemos que también la tendrán la existencia y unicidad de una y otra.

**Proposición 3.4.** Una función masa de probabilidad dada por un vector  $\pi^* = (\pi_1^*, \dots, \pi_N^*)^T$  es una distribución estacionaria si, y solo si verifica las ecuaciones 3.10.

*Demostración.* Lo probaremos por doble implicación.

$\Rightarrow$  Supongamos que  $\pi^*$  cumple la propiedad de la definición 3.9. Si tomamos  $n = 0$  en (3.11) obtenemos

$$P[X_1 = j] = \sum_{i=1}^N P[X_0 = i]p_{ij}, \quad \forall j \in S.$$

Pero como  $P[X_0 = j] = \pi_j^*$  y  $P[X_1 = j] = \pi_j^*$ , sustituyendo obtenemos la igualdad (3.10.1). La ecuación (3.10.2) se deduce de que partimos de que  $\pi^*$  es una función masa de probabilidad representada en un vector.

$\Leftarrow$  Ahora asumimos que  $\pi^*$  verifica las ecuaciones (3.10). Consideramos entonces que  $P[X_0 = j] = \pi_j^*$ ,  $j \in S$ . De nuevo, tomando  $n = 0$  en (3.11):

$$P[X_1 = j] = \sum_{i=1}^N P[X_0 = i]p_{ij} = \sum_{i=1}^N \pi_i^* p_{ij} \underbrace{=}_{(3.10.1)} \pi_j^*.$$

Por lo que la fmp de  $X_1$  es  $\pi^*$ . Si usamos repetidamente (3.11) con distintos valores de  $n$ , deducimos que la fmp de  $X_n$  es  $\pi^*$  para cualquier  $n \geq 0$ . Esto es,  $\pi^*$  es una distribución estacionaria.

□

El hecho de que tanto distribuciones límite como distribuciones estacionarias cumplan las mismas ecuaciones tiene una consecuencia sencilla de comprobar.

**Corolario 3.5.** *Si una cadena admite una distribución límite, entonces ésta es también una distribución estacionaria.*

## CAPÍTULO 4

# POLINOMIOS ORTOGONALES Y PROCESOS DE NACIMIENTO Y MUERTE

**Ejemplo 10** (Procesos de nacimiento y muerte lineales). Sea el proceso de nacimiento y muerte dado por los parámetros

$$\lambda_n = (n + \beta)\kappa \qquad \mu_n = n\kappa,$$

donde  $\beta, \kappa > 0$ . Comprobaremos que los polinomios asociados a este proceso guardan una estrecha relación con los polinomios de Laguerre (TODO referencia a Laguerre).

Con estos parámetros, los polinomios de nacimiento y muerte  $Q_n(x)$  siguen la relación de recurrencia

$$\begin{aligned} -xQ_n(x) &= \lambda_n Q_{n+1}(x) - (\lambda_n + \mu_n)Q_n(x) + \mu_n Q_{n-1}(x) \Leftrightarrow \\ -xQ_n(x) &= (n + \beta)\kappa Q_{n+1}(x) - (2n + \beta)\kappa Q_n(x) + n\kappa Q_{n-1}(x) \end{aligned}$$

Si dividimos la ecuación entre  $\kappa$ , obtenemos

$$-\frac{x}{\kappa}Q_n(x) = (n + \beta)Q_{n+1}(x) - (2n + \beta)Q_n(x) + nQ_{n-1}(x) \quad (4.1)$$

Recordemos que los polinomios de Laguerre  $L_n^\alpha(x)$  obedecen a una relación de recurrencia a tres términos dada por

$$-xL_n^\alpha = (n + 1)L_{n+1}^\alpha(x) - (2n + \alpha + 1)L_n^\alpha(x) + (n + \alpha)L_{n-1}^\alpha(x), \quad (4.2)$$

con  $\alpha > -1$ . Tomamos entonces

$$Q_n(x) = \frac{n!}{(\beta)_n} L_n^{\beta-1} \left( \frac{x}{\kappa} \right), \quad (4.3)$$

Si tomamos  $\alpha = \beta - 1$ , evaluamos (4.2) en  $x/\kappa$  y multiplicamos ambos miembros de la igualdad por  $\frac{n!}{(\beta)_n}$ , podemos aplicar las siguientes igualdades en los términos en  $n + 1$  y en  $n - 1$ :

$$(n + 1) \left[ \frac{n!}{(\beta)_n} \right] L_{n+1}^{\beta-1} \left( \frac{x}{\kappa} \right) = (n + \beta) \frac{(n + 1)!}{(\beta)_{n+1}} L_{n+1}^{\beta-1} \left( \frac{x}{\kappa} \right) = (n + \beta) Q_{n+1}(x),$$

y

$$(\beta + n - 1) \left[ \frac{n!}{(\beta)_n} \right] L_{n-1}^{\beta-1} \left( \frac{x}{\kappa} \right) = n \frac{(n-1)!}{(\beta)_{n-1}} L_{n-1}^{\beta-1} \left( \frac{x}{\kappa} \right) = n Q_{n-1}(x).$$

Aplicando estas igualdades, tenemos que (4.2) es equivalente a (4.1).

Por tanto, los polinomios asociados al proceso de nacimiento y muerte de este ejemplo son los presentados en (4.3). Por tanto,  $Q_i(x)$  son ortogonales en  $[0, +\infty)$  con respecto a la función peso

$$\rho(x) = ce^{-x/\kappa} x^{\beta-1},$$

donde  $c$  es una constante de estandarización.

Por tanto, podemos calcular las probabilidades de transición aplicando la ecuación (TODO referencia) y teniendo en cuenta que

$$\pi_i = \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \cdots \mu_i} = \frac{\beta(\beta+1) \cdots (\beta+i-1)}{i!} = \frac{(\beta)_i}{i!}.$$

Tenemos entonces

$$\begin{aligned} P_{ij}(t) &= P[X_t = j / X_0 = i] \\ &= \pi_j \int_0^\infty e^{-xt} Q_i(x) Q_j(x) \rho(x) dx \\ &= c \frac{(\beta)_j}{j!} \int_0^\infty e^{-xt} \left[ \frac{i!}{(\beta)_i} L_i^{\beta-1} \left( \frac{x}{\kappa} \right) \right] \left[ \frac{j!}{(\beta)_j} L_j^{\beta-1} \left( \frac{x}{\kappa} \right) \right] e^{-\frac{x}{\kappa}} x^{\beta-1} dx \\ &= c \frac{(\beta)_i}{i!} \int_0^\infty e^{-x(t+\frac{1}{\kappa})} x^{\beta-1} L_i^{\beta-1} \left( \frac{x}{\kappa} \right) L_j^{\beta-1} \left( \frac{x}{\kappa} \right) dx. \end{aligned}$$

CONCLUSIONES

Las conclusiones



- [Alv03] Renato Alvarez Nodarse. *Polinomios hipergeométricos y q-polinomios (Monografías del Seminario matematico)*. Ene. de 2003.
- [AS64] Milton Abramowitz e Irene A. Stegun. *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*. ninth Dover printing, tenth GPO printing. New York: Dover, 1964.
- [AWH13] George B. Arfken, Hans J. Weber y Frank E. Harris. “Chapter 12 - Further Topics in Analysis”. En: *Mathematical Methods for Physicists (Seventh Edition)*. Ed. por George B. Arfken, Hans J. Weber y Frank E. Harris. Seventh Edition. Boston: Academic Press, 2013, págs. 551-598. ISBN: 978-0-12-384654-9. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384654-9.00012-8>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123846549000128>.
- [Chi11] Theodore Chihara. *An Introduction to Orthogonal Polynomials*. Dover Publications, feb. de 2011.
- [Dom22] Manuel Domínguez de la Iglesia. *Orthogonal polynomials in the spectral analysis of Markov processes : birth-death models and diffusion*. Encyclopedia of mathematics and its applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. ISBN: 9781316516553.
- [DX14] Charles Dunkl y Yuan Xu. *Orthogonal Polynomials of Several Variables: 155*. 2nd Revised ed. Cambridge University Press, ago. de 2014.
- [INE] INE - Instituto Nacional de Estadística. *INE. Instituto Nacional de Estadística*. URL: <https://www.ine.es/index.htm> (visitado 28-03-2023).
- [KM58] Samuel Karlin y James McGregor. “Linear Growth, Birth and Death Processes”. En: *Journal of Mathematics and Mechanics* 7.4 (1958), págs. 643-662. ISSN: 00959057, 19435274. URL: <http://www.jstor.org/stable/24900526> (visitado 03-03-2023).
- [Kul12] V. Kulkarni. *Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems*. New York, Estados Unidos: Springer Publishing, 2012.
- [MBP94] F. Marcellán, A. Branquinho y J Petronilho. “Classical orthogonal polynomials: A functional approach”. En: *Acta Applicandae Mathematica* 34 (1994), págs. 283-303. DOI: [10.1007/BF00998681](https://doi.org/10.1007/BF00998681). URL: <https://doi.org/10.1007/BF00998681>.

- [Ros83] Sheldon M. Ross. *Stochastic processes*. eng. Wiley series in probability and mathematical statistics. Probability and mathematical statistics. New York: John Wiley, 1983. ISBN: 0471099422.
- [Sch00] Wim Schoutens. *Stochastic Processes and Orthogonal Polynomials*. New York, Estados Unidos: Springer Publishing, 2000.
- [Ste18] Stefan Steinerberger. *Electrostatic Interpretation of Zeros of Orthogonal Polynomials*. 2018. DOI: [10.48550/ARXIV.1804.09697](https://arxiv.org/abs/1804.09697). URL: <https://arxiv.org/abs/1804.09697> (visitado 07-03-2023).
- [Tea23a] The Sage Development Team. *2D Graphics. Release 9.8*. 2023. URL: <https://doc.sagemath.org/pdf/en/reference/plotting/plotting.pdf> (visitado 07-03-2023).
- [Tea23b] The Sage Development Team. *Orthogonal polynomials - Functions*. 2023. URL: [https://doc.sagemath.org/html/en/reference/functions/sage/functions/orthogonal\\_polys.html](https://doc.sagemath.org/html/en/reference/functions/sage/functions/orthogonal_polys.html) (visitado 07-03-2023).



## APÉNDICE A

### TABLAS SOBRE POLINOMIOS ORTOGONALES CLÁSICOS

En este apéndice puede consultarse todo lo explicado sobre los polinomios ortogonales clásicos reales: ecuación de Pearson, intervalo de ortogonalidad, función peso, RR3T, ecuación diferencial hipergeométrica, fórmula de Rodrigues... Apéndice basado en las deducciones del capítulo 2 y en las tablas de [AS64, Ch. 22].

Familia de polinomios	Notación	Parámetros	Intervalo de ortogonalidad $I$
Hermite	$H_n(x)$	-	$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$
Laguerre	$L_n^{(\alpha)}(x)$	$\alpha > -1$	$\mathbb{R}_0^+ = [0, +\infty)$
Jacobi	$P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$	$\alpha, \beta > -1$	$[-1, 1]$

Tabla A.1: Generalidades sobre los PO clásicos

#### A.1. Relación de recurrencia a tres términos

Los PO clásicos satisfacen la relación de recurrencia

$$a_{1n}xP_n(x) = a_{2n}P_{n+1}(x) - a_{3n}P_n(x) + a_{4n}P_{n-1}(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}_0, \quad P_{-1} = 0, P_0 = 1,$$

donde

Familia	$a_{1n}$	$a_{2n}$	$a_{3n}$	$a_{4n}$
Hermite	2	1	0	$2n$
Laguerre	$-1$	$n + 1$	$2n + \alpha + 1$	$n + \alpha$
Jacobi	$(2n + \alpha + \beta)_3$	$\frac{2(n+1) \times}{\times (n + \alpha + \beta + 1) \times \times (2n + \alpha + \beta)}$	$\frac{(2n + \alpha + \beta + 1) \times}{\times (\alpha^2 - \beta^2)}$	$\frac{2(n + \alpha)(n + \beta) \times}{\times (2n + \alpha + \beta + 2)}$

Tabla A.2: Parámetros de la RR3T de las SPO clásicas

## A.2. Ecuación de Pearson

Las SPO clásicas son ortogonales respecto a una función peso  $\rho(x)$  definida en  $I$  que es solución de la ecuación de Pearson

$$[\sigma(x)\rho(x)]' = \tau(x)\rho(x),$$

donde:

Familia	$\sigma(x)$	$\tau(x)$	$\rho(x)$
Hermite	1	$-2x$	$e^{-x^2}$
Laguerre	$x$	$-x + \alpha + 1$	$x^\alpha e^{-x}$
Jacobi	$1 - x^2$	$-(\alpha + \beta + 2)x + (\beta - \alpha)$	$(1 - x)^\alpha (1 + x)^\beta$

Tabla A.3: Parámetros de la ecuación de Pearson

## A.3. Ecuación diferencial hipergeométrica

Los polinomios de Hermite, Laguerre y Jacobi son soluciones, para todo  $n \in \mathbb{N}_0$ , de las siguientes EDOs:

Familia	Ecuación diferencial hipergeométrica
Hermite	$(H_n)'' - 2x(H_n)' + 2nH_n$
Laguerre	$x(L_n^{(\alpha)})'' + [-x + \alpha + 1](L_n^{(\alpha)})' + nL_n^{(\alpha)}$
Jacobi	$[1 - x^2](P_n^{(\alpha, \beta)})'' + [-(\alpha + \beta + 2)x + (\beta - \alpha)](P_n^{(\alpha, \beta)})' + n(\alpha + \beta + n + 1)P_n^{(\alpha, \beta)}$

Tabla A.4: Ecuación diferencial que satisfacen los PO clásicos.

## A.4. Fórmulas de Rodrigues

Los polinomios de Hermite, Laguerre y Jacobi pueden ser calculados mediante las siguientes fórmulas de Rodrigues:

Familia	Fórmula de Rodrigues
Hermite	$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$
Laguerre	$L_n^{(\alpha)}(x) = \frac{1}{n!} x^{-\alpha} e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^{n+\alpha} e^{-x})$
Jacobi	$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} (1 - x)^{-\alpha} (1 + x)^{-\beta} \frac{d^n}{dx^n} (1 - x)^{n+\alpha} (1 + x)^{n+\beta}$

Tabla A.5: Fórmulas de Rodrigues de los PO clásicos.